

ESTADÍSTICAS 2017

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

**ENCUESTA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS
EN ESPAÑA (EIDADES), 1995-2015**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Luz Marina MORENO

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara FERREIRA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-001-3

ÍNDICE

1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015 16

Metodología

1.1.1.	Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2015	16
1.1.2.	Distribución de la muestra de la encuesta EDADES por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015	17
1.1.3.	Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (porcentajes). España, 2015	18

Prevalencia de consumo de drogas 1995-2015: evolución temporal. Edad y sexo

1.1.4.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	19
1.1.5.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	19
1.1.6.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	20
1.1.7.	Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	20
1.1.8.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	21
1.1.9.	Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2015	21
1.1.10.	Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2015	22
1.1.11.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015	22
1.1.12.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015	23
1.1.13.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015	24
1.1.14.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015	25
1.1.15.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015	26
1.1.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2015	27

1.1.17.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España 2015	27
1.1.18.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	28
1.1.19.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	30
1.1.20.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	32
1.1.21.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	34
1.1.22.	Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	35
1.1.23.	Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	36
1.1.24.	Prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	37
1.1.25.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de personas). España, 2015	37

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.1.26.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y edad media en el inicio de consumo de alcohol en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	38
1.1.27.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	38
1.1.28.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	39
1.1.29.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	39
1.1.30.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015	40
1.1.31.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	40
1.1.32.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2015	41
1.1.33.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	41
1.1.34.	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días según hayan consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días o no, en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	42
1.1.35.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2003-2015	42
1.1.36.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	43
1.1.37.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	43

1.1.38.	Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	44
1.1.39.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	44
1.1.40.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	45
1.1.41.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	45
1.1.42.	Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	46
1.1.43.	Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	46
1.1.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	47
1.1.45.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	47
1.1.46.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	47
1.1.47.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	48
1.1.48.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no. España, 2015	48
1.1.49.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho binge drinking en los últimos 30 días o no. España, 2015	48
1.1.50.	Prevalencia de botellón y del consumo de alcohol en botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	49
1.1.51.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015	49
1.1.52.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población, según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015 .	49

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.1.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	50
1.1.54.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	50
1.1.55.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015	51
1.1.56.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015	51

1.1.57.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	52
1.1.58.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015	52
1.1.59.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de formato de consumo que ha utilizado para fumar, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	53
1.1.60.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015	53

Consumo por tipo de drogas: cigarrillos electrónicos

1.1.61.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan nicotina, edad y sexo (porcentajes). España, 2015	54
1.1.62.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	54
1.1.63.	Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los que han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los que nunca han fumado (porcentajes). España, 2015	55
1.1.64.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años, según hayan consumido tabaco o no (porcentajes). España, 2015	55
1.1.65.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015 . . .	56
1.1.66.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	56
1.1.67.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido cannabis en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	56

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.1.68.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	57
1.1.69.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	57
1.1.70.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta e hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	58
1.1.71.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	58
1.1.72.	Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	59
1.1.73.	Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V \geq 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	59
1.1.74.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	60
1.1.75.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	60

1.1.76.	Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, según sexo (porcentajes). España, 2015	61
1.1.77.	Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2015	61
1.1.78.	Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	62
1.1.79.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y riesgo percibido ante el consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	62
1.1.80.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	63
1.1.81.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	63
1.1.82.	Perfil de la población que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses, según registren consumo problemático de hipnosedantes DSM-V >2 o no (porcentajes). España, 2015	64
1.1.83.	Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V ≥2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	65
1.1.84.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad (proporción de personas que piensan que adquirir la sustancia es fácil o muy fácil), según DSM-V ≥2 o no (porcentajes). España, 2015	65
1.1.85.	Prevalencia de borracheras y de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha respondido a la escala DSM-V para hipnosedantes, según el resultado sea DSM-V ≥2 o <2 (porcentajes). España, 2015	65

Consumo por tipo de drogas: cannabis

1.1.86.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	66
1.1.87.	Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	66
1.1.88.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	67
1.1.89.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	67
1.1.90.	Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	68
1.1.91.	Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	68
1.1.92.	Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	69
1.1.93.	Prevalencia y continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2015	70
1.1.94.	Prevalencia de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según el consumo de cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	70

1.1.95.	Número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	71
1.1.96.	Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015	71
1.1.97.	Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015	71
1.1.98.	Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	72
1.1.99.	Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	72
1.1.100.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	73
1.1.101.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	73
1.1.102.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo (porcentajes). España 2013, 2015	73
1.1.103.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años (porcentaje y estimación). España, 2013-2015	74
1.1.104.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2013-2015	74
1.1.105.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	75
1.1.106.	Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad, según puntuación en escala CAST (porcentajes). España, 2015	75
1.1.107.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	75
1.1.108.	Distribución según sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, frecuencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de consumo de otras drogas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según la puntuación obtenida, y entre la población general (porcentajes). España, 2015	76
1.1.109.	Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	77

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.1.110.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	77
1.1.111.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	78
1.1.112.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	78
1.1.113.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	79
1.1.114.	Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	79

1.1.115. Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	80
1.1.116. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1999-2015	80
1.1.117. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1999-2015	81
1.1.118. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015 . . .	81
1.1.119. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	82
1.1.120. Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	82
1.1.121. Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	83
1.1.122. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	83

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

1.1.123. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	84
1.1.124. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	84
1.1.125. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	85
1.1.126. Prevalencia de consumo de éxtasis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	85
1.1.127. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de éxtasis una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	86
1.1.128. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	86
1.1.129. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de éxtasis (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido éxtasis alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	87

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

1.1.130. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	87
1.1.131. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	88
1.1.132. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	88
1.1.133. Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	89

1.1.134. Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	89
1.1.135. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de anfetaminas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido anfetaminas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	90
1.1.136. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	90

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

1.1.137. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	91
1.1.138. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	91
1.1.139. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	92
1.1.140. Prevalencia de consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	92
1.1.141. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de alucinógenos (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido alucinógenos alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	93
1.1.142. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de alucinógenos una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	93
1.1.143. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de alucinógenos (conseguirlos en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	94
1.1.144. Prevalencia de consumo de setas alucinógenas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	94
1.1.145. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de setas alucinógenas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	95

Consumo por tipo de drogas: heroína

1.1.146. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	95
1.1.147. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	96
1.1.148. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de heroína una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	96
1.1.149. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	97

Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

1.1.150. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015 . . .	97
1.1.151. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	98

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.1.152. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	98
1.1.153. Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	99
1.1.154. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	99
1.1.155. Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	100
1.1.156. Prevalencias de consumo de diferente sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	101
1.1.157. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	102
1.1.158. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	102
1.1.159. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	103
1.1.160. Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2015	104
1.1.161. Proporción porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 30 días). España, 2015	104
1.1.162. Prevalencia de binge drinking y de intoxicaciones etílicas, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	105
1.1.163. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015	105
1.1.164. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015	106
1.1.165. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	106
1.1.166. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	107
1.1.167. Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	107
1.1.168. Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	108

Nuevas sustancias psicoactivas

1.1.169. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	109
1.1.170. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	109
1.1.171. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011-2015	110
1.1.172. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	110
1.1.173. Distribución de la población de 15-44 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no, según sexo, estado civil y nivel de estudios (porcentajes). España, 2015	111
1.1.174. Edad de inicio en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	111
1.1.175. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	112
1.1.176. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	112
1.1.177. Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según edad y sexo. España, 2015	112
1.1.178. Riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad y sexo. España, 2015	113
1.1.179. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se hayan consumido alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	113
1.1.180. Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas como GHB y ketamina (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	114
1.1.181. Vías de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	114
1.1.182. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice o salvia alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	114
1.1.183. Prevalencia de consumo de cinco o más sustancias psicoactivas alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se hayan consumido en alguna ocasión nuevas sustancias, ketamina, GHB, spice o salvia (porcentajes). España, 2015	115
1.1.184. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	115
1.1.185. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2015	116
1.1.186. Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según haya consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	117

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.1.187. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	118
1.1.188. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos, bastantes, pocos o ningún problema). España, 2015	119
1.1.189. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2015	119
1.1.190. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	120
1.1.191. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos), (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	121
1.1.192. Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	121
1.1.193. Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	122
1.1.194. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	122
1.1.195. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad (porcentajes). España, 2015	123

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.1.196. Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2015	124
---	-----

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre la importancia del problema del consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.197. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2015	124
1.1.198. Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2015	125

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas


1.1.199. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	126
1.1.200. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	127

1.1.201. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	127
1.1.202. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	128

Percepción del estado de salud en consumidores de drogas

1.1.203. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2015	128
1.1.204. Percepción de estado de salud bueno o muy bueno en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	129
1.1.205. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años, según se hayan consumido sustancias psicoactivas en los últimos 30 días o no (porcentajes fila). España, 2015	129


Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015

1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2015.



	Tamaño muestra (personas)
1995	8.888
1997	12.304
1999	12.234
2001	14.113
2003	12.033
2005	27.934
2007	23.715
2009	20.109
2011	22.128
2013	23.136
2015	22.541

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.2.

Distribución de la muestra de la encuesta EDADES por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015.

CCAA	DGPNSD ¹	Ampliación ²	Muestra final ³	Error muestral ⁴
Andalucía	2.207	-	2.207	2,1%
Aragón	860	-	860	3,3%
Asturias	777	-	777	3,5%
Islas Baleares	802	-	802	3,5%
Canarias	1.125	-	1.125	2,9%
Cantabria	572	410	982	3,1%
Castilla y León	1.174	-	1.174	2,9%
Castilla-La Mancha	1.078	493	1.571	2,5%
Cataluña	2.041	-	2.041	2,2%
Comunidad Valenciana	1.674	754	2.428	2,0%
Extremadura	794	-	794	3,5%
Galicia	1.249	766	2.015	2,2%
Comunidad de Madrid	1.932	-	1.932	2,2%
Murcia	937	-	937	3,2%
Navarra	595	-	595	4,0%
País Vasco	1.121	-	1.121	2,9%
La Rioja	420	319	739	3,6%
Ceuta	225	-	225	6,5%
Melilla	216	-	216	6,7%
Total	19.799	2.742	22.541	0,7%

1. Número de entrevistas financiadas por la DGPNSD.

2. Número de entrevistas financiadas por las CCAA.

3. Muestra final. Número de entrevistas realizadas.

4. Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p = q = 0,5$.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.3.

Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (porcentajes). España, 2015.

		Porcentaje
SEXO	Hombre	50,3
	Mujer	49,7
EDAD	15 - 24 años	14,5
	25 - 34 años	19,4
	35 - 44 años	24,8
	45 - 54 años	22,6
	55 - 64 años	18,6
ESTADO CIVIL	Soltero/a	38,7
	Casado/a	51,4
	Separado/a - Divorciado/a	7,7
	Viudo/a	2,2
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	14,8
	Estudios secundarios	65,7
	Estudios universitarios	19,5
NACIONALIDAD	Española	88,5
	Extranjera	11,5
CONVIVENCIA*	Solo	11,3
	Cónyuge / pareja	58,4
	Padre	16,8
	Madre	22,4
	Hijos	42,0
	Hermanos	12,3
	Abuelos	1,1

* La suma de porcentajes puede superar el 100% por tratarse de una pregunta en la que es posible seleccionar varias opciones de respuesta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.4.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	–	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Alcohol	–	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	8,3	10,2	8,8	10,3	9,1
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Tranquilizantes con o sin receta	–	–	–	–	–	7,0	13,0	11,0	17,1	20,1	–
Somníferos con o sin receta	–	–	–	–	–	4,6	6,0	6,3	7,9	9,6	–
Hipnosedantes sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	2,7	4,1
Tranquilizantes sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	2,2	–
Somníferos sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	1,5	–

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.5.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	–	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3	2,2	2,0
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Tranquilizantes con o sin receta	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8	10,6	–
Somníferos con o sin receta	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4	5,5	–
Hipnosedantes sin receta	–	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3
Tranquilizantes sin receta	–	2,0	2,0	2,5	2,5	0,9	0,9	1,6	0,9	0,9	–
Somníferos sin receta	–	1,2	1,3	1,6	1,6	0,8	0,8	1,1	0,6	0,6	–

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0	0,9
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	2,7	4,7	4,0	6,9	7,7	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9	2,1
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	2,1	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	1,7	2,6	2,3	4,0	5,9	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	1,1	1,1	1,4	1,7	3,1	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.8.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	72,5	40,2	38,5	30,8
Alcohol	93,5	77,6	62,1	9,3
Cannabis	31,5	9,5	7,3	2,1
Éxtasis	3,6	0,6	0,2	-
Alucinógenos	3,8	0,6	0,2	-
Anfetaminas/speed	3,6	0,5	0,2	-
Cocaína en polvo	8,9	1,9	0,9	-
Cocaína base	0,8	0,2	0,1	-
Cocaína polvo y/o base	9,1	2,0	0,9	-
Heroína	0,6	0,1	0,1	-
Inhalables volátiles	0,5	0,1	0,0	-
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	12,0	8,1	6,0
Hipnosedantes sin receta	4,1	2,3	0,9	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.9.

Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.10.

Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4
Alcohol	–	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4	20,5
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2	20,7
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	–	20,9	21,0	21,3	20,8
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	32,4	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6
Hipnosedantes sin receta	–	28,7	29,2	29,5	30,0	28,5	29,1	29,5	27,8	31,3	32,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.11.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015.

	2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M
Tabaco	77,6	65,7	77,5	68,6	77,1	67,9
Alcohol	94,0	87,7	95,0	91,3	95,3	91,7
Cannabis	35,4	19,2	37,9	22,7	40,1	22,8
Éxtasis	5,1	2,0	6,3	2,2	5,3	1,8
Alucinógenos	4,4	1,4	5,8	1,8	5,7	1,8
Anfetaminas/speed	4,8	1,7	5,7	1,8	5,4	1,9
Cocaína en polvo	12,7	4,7	14,9	5,4	13,3	4,6
Cocaína base	1,5	0,3	1,7	0,3	1,4	0,3
Cocaína polvo y/o base	12,8	4,7	15,0	5,4	13,4	4,7
Heroína	0,9	0,2	1,2	0,2	1,0	0,3
Inhalables volátiles	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2
Hipnosedantes con o sin receta	13,7	25,4	16,8	27,6	13,6	23,9
Hipnosedantes sin receta	2,1	2,6	2,6	2,8	3,3	4,9

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0	44,2	37,2	44,4	36,0
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9	83,2	73,4	82,9	72,1
Cannabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5	12,9	5,4	13,3	5,6
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,5	0,1	0,8	0,3
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	0,9	2,9	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	1,0	3,1	0,9
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Inhalables	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Hipnosedantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3	8,5	16,0	8,3	15,8
Tranquilizantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2	7,3	14,0	-	-
Somníferos																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9	3,7	7,3	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	2,9
Tranquilizantes sin receta	-	-	2,0	2,1	1,9	2,2	2,2	2,8	2,5	2,5	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0	0,8	1,0	-	-
Somníferos sin receta	-	-	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4	1,8	1,5	1,9	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7	0,6	0,7	-	-

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7	41,7	34,8	42,6	34,3
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2	73,4	55,3	71,3	52,8
Cannabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8	9,8	3,4	10,7	3,9
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,4	0,3
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,5	0,3
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4	5,8	12,1	5,4	10,8
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6	5,1	10,4	-	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7	2,6	5,5	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	1,1
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,5	0,4	-	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,3	0,2	-	-

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.14.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6	65,4	76,2
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7	91,2	94,7
Cannabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0	38,8	27,8
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2	4,7	3,0
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1	4,5	3,4
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2	4,3	3,3
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	11,6	9,4	9,3	8,8
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,6	1,0
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9	0,2	0,9
Inhalables	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,1	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5
Hipnosedantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	10,6	10,6	19,6	8,8	16,5	12,1	24,1	13,0	27,0	10,8	22,8
Tranquilizantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16,0	7,1	13,8	10,7	21,0	12,3	24,5	-	-
Somníferos																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3	5,1	12,2	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,5	2,3	2,8	2,6	4,8
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	1,9	2,3	-	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,4	1,0	1,7	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2	40,8	39,9
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7	79,2	76,7
Cannabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8	17,1	5,5
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2	1,3	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1	1,1	0,3
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5	3,0	1,3
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Inhalables	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Hipnosedantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,4	5,8	11,4	4,0	9,1	6,3	14,5	6,4	15,5	6,3	15,0
Tranquilizantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4	5,6	13,4	-	-
Somníferos																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9	2,4	7,1	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	2,3	2,4	1,9	2,7	2,8	2,9	2,5	3,6	1,0	1,3	1,3	1,1	1,8	1,9	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	2,7
Tranquilizantes sin receta	-	-	1,9	2,2	1,8	2,3	2,5	2,4	1,9	3,1	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9	0,8	1,0	-	-
Somníferos sin receta	-	-	1,0	1,4	1,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,9	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7	0,5	0,7	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2	38,4	38,6
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9	61,6	62,4
Cannabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5	12,9	4,4
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9	1,3	0,6
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,0	2,8	8,1	2,4	7,0	3,4	11,3	3,4	12,0	3,3	10,6
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5	2,9	10,4	-	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1,0	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7	1,4	5,5	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	1,0
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,3	0,5	-	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,2	0,3	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.17.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	9,3	14,5	4,1	1,4	2,0	0,9	4,5	7,4	1,7	7,6	11,8	3,0	12,1	18,8	6,1	19,6	30,2	8,2
Tabaco	30,8	34,2	27,3	23,9	25,3	22,4	34,1	38,7	29,4	32,8	36,1	29,2	34,8	37,5	32,4	25,3	30,5	19,7
Hipnosedantes con o sin receta	6,0	4,0	8,1	1,1	0,8	1,4	2,5	1,7	3,3	4,9	3,8	6,1	8,4	5,4	11,0	12,1	7,2	17,2
Cannabis	2,1	3,4	0,9	3,7	5,2	2,0	3,8	5,8	1,7	2,1	3,5	0,7	1,1	1,9	0,3	0,5	0,9	0,0
	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años								
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M						
Alcohol	1,0	0,7	1,3	9,6	14,9	4,2	3,2	5,0	1,3	12,5	19,3	5,5						
Tabaco	7,5	6,4	8,5	31,5	35,1	28,0	29,7	32,9	26,5	31,4	35,0	27,8						
Hipnosedantes con o sin receta	0,9	0,2	1,5	6,2	4,1	8,3	1,9	1,3	2,5	8,1	5,3	10,9						
Cannabis	0,9	1,7	0,2	2,2	3,4	0,9	3,7	5,6	1,9	1,3	2,2	0,4						

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.18.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	93,5	95,3	91,7	87,5	89,0	86,0	93,9	95,8	91,9	94,5	95,7	93,2	95,6	97,0	94,3	94,0	97,3	90,5
Tabaco	72,5	77,1	67,9	57,4	60,0	54,7	71,3	74,9	67,7	74,2	77,7	70,4	79,5	82,4	77,0	74,8	86,1	62,9
Cigarrillos electrónicos	6,8	7,3	6,3	7,9	8,9	6,9	8,5	9,7	7,2	6,4	6,5	6,3	6,7	6,7	6,6	5,0	5,4	4,6
Cigarrillos electrónicos con nicotina	5,3	5,8	4,8	5,7	6,6	4,7	6,6	7,7	5,5	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	4,1	4,8	3,4
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	13,6	23,9	7,1	5,8	8,6	13,5	10,7	16,3	19,3	15,7	23,2	24,0	16,6	30,7	25,8	16,3	35,8
Hipnosedantes sin receta	4,1	3,3	4,9	1,6	1,3	2,0	3,4	3,0	3,8	4,2	3,7	4,8	5,4	3,8	6,9	4,8	3,9	5,8
Cannabis	31,5	40,1	22,8	35,5	42,8	27,8	41,3	49,6	32,9	35,4	44,9	25,3	29,1	39,3	20,0	16,0	22,9	8,6
Cocaína en polvo	8,9	13,3	4,6	5,1	7,1	3,0	12,4	17,7	7,0	12,4	18,9	5,6	9,1	13,6	5,0	3,5	5,6	1,3
Cocaína base	0,8	1,4	0,3	0,5	0,8	0,2	0,6	0,9	0,3	1,1	1,9	0,3	1,2	2,2	0,3	0,5	0,7	0,2
Cocaína polvo y/o base	9,1	13,4	4,7	5,3	7,4	3,2	12,4	17,8	7,1	12,6	19,1	5,7	9,3	13,9	5,2	3,6	5,6	1,4
Éxtasis	3,6	5,3	1,8	3,2	4,4	2,0	5,8	8,4	3,2	5,1	7,7	2,4	2,5	3,9	1,2	0,8	1,1	0,4
Anfetaminas/speed	3,6	5,4	1,9	3,0	3,9	1,9	5,4	7,8	2,9	4,8	7,3	2,0	3,3	4,9	1,8	1,3	2,0	0,6
Alucinógenos	3,8	5,7	1,8	3,1	3,9	2,4	5,6	8,3	2,9	5,3	8,3	2,1	3,0	5,0	1,2	1,2	1,9	0,5
Heroína	0,6	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,1	0,7	1,1	0,3	1,2	2,0	0,5	0,6	0,9	0,3
Inhalables volátiles	0,5	0,7	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	0,3	0,8	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,1	0,2	0,0
Drogas inyectadas	0,5	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,4	0,6	0,3	0,9	1,4	0,4	0,5	0,8	0,2
Nuevas sustancias*	3,4	5,0	1,8	3,9	4,8	2,9	5,5	8,4	2,6	4,6	6,8	2,3	2,2	3,6	1,0	0,6	0,9	0,3
Ketamina	0,7	1,1	0,3	0,7	0,8	0,5	1,2	1,9	0,6	1,2	1,9	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
GHB	0,6	1,0	0,2	0,4	0,6	0,2	0,9	1,5	0,4	1,1	2,0	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0
Spice	0,8	1,1	0,5	0,5	0,7	0,3	1,2	1,9	0,6	1,1	1,6	0,7	0,7	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2
Mefedrona	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,6	1,0	0,2	0,7	1,1	0,2	1,0	1,6	0,4	0,9	1,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Setas mágicas	2,0	3,0	1,0	2,2	2,6	1,8	3,5	5,4	1,7	3,0	4,6	1,3	1,1	1,8	0,5	0,2	0,4	0,1
Salvia	0,5	0,8	0,1	0,6	1,1	0,0	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.18. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	66,6	65,0	68,2	94,4	96,2	92,5	91,2	92,9	89,4	94,7	96,6	92,9
Tabaco	31,1	32,2	30,2	73,8	78,4	69,1	65,4	68,5	62,2	76,2	81,6	70,7
Cigarrillos electrónicos	5,3	5,1	5,4	6,9	7,4	6,3	8,2	9,3	7,1	6,1	6,2	5,9
Cigarrillos electrónicos con nicotina	3,8	3,5	4,0	5,4	5,8	4,9	6,2	7,2	5,2	4,8	5,0	4,7
Hipnosedantes con o sin receta	3,7	3,6	3,8	19,1	13,9	24,5	10,8	8,6	13,0	22,8	16,2	29,4
Hipnosedantes sin receta	1,1	1,0	1,1	4,2	3,3	5,0	2,6	2,3	3,0	4,8	3,8	5,8
Cannabis	15,8	17,8	13,9	32,0	40,8	23,1	38,8	46,6	30,8	27,8	36,7	18,8
Cocaína en polvo	0,9	0,9	0,9	9,2	13,6	4,7	9,3	13,1	5,3	8,8	13,3	4,2
Cocaína base	0,3	0,6	0,0	0,8	1,4	0,3	0,6	0,8	0,3	1,0	1,6	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,4	0,9	9,4	13,8	4,8	9,4	13,3	5,4	9,0	13,5	4,3
Éxtasis	1,0	1,4	0,6	3,6	5,4	1,9	4,7	6,7	2,7	3,0	4,6	1,4
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,2	3,7	5,5	1,9	4,3	6,2	2,5	3,3	5,0	1,5
Alucinógenos	1,2	0,6	1,6	3,8	5,9	1,8	4,5	6,4	2,6	3,4	5,4	1,3
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,3	0,2	0,4	0,1	0,9	1,3	0,4
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	0,8	0,2
Drogas inyectadas	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,9	0,3
Nuevas sustancias*	1,9	0,8	2,8	3,4	5,1	1,7	4,8	6,8	2,7	2,7	4,0	1,3
Ketamina	0,1	0,2	0,0	0,7	1,1	0,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,9	0,2
GHB	0,1	0,3	0,0	0,6	1,1	0,2	0,7	1,1	0,3	0,6	1,0	0,1
Spice	0,0	0,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,9	1,4	0,5	0,7	1,0	0,5
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,2	0,6	1,0	0,2	0,9	1,4	0,3	0,5	0,8	0,2
Setas mágicas	0,9	0,1	1,7	2,1	3,1	1,0	3,0	4,2	1,7	1,6	2,5	0,7
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,5	0,8	0,1	0,7	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.19.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	77,6	82,9	72,1	78,4	80,5	76,1	79,8	86,1	73,4	77,8	82,6	72,6	79,1	84,2	74,5	72,3	80,5	63,7
Borracheras	16,8	22,3	11,2	35,1	41,3	28,5	26,5	34,6	18,3	14,8	21,3	8,0	9,1	13,8	4,8	4,5	6,0	2,9
Botellón	9,4	11,0	7,7	42,1	46,2	37,8	12,5	16,2	8,8	2,1	3,0	1,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,5	0,6
Botellón y alcohol	8,9	10,5	7,2	40,0	43,9	35,9	11,9	15,6	8,1	1,9	2,7	1,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,5
Tabaco	40,2	44,4	36,0	36,4	38,5	34,1	44,1	49,5	38,7	41,9	46,0	37,4	43,9	47,0	41,1	32,4	38,7	25,7
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	8,3	15,8	4,4	3,3	5,6	7,7	5,9	9,5	11,7	9,3	14,2	15,6	10,2	20,5	18,5	11,0	26,5
Hipnosedantes sin receta	2,3	1,6	2,9	0,9	0,5	1,4	1,8	1,4	2,2	2,4	2,0	2,7	2,9	1,7	3,9	3,0	2,2	3,7
Cannabis	9,5	13,3	5,6	19,9	25,4	14,2	15,0	21,3	8,7	8,9	12,9	4,6	4,7	7,4	2,3	2,0	2,6	1,4
Cocaína en polvo	1,9	2,9	0,9	2,6	3,6	1,6	3,2	5,1	1,3	2,3	3,7	0,9	1,1	1,6	0,5	0,4	0,6	0,1
Cocaína base	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Cocaína polvo y/o base	2,0	3,1	0,9	2,7	3,8	1,6	3,3	5,2	1,3	2,5	3,8	1,0	1,3	2,0	0,7	0,4	0,6	0,1
Éxtasis	0,6	0,9	0,3	1,7	2,3	1,0	1,0	1,5	0,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,3	1,2	1,5	0,8	1,0	1,4	0,5	0,5	0,9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	0,6	0,8	0,3	1,5	1,7	1,2	0,8	1,1	0,4	0,7	1,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Drogas inyectadas	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,9	1,3	0,4	2,0	2,6	1,5	1,2	2,0	0,4	0,9	1,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1
Ketamina	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,4	0,5	0,2	1,2	1,2	1,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,3	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.19. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	58,0	54,6	61,2	78,2	83,7	72,5	79,2	83,7	74,6	76,7	82,5	70,9
Borracheras	18,0	17,4	18,6	16,8	22,5	11,0	30,2	37,5	22,6	10,0	14,4	5,4
Botellón	31,7	30,4	32,9	8,7	10,4	6,9	25,2	29,2	21,1	1,2	1,5	1,0
Botellón y alcohol	29,5	26,4	32,2	8,2	10,0	6,4	23,9	27,9	19,9	1,1	1,4	0,8
Tabaco	20,6	18,2	22,7	40,8	45,2	36,4	40,8	44,7	36,7	39,9	44,2	35,6
Hipnosedantes con o sin receta	2,1	1,4	2,7	12,3	8,5	16,2	6,3	4,8	7,9	15,0	10,1	19,9
Hipnosedantes sin receta	0,4	0,3	0,6	2,3	1,7	3,0	1,4	1,0	1,9	2,7	2,0	3,4
Cannabis	12,6	12,5	12,8	9,4	13,3	5,4	17,1	23,1	11,0	5,5	8,2	2,9
Cocaína en polvo	0,4	0,8	0,0	1,9	3,0	0,9	3,0	4,5	1,4	1,3	2,1	0,6
Cocaína base	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1
Cocaína polvo y/o base	0,6	1,3	0,0	2,1	3,1	1,0	3,0	4,6	1,5	1,5	2,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,6	0,6	0,9	0,3	1,3	1,9	0,7	0,2	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,2	0,4	0,0	0,5	0,8	0,3	1,0	1,4	0,6	0,3	0,4	0,1
Alucinógenos	0,5	0,3	0,7	0,6	0,8	0,3	1,1	1,3	0,8	0,3	0,5	0,1
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Drogas inyectadas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,7	0,4	1,0	0,9	1,3	0,4	1,6	2,3	0,9	0,5	0,8	0,2
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spice	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,4	0,0	0,7	0,4	0,5	0,2	0,7	0,9	0,6	0,2	0,3	0,1
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.20.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	62,1	71,3	52,8	59,5	63,8	54,9	63,1	73,0	53,2	62,5	70,6	53,8	65,2	75,3	56,1	58,7	71,8	44,9
Borracheras	6,5	8,8	4,3	14,9	18,2	11,5	9,9	13,1	6,6	4,9	7,2	2,4	3,6	5,5	1,9	2,2	2,8	1,7
Binge drinking	17,9	23,5	12,3	26,8	30,6	22,8	22,6	30,0	15,2	17,3	23,0	11,1	15,4	21,0	10,3	10,0	14,7	5,0
Bebidas energéticas	10,9	13,4	8,5	28,9	32,7	24,9	16,5	20,8	12,1	8,8	10,9	6,5	4,2	5,7	2,8	2,2	2,6	1,9
Bebidas energéticas + alcohol	2,8	3,5	2,0	8,0	9,3	6,5	4,2	5,2	3,1	1,8	2,6	0,9	1,1	1,4	0,7	0,7	0,8	0,6
Tabaco	38,5	42,6	34,3	33,1	34,8	31,2	42,4	48,0	36,7	40,4	44,6	36,0	42,6	45,7	39,8	31,2	37,2	24,7
Hipnosedantes con o sin receta	8,1	5,4	10,8	1,9	1,3	2,6	4,3	3,4	5,3	7,3	6,0	8,6	10,9	7,0	14,4	14,6	8,1	21,4
Hipnosedantes sin receta	0,9	0,8	1,1	0,6	0,3	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,7	1,2	0,7	1,7	1,0	0,8	1,2
Cannabis	7,3	10,7	3,9	14,9	19,7	9,8	11,5	17,0	5,9	6,9	10,5	3,0	4,0	6,5	1,7	1,8	2,4	1,1
Cocaína en polvo	0,9	1,4	0,3	1,0	1,5	0,5	1,5	2,4	0,5	1,1	1,9	0,4	0,5	0,9	0,2	0,1	0,2	0,0
Cocaína base	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,9	1,5	0,3	1,0	1,5	0,5	1,5	2,4	0,5	1,1	1,9	0,4	0,7	1,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Éxtasis	0,2	0,3	0,1	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,1	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuevas sustancias*	0,4	0,6	0,2	0,8	1,0	0,6	0,6	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas mágicas	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Contestar las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.20. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	33,5	30,7	36,0	63,0	72,5	53,3	61,6	69,0	53,9	62,4	72,5	52,2
Borracheras	7,8	6,9	8,7	6,5	8,8	4,1	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0
Binge drinking	10,3	10,0	10,5	18,2	23,9	12,3	24,4	30,3	18,4	14,6	20,0	9,1
Bebidas energéticas	31,7	33,0	30,6	10,3	12,8	7,8	21,8	25,9	17,5	5,4	6,8	3,9
Bebidas energéticas + alcohol	5,6	4,7	6,5	2,7	3,5	1,9	5,8	7,0	4,6	1,2	1,7	0,7
Tabaco	15,2	12,0	18,2	39,2	43,5	34,9	38,4	42,3	34,4	38,6	42,8	34,3
Hipnosedantes con o sin receta	1,3	0,6	2,1	8,3	5,5	11,1	3,3	2,5	4,1	10,6	6,9	14,3
Hipnosedantes sin receta	0,4	0,2	0,6	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9	1,0	0,8	1,2
Cannabis	7,6	6,8	8,4	7,3	10,9	3,7	12,9	18,2	7,6	4,4	6,9	2,0
Cocaína en polvo	0,3	0,6	0,0	0,9	1,4	0,3	1,3	2,0	0,5	0,6	1,1	0,2
Cocaína base	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,3	0,6	0,0	0,9	1,5	0,3	1,3	2,1	0,5	0,7	1,2	0,2
Éxtasis	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,5	0,7	0,4	0,1	0,2	0,0
Anfetaminas/speed	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3	0,1	0,2	0,0
Alucinógenos	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,7	1,1	0,3	0,2	0,4	0,1
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas mágicas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.21.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (alguna vez en la vida)		Prevalencia (alguna vez en la vida)	
Alcohol	93,5	Nuevas sustancias*	3,4
Tabaco	72,5	Setas mágicas	2,0
Cannabis	31,5	Cocaína base	0,8
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	Spice	0,8
Cocaína polvo y/o base	9,1	Ketamina	0,7
Cocaína en polvo	8,9	Heroína	0,6
Cigarrillos electrónicos	6,8	GHB	0,6
Cigarrillos electrónicos con nicotina	5,3	Metanfetamina	0,6
Hipnosedantes sin receta	4,1	Inhalables volátiles	0,5
Alucinógenos	3,8	Salvia	0,5
Éxtasis	3,6	Mefedrona	0,2
Anfetaminas/speed	3,6	Esteroides anabolizantes	0,2

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.22.

Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (últimos 12 meses)		Prevalencia (últimos 12 meses)	
Alcohol	77,6	Alucinógenos	0,6
Tabaco	40,2	Anfetaminas/speed	0,5
Borracheras	16,8	Setas mágicas	0,4
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	Cocaína base	0,2
Cannabis	9,5	Heroína	0,1
Botellón	9,4	Inhalables volátiles	0,1
Botellón y alcohol	8,9	Ketamina	0,1
Hipnosedantes sin receta	2,3	GHB	0,1
Cocaína polvo y/o base	2,0	Spice	0,1
Cocaína en polvo	1,9	Metanfetamina	0,1
Nuevas sustancias*	0,9	Salvia	0,1
Éxtasis	0,6	Mefedrona	0,0
		Esteroides anabolizantes	0,0

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.23.

Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (últimos 30 días)		Prevalencia (últimos 30 días)	
Alcohol	62,1	Éxtasis	0,2
Tabaco	38,5	Anfetaminas/speed	0,2
Binge drinking	17,9	Alucinógenos	0,2
Bebidas energéticas	10,9	Cocaína base	0,1
Hipnosedantes con o sin receta	8,1	Heroína	0,1
Cannabis	7,3	Setas mágicas	0,1
Borracheras	6,5	Salvia	0,1
Cannabis + tabaco	6,4	Inhalables volátiles	0,0
Bebidas energéticas + alcohol	2,8	Ketamina	0,0
Hipnosedantes sin receta	0,9	GHB	0,0
Cocaína en polvo	0,9	Spice	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,9	Mefedrona	0,0
Nuevas sustancias*	0,4	Metanfetamina	0,0
		Esteroides anabolizantes	0,0

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.24.

Prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




	Prevalencia (a diario, últimos 30 días)
Tabaco	30,8
Alcohol	9,3
Hipnosedantes con o sin receta	6,0
Cannabis	2,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.25.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de personas). España, 2015.




	Hombres	Mujeres
Tabaco	122	122
Hipnosedantes con o sin receta	178	366
Cannabis	98	61
Cocaína en general	31	18
Cocaína en polvo	23	18
Cocaína base	8	0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y edad media en el inicio de consumo de alcohol en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
Últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
Últimos 30 días	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
Diariamente en los últimos 30 días	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3
Edad media de inicio en el consumo	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	15-17 años	18-64 años
Hombres	63,8	73,0	70,6	75,3	71,8	30,7	72,5
Mujeres	54,9	53,2	53,8	56,1	44,9	36,0	53,3
Total	59,5	63,1	62,5	65,2	58,7	33,5	63,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.28.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	2,0	7,4	11,8	18,8	30,2
Mujeres	0,9	1,7	3,0	6,1	8,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.29.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.




	Vino	Cerveza	Combinados/cubatas	Vermú/jerez/fino	Licores de frutas	Licores fuertes	Calimocho	Sangría
Laborables (lunes a jueves)	15,6	24,5	3,1	1,3	1,0	1,6	0,5	0,7
Fin de semana (viernes, sábado, domingo)	27,8	45,1	24,0	3,8	2,7	5,1	1,6	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.30.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones éticas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres 15-34 años	39,1	38,3	36,3	40,7	40,3	38,9	44,0	41,3	43,2	37,5
Mujeres 15-34 años	19,1	19,6	18,1	21,0	20,9	23,2	25,9	23,5	25,5	22,6
Hombres 35-64 años	16,5	16,6	18,3	20,2	17,1	15,2	21,2	16,2	15,4	14,4
Mujeres 35-64 años	4,1	3,6	4,9	6,3	5,5	5,0	8,8	5,9	5,5	5,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.31.

Prevalencia de intoxicaciones éticas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Más de una vez al mes	5,3	3,9	3,8	5,1	5,0	5,1	4,8	5,4	4,4	3,6
Menos frecuencia	13,4	14,7	14,3	15,7	14,8	14,1	18,4	13,9	14,7	12,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2015.




	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Binge drinking últimos 30 días	-	-	5,3	4,9	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9
Borracheras últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5
Borracheras últimos 12 meses	19,3	18,4	20,8	19,8	19,1	23,2	19,3	19,1	16,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.33.


Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.34.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días según hayan consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días o no, en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Consumo de CANNABIS en los últimos 30 días	20,8	4,4
Consumo de COCAÍNA EN GENERAL en los últimos 30 días	4,1	0,2
Consumo de ÉXTASIS U OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS en los últimos 30 días	1,1	0,1
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	1,0	0,0
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	0,8	0,1
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	0,2	0,0
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.35.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2003-2015.




	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Binge drinking últimos 30 días	5,3	4,9	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.36.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Consumo de vino últimos 30 días	19,3	39,2	51,5	61,6	71,3
Consumo de cerveza últimos 30 días	76,5	84,4	89,6	89,8	80,2
Consumo de combinados últimos 30 días	84,5	74,7	55,1	48,5	44,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.37.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Consumo de vino últimos 30 días	22,5	42,0	48,1	59,4	66,8
Consumo de cerveza últimos 30 días	74,6	86,1	91,2	88,0	70,0
Consumo de combinados últimos 30 días	87,6	79,2	64,2	45,0	53,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.38.

Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.39.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.40.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.41.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.42.

Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	87,5	89,0	86,0	93,9	95,8	91,9	94,5	95,7	93,2	95,6	97,0	94,3	94,0	97,3	90,5
Últimos 12 meses	78,4	80,5	76,1	79,8	86,1	73,4	77,8	82,6	72,6	79,1	84,2	74,5	72,3	80,5	63,7
Últimos 30 días	59,5	63,8	54,9	63,1	73,0	53,2	62,5	70,6	53,8	65,2	75,3	56,1	58,7	71,8	44,9
Diariamente en últimos 30 días	1,4	2,0	0,9	4,5	7,4	1,7	7,6	11,8	3,0	12,1	18,8	6,1	19,6	30,2	8,2
Nunca	12,5	11,0	14,0	6,1	4,2	8,1	5,5	4,3	6,8	4,4	3,0	5,7	6,0	2,7	9,5

	15-64 años			15-17 años			18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	93,5	95,3	91,7	66,6	65,0	68,2	94,4	96,2	92,5	91,2	92,9	89,4	94,7	96,6	92,9
Últimos 12 meses	77,6	82,9	72,1	58,0	54,6	61,2	78,2	83,7	72,5	79,2	83,7	74,6	76,7	82,5	70,9
Últimos 30 días	62,1	71,3	52,8	33,5	30,7	36,0	63,0	72,5	53,3	61,6	69,0	53,9	62,4	72,5	52,2
Diariamente en últimos 30 días	9,3	14,5	4,1	1,0	0,7	1,3	9,6	14,9	4,2	3,2	5,0	1,3	12,5	19,3	5,5
Nunca	6,5	4,7	8,3	33,4	35,0	31,8	5,6	3,8	7,5	8,8	7,1	10,6	5,3	3,4	7,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.43.

Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años		15-17 años		18-64 años		15-34 años		35-64 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	15,6	27,8	0,7	3,1	16,0	28,6	6,4	15,8	20,3	33,9
Cerveza/sidra	24,5	45,1	4,1	15,2	25,1	46,0	20,4	45,0	26,6	45,2
vermú/jerez/fino	1,3	3,8	0,0	0,2	1,4	3,9	0,8	2,9	1,6	4,2
Combinados/cubatas	3,1	24,0	0,9	23,7	3,2	24,0	3,7	37,7	2,8	16,9
Licores de frutas	1,0	2,7	0,5	1,6	1,0	2,7	1,0	3,0	1,0	2,5
Licores fuertes	1,6	5,1	0,3	2,9	1,7	5,2	1,1	5,5	1,9	5,0
Calimochó	0,5	1,6	0,0	4,4	0,5	1,5	0,6	3,6	0,4	0,6
Sangría	0,7	1,4	0,2	1,9	0,7	1,4	0,8	2,4	0,7	0,9
Cualquier bebida alcohólica	31,8	60,1	5,5	30,2	32,6	61,0	23,0	59,7	36,3	60,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.44.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años		25-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	3,6	8,7	8,5	21,2	14,0	27,5	20,0	36,5	29,0	39,4
Cerveza/sidra	15,1	39,5	24,3	49,0	26,4	48,1	28,6	49,1	24,4	36,5
vermú/jerez/fino	0,5	1,6	1,0	3,8	1,3	4,2	1,6	4,4	2,0	4,2
Combinados/cubatas	4,0	42,6	3,4	34,1	3,4	22,5	2,8	16,7	2,2	9,6
Licores de frutas	1,0	3,5	0,9	2,7	0,7	2,5	1,3	3,1	1,0	1,8
Licores fuertes	0,9	5,7	1,2	5,2	1,3	4,5	1,9	5,2	2,7	5,3
Calimocho	0,7	5,6	0,5	2,0	0,5	1,0	0,3	0,6	0,3	0,2
Sangría	0,9	3,1	0,7	1,9	0,7	1,1	0,7	0,7	0,6	1,0
Cualquier bebida alcohólica	17,6	57,7	27,0	61,1	32,1	60,3	37,0	63,5	41,2	56,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.45.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-34 años			35-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
16,8	22,3	11,2	30,2	37,5	22,6	10,0	14,4	5,4	35,1	41,3	28,5	26,5	34,6	18,3	14,8	21,3	8,0	9,1	13,8	4,8	4,5	6,0	2,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.46.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-34 años			35-64 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
6,5	8,8	4,3	14,9	18,2	11,5	9,9	13,1	6,6	4,9	7,2	2,4	3,6	5,5	1,9	2,2	2,8	1,7	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0
MENORES: 15-17 años			MAYORES: 18-64 años						15-34 años			35-64 años											
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M									
7,8	6,9	8,7	6,5	8,8	4,1	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0												

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.47.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-34 años			35-64 años					
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
10,6	12,4	8,1	25,4	28,8	21,3	15,7	18,0	12,5	7,8	10,2	4,5	5,6	7,4	3,5	3,9	3,9	3,8	19,7	22,3	16,3	6,0	7,5	3,9			
MENORES: 15-17 años						MAYORES: 18-64 años						15-34 años						35-64 años								
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M			
24,0	23,3	24,5				10,4	12,2	7,8				19,7	22,3	16,3				6,0	7,5	3,9						

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.48.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no. España, 2015.

	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	No se ha emborrachado en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	19,0	47,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	78,1	90,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.49.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho binge drinking en los últimos 30 días o no. España, 2015.

	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	20,8	51,2
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	76,9	92,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.50.

Prevalencia de botellón y del consumo de alcohol en botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hacer botellón	42,1	46,2	37,8	12,5	16,2	8,8	2,1	3,0	1,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,5	0,6	39,6	41,7	37,3
Hacer botellón y beber alcohol	40,0	43,9	35,9	11,9	15,6	8,1	1,9	2,7	1,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,5	37,0	38,3	35,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.51.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	26,7	47,6	27,8	55,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	84,2	90,6	86,3	93,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.52.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población, según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Ningún consumo	1,2	15,3	1,1	30,5
Una sustancia	40,5	44,5	43,0	40,7
Dos sustancias	28,0	30,5	27,8	19,0
Tres sustancias	20,9	7,8	21,6	8,0
Cuatro sustancias	4,9	1,3	3,2	1,0
Cinco o más sustancias	4,5	0,5	3,3	0,8

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes con o sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Diariamente en los últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Edad media inicio en el consumo	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4
Edad media inicio consumo diario de tabaco	-	-	-	-	-	-	19,3	18,5	18,6	18,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.54.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	30,8	23,9	34,1	32,8	34,8	25,3
Hombres	34,2	25,3	38,7	36,1	37,5	30,5
Mujeres	27,3	22,4	29,4	29,2	32,4	19,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.55.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres 15-34 años	41,4	36,3	39,8	40,0	37,1	31,5	35,9	33,9	33,0	32,9
Mujeres 15-34 años	36,5	34,2	36,4	36,8	33,0	29,7	28,0	28,5	28,4	26,5
Hombres 35-64 años	44,0	39,5	41,8	43,7	36,9	33,9	36,4	34,2	33,9	35,0
Mujeres 35-64 años	19,1	25,1	25,9	27,0	25,3	24,4	26,7	25,6	27,8	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres	42,8	38,0	40,9	42,0	37,0	32,9	36,2	34,1	33,6	34,2
Mujeres	27,1	29,3	30,5	31,3	28,6	26,6	27,2	26,7	28,0	27,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.57.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo diario de tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Riesgo atribuido a fumar paquete de tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.58.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.59.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de formato de consumo que ha utilizado para fumar, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos de cajetilla	78,4	76,8	80,4	67,9	66,3	69,8	72,8	68,6	78,3	78,8	79,2	78,3	83,3	81,0	85,6	86,2	85,8	86,8
Tabaco de liar	14,7	15,4	13,9	19,3	18,7	20,0	18,6	20,8	15,6	15,0	14,5	15,7	11,8	13,2	10,3	9,8	10,1	9,5
Los 2 tipos	6,9	7,8	5,7	12,8	15,0	10,2	8,7	10,6	6,1	6,2	6,3	5,9	4,9	5,7	4,1	4,0	4,1	3,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.60.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.61.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan nicotina, edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.62.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.63.


Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los que han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los que nunca han fumado (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.64.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años, según hayan consumido tabaco o no (porcentajes). España, 2015.



	Ha consumido cigarrillos electrónicos	No ha consumido cigarrillos electrónicos
Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	9,1	0,5
Ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	14,8	1,5
Ha consumido tabaco en los últimos 30 días	14,9	1,8
Ha consumido tabaco a diario en los últimos 30 días	16,1	2,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.65.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	Total			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	60,8	60,9	60,6	55,4	57,0	53,2	60,7	60,8	60,5	62,0	62,8	61,1	60,1	57,2	62,7
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	20,3	19,4	21,3	25,9	24,5	27,9	19,6	17,9	21,9	17,8	17,9	17,6	21,5	23,7	19,5
Los 2 tipos	19,0	19,7	18,1	18,7	18,5	18,9	19,7	21,3	17,6	20,3	19,3	21,3	18,4	19,1	17,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

Nota: se excluye de la base el segmento de 55 a 64 años por presentar una base reducida

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.66.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	64,7	35,3	64,8	39,7
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	17,8	37,2	17,4	35,7
Los 2 tipos	17,6	27,5	17,8	24,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.67.


Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido cannabis en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	65,5	59,7	66,6	59,8
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	15,3	21,7	12,6	21,9
Los 2 tipos	19,2	18,6	20,7	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
A diario o casi a diario en los últimos 30 días	-	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0
Edad media de inicio en el consumo	-	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.69.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta									
Alguna vez	18,7	13,6	23,9	10,8	8,6	13,0	22,8	16,2	29,4
Último año	12,0	8,3	15,8	6,3	4,8	7,9	15,0	10,1	19,9
Último mes	8,1	5,4	10,8	3,3	2,5	4,1	10,6	6,9	14,3
A diario	6,0	4,0	8,1	1,9	1,3	2,5	8,1	5,3	10,9
Hipnosedantes sin receta									
Alguna vez	4,1	3,3	4,9	2,6	2,3	3,0	4,8	3,8	5,8
Último año	2,3	1,6	2,9	1,4	1,0	1,9	2,7	2,0	3,4
Último mes	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9	1,0	0,8	1,2
A diario*	-	-	-	-	-	-	-	-	-


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* No se recoge esta información en el cuestionario

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.70.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta e hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3
Riesgo percibido por consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.71.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.


	Ha consumido hipnosedantes sin receta	No ha consumido hipnosedantes sin receta
Ningún consumo	0,0	14,6
Una sustancia	17,5	44,7
Dos sustancias	38,6	30,0
Tres sustancias	28,6	8,5
Cuatro sustancias	7,3	1,5
Cinco o más sustancias	8,0	0,7

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.72.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida (A)	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses (B)	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días (C)	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
B/A*100	58,6	55,8	53,0	58,4	55,2	64,2
C/B*100	72,5	68,6	73,2	72,5	72,8	67,5
C/A*100	42,5	38,3	38,8	42,4	40,2	43,3

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.73.


Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V \geq 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	12,0	4,4	7,7	11,7	15,6	18,5
Hombres	8,3	3,3	5,9	9,3	10,2	11,0
Mujeres	15,8	5,6	9,5	14,2	20,5	26,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.75.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	8,1	1,9	4,3	7,3	10,9	14,6
Hombres	5,4	1,3	3,4	6,0	7,0	8,1
Mujeres	10,8	2,6	5,3	8,6	14,4	21,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.76.

Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	5,9	13,9	28,8	26,1	25,2
Mujeres	5,1	11,7	21,7	31,0	30,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.77.

Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	3,6	12,3	28,3	27,4	28,5
Mujeres	3,4	9,4	19,2	32,0	36,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.78.


Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.79.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y riesgo percibido ante el consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.80.


Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.81.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.82.

Perfil de la población que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses, según registren consumo problemático de hipnosedantes DSM-V>2 o no (porcentajes). España, 2015.

		Consumo problemático DSM-V ≥2	Resto DSM-V <2
SEXO	Hombre	40,8	31,9
	Mujer	59,2	68,1
EDAD	15 a 24 años	4,7	5,3
	25 a 34 años	11,2	12,8
	35 a 44 años	26,5	22,8
	45 a 54 años	32,7	28,5
	55 a 64 años	24,9	30,6
ESTADO CIVIL	Soltero/a	30,6	27,3
	Casado/a	49,9	55,7
	Separado/a - Divorciado/a	13,6	11,9
	Viudo/a	5,9	5,1
CONVIVENCIA	Solo	17,5	11,8
	Cónyuge - pareja	53,1	61,8
	Padre	9,4	8,9
	Madre	17,7	15,5
	Hijos	39,0	49,0
	Hermanos	7,6	7,0
	Abuelos	0,7	0,7
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	25,3	19,8
	Estudios secundarios	60,5	64,0
	Estudios universitarios	14,2	16,1
SITUACIÓN LABORAL	Trabajando	31,3	41,0
	Con empleo, pero temporalmente ausente del mismo	3,2	1,9
	Parado que ha trabajado antes	23,3	19,9
	Parado que busca su primer empleo	1,4	0,8
	Jubilado	8,6	8,8
	Incapacitado permanente	13,9	4,6
	Cursando algún estudio	2,6	3,4
	Dedicado principalmente a labores del hogar (actividad no económica)	14,3	18,9
	Otra situación sin ejercer actualmente actividad económica alguna	1,4	0,9
CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días		11,6	6,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.83.

Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V ≥ 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo problemático de hipnosedantes	2,5	2,0	3,0	0,8	0,7	1,0	1,5	1,2	1,7	2,7	2,6	2,7	3,6	3,1	4,2	3,4	2,1	4,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.84.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad (proporción de personas que piensan que adquirir la sustancia es fácil o muy fácil), según DSM-V ≥ 2 o no (porcentajes). España, 2015.

	DSM-V ≥ 2 (consumo problemático hipnosedantes)	DSM-V < 2 (consumo no problemático hipnosedantes)	No consumidores (15 a 64 años)*
PERCEPCIÓN DE RIESGO			
Fumar un paquete de tabaco diario	85,8	92,2	91,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	42,9	48,9	45,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	89,4	90,7	90,0
Fumar cannabis una vez por semana o más	73,7	79,7	80,0
Tomar hipnosedantes de una a tres veces por semana	49,5	53,7	82,0
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	65,7	73,0	93,7
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	93,6	95,8	94,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,3	94,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,8	97,9	97,3
PERCEPCIÓN DE DISPONIBILIDAD			
Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta	48,5	32,9	31,3

* Población de 15 a 64 años que no ha contestado el DSM-V (no consumidores)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.85.

Prevalencia de borracheras y de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha respondido a la escala DSM-V para hipnosedantes, según el resultado sea DSM-V ≥ 2 o < 2 (porcentajes). España, 2015.

	DSM-V ≥ 2 (consumo problemático de hipnosedantes)	DSM-V < 2 (consumo no problemático de hipnosedantes)
Borracheras	18,9	12,2
Tabaco	52,9	46,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.86.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.87.


Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.88.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	9,5	19,9	15,0	8,9	4,7	2,0
Hombres	13,3	25,4	21,3	12,9	7,4	2,6
Mujeres	5,6	14,2	8,7	4,6	2,3	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.89.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	7,3	14,9	11,5	6,9	4,0	1,8
Hombres	10,7	19,7	17,0	10,5	6,5	2,4
Mujeres	3,9	9,8	5,9	3,0	1,7	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.90.

Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Disponibilidad	52,1	51,8	59,5	59,2	66,4	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3
Riesgo	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5
Prevalencia de consumo 12 meses	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.91.

Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
15-24 años	42,8	27,8	25,4	14,2	19,7	9,8
25-34 años	49,6	32,9	21,3	8,7	17,0	5,9
35-44 años	44,9	25,3	12,9	4,6	10,5	3,0
45-54 años	39,3	20,0	7,4	2,3	6,5	1,7
55-64 años	22,9	8,6	2,6	1,4	2,4	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis últimos 30 días															
Principalmente marihuana	57,9	53,0	68,6	53,5	52,2	57,3	49,6	48,7	53,2	44,7	43,4	49,2	50,6	52,2	47,6
Principalmente hachis	12,8	14,4	9,2	17,3	17,2	17,6	18,7	18,2	20,5	24,5	25,7	20,2	14,8	15,7	13,1
De los dos tipos	29,4	32,6	22,3	29,3	30,6	25,1	31,7	33,0	26,2	30,8	30,8	30,6	34,5	32,2	39,3
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días															
Sí	89,4	89,7	88,7	92,0	93,2	88,4	86,5	86,3	87,5	89,9	90,8	86,6	86,8	89,9	77,4
No	10,6	10,3	11,3	8,0	6,8	11,6	13,5	13,7	12,5	10,1	9,2	13,4	13,2	10,1	22,6
Media de porros consumidos al día	2,5	2,7	2,1	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	2,0	2,3	2,4	1,8	2,4	2,6	1,8

	15-64 años			15-34 años			35-64 años					
	T	H	M	T	H	M	T	H	M			
Consumo cannabis últimos 30 días												
Principalmente marihuana	52,7	50,5	59,3				55,6	52,6	63,5	48,3	47,5	51,0
Principalmente hachis	17,0	17,7	15,1				15,0	15,9	13,0	20,0	20,3	19,2
De los dos tipos	30,3	31,9	25,7				29,3	31,6	23,6	31,7	32,3	29,7
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días												
Sí	89,5	90,1	87,7				90,7	91,5	88,5	87,6	88,0	85,9
No	10,5	9,9	12,3				9,3	8,5	11,5	12,4	12,0	14,1
Media de porros consumidos al día	2,5	2,6	2,1				2,5	2,5	2,6	2,4	2,5	1,9


	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años					
	T	H	M	T	H	M			
Consumo cannabis últimos 30 días									
Principalmente marihuana				58,1	35,7	74,1	52,6	50,7	58,1
Principalmente hachis				13,1	17,4	10,0	17,1	17,7	15,5
De los dos tipos				28,8	46,9	15,9	30,3	31,6	26,4
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días									
Sí				92,8	97,1	89,4	89,4	90,0	87,5
No				7,2	2,9	10,6	10,6	10,0	12,5
Media de porros consumidos al día				2,4	3,2	1,9	2,5	2,6	2,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.93.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2015.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	14,5	22,9	19,6	23,8	29	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	7,5	7,7	7	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	-	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,1	7,6	7,0	6,6	7,3
B/A*100	51,7	33,6	35,7	38,7	39,0	39,2	37,0	33,0	35,2	30,3	30,0
C/B*100	-	59,7	64,3	69,6	67,3	77,7	70,3	71,7	73,1	72,2	77,5
C/A*100	-	20,1	23,0	26,9	26,2	30,4	26,0	23,7	25,7	21,8	23,3

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.
 C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis en los últimos 12 meses y lo había consumido también en los últimos 30 días.
 C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.94.

Prevalencia de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según el consumo de cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	No ha fumado cannabis nunca	Fuma cannabis pero no diariamente	De 1 a 2 porros diarios	3 o más porros diarios
Problemas familiares	0,7	7,5	14,8	20,2
Problemas con amigos	0,4	6,1	7,4	15,8
Problemas de salud física	0,5	2,9	6,5	8,5
Problemas psicológicos	0,8	3,8	7,2	9,7
Accidentes de tráfico	0,1	2,6	1,1	6,8
Problemas laborales	0,2	1,7	3,4	4,0
Problemas económicos	0,3	6,0	7,1	10,6
Problemas con la policía o la ley	0,2	7,0	11,3	18,3
Relaciones sexuales que en otras circunstancias no hubiera mantenido	0,1	3,7	1,3	10,3
Relaciones sexuales sin protección	0,1	3,7	3,5	9,7
Necesidad de acudir a un centro de urgencias	0,2	2,3	4,1	7,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.95.

Número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
De 1 a 2 porros	68,6	65,6	77,5	67,1	61,8	78,9	68,2	67,4	70,7	69,4	65,9	83,1	69,4	66,2	81,6	76,0	74,6	79,7
De 3 a 4 porros	18,9	20,4	14,4	21,4	24,9	13,7	18,9	18,9	18,9	16,9	18,9	8,7	17,9	19,6	11,4	13,2	10,6	20,3
≥5 porros	12,5	14,0	8,1	11,4	13,3	7,5	12,9	13,7	10,5	13,8	15,2	8,2	12,7	14,1	7,0	10,8	14,8	0,0
Nº medio de porros	2,5	2,6	2,1	2,5	2,7	2,1	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	2,0	2,3	2,4	1,8	2,4	2,6	1,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.96.


Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.97.


Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.98.

Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.99.

Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.100.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	21,2	24,1	14,1	21,7	24,4	15,7	20,4	23,6	10,8
Prevalencia de consumo de cannabis (CAST<4)	78,8	75,9	85,9	78,3	75,6	84,3	79,6	76,4	89,2

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.101.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años	15-17 años
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	Total*	Total*
Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	21,9	25,6	14,8	21,5	23,3	16,7	19,4	21,2	13,9	24,7	12,5
Prevalencia de consumo de cannabis (CAST<4)	78,1	74,4	85,2	78,5	76,7	83,3	80,6	78,8	86,1	75,3	87,5

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Nota: se excluyen los datos por sexo en los grupos de 45-54 años y 15-17 años por su base muestral. Tampoco se incluye el segmento de 55-64 años por el mismo motivo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.102.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST \geq 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo (porcentajes). España 2013, 2015.




	2013 (15-64 años)	2015 (15-64 años)
Hombres	3,5	2,9
Mujeres	0,8	0,7

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.103.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años (porcentaje y estimación). España, 2013-2015.



	2013	2015
Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4)	2,2	1,8
Estimación nº consumidores problemáticos (números absolutos)	687.233	558.549

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.104.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2013-2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2013	4,4	6,5	2,1	3,4	5,6	1,3	1,9	3,2	0,5	1,1	1,9	0,3	0,4	0,9	0,0
2015	4,0	6,0	1,9	3,0	4,6	1,3	1,6	2,5	0,5	1,0	2,1	0,1	0,2	0,3	0,2

	MENORES						MAYORES								
	15-64 años			15-17 años			18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2013	2,2	3,5	0,8	2,8	4,5	1,0	2,1	3,5	0,8	3,8	6,0	1,6	1,2	2,1	0,3
2015	1,8	2,9	0,7	1,4	1,3	1,4	1,8	3,0	0,7	3,4	5,2	1,6	1,0	1,7	0,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.105.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Fumar un paquete de tabaco diario	76,3	83,5	91,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	24,7	22,7	45,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	75,9	79,9	90,0
Fumar cannabis una vez por semana o más	32,3	37,6	79,8
Tomar hipnosedantes de 1 a 3 veces semana	63,9	70,0	78,8
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	83,2	88,9	91,3
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	82,0	82,5	94,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	78,7	81,9	94,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	93,6	94,4	97,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.106.

Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad, según puntuación en escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Cannabis	94,9	91,1	64,3
Heroína	38,8	32,9	27,4
Cocaína	75,3	64,2	42,0
Alucinógenos	46,6	42,0	28,7
Éxtasis u otras drogas de síntesis	50,4	43,5	28,5
GHB o éxtasis líquido	36,5	33,5	24,2
Anfetaminas o speed	54,7	47,9	29,2
Setas alucinógenas	43,9	38,0	24,7
Ketamina	37,5	32,1	23,0
Hipnosedantes con receta	71,4	65,3	58,1
Hipnosedantes sin receta	47,8	43,2	31,9

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.107.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Alcohol	91,5	94,1	77,6
Borracheras	60,5	54,8	16,8
Tabaco	90,1	81,9	40,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	25,0	10,5	12,0
Cocaína general (polvo y/o base)	28,1	13,4	2,0
Éxtasis	12,1	3,5	0,6
Anfetaminas/speed	8,0	3,8	0,5
Alucinógenos	10,7	3,3	0,6

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.108.

Distribución según sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, frecuencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de consumo de otras drogas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según la puntuación obtenida, y entre la población general (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-64 años		
	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.
Sexo									
Hombre	76,6	62,3	51,2	78,1	70,2	50,3	86,6	71,7	50,1
Mujer	23,4	37,7	48,8	21,9	29,8	49,7	13,4	28,3	49,9
Estado civil									
Soltero/a	93,3	96,9	94,9	79,2	79,0	63,2	52,8	40,1	19,2
Casado/a	6,0	2,9	4,9	19,5	19,9	34,8	31,4	42,5	66,4
Separado/a - Divorciado/a	0,7	0,2	0,2	1,3	1,1	1,9	15,9	15,6	11,1
Viuado/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,9	3,3
Nivel de estudios									
Primarios	20,4	11,5	13,9	17,5	10,6	8,5	19,1	9,2	16,8
Secundarios	73,7	81,9	78,4	67,3	65,7	64,7	67,0	68,2	63,2
Universitarios	5,8	6,7	7,7	15,2	23,7	26,9	13,9	22,6	20,0
Situación laboral									
Trabajando	29,3	24,9	21,2	55,1	60,0	61,4	46,9	65,0	56,7
Parado	29,8	20,0	15,6	33,3	28,9	22,6	37,8	24,3	16,5
Jubilado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,8	9,1
Incapacitado permanente	0,0	0,0	0,1	1,4	0,3	0,5	9,8	3,0	2,7
Estudiando	40,6	54,5	60,4	8,8	9,1	8,1	0,4	0,5	0,2
Labores del hogar (act. no económica)	0,3	0,0	2,3	0,8	1,3	7,0	2,6	2,7	13,9
Otra situación (sin act. económica alguna)	0,0	0,7	0,4	0,6	0,4	0,5	0,8	0,7	0,9
Cuántos días ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días									
Entre 1 y 3 días	8,9	29,2	4,5	9,6	26,4	3,1	6,7	25,3	1,0
Entre 4 y 9 días	10,8	16,6	2,8	6,9	12,1	1,5	11,3	18,2	0,8
Entre 10 y 19 días	14,5	11,4	2,2	14,9	11,5	1,7	15,2	9,1	0,5
Entre 20 y 29 días	13,3	3,4	1,0	10,5	4,3	0,8	12,6	5,2	0,3
30 días	46,0	11,9	3,7	50,0	20,2	3,8	49,0	20,5	1,3
No ha consumido cannabis	6,4	27,5	85,8	8,1	25,5	89,2	5,1	21,8	96,1
Prevalencia binge drinking en los últimos 30 días									
Ha hecho binge drinking	58,0	53,7	26,8	45,5	51,8	22,6	47,2	44,6	14,6
No ha hecho binge drinking	42,0	46,3	73,2	54,5	48,2	77,4	52,8	55,4	85,4
Consumo droga ilegal sin cannabis: cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos en los últimos 12 meses									
Ha consumido	31,7	14,2	4,1	27,2	20,2	3,9	37,9	17,4	1,8
No ha consumido	68,3	85,8	95,9	72,8	79,8	96,1	62,1	82,6	98,

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

P. GRAL. = población general.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.109.

Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST≥4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.


	Consumidores problemáticos de cannabis (CAST≥4)	Consumidores de cannabis CAST<4
Consumo cannabis últimos 30 días		
Principalmente marihuana	45,3	55,5
Principalmente hachís	18,1	16,6
De los dos tipos	36,6	27,9
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días		
Sí	94,5	88,9
No	5,5	11,1
Media de porros consumidos al día	3,3	2,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.110.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Últimos 12 meses	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Últimos 30 días	-	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
Edad media de inicio consumo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.111.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	1,0	0,8
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Últimos 30 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Edad media de inicio en el consumo	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	23,1	22,4	23,2	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.112.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	8,9	0,8	9,1
Últimos 12 meses	1,9	0,2	2,0
Últimos 30 días	0,9	0,1	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.113.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.114.


Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.115.

Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.116.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1999-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.117.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1999-2015.




	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
15-34 años	2,8	4,4	4,8	5,2	5,3	4,3	3,5	3,2	3,0
35-64 años	0,5	0,9	0,9	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.118.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Disponibilidad	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0
Riesgo	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6
Prevalencia de consumo	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,3	2,1	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.119.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Cocaína en polvo	13,3	4,6	8,9	2,9	0,9	1,9	1,4	0,3	0,9
Cocaína base	1,4	0,3	0,8	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Cocaína polvo y/o base	13,4	4,7	9,1	3,1	0,9	2,0	1,5	0,3	0,9

H = hombres; M = mujeres; T = total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.120.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
B/A*100	47,1	51,6	52,1	45,8	42,9	37,5	25,5	25,6	20,9	21,2
C/B*100	56,3	56,3	52,0	40,7	53,3	53,3	46,2	50,9	47,6	45,2
C/A*100	26,5	29,0	27,1	18,6	22,9	20,0	11,8	13,0	9,9	9,6

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo en los últimos 12 meses y lo había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.121.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
B/A*100	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2
C/A*100	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.
 C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.122.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	2,0	2,7	3,3	2,5	1,3	0,4
Hombres	3,1	3,8	5,2	3,8	2,0	0,6
Mujeres	0,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.123.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6
Últimos 12 meses	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Últimos 30 días	-	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2
Edad media de inicio consumo	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.124.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,6	1,7	1,0	0,4	0,2	0,1
Hombres	0,9	2,3	1,5	0,7	0,4	0,1
Mujeres	0,3	1,0	0,5	0,0	0,0	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.125.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	2,3	1,5	0,7	0,4	0,1
Mujeres	1,0	0,5	0,0	0,0	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.126.

Prevalencia de consumo de éxtasis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	4,4	2,0	2,3	1,0	0,8	0,5
25-34 años	8,4	3,2	1,5	0,5	0,5	0,3
35-44 años	7,7	2,4	0,7	0,0	0,3	0,0
45-54 años	3,9	1,2	0,4	0,0	0,2	0,0
55-64 años	1,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.127.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de éxtasis una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Riesgo percibido	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.128.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Disponibilidad percibida	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.129.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de éxtasis (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido éxtasis alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.130.


Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.131.


Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.132.


Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	3,9	1,9	1,5	0,8	0,4	0,4
25-34 años	7,8	2,9	1,4	0,5	0,7	0,3
35-44 años	7,3	2,0	0,9	0,2	0,4	0,0
45-54 años	4,9	1,8	0,2	0,1	0,0	0,0
55-64 años	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
15-24 años	3,0	1,2	0,4
25-34 años	5,4	1,0	0,5
35-44 años	4,8	0,5	0,2
45-54 años	3,3	0,2	0,0
55-64 años	1,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.135.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de anfetaminas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido anfetaminas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.136.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	0,6	1,0	0,2	0,7	1,1	0,2	1,0	1,6	0,4	0,9	1,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
En los últimos 12 meses	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
En los últimos 30 días	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.137.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8
Últimos 12 meses	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Últimos 30 días	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Edad media de inicio consumo	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.138.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,6	1,5	0,8	0,7	0,1	0,1
Hombres	0,8	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1
Mujeres	0,3	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.139.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1
Mujeres	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.140.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	3,9	2,4	1,7	1,2	0,5	0,4
25-34 años	8,3	2,9	1,1	0,4	0,6	0,1
35-44 años	8,3	2,1	1,0	0,3	0,4	0,0
45-54 años	5,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,0
55-64 años	1,9	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.141.


Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de alucinógenos (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido alucinógenos alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.142.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de alucinógenos una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de alucinógenos (conseguirlos en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.144.

Prevalencia de consumo de setas alucinógenas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ha consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida	2,0	3,0	1,0	2,2	2,6	1,8	3,5	5,4	1,7	3,0	4,6	1,3	1,1	1,8	0,5	0,2	0,4	0,1
Ha consumido setas alucinógenas en los últimos 12 meses	0,4	0,5	0,2	1,2	1,2	1,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ha consumido setas alucinógenas en los últimos 30 días	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.145.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de setas alucinógenas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.146.


Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.147.

Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	0,1	0,5	1,1	2,0	0,9
Mujeres	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3
Total	0,1	0,3	0,7	1,2	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.148.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de heroína una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Riesgo percibido	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.149.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.150.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.151.


Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.152.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.153.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.154.

Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.155.

Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



		Ninguna sustancia	Una sola sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-17 años	Hombres	40,8	39,8	11,4	7,0	1,0
	Mujeres	37,6	39,6	12,8	8,3	1,7
18-64 años	Hombres	9,6	44,4	31,8	10,4	3,8
	Mujeres	17,3	43,9	29,7	7,8	1,3
15-24 años	Hombres	16,5	39,7	22,1	16,6	5,2
	Mujeres	20,4	43,3	23,2	10,6	2,5
25-34 años	Hombres	8,6	40,3	31,7	13,2	6,2
	Mujeres	19,0	42,9	27,3	8,8	2,1
35-44 años	Hombres	9,7	44,1	32,0	10,1	4,2
	Mujeres	17,8	44,0	30,1	6,8	1,2
45-54 años	Hombres	8,7	45,0	36,2	7,4	2,6
	Mujeres	13,7	42,6	34,9	8,0	0,8
55-64 años	Hombres	10,8	51,5	31,3	5,7	0,6
	Mujeres	20,9	46,2	27,3	5,3	0,3


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.156.

Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



		Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-17 años	Hombres	63,5	26,1	7,8	1,9	0,7
	Mujeres	61,7	22,4	10,0	5,9	0,0
18-64 años	Hombres	16,8	44,0	29,3	8,3	1,7
	Mujeres	30,4	41,3	23,1	4,6	0,6
15-24 años	Hombres	29,1	36,2	19,5	13,4	1,7
	Mujeres	36,5	36,8	19,2	6,2	1,3
25-34 años	Hombres	15,6	41,8	28,7	11,0	2,9
	Mujeres	33,2	38,7	21,9	5,3	0,9
35-44 años	Hombres	17,0	43,9	29,4	7,7	2,0
	Mujeres	31,0	41,3	23,4	3,9	0,4
45-54 años	Hombres	14,7	43,9	34,6	5,5	1,3
	Mujeres	25,2	42,6	26,8	4,9	0,5
55-64 años	Hombres	17,4	49,9	28,2	4,2	0,3
	Mujeres	34,2	42,8	19,6	3,3	0,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.157.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	85,2	94,9	98,2	99,8	98,4
Tabaco	9,7	81,5	97,8	95,8	90,0
Cannabis	0,2	5,6	59,3	93,7	95,2
Éxtasis	0,0	0,1	0,4	4,3	49,6
Hipnosedantes con o sin receta	4,7	17,3	40,2	45,1	40,6
Cocaína en polvo	0,0	0,4	3,1	44,2	87,9
Cocaína base	0,1	0,2	0,2	1,5	5,8
Anfetaminas	0,0	0,0	0,2	8,2	42,7
Alucinógenos	0,1	0,0	0,4	6,6	40,2
Heroína	0,0	0,0	0,2	0,9	5,4
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.158.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ningún consumo	4,4	3,2	5,7	14,2	10,5	18,0	24,7	18,1	31,4
Una sola sustancia	19,3	16,9	21,8	44,0	44,3	43,7	42,1	43,5	40,7
Dos sustancias	38,1	36,5	39,6	30,2	31,2	29,2	25,7	28,7	22,7
Tres sustancias	24,4	25,5	23,2	9,0	10,3	7,8	6,4	8,1	4,6
Cuatro sustancias	7,8	9,1	6,4	1,6	2,4	0,8	0,8	1,2	0,4
Cinco o más sustancias	6,1	8,7	3,4	0,9	1,3	0,5	0,3	0,4	0,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.159.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.

ALGUNA VEZ EN LA VIDA								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	31,0	3,6	22,5	10,9	4,4	3,6	2,4	2,8
Una sola sustancia	37,4	18,8	34,5	28,0	20,6	18,5	15,3	17,0
Dos sustancias	16,9	38,7	22,0	26,8	31,5	36,5	42,4	50,7
Tres sustancias	11,7	24,8	16,5	25,2	25,5	23,4	25,4	22,7
Cuatro sustancias	1,8	7,9	2,5	4,9	9,6	9,5	8,6	4,6
Cinco o más sustancias	1,1	6,2	2,1	4,3	8,3	8,4	5,9	2,2

ÚLTIMOS 12 MESES								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	39,1	13,4	29,5	18,4	13,8	13,6	11,3	15,7
Una sola sustancia	39,7	44,2	40,1	41,5	41,6	44,1	43,7	49,0
Dos sustancias	12,1	30,8	18,4	22,6	29,5	31,1	35,5	29,4
Tres sustancias	7,7	9,1	9,7	13,7	11,0	8,5	7,7	5,5
Cuatro sustancias	1,0	1,6	1,4	2,0	2,6	2,0	1,2	0,4
Cinco o más sustancias	0,3	0,9	0,8	1,9	1,5	0,8	0,5	0,0

ÚLTIMOS 30 DÍAS								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	62,6	23,5	49,6	32,7	24,3	23,8	20,3	25,5
Una sola sustancia	24,2	42,7	29,5	36,5	40,3	42,7	43,2	46,5
Dos sustancias	9,0	26,2	14,1	19,4	25,3	26,5	30,5	24,0
Tres sustancias	4,0	6,4	5,9	9,9	8,2	5,8	5,2	3,8
Cuatro sustancias	0,1	0,9	0,5	0,9	1,4	1,0	0,7	0,2
Cinco o más sustancias	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.160.

Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2015.

	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles	Nuevas sustancias
Alcohol	100,0	44,1	11,3	2,1	11,4	2,4	0,2	2,5	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	1,0
Tabaco	85,3	100,0	14,4	3,0	19,8	4,0	0,2	4,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,1	1,7
Hipnosedantes*	72,4	48,1	100,0	19,3	10,2	3,0	0,2	3,2	0,9	0,8	1,0	0,3	0,1	0,9
Hipnosedantes**	72,4	52,9	100,0	100,0	14,0	8,3	0,1	8,4	1,6	1,6	2,0	0,5	0,1	2,0
Cannabis	93,4	82,2	13,0	3,4	100,0	15,7	0,7	16,0	5,3	4,6	4,8	0,9	0,4	7,4
Cocaína polvo y/o base	96,1	80,0	18,9	9,5	74,7	94,4	8,3	100,0	20,6	17,6	15,9	3,0	1,8	21,7
Éxtasis	94,2	72,9	17,5	6,2	83,2	67,7	3,8	70,3	100,0	44,7	40,9	3,8	6,0	41,1
Anfetaminas	96,7	77,9	18,5	6,8	81,5	66,3	2,2	67,1	48,9	100,0	42,7	2,2	2,8	46,5
Alucinógenos	92,0	72,9	20,0	8,0	79,0	53,8	3,6	56,4	43,3	41,9	100,0	3,6	4,7	84,2

* Hipnosedantes con o sin receta. ** Hipnosedantes sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.161.

Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 30 días). España, 2015.


	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles	Nuevas sustancias
Alcohol	100,0	44,7	6,9	0,9	10,1	1,3	0,1	1,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,5
Tabaco	72,2	100,0	9,9	1,3	16,2	1,8	0,1	1,9	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,8
Hipnosedantes*	53,0	46,9	100,0	12,0	7,0	1,4	0,2	1,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,1	0,4
Hipnosedantes**	61,5	53,8	100,0	100,0	14,6	6,9	0,0	6,9	1,2	1,2	2,2	1,1	0,0	1,8
Cannabis	84,9	83,2	7,8	1,9	100,0	8,8	0,7	9,2	2,5	2,2	2,0	0,7	0,2	4,1
Cocaína en polvo	94,3	80,3	13,5	7,6	74,7	100,0	2,3	100,0	15,4	13,7	8,2	3,5	0,8	14,1
Cocaína base	94,4	98,9	29,8	0,0	90,6	37,5	100,0	100,0	34,6	0,0	21,5	44,2	26,8	37,4
Cocaína polvo y/o base	94,5	81,0	14,8	7,3	75,1	96,3	6,0	100,0	16,4	13,3	9,2	5,2	2,1	15,4
Éxtasis	93,7	73,2	13,1	5,0	78,4	55,5	8,0	62,9	100,0	38,4	18,2	7,0	5,5	23,7
Anfetaminas	93,0	71,0	13,2	5,3	72,2	53,0	0,0	53,0	39,2	100,0	22,8	0,0	0,9	28,5
Alucinógenos	85,0	74,1	20,4	9,7	66,7	32,5	5,5	38,0	21,7	26,9	100,0	5,5	6,1	77,2
Heroína	97,3	100,0	68,9	19,3	89,2	54,9	43,1	84,0	32,3	0,0	22,7	100,0	26,1	10,4
Inhalables volátiles	100,0	72,6	58,7	0,0	72,6	34,5	70,0	90,6	63,0	21,4	63,0	70,0	100,0	9,4
Nuevas sustancias	80,8	80,5	9,3	4,3	76,1	28,8	5,4	33,3	13,3	15,8	42,6	1,3	0,5	100,0

* Hipnosedantes con o sin receta. ** Hipnosedantes sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.162.

Prevalencia de binge drinking y de intoxicaciones étlicas, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.




	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	3,7	7,1	18,5	44,8
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	13,0	19,5	39,0	71,7
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	14,2	22,5	37,3	65,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.163.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015.




	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
No ha hecho binge drinking	4,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Ha hecho binge drinking	20,8	4,1	1,1	1,0	0,8	0,2	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.164.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015.




	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
No se ha emborrachado	5,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Se ha emborrachado	34,4	8,2	2,8	2,3	1,9	0,4	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.165.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.



	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
Puntuación CAST <4	76,7	5,9	1,3	1,5	1,3	0,1	0,1
Puntuación CAST ≥4*	93,6	15,4	5,4	3,7	4,0	2,3	0,6


CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

* Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.166.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según el número de sustancias psicoactivas consumidas* en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Prevalencia consumidores problemáticos de cannabis entre los que han contestado al CAST (CAST \geq 4)	12,1	17,8	34,7
Prevalencia de consumo de cannabis CAST<4	87,9	82,2	65,3

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.167.

Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	No policonsumo (ninguna o una sustancia)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Estado civil				
Soltero/a	36,5	36,3	54,3	67,9
Casado/a	54,9	51,8	34,4	19,6
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	8,6	12,0	11,3	12,4
Nivel de estudios				
Primarios/sin estudios	15,2	14,6	13,0	13,7
Secundarios	63,7	67,7	72,2	69,8
Universitarios	21,1	17,7	14,8	16,5
Percepción sobre el propio estado de salud				
Buena/muy buena	87,7	84,4	79,9	76,2
Regular	10,9	13,3	17,3	20,8
Mala/muy mala	1,5	2,3	2,8	2,9

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.168.

Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Fumar un paquete de tabaco diario	97,0	94,1	88,1	85,2	77,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	72,5	47,9	37,5	29,0	17,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	96,5	91,5	88,0	83,7	74,3
Fumar cannabis una vez o menos al mes	84,0	68,2	57,2	33,8	11,9
Fumar cannabis una vez por semana o más	92,3	85,1	77,6	54,9	31,1
Tomar hipnosedantes una vez o menos al mes	75,0	60,8	54,0	39,4	33,6
Tomar hipnosedantes de una a tres veces por semana	88,6	81,6	76,1	63,7	58,5
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	95,8	93,0	90,2	82,5	81,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	98,1	96,2	94,4	89,5	73,0
Consumir cocaína una vez o menos al mes	97,9	96,5	94,7	89,6	65,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	98,7	98,0	97,1	96,5	92,4
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	98,4	97,8	96,4	93,9	81,6
Consumir GHB una vez o menos al mes	98,5	98,0	96,9	95,0	86,2
Consumir anfetaminas una vez o menos al mes	98,2	97,4	95,7	93,3	77,2
Consumir setas alucinógenas una vez o menos al mes	98,4	97,5	95,8	93,0	76,3
Consumir ketamina una vez o menos al mes	98,7	98,2	96,9	95,0	88,0

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	3,9	4,8	2,9	5,5	8,4	2,6	4,6	6,8	2,3	2,2	3,6	1,0	0,6	0,9	0,3
Ketamina	0,7	0,8	0,5	1,2	1,9	0,6	1,2	1,9	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
GHB	0,4	0,6	0,2	0,9	1,5	0,4	1,1	2,0	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0
Spice	0,5	0,7	0,3	1,2	1,9	0,6	1,1	1,6	0,7	0,7	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2
Mefedrona	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,6	1,1	0,0	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	3,4	5,0	1,8	1,9	0,8	2,8	3,4	5,1	1,7	4,8	6,8	2,7	2,7	4,0	1,3
Ketamina	0,7	1,1	0,3	0,1	0,2	0,0	0,7	1,1	0,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,9	0,2
GHB	0,6	1,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,6	1,1	0,2	0,7	1,1	0,3	0,6	1,0	0,1
Spice	0,8	1,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,9	1,4	0,5	0,7	1,0	0,5
Mefedrona	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,8	0,1	0,7	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.170.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	2,0	2,6	1,5	1,2	2,0	0,4	0,9	1,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1
Ketamina	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,3	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	0,9	1,3	0,4	0,7	0,4	1,0	0,9	1,3	0,4	1,6	2,3	0,9	0,5	0,8	0,2
Ketamina	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spice	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.171.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011-2015.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2011	2013	2015	2011	2013	2015	2011	2013	2015
Nuevas sustancias	–	3,0	3,4	–	0,7	0,9	–	0,3	0,4
Ketamina	1,1	0,8	0,7	0,8	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0
GHB	–	0,6	0,6	–	0,1	0,1	–	0,0	0,0
Spice	1,1	0,5	0,8	0,8	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0
Piperazinas	0,4	0,0	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Mefedrona	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Nexus	0,5	0,2	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Research Chemicals	0,4	0,1	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Legal Highs	0,7	0,0	–	0,6	0,0	–	0,5	0,0	–
Salvia	–	0,5	0,5	–	0,1	0,1	–	0,0	0,1
Esteroides anabolizantes	–	0,2	0,2	–	0,0	0,0	–	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.172.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.



	Spice	Ketamina	GHB	Salvia	Mefedrona	E. anabolizantes
Hombres	1,1	1,1	1,0	0,8	0,2	0,3
Mujeres	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.173.

Distribución de la población de 15-44 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no, según sexo, estado civil y nivel de estudios (porcentajes). España, 2015.


	15-24 años		25-34 años		35-44 años	
	NSP alguna vez	NSP nunca	NSP alguna vez	NSP nunca	NSP alguna vez	NSP nunca
Sexo						
Hombre	63,3	50,8	76,5	48,7	76,0	50,4
Mujer	36,7	49,2	23,5	51,3	24,0	49,6
Estado civil						
Soltero/a	92,0	95,0	79,8	62,3	50,4	27,8
Casado/a	8,0	4,8	18,5	35,6	39,1	63,4
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	0,0	0,2	1,7	2,0	10,4	8,8
Nivel de estudios						
Sin estudios/ estudios primarios	9,6	14,1	11,1	8,3	10,1	8,1
Estudios secundarios	79,6	78,3	64,1	64,8	67,8	66,4
Estudios universitarios	10,9	7,6	24,8	26,9	22,1	25,6

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.174.

Edad de inicio en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.175.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Mefedrona	Salviaa
Una sola sustancia	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0
Dos sustancias	3,3	0,1	3,5	0,0	3,8	0,7
Tres sustancias	5,1	0,7	1,0	1,0	4,2	6,0
Cuatro sustancias	14,9	5,2	2,3	8,5	1,3	13,2
Cinco o más sustancias	75,6	94,0	92,1	90,2	90,7	80,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.176.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Mefedrona	Salviaa
Una sola sustancia	7,1	0,0	6,6	0,0	12,8	3,3
Dos sustancias	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Tres sustancias	18,7	1,7	20,8	29,5	0,0	42,8
Cuatro sustancias	22,3	4,5	18,8	31,0	34,3	14,5
Cinco o más sustancias	43,0	93,7	53,8	39,5	52,8	29,8

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.177.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según edad y sexo. España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nunca han oído hablar de NSP	66,6	64,8	68,5	67,1	62,5	71,8	69,0	65,6	72,6	73,2	71,0	75,2	79,0	78,0	80,2
	TOTAL 15-64 años						MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años					
	T	H	M				T	H	M				T	H	M
Nunca han oído hablar de NSP	71,1	68,4	73,9				71,1	73,5	68,9				71,1	68,2	74,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.178.

Riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad y sexo. España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumir GHB																		
una vez o menos al mes	96,9	96,2	97,7	96,3	96,0	96,7	96,3	95,3	97,2	96,9	95,9	97,9	97,2	96,6	97,7	98,0	97,2	98,7
Consumir ketamina																		
una vez o menos al mes	97,1	96,3	97,9	96,4	96,3	96,6	96,3	95,3	97,3	96,9	96,0	97,9	97,5	96,9	98,0	98,3	97,4	99,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.179.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se hayan consumido alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.180.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas como GHB y ketamina (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
GHB	24,2	27,8	20,4	25,7	28,5	22,7	29,9	33,2	26,4	26,3	30,8	21,2	22,3	26,2	18,7	15,5	18,4	12,3
Ketamina	23,0	26,2	19,6	24,1	26,0	22,1	28,4	31,3	25,4	24,9	29,5	19,7	21,1	24,3	18,1	15,3	18,0	12,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.181.

Vías de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.182.


Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice o salvia alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Salvia
Alcohol	99,2	98,4	98,2	98,4	97,4
Tabaco	94,7	95,0	94,8	94,6	96,8
Anfetaminas/speed	55,0	80,5	79,2	77,3	62,7
Alucinógenos	73,6	100,0	87,7	69,3	84,5
Hipnosedantes con o sin receta	32,4	40,9	38,9	44,5	40,8
Cannabis	94,1	98,3	94,4	97,9	96,8
Éxtasis	53,9	83,3	81,9	68,4	62,4
Cocaína polvo y/o base	74,0	93,1	92,9	91,8	75,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.183.

Prevalencia de consumo de cinco o más sustancias psicoactivas* alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se hayan consumido en alguna ocasión nuevas sustancias, ketamina, GHB, spice o salvia (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.184.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* en los últimos 12 meses en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas** alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales*	Ninguna sustancia legal e ilegal**
Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	96,6	68,6	2,1
No ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	83,5	8,2	14,6


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles)

** Respuesta a la pregunta NS1 del cuestionario

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.185.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2015.




	Alcohol	Borracheras	Borracheras*	Binge drinking*	Tabaco	Hipnosedantes	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos
Ha consumido NSP alguna vez en la vida	90,8	53,4	31,4	48,3	77,8	19,1	59,2	30,8	11,1	10,9	16,5
No ha consumido NSP alguna vez en la vida	77,0	15,5	5,6	16,8	38,9	11,7	7,7	1,0	0,2	0,2	0,0

* Últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.186.

Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según haya consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



	Ha consumido NSP alguna vez en la vida	Nunca ha consumido NSP
Educación sobre las drogas en las escuelas	83,7	91,0
Tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga	76,0	84,1
Legalización del hachís y la marihuana	66,0	36,3
Administración médica de metadona a los consumidores de heroína	60,7	69,7
Campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas	59,7	81,4
Control policial y de aduanas	58,0	81,2
Leyes estrictas contra las drogas	47,7	75,9
Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	46,6	58,5
Tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga	39,9	60,1
Legalización de todas las drogas	27,6	20,7

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.187.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	Diferencia 2015-2013	Diferencia 2015-1997
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6	-	-	-
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3	0,1	-0,3
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99	99,1	99,0	-	-	-
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6	0,8	1,1
Probar cocaína una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	77,4	76,5	72,4	-	-	-
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0	-	-	-
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6	-0,5	2,1
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	76,7	78,2	74,8	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez por semana o más	99,1	99,4	98,5	99,1	99,2	-	-	-	-	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	96,5	2,0	0,5
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	-	-	-
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	0,4	-2,4
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83	81,6	85,5	82,4	79,8	-2,7	-4,2
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	1,3	-6,4
Probar cocaína base 1 o 2 veces en su vida	-	-	-	-	-	-	95,7	91,8	89,5	-	-	-
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	90,0	-0,7	0,8
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	45,8	2,2	0,2
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6	2,8	11,9
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	99,4	99,5	-	-	-
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	97,8	97,2	96,9	-0,2	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.188.


Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos, bastantes, pocos o ningún problema). España, 2015.

	Muchos problemas	Bastantes problemas	Pocos problemas	Ningún problema	NS/NC
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	19,5	25,7	36,8	16,7	1,2
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	34,2	20,2	27,0	12,4	6,1
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	37,8	22,9	24,8	11,7	2,8
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos de una a tres veces por semana	43,3	30,4	15,1	4,7	6,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	51,2	26,3	13,7	5,9	2,8
Fumar un paquete de tabaco diario	55,7	35,0	6,3	2,1	0,9
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	55,9	33,2	8,1	1,7	1,0
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos a diario o casi a diario	64,4	21,3	5,6	2,6	6,1
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	74,3	16,3	4,1	1,1	4,1
Consumir cocaína una vez o menos al mes	77,1	14,9	4,2	1,0	2,8
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	78,0	12,6	3,0	0,9	5,5
Consumir ketamina una vez o menos al mes	78,5	11,9	2,1	0,6	6,9
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	78,5	13,2	3,1	0,8	4,5
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	78,9	12,9	2,3	0,6	5,4
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	79,2	13,5	2,7	0,7	3,9
Consumir heroína una vez o menos al mes	81,8	12,7	2,1	0,5	2,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.189.


Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.190.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



- Consumir heroína una vez o menos al mes
- Consumir alucinógenos una vez o menos al mes
- Consumir éxtasis una vez o menos al mes
- Consumir cocaína una vez o menos al mes
- Consumir 5-6 cañas/copas cada día
- Fumar paquete tabaco diario
- Consumir cannabis una vez o menos al mes
- Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes
- Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	96,5
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	90,0
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	45,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.191.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos), (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



* Paquete tabaco diario. ** 5-6 copas fin de semana.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.192.


Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.193.


Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.194.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.195.


Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad (porcentajes). España, 2015.

	Total	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Paquete tabaco diario	91,6	91,7	91,3	91,3	91,0	92,7
5-6 copas fin de semana	45,8	44,1	42,5	44,1	45,6	52,9
5-6 copas cada día	90,0	90,5	89,5	89,6	89,8	91,1
Cannabis una vez o menos al mes	62,5	54,3	54,6	60,6	64,9	77,1
Cannabis una vez por semana o más	79,8	75,5	74,6	78,7	81,5	88,0
Hipnosedantes una vez o menos al mes	58,0	60,8	58,4	58,5	55,3	57,9
Hipnosedantes de 1 a 3 veces por semana	78,8	81,8	80,3	79,0	77,8	75,9
Hipnosedantes a diario o casi a diario	91,3	93,5	92,8	92,1	90,2	88,3
Éxtasis una vez o menos al mes	94,6	93,4	93,1	94,4	95,3	96,5
Cocaína una vez o menos al mes	94,6	93,3	92,9	94,2	95,4	96,9
Heroína una vez o menos al mes	97,3	96,6	96,8	97,3	97,6	98,2
Alucinógenos una vez o menos al mes	96,5	95,5	95,4	96,3	97,1	97,8
GHB una vez o menos al mes	96,9	96,3	96,3	96,9	97,2	98,0
Anfetaminas una vez o menos al mes	95,9	94,7	95,1	95,9	96,4	97,3
Setas alucinógenas una vez o menos al mes	95,9	94,8	94,6	95,9	96,4	97,8
Ketamina una vez o menos al mes	97,1	96,4	96,3	96,9	97,5	98,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.196.

Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2015.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5
Cocaína	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6	27,4
Alucinógenos (LSD)	37,1	37,0	37,2	42,7	40,0	44,8	40,2	48,7	45,4	33,0	28,7
GHB o éxtasis líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	24,2
Anfetaminas o speed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	29,2
Setas alucinógenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	24,7
Ketamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	23,0
Hipnosedantes con receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.197.


Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	Diferencia 2013-2015
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	26,0	3,0
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	37,7	-0,2
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	36,3	-2,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.198.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0	1,1
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3	0,8
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4	1,6
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8	2,6
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4	7,3
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9	6,1
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	45,1
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	34,9
Personas borrachas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.199.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4	90,8
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2	83,8
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2	80,4
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81	78,7	80,7
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6	74,9
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3	69,3
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9	59,4
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1	58,1
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1	37,4
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.200.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4)	15,3	15,5	66,7
Han consumido cannabis en el último año (CAST <4)	15,2	21,3	59,1
No han consumido cannabis en el último año	40,6	17,6	30,8

CAST: Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.201.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
15-24 años	36,1	39,3	32,8	18,7	18,7	18,8
25-34 años	38,9	43,1	34,6	20,5	20,5	20,5
35-44 años	39,8	42,5	36,8	21,7	22,8	20,5
45-54 años	37,0	38,5	35,6	21,6	20,1	22,9
55-64 años	33,9	35,5	32,1	21,4	20,7	22,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.202.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



	Nada importante	Algo importante	Muy importante
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	55,0	17,1	19,9
No han consumido ninguna droga ilegal en el último año	61,7	8,5	18,4

*Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.203.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Muy buena / buena	96,4	96,8	95,9	94,8	95,0	94,6	88,9	89,0	88,9	81,4	82,5	80,4	68,2	67,9	68,4
Regular	3,4	2,8	4,0	4,9	4,8	5,0	9,6	9,4	9,8	16,2	15,3	17,0	27,4	27,7	27,1
Mala / muy mala	0,3	0,4	0,1	0,3	0,2	0,4	1,5	1,6	1,3	2,4	2,2	2,6	4,4	4,3	4,5


	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Muy buena / buena	85,6	85,9	85,2	96,1	96,4	95,8	85,3	85,6	84,9
Regular	12,6	12,3	12,9	3,9	3,6	4,1	12,8	12,5	13,2
Mala / muy mala	1,8	1,8	1,9	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	1,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.204.

Percepción de estado de salud bueno o muy bueno en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



	HOMBRES	MUJERES
15-19 años	97,1	95,9
20-24 años	96,5	95,9
25-29 años	95,7	96,0
30-34 años	94,4	93,5
35-39 años	91,7	91,6
40-44 años	86,2	85,9
45-49 años	84,4	83,5
50-54 años	79,9	76,8
55-59 años	71,4	72,9
60-64 años	65,2	64,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.205.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años, según se hayan consumido sustancias psicoactivas en los últimos 30 días o no (porcentajes fila). España, 2015.

		15-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
		Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala
Ha hecho binge drinking	Sí	95,2	4,8	88,8	11,2	82,7	17,3	77,9	22,1
	No	95,5	4,5	88,9	11,1	81,3	18,7	67,2	32,8
Ha consumido tabaco	Sí	93,5	6,5	85,5	14,5	78,6	21,4	66,7	33,3
	No	96,6	3,4	91,3	8,7	83,9	16,1	69,1	30,9
Ha consumido hipnosedantes	Sí	75,7	24,3	55,4	44,6	54,7	45,3	45,7	54,3
	No	96,2	3,8	91,5	8,5	84,7	15,3	72,1	27,9
Ha consumido cannabis	Sí	92,3	7,7	80,2	19,8	65,8	34,2	-	-
	No	96,0	4,0	89,6	10,4	82,1	17,9	-	-
Consumo de cocaína	Sí	85,0	15,0	77,8	22,2	-	-	-	-
	No	95,6	4,4	89,1	10,9	-	-	-	-
Consumo de éxtasis	Sí	80,2	19,8	-	-	-	-	-	-
	No	95,6	4,4	-	-	-	-	-	-
Consumo de anfetaminas	Sí	79,2	20,8	-	-	-	-	-	-
	NO	95,5	4,5	-	-	-	-	-	-

Nota: se excluyen de la tabla los grupos con menor base muestral.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).