

# 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2011

## 1.1.1.

Distribución de la muestra de la encuesta EDADES 2011 por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2011.

CCAA	PNSD*	Ampliación**	Realizadas	Error muestral***
Andalucía	2.209	-	2.209	2,1%
Aragón	871	-	871	3,3%
Asturias	786	-	786	3,5%
Baleares	774	204	978	3,1%
Canarias	1.109	1.368	2.477	2,0%
Cantabria	577	415	992	3,1%
Castilla-La Mancha	1.064	-	1.064	3,0%
Castilla y León	1.213	-	1.213	2,8%
Cataluña	2.069	-	2.069	2,2%
C. Valenciana	1.712	-	1.712	2,4%
Extremadura	804	-	804	3,5%
Galicia	1.262	-	1.262	2,8%
Madrid	1.905	-	1.905	2,2%
Murcia	900	-	900	3,3%
Navarra	605	-	605	4,0%
País Vasco	1.117	-	1.117	2,9%
La Rioja	432	317	749	3,6%
Ceuta	209	-	209	6,8%
Melilla	206	-	206	6,8%
<b>Total España</b>	<b>19.824</b>	<b>2.304</b>	<b>22.128</b>	<b>0,7%</b>

\* Muestra financiada por el PNSD.


\*\* Muestra financiada por las CCAA.

\*\*\* Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y  $p=q=0,5$

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


### 1.1.2.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2011.




### 1.1.3.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.4.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.5.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	-	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7
Alcohol	-	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9
Cánnabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	8,3	10,2	8,8
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	7,0	13,0	11,0	17,1
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	4,6	6,0	6,3	7,9
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	8,7	15,4	13,4	19,5

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población española de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	–	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6
Cánnabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Tranquilizantes (con/sin receta)	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8
Tranquilizantes (sin receta)	–	–	–	–	–	0,9	0,9	1,6	0,9
Somníferos (con/sin receta)	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4
Somníferos (sin receta)	–	–	–	–	–	0,8	0,8	1,1	0,6
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4
Hipnosedantes* (sin receta)	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.7.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3
Cánnabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	1,3	1,1
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	–	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	–	–	–	–	2,7	4,7	4,0	6,9
Somníferos (con/sin receta)	–	–	–	–	2,0	2,5	2,7	3,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	–	–	–	–	3,7	5,9	5,2	8,3

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.8.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2
Cánnabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	2,6	2,3	4,0
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	1,1	1,4	1,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	3,1	2,7	4,6

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.9.

Edad media de inicio en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2011.



\* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

### 1.1.10.

Edad media de inicio de consumo de las diferentes sustancias entre la población de 15-64 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5
Bebidas alcohólicas	-	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7
Cánnabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	20,9	21,0
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	33,8	34,5	34,5
Hipnosedantes* (sin receta)	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	-	29,1	29,5	27,8

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

## 1.1.11.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	71,7	77,6	65,7	60,6	72,5	74,4	78,0	69,3	40,7	72,8	67,8	74,2
Alcohol	90,9	94,0	87,7	86,3	91,5	92,0	92,5	90,6	69,7	91,6	89,5	91,7
Cánnabis	27,4	35,4	19,2	34,6	38,4	30,1	22,1	9,0	18,1	27,7	36,9	21,6
Éxtasis	3,6	5,1	2,0	4,0	6,8	4,2	1,4	0,4	0,9	3,7	5,7	2,3
Alucinógenos	2,9	4,4	1,4	3,0	5,3	3,5	1,6	0,4	1,0	3,0	4,4	2,0
Anfetaminas/speed	3,3	4,8	1,7	3,0	5,7	4,2	1,9	0,5	0,4	3,4	4,6	2,4
Cocaína (polvo y/o base)	8,8	12,8	4,7	7,1	13,7	11,8	7,0	1,8	1,6	9,1	11,1	7,4
Cocaína en polvo	8,8	12,7	4,7	7,0	13,7	11,7	6,9	1,8	1,6	9,0	11,0	7,4
Cocaína base	0,9	1,5	0,3	0,4	1,0	1,5	1,2	0,2	0,0	1,0	0,8	1,0
Heroína	0,6	0,9	0,2	0,2	0,6	0,9	0,7	0,1	0,0	0,6	0,4	0,6
Inhalables volátiles	0,8	1,1	0,4	0,8	1,3	1,1	0,4	0,1	0,7	0,8	1,1	0,6
Tranquilizantes (con/sin receta)	17,1	11,9	22,3	7,2	13,0	17,2	21,8	25,3	2,8	17,5	10,7	21,0
Tranquilizantes (sin receta)	1,9	1,7	2,1	1,6	2,0	2,4	1,8	1,6	1,1	1,9	1,8	2,0
Somníferos (con/sin receta)	7,9	5,5	10,2	2,3	5,1	7,9	10,7	13,2	0,7	8,1	3,9	10,3
Somníferos (sin receta)	1,3	1,1	1,4	0,8	1,1	1,6	1,4	1,2	0,1	1,3	1,0	1,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	19,5	13,7	25,4	8,0	14,8	19,3	24,9	29,8	3,3	20,1	12,1	24,1
Hipnosedantes* (sin receta)	2,4	2,1	2,6	2,0	2,5	2,9	2,2	2,1	1,1	2,4	2,3	2,5
Ketamina	1,0	1,5	0,5	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,8	0,5
Spice	0,8	1,2	0,3	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	0,3	0,8	1,2	0,5
Piperazinas	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,2	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	0,8	1,2	0,3	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	0,3	0,8	1,1	0,5
Setas mágicas	2,4	3,5	1,2	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	1,5	2,4	4,3	1,2
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Salvia	0,9	1,3	0,4	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	0,4	0,9	1,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,4	0,2

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

## 1.1.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	40,2	44,2	36,0	40,6	45,9	42,7	40,9	27,7	26,6	40,6	43,8	37,9
Alcohol	76,6	83,2	69,9	78,5	79,5	78,0	76,5	69,3	62,2	77,1	79,1	75,1
Cánnabis	9,6	13,6	5,5	20,7	14,6	8,5	4,3	1,3	13,4	9,5	17,0	5,1
Éxtasis	0,7	1,0	0,4	1,7	1,2	0,4	0,2	0,0	0,5	0,7	1,4	0,2
Alucinógenos	0,4	0,6	0,2	1,3	0,6	0,2	0,1	0,0	0,8	0,4	0,9	0,1
Anfetaminas/speed	0,6	0,9	0,3	1,4	0,9	0,5	0,2	0,0	0,3	0,6	1,1	0,3
Cocaína (polvo y/o base)	2,3	3,6	0,9	3,5	3,6	2,6	1,1	0,2	1,2	2,3	3,6	1,4
Cocaína en polvo	2,2	3,6	0,9	3,4	3,6	2,6	1,1	0,2	1,2	2,3	3,5	1,4
Cocaína base	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2
Heroína	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Tranquilizantes (con/sin receta)	9,8	6,4	13,2	3,9	6,6	9,3	13,1	15,9	2,2	10,0	5,5	12,4
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	1,4	0,9	0,3	0,5	1,0	1,0	0,9
Somníferos (con/sin receta)	4,4	3,1	5,9	1,2	2,5	4,4	6,1	8,0	0,5	4,6	2,0	5,9
Somníferos (sin receta)	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,8	0,8	0,2	0,0	0,6	0,5	0,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	11,4	7,6	15,3	4,2	7,7	10,5	15,3	19,1	2,5	11,7	6,3	14,5
Hipnosedantes* (sin receta)	1,2	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	1,2	0,4	0,5	1,2	1,2	1,2
Ketamina	0,2	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,0
Spice	0,1	0,3	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,2	0,3	0,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
Setas mágicas	0,4	0,6	0,2	1,1	0,8	0,2	0,0	0,0	1,0	0,4	1,0	0,1
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,2	0,3	0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1
Esteroides anabolizantes	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

## 1.1.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	37,6	41,4	33,7	36,5	42,9	40,5	38,9	25,9	20,5	38,2	40,4	35,9
Alcohol	62,3	73,2	51,2	61,9	64,9	63,1	63,6	56,9	41,0	63,1	63,7	61,5
Cánnabis	7,0	10,2	3,8	14,7	11,0	6,3	2,7	1,1	8,2	7,0	12,5	3,7
Éxtasis	0,3	0,4	0,2	0,7	0,5	0,2	0,1	0,0	0,4	0,3	0,6	0,1
Alucinógenos	0,2	0,2	0,1	0,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,3	0,4	0,1	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	1,1	1,8	0,5	1,6	1,8	1,4	0,7	0,0	0,4	1,2	1,7	0,8
Cocaína en polvo	1,1	1,8	0,5	1,6	1,7	1,4	0,7	0,0	0,4	1,2	1,7	0,8
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	6,9	4,4	9,6	1,8	3,5	6,5	10,1	12,9	0,3	7,2	2,8	9,5
Tranquilizantes (sin receta)	0,5	0,5	0,6	0,3	0,5	0,8	0,8	0,2	0,0	0,6	0,4	0,6
Somníferos (con/sin receta)	3,4	2,1	4,7	0,7	1,6	3,1	5,0	6,7	0,2	3,5	1,3	4,7
Somníferos (sin receta)	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,7	0,2	0,0	0,4	0,3	0,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	8,3	5,2	11,4	2,0	4,3	7,5	12,0	15,7	0,4	8,5	3,4	11,3
Hipnosedantes* (sin receta)	0,7	0,6	0,8	0,5	0,6	1,0	1,0	0,3	0,0	0,7	0,6	0,8
Ketamina	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
Spice	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.14.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Tabaco	30,4	34,1	26,7	26,8	34,2	33,7	32,3	21,9	13,8	31,0	31,3	29,9
Alcohol	10,2	15,3	5,0	1,6	4,8	9,2	14,4	21,6	1,0	10,5	3,5	14,4
Cánnabis	1,7	2,7	0,7	3,4	2,6	1,7	0,7	0,3	1,4	1,8	2,9	1,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	4,0	2,2	5,8	0,7	1,5	3,8	6	7,9	0,2	4,1	1,2	5,7
Somníferos (con/sin receta)	1,7	0,9	2,4	0,3	0,5	1,7	2,2	3,9	0,2	1,7	0,4	2,4
Hipnosedantes* (con/sin receta)	4,6	2,5	6,7	0,8	1,7	4,2	6,6	9,7	0,2	4,7	1,3	6,5

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADADES).

### 1.1.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9
Cánnabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Inhalables	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7
Hipnosedantes* (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3
Hipnosedantes* (sin receta)	8,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EADADES).

## 1.1.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2
Cánnabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7
Hipnosedantes*	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

## 1.1.17.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7
Cánnabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6
Inhalables	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,0	0,4	1,1	0,6
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16	7,1	13,8	10,7	21,0
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.18.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1
Cánnabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.19.


Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2011.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5
Cánnabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5
Somníferos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.20.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.




1.1.21.

Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.



1.1.22.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2011.




1.1.23.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.



1.1.24.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.



1.1.25.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	88,1	84,5	94,0	89,0	94,7	89,0	95,6	89,6	96,5	84,6
Último año	81,9	75,0	85,9	72,8	84,1	71,6	83,5	69,7	79,2	59,5
Último mes	67,3	56,3	74,9	54,4	74,6	50,8	74,6	53,0	72,2	41,2
Diario en el último mes	2,2	1,0	7,3	2,1	13,8	4,3	21,9	7,1	32,5	10,5
Nunca	11,9	15,5	6,0	11,0	5,3	11,0	4,4	10,4	3,5	15,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.26.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según el tipo de bebida consumida (porcentajes). España, 2011.



1.1.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en fin de semana, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.



1.1.28.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en función de los días de la semana que se consume, y según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.

	% que ha consumido 1, 2 o 3 fines de semana en el último mes	% que ha consumido todos los fines de semana en el último mes	% que ha consumido 1, 2 o 3 días laborables por semana en el último mes	% que ha consumido todos los días laborables de la semana en el último mes
Total	32,4	28,6	18,4	12,3
Sexo				
Hombres	33,3	38,4	22,2	18,5
Mujeres	31,4	18,7	14,6	6,0
Edad				
15-17 años	29,6	10,4	6,5	1,1
18-64 años	32,5	29,3	18,8	12,7
15-34 años	38,2	24,3	19,1	4,6
35-64 años	28,8	31,3	18,0	17,0
15-64 años	32,4	28,6	18,4	12,3

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.29.


Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.30.

Prevalencia de consumo en atracón\* de bebidas alcohólicas (*binge drinking*) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.31.

Prevalencia de bebedores de riesgo\* entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	Total	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	Hombre	Mujer
Prevalencia de bebedores de riesgo	4,1	4,3	4,3	3,6	4,3	4,2	4,5	3,5

\* Bebedor de riesgo: hombre que consume, por término medio, 50 cc o más de alcohol puro/día o mujer que consume, por término medio 30 cc o más de alcohol puro/día.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2011.



1.1.33.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.34.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2011.




1.1.35.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes\* (con o sin receta) y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



### 1.1.36.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes\* (con o sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.37.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15 A 64 AÑOS			15 A 34 AÑOS			35 A 64 AÑOS		
	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer
<b>Hipnosedantes* con o sin receta</b>									
Alguna vez	19,5	13,7	25,4	12,1	8,9	15,4	24,1	16,7	31,5
Último año	11,4	7,6	15,3	6,3	4,8	7,9	14,5	9,3	19,8
Último mes	8,3	5,2	11,4	3,4	2,6	4,2	11,3	6,9	15,7
<b>Tranquilizantes con o sin receta</b>									
Alguna vez	17,1	11,9	22,3	10,7	7,8	13,8	21,0	14,5	27,5
Último año	9,8	6,4	13,2	5,5	4,1	7,1	12,4	7,9	16,9
Último mes	6,9	4,4	9,6	2,8	2,1	3,6	9,5	5,8	13,2
<b>Somníferos con o sin receta</b>									
Alguna vez	7,9	5,5	10,2	3,9	3,3	4,6	10,3	6,9	13,6
Último año	4,4	3,1	5,9	2,0	1,7	2,4	5,9	3,9	8,0
Último mes	3,4	2,1	4,7	1,3	1,0	1,5	4,7	2,9	6,6

\* Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.38.

Evolución temporal de la prevalencia de consumo de hipnosedantes\* (sin receta) en la población de 15-64 años. España, 2003-2011.

	2003	2005	2007	2009	2011
Últimos 12 meses	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.39.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes\* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.


	15 A 64 AÑOS			15 A 34 AÑOS			35 A 64 AÑOS		
	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer	Global	Hombre	Mujer
Hipnosedantes (sin receta)	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,1	1,2	1,0	1,3
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	0,8	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.40.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes\* (sin receta) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.41.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis y edad media de inicio en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.42.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.43.

Prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 30 días en las mujeres de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2009-2011.



### 1.1.44.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cánnabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6
Prevalencia últimos 30 días (%) C	–	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,1	7,6	7,0
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 12 meses (%) B/A	51,7	33,6	35,7	38,7	39,0	39,2	37,0	33,0	35,2
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 30 días (%) C/A	–	20,1	23,0	26,9	26,2	30,4	26,0	23,7	25,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.46.

Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.47.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.48.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (base y polvo) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.49.

Prevalencia de consumo de cocaína general (base y/o polvo) en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.50.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años según sexo. España, 1995-2011.



### 1.1.51.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad. España, 1995-2011.



### 1.1.52.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años. España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Prevalencia alguna vez en la vida (%) A	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8
Prevalencia últimos 12 meses (%) B	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2
Prevalencia últimos 30 días (%) C	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 12 meses (%) B/A	47,1	51,6	52,1	45,8	42,9	37,5	25,5	25,6
De los que han consumido alguna vez, porcentaje que ha consumido en los últimos 30 días (%) C/A	26,5	29,0	27,1	18,6	22,9	20,0	11,8	13,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.54.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.55.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.56.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.57.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.




1.1.58.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.




1.1.59.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.60.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2011.



1.1.61.


Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales o ilegales) entre las personas que han consumido al menos una droga legal o ilegal en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (%). España, 2011.

	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Una sola sustancia	51,9	57,1
Dos sustancias	34,7	33,2
Tres sustancias	10,0	7,8
Cuatro sustancias	2,2	1,3
Cinco o más sustancias	1,2	0,6




1.1.62.

Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 12 meses entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.63.

Prevalencias de consumo múltiple de drogas en los últimos 30 días entre los consumidores de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.64.

Prevalencia de policonsumo de dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes de columna). España, 2011.

	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	95,3	99,0	98,7	99,8
Tabaco	82,8	97,1	96,6	98,3
Cánnabis	5,0	62,6	95,1	95,1
Éxtasis	0,0	0,8	5,7	50,7
Tranquilizantes	14,5	30,5	36,4	43,2
Somníferos	6,4	14,6	16,1	23,8
Cocaína en polvo	0,2	4,0	54,1	82,3
Cocaína base	0,0	0,0	3,1	10,0
Anfetaminas/speed	0,0	0,5	4,5	49,0
Alucinógenos	0,0	0,3	3,3	31,9
Heroína	0,0	0,0	0,5	8,6
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,6	7,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.65.

Distribución del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los consumidores, en función de la edad (porcentajes). España, 2011.

	15-17	18-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Una sola sustancia	60,8	51,7	48,5	47,3	52	53,2	59,8
Dos sustancias	22,2	35	29,5	35,1	35,4	36,7	35
Tres sustancias	14,3	9,9	16,2	12,9	8,8	8,1	4,8
Cuatro sustancias	1,5	2,3	3,4	3	2,6	1,5	0,4
Cinco o mas sustancias	1,3	1,2	2,4	1,7	1,1	0,6	0,1

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

## 1.1.66.

Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 12 meses (porcentajes de columna). España, 2011.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Éxtasis	Tranquilizantes	Somníferos	Hipnosedantes*	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	–	84,7	94,4	97,2	70,9	71,0	71,5	98,1	90,4	98,2	97,6	97,7	94,5	100,0
Tabaco	44,5	–	84	87,7	46,8	49,8	46,4	88,0	93,8	87,8	90,8	92,7	100,0	94,7
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,9	5,1	0,4	0,1	0,3	2,4	5,7	2,3	7,9	11,1	6,5	–
Anfetaminas/speed	0,8	1,4	5,0	51,4	1,4	2,0	1,5	18,2	20,9	18,0	–	52,6	37,1	51,3
Alucinógenos	0,5	0,9	3,7	29,7	0,9	1,1	0,9	10,0	10,3	9,9	35,4	–	24,7	48,9
Heroína	0,1	0,2	0,9	3,5	0,7	1,0	0,6	2,4	17,8	2,4	5,9	5,8	–	6,8
Tranquilizantes	9,0	11,4	12,4	16,3	–	64,6	86,2	17,4	45,0	17,5	23,1	22,5	69,6	43,1
Somníferos	4,1	5,5	5,8	9,8	29,2	–	39,2	10,9	35,7	10,8	14,7	12,3	46,5	6,2
Hipnosedantes*	10,6	13,2	13,6	18,2	–	–	–	19,2	47,5	19,3	28,1	24,9	73,8	43,1
Cánnabis	11,9	20,2	–	84,7	12,2	12,6	11,5	81,5	94,0	81,5	79,4	88,2	90,3	94,7
Éxtasis	0,9	1,5	6,0	–	1,1	1,5	1,1	19,6	29,5	19,6	57,9	49,7	24,7	39,2
Cocaína en polvo	2,9	4,9	19,0	64,2	3,9	5,4	3,7	–	84,3	98,9	68,7	55,1	56,7	57,3
Cocaína base	0,2	0,4	1,6	7,1	0,7	1,3	0,7	6,2	–	7,2	5,7	4,1	30,4	10,1
Cocaína (polvo y/o base)	2,9	5,0	19,2	65	4,0	5,4	3,8	–	–	–	68,7	55,1	56,7	57,3

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.67.

Proporción de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cánnabis, éxtasis, tranquilizantes, somníferos, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína general (polvo y/o base), anfetaminas, alucinógenos, heroína o inhalables volátiles en los últimos 30 días (porcentajes de columna). España, 2011.

	Alcohol	Tabaco	Cánnabis	Éxtasis	Tranquilizantes	Somníferos	Hipnosedantes*	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	-	72,6	87,5	90,1	51,1	54,0	52,3	98,3	100,0	98,3	93,0	88,0	96,5	100,0
Tabaco	43,9	-	84,5	89,2	45,1	46,2	44,3	89,4	100,0	89,5	97,8	94,1	100,0	100,0
Inhalables volátiles	0,0	0,1	0,2	3,3	0,2	0,2	0,1	0,7	0,0	0,7	6,1	4,6	9,7	-
Anfetaminas/speed	0,4	0,7	2,9	46,9	0,5	0,9	0,5	11,3	9,8	11,3	-	48,0	38,3	63,0
Alucinógenos	0,2	0,4	1,8	30,6	0,4	0,5	0,4	4,8	14,4	4,8	32,3	-	25,7	31,6
Heroína	0,1	0,2	0,8	3,7	0,8	0,9	0,7	2,5	20,8	2,4	9,8	9,8	-	25,5
Tranquilizantes	5,6	8,4	8,4	11,1	-	61,4	84,1	15,2	37,5	15,3	13,3	17,4	83,4	50,7
Somníferos	2,9	4,2	4,6	8,3	30,1	-	41,3	11,2	32,6	11,1	12,7	9,4	47,4	22,1
Hipnosedantes*	6,9	9,8	9,7	12,4	-	-	-	18,1	42,4	18,1	17,4	19,5	83,4	50,7
Cánnabis	10,0	15,9	-	75,5	8,5	9,6	8,2	76,4	97,3	76,4	82,5	79,2	96,1	91,9
Éxtasis	0,4	0,7	2,9	-	0,4	0,7	0,4	11,7	19,6	11,6	52,2	49,8	15,9	37,4
Cocaína en polvo	1,8	2,7	12,4	48,5	2,5	3,7	2,4	-	92,5	99,4	51,6	32,6	43,5	34,5
Cocaína base	0,2	0,3	1,3	6,8	0,5	0,9	0,5	7,7	-	8,3	3,7	8,1	30,7	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,8	2,7	12,5	48,5	2,5	3,7	2,5	-	-	-	51,6	32,6	43,5	34,5

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.68.


Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras drogas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2011.

Total	Hombre	Mujer	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
0,4	0,6	0,2	0,1	0,3	0,8	0,5	0,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.69.

Proporción de la población española de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes)\*. España, 2011.



Conductas	Porcentaje
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	49,3
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos 1 vez o menos al mes	62,5
Fumar hachís o marihuana 1 vez o menos al mes	69,4
Probar cocaína 1 o 2 veces en su vida	76,5
Probar éxtasis, 1 o 2 veces en su vida	78,2
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos 1 vez por semana o más	79,9
Fumar hachís o marihuana 1 vez por semana o más	85,5
Fumar un paquete de tabaco diario	89,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	91,7
Probar cocaína en forma de base o crack 1 o 2 veces en su vida	91,8
Consumir cocaína 1 vez o menos al mes	94,5
Consumir éxtasis 1 vez o menos al mes	95,4
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) 1 vez o menos al mes	96,6
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez o menos al mes	97,8
Consumir heroína 1 vez o menos al mes	98,0
Consumir éxtasis 1 vez por semana o más	98,9
Consumir cocaína 1 vez por semana o más	99,1
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez por semana o más	99,4
Consumir heroína 1 vez por semana o más	99,6


\* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.70.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95	95,8	94,6	94,5
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4
Consumir tranquil/somn una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45	49,3



## 1.1.71.


Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas), según sexo y edad. España, 2011.

	SEXO		EDAD						TOTAL	
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	
Fumar un paquete de tabaco diario	87,2	91,0	88,0	88,8	89,4	89,2	89,8	89,2	89,1	89,1
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	43,1	55,7	47,3	42,3	47,3	51,7	60,5	60,9	48,9	49,3
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	89,1	94,3	91,6	91,1	91,1	92,0	92,8	94,1	91,6	91,7
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	63,4	75,5	59,6	60,1	67,4	75,4	86,9	71,6	69,3	69,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	81,0	90,1	80,3	80,3	84,5	89,5	94,2	86,9	85,5	85,5
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez o menos al mes	62,5	62,4	65,8	61,4	61,3	62,6	62,6	73,6	62,1	62,5
Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez por semana o más	79,9	79,9	83,7	80,9	79,3	79,5	76,5	86,7	79,7	79,9
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	75,0	81,5	71,6	72,9	76,5	82,7	88,9	75,8	78,3	78,2
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	94,0	96,7	92,5	93,8	95,4	97,4	97,8	94,0	95,4	95,4
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,5	99,4	98,4	98,5	99,1	99,3	99,4	98,9	98,9	98,9
Probar cocaína una o dos veces en su vida	72,4	80,7	71,1	70,9	74,5	80,8	87,0	76,2	76,5	76,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	92,7	96,4	92,4	92,3	94,4	95,8	98,0	94,1	94,6	94,5
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,7	99,5	98,7	98,8	99,1	99,4	99,6	99,4	99,1	99,1
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,4	98,7	96,8	97,7	98,0	98,7	98,8	97,8	98,0	98,0
Consumir heroína una vez por semana o más	99,5	99,8	99,5	99,6	99,6	99,7	99,8	99,8	99,6	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) una vez o menos al mes	95,6	97,7	94,5	95,3	96,9	97,9	98,6	96,9	96,6	96,6
Probar cocaína en forma de base o crack 1 o 2 veces en su vida	90,2	93,4	88,7	90,5	91,4	93,6	94,9	89,9	91,9	91,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	97,1	98,5	96,7	97,2	97,9	98,4	99,0	97,8	97,8	97,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	99,2	99,7	99,1	99,4	99,5	99,5	99,7	99,9	99,4	99,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


### 1.1.72.

Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas). España, 1997-2011.




### 1.1.73.

Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes)\*. España, 1995-2011.




1.1.74.

Evolución de la disponibilidad percibida de cánnabis (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y el precio por gramo de hachís en la población de 15-64 años (porcentajes)\*. España, 1997-2011.




1.1.75.

Evolución de la prevalencia de consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.




### 1.1.76.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.




### 1.1.77.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) en la población de 15-64 años (porcentajes)\*. España, 2001-2011.



### 1.1.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (1 vez o menos al mes). Porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas. España, 1997-2011.



### 1.1.79.

Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2011.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	Diferencia 2009- 2011
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	7,1
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	1,8
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52	49,8	48,9	40	-8,9

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.80.


Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), diferencia en los últimos 10 años. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	Diferencia 2001-2011
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	-5,5
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	-3,8
Personas fumando chinos	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	-2,8
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	-3,5
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10,0	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	1,9
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	-

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).


1.1.81.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2011.



1.1.82.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.



1.1.83.


Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes)\*. España, 1995-2011.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2
Legalización de cánnabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9



### 1.1.84.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2011.



### 1.1.85.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias\* entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2011.

	15-18 años			19-34 años			35-64 años			15-64 años		
	Global	H	M									
Alguna vez en la vida	2,4	3,5	1,3	6,6	9,5	3,6	2,1	3,3	0,9	3,6	5,4	1,8
Último año	1,8	2,4	1,2	1,7	2,6	0,8	0,3	0,5	0,1	0,9	1,3	0,4
Último mes	0,4	0,6	0,2	0,8	1,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,2

\* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.86.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias\* entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Ketamina	1,0	0,2	0,0
Spice	0,8	0,1	0,1
Piperazinas	0,1	0,0	0,0
Mefedrona	0,1	0,0	0,0
Nexus	0,2	0,0	0,0
Metanfetamina	0,8	0,2	0,1
Setas mágicas	2,4	0,4	0,1
Research chemicals	0,1	0,0	0,0
Legal highs	0,1	0,0	0,0
Salvia	0,9	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,3	0,1	0,1

\* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.87.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias\* alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2010-2011.


	TOTAL	2010	2011								
		14-18	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Ketamina	1,0	1,1	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	0,2	1,0	1,8	0,5
Spice	0,8	1,1	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	0,3	0,8	1,2	0,5
Piperazinas	0,1	0,4	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1
Nexus	0,2	0,5	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,1
Metanfetamina	0,8	0,8	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	0,3	0,8	1,1	0,5
Setas mágicas	2,4	2,1	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	1,5	2,4	4,3	1,2
Research chemicals	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,7	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Salvia	0,9	–	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	0,4	0,9	1,5	0,5
Esteroides anabolizantes	0,3	–	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,0	0,3	0,4	0,2

\* Incluye: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES) y Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES).


1.1.88.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2011.



1.1.89.

Prevalencia de consumo de diversas sustancias alguna vez en la vida en la población española de 15-34 años (porcentajes). España, 2011.



### 1.1.90.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)\*, según sexo y edad. España, 2011.

	SEXO		EDAD					TOTAL
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ketamina	94,4	96,5	93,9	94,4	95,8	96,6	97,2	95,4
Spice	94,3	96,7	93,0	94,6	96,2	96,4	97,5	95,4
Piperazinas	95,5	97,2	95,1	95,5	96,5	96,8	98,3	96,3
Mefedrona	95,6	97,3	95,2	95,5	96,9	96,8	98,3	96,4
Nexus	95,4	97,2	94,5	95,4	96,9	96,9	97,7	96,2
Metanfetamina	94,5	97,2	94,1	95,1	96,0	96,8	97,4	95,7
Setas mágicas	90,1	94,3	87,6	89,9	93,0	95,8	96,5	92,0
Research chemicals	95,7	97,4	95,4	95,7	96,9	97,1	97,7	96,5
Legal highs	95,4	97,4	95,3	95,2	96,8	97,0	98,0	96,3
Salvia	92,0	94,9	91,2	91,5	94,6	94,6	95,8	93,3
Esteroides anabolizantes	91,5	94,5	90,5	91,9	93,8	93,3	95,9	92,9

\* Eliminando los casos que señalan que No conocen la sustancia o que han contestado Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

### 1.1.91.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes)\*. España, 2011.

	SEXO		EDAD					TOTAL
	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	
Ketamina	43,0	39,2	45,8	45,5	42,0	36,1	28,4	41,4
Spice	45,3	42,2	49,0	49,0	44,0	38,4	30,9	43,9
Piperazinas	42,8	39,2	45,5	45,0	42,8	36,5	29,2	41,2
Mefedrona	42,2	38,7	45,6	44,7	41,5	36,2	28,6	40,7
Nexus	42,2	39,3	45,1	44,8	42,1	36,3	29,9	40,9
Metanfetamina	43,4	38,6	46,5	45,4	41,5	36,3	29,2	41,3
Setas mágicas	46,4	40,3	50,2	47,9	42,8	37,8	30,9	43,7
Research chemicals	42,7	39,3	45,9	44,9	42,1	37,5	28,5	41,2
Legal highs	42,5	39,1	45,8	45,2	42,2	36,4	28,2	41,0
Salvia	44,8	40,7	48,4	47,7	43,7	36,9	31,1	43,0
Esteroides anabolizantes	51,7	45,2	54,4	55,2	48,7	41,8	35,2	48,8


\* Eliminando los casos que señalan que No conocen la sustancia o que han contestado Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Vías de obtención de nuevas sustancias entre aquellos que las han conseguido alguna vez, en la población de 15-64 años (porcentajes)\*. España, 2011.

¿Dónde consiguió estas drogas?	
A través de Internet: páginas web	0,9
A través de Internet: redes sociales	0,4
A través de Internet: foros	0,1
Un amigo/a o conocido/a	55,0
A través de un distribuidor	13,2
En una discoteca o bar	13,2
En una tienda especializada (smart shop o head shop)	6,1
En un festival	5,4
Otros	5,6



1.1.93.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.

	Vías por las que ha recibido información	Vías por las que le gustaría recibir información
A través de Internet: páginas web	6,1	14,2
A través de Internet: redes sociales	2,4	9,2
A través de Internet: foros	1,3	5,0
Padres/familiares	5,2	6,2
Un amigo/a, conocido/a o compañero/a de trabajo	14,2	5,1
Profesionales sociosanitarios (médicos, enfermeras/os, trabajadores sociales)	4,0	18,6
Profesores/as	6,7	14,4
Charlas o cursos sobre el tema	5,8	16,4
Organismos oficiales (ministerios, consejerías...)	2,6	11,8
Libros y/o folletos	6,8	14,6
Los medios de comunicación (prensa, televisión o radio)	30,0	39,4
La policía	1,2	5,0
Personas que han tenido contacto con ellas	6,6	8,0
Otros	1,4	0,7
No he recibido información sobre dichas drogas	50,8	-
No me interesa este tipo de información	-	34,5
No contesta	1,8	3,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.94.


Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre nuevas sustancias y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de nuevas sustancias, los efectos y los problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2011.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES)

1.1.95.

Número de sustancias psicoactivas consumidas alguna vez en la vida entre los consumidores de cada una de las nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011.



1.1.96.

Proporción de consumidores de algunas drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido “nuevas sustancias” (ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research chemicals, legal highs, salvia y esteroides anabolizantes) en los últimos 12 meses (%). España, 2011.

	Ketamina	Spice	Piperazinas	Mefedrona	Nexus	Metanfetamina	Setas mágicas	Research chemicals	Legal highs	Salvia	E. anabolizantes
Alcohol	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	97,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Tabaco	97,2	85,2	79,0	100,0	100,0	88,2	87,9	79,0	100,0	81,4	82,0
Inhalables volátiles	12,4	7,4	55,3	19,2	0,0	12,8	5,6	26,5	0,0	4,7	0,0
Anfetaminas/speed	61,8	48,5	79,0	73,1	68,5	71,4	32,6	87,7	71,0	22,6	20,1
Alucinógenos	46,6	25,9	55,3	67,6	54,4	37,4	45,8	47,6	10,7	18,1	5,0
Heroína	9,2	11,4	0,0	10,4	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6
Tranquilizantes	34,2	13,5	38,8	9,0	58,8	27,3	17,3	26,5	12,6	15,2	44,3
Somníferos	22,2	13,3	0,0	0,0	34,7	17,2	7,6	21,1	12,6	4,0	25,7
Hipnosedantes*	34,8	14,5	38,8	9,0	58,8	27,3	19,2	47,6	12,6	15,2	45,2
Cánnabis	94,1	90,8	100,0	100,0	100,0	84,3	84,9	100,0	100,0	73,3	55,5
Éxtasis	67,5	49,8	55,3	66,5	92,6	61,2	36,0	87,7	71,0	19,0	20,9
Cocaína en polvo	79,9	67,1	79,0	69,4	79,9	74,1	48,2	66,5	71,0	32,9	34,0
Cocaína base	13,2	20,3	0,0	0,0	0,0	15,3	3,9	21,0	0,0	3,7	19,1
Cocaína (polvo y/o base)	79,9	71,6	79,0	69,4	79,9	74,1	48,2	66,5	71,0	32,9	34,0

\* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. FUENTE: OEDT. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).