

ESTADÍSTICAS 2021

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD)

Begoña BRIME. Nuria GARCÍA. Luz LEÓN. Noelia LLORENS. Marian LÓPEZ. Marta MOLINA. Carmen TRISTÁN. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Rosario BALLESTA

Ara MILLÁN

Mónica TENA

Lara FORNOVI

Aragón

Carmen BARANGUAN

Francisco Javier FALO

Laura JOSÉ

Asturias

Jose Ramon HEVIA

Jose Antonio GONZALEZ

Luisa GONZÁLEZ

Javier DOLADO

Julio César FERNÁNDEZ

Baleares

Francisca BIBILONI

Rut SUAREZ

Mª Eugenia JANER

Alicia MAGISTRIS

Ana FERRER

Canarias

Luz Marina MORENO

Nicolas PERDOMO

Nicolás AMADOR

Ángel RODRIGUEZ

María del Mar VELASCO

Cantabria

Carmen DIEGO

Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO

Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Susana REDONDO

Ana SÁNCHEZ

Esperanza VÁZQUEZ

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Joan COLOM

Mercè GOTSSENS

Xavier MAJO

Regina MUÑOZ

Josep M. OLLÉ

Extremadura

Mercedes CORTÉS

Mª Pilar MORCILLO

José Antonio SANTOS

Galicia

Sara CERDEIRA

Mercedes LIJO

Maria TAJES

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

Piedad HERNANDO

Mª del Carmen ÁLVAREZ

Murcia

Mónica BALLESTA

Mª Dolores CHIRLAQUE

Juan Francisco CORREA

Purificación ROS

Navarra

Raquel GONZÁLEZ

Miguel MARTÍNEZ

Mª Ángeles NUIÑ

País Vasco

Elena ALDASORO

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

Itziar LARIZGOITIA

Mikel SÁNCHEZ

La Rioja

Cristina NUEZ

Pello LATASA

Comunidad Valenciana

Ofelia GIMENO

Mª Jesus MATEU

Francesc J. VERDU

Blanca NAVARRO

Noelia SELLES

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Cleopatra R'KAINA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

Juán Luis CABANILLAS

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación y Formación Profesional y Departamentos de Educación de las comunidades autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre el Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes comunidades y ciudades autónomas y organizaciones no gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@sanidad.gob.es

Internet: <https://pnsd.sanidad.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD

Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 133-21-116-2

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado (CPAGE): <https://cpage.mpr.gob.es>

CITA SUGERIDA: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Estadísticas 2021. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Madrid: Ministerio de Sanidad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; 2021. 213 p.

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) hace público cada año su documento de Estadísticas, que complementa la información disponible en el Informe anual del OEDA. En esta edición de 2021, se amplía la información de los resultados pormenorizados de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) en su edición 2019/2020, junto con el análisis de los indicadores de admisiones a tratamiento, urgencias, y mortalidad relacionada con las drogas, además de actualizar sus tendencias hasta 2019, último año para el que hay datos disponibles.

La solidez y trayectoria de los informes y estadísticas anuales elaborados por el Observatorio, contribuyen a poder hacer un diagnóstico global del estado de situación de las drogas y las consecuencias de su consumo a nivel nacional. Por tanto, ayuda a construir unas políticas y actuaciones basadas en datos sólidos, y sirve de apoyo a la toma de decisiones. Pero, además, proporciona información a todos los agentes implicados en el ámbito de la prevención y atención de las adicciones para un mejor conocimiento de esta realidad, proporcionando respuestas a la demanda social de transparencia. De hecho, las series de informes y estadísticas están disponibles para toda la ciudadanía, y los indicadores de visitas y descargas en la web sugieren que son de utilización amplia.

Esta publicación no habría sido posible sin la colaboración de todas las personas e instituciones que contribuyen anualmente a su edición con su trabajo: quiero expresarles mi más sincero agradecimiento. En particular, deseo reconocer la profesionalidad y dedicación de las personas que conforman el equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones: sin su labor y esfuerzo, este documento no estaría a disposición de la sociedad.

Joan R. Villalbí

Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2021

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	25
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	26
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2019/2020	27
Metodología: tamaño muestra	
1.1.1 Evolución del tamaño de muestra válida de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años (número de personas). España, 1995-2019/2020	27
1.1.2 Distribución de la muestra válida de la encuesta EDADES por comunidad autónoma (número de personas). España, 2019/2020	27
1.1.3. Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (%). España, 2019/2020 ..	28
Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas 2013-2019/2020: evolución temporal por sexo	
1.1.4. Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España 2013-2019/2020	28
1.1.5. Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (números absolutos). España 2013-2019/2020	29
Prevalencia del consumo de drogas 1997-2019/2020: evolución temporal. Edad y sexo	
1.1.6. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	29
1.1.7. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	30
1.1.8. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	31
1.1.9. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	31
1.1.10. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020	32
1.1.11. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020	32

1.1.12.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020	33
1.1.13.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020	33
1.1.14.	Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020	34
1.1.15.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (años). España, 2019/2020	34
1.1.16.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2019/2020	34
1.1.17.	Evolución de la edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	35
1.1.18.	Edad media de inicio de consumo de diferentes sustancias psicoactivas y otras adicciones entre la población de 15-64 años, según sexo (años). España, 2017-2019/2020	35
1.1.19.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1995-2019/2020	36
1.1.20.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1995-2019/2020	37
1.1.21.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1997-2019/2020	38
1.1.22.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019/2020	39
1.1.23.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	40
1.1.24.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020	41

Prevalencia del consumo de drogas 2019/2020: comunidad/ciudad autónoma

1.1.25.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	42
1.1.26.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	43
1.1.27.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020	44
1.1.28.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	45
1.1.29.	Prevalencia de borracheras alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	46
1.1.30.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	47
1.1.31.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	48
1.1.32.	Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	49

1.1.33.	Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	50
1.1.34.	Prevalencia de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	51
1.1.35.	Prevalencia de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020	52
1.1.36.	Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	53
1.1.37.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020	54
1.1.38.	Prevalencia de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	55
1.1.39.	Prevalencia de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad Autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020	56
1.1.40.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	57
1.1.41.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	58
1.1.42.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020	59
1.1.43.	Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020	60
1.1.44.	Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%) por comunidad/ciudad autónoma. España, 2019/2020	61

Consumo por tipo de droga: bebidas alcohólicas

1.1.45.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%) y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2019/2020	62
1.1.46.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2019/2020	62
1.1.47.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019	63
1.1.48.	Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019	63
1.1.49.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años que ha consumido bebidas alcohólicas en ese periodo, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2019/2020	63
1.1.50.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en fines de semana y días laborables en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	64
1.1.51.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida en fin de semana y días laborables (%). España, 2019/2020	64
1.1.52.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	64

1.1.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo del consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020	65
1.1.54.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2019/2020	65
1.1.55.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	66
1.1.56.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 1997-2019/2020	66
1.1.57.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	67
1.1.58.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	67
1.1.59.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días en la población de 15 a 64 años que se ha emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2019/2020	67
1.1.60.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2019/2020	68
1.1.61.	Evolución de la prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2011-2019/2020	68
1.1.62.	Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	69
1.1.63.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	69
1.1.64.	Riesgo percibido ante el consumo de bebidas alcohólicas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no (%). España, 2019/2020	70
1.1.65.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o no (%). España, 2019/2020	70
1.1.66.	Prevalencia de botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	70
1.1.67.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	70
1.1.68.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según hayan hecho botellón en el último año o no (%). España, 2019/2020	71
1.1.69.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya hecho botellón en el último año o no (%). España, 2019/2020	71
1.1.70.	Razones referidas para el consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	71

1.1.71.	Porcentaje de población que se muestra de acuerdo con determinadas políticas en materia de alcohol. Población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	72
1.1.72.	Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según edad y sexo. España, 2017-2019/2020	72
1.1.73.	Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según su consumo de alcohol. España, 2019/2020	72
1.1.74.	Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según edad y sexo. España, 2017-2019/2020	73
1.1.75.	Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según su consumo de alcohol. España, 2019/2020	73
1.1.76.	Evolución de la prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2009-2019/2020	73
1.1.77.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) en la población de 15-64 años (porcentajes y estimación). España, 2009-2019/2020	74
1.1.78.	Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2017-2019/2020	74
1.1.79.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT \geq 20), entre la población de 15 a 64 años que ha contestado la escala AUDIT, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	74
1.1.80.	Prevalencia de consumos intensivos de alcohol en la población de 15 a 64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) o no (AUDIT $<$ 8) (%). España, 2019/2020	75
1.1.81.	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) o no (%). España, 2019/2020	75
1.1.82.	Prevalencia de consumos intensivos de alcohol (borracheras y binge drinking) en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años y en la población que ha tenido un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) (%). España, 2017-2019/2020	75
1.1.83.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	76

Consumo por tipo de droga: bebidas energéticas

1.1.84.	Prevalencia del consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020	76
1.1.85.	Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	76
1.1.86.	Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días, entre la población de 15 a 64 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020	76
1.1.87.	Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020	77
1.1.88.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según hayan consumido o no bebidas energéticas (%). España, 2019/2020	77

Consumo por tipo de droga: tabaco

1.1.89.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años), en la población de 15-64 años. España, 1997-2019/2020	77
1.1.90.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020	78
1.1.91.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020	78
1.1.92.	Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España 2011-2019/2020	79
1.1.93.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	79
1.1.94.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2019/2020	80
1.1.95.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020	80
1.1.96.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020	81
1.1.97.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020	81
1.1.98.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco que ha fumado, sexo y edad (%). España, 2019/2020	82
1.1.99.	Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	82
1.1.100.	Porcentaje de fumadores que fuman por término medio una cantidad de cigarrillos determinada (%), y número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman (nº cigarrillos) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	82
1.1.101.	Evolución del número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2013-2019/2020	82
1.1.102.	Evolución del consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos fumados (%). España, 2015-2019/2020	83
1.1.103.	Prevalencia de consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	83
1.1.104.	Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días y consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que ha consumido tabaco en pipas de agua en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020	83
1.1.105.	Prevalencia de consumidores de tabaco entre la población de 15-64 años que fuma cigarrillos u otro tipo de tabaco según se hayan planteado o hayan intentado dejar de fumar y según sexo (%). España, 2017-2019/2020	84

Consumo por tipo de droga: cigarrillos electrónicos

1.1.106.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	84
----------	--	----

1.1.107. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2015-2019/2020	84
1.1.108. Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	84
1.1.109. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	85
1.1.110. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años según el marco temporal de consumo de tabaco (%). España, 2019/2020	85
1.1.111. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2017-2019/2020	85
1.1.112. Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	86
1.1.113. Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020	86
1.1.114. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos, según contengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2017-2019/2020	86
1.1.115. Porcentaje de personas que utilizan los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, en la población de 15-64 años, según el tipo de cartuchos utilizados (%). España, 2019/2020	87
1.1.116. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	87
1.1.117. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2017-2019/2020	87
1.1.118. Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida o no (%). España, 2019/2020	87

Consumo por tipo de droga: hipnosedantes

1.1.119. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 2005-2019/2020	88
1.1.120. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2005-2019/2020	88
1.1.121. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	89
1.1.122. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	89
1.1.123. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020	89

1.1.124. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020 . .	90
1.1.125. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	90
1.1.126. Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta, según sexo (%). España, 2019/2020	90
1.1.127. Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta, según sexo (%). España, 2019/2020	91
1.1.128. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años (%). España, 2003-2019/2020	91
1.1.129. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2005-2019/2020	91
1.1.130. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	92
1.1.131. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020	92
1.1.132. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta o para uso no médico mezclados con alcohol y/o drogas ilegales entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en el último año, según sexo (%). España, 2019/2020	92
1.1.133. Prevalencia de consumo de alcohol, drogas ilegales o alcohol y drogas ilegales junto con hipnosedantes sin receta o para uso no médico en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses según sexo (%). España, 2017- 2019/2020	93
1.1.134. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020	93
1.1.135. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020	93
1.1.136. Medios por los que consiguió, la última vez que tomó hipnosedantes sin receta entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida, según sexo y edad (%). España, 2017-2019/2020	94

Consumo por tipo de droga: analgésicos opioides

1.1.137. Evolución de la prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2017-2019/2020	94
1.1.138. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	94
1.1.139. Evolución de la prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2017-2019/2020	95
1.1.140. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2017-2019/2020	95
1.1.141. Razones referidas para iniciar el consumo entre la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides, según sexo (%). España, 2017-2019/2020	95

1.1.142. Evolución del modo de consumo realizado entre la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida (%). España, 2017-2019/2020	96
1.1.143. Prevalencia de consumo de analgésicos opioides sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	96
1.1.144. Prevalencia de consumo de drogas legales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020	96
1.1.145. Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020	97
1.1.146. Medios por los que consiguió analgésicos opioides sin receta en la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida (%). España, 2019/2020	97

Consumo por tipo de droga: cannabis

1.1.147. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019	97
1.1.148. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y edad media de inicio en el consumo de cannabis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	98
1.1.149. Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	98
1.1.150. Evolución de la prevalencia de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 2001-2019/2020	99
1.1.151. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	99
1.1.152. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	99
1.1.153. Evolución de las características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	100
1.1.154. Evolución del número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	100
1.1.155. Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2017-2019/2020	100
1.1.156. Porcentaje de personas que afirman que si fuese legal el consumo de hachís o marihuana lo probarían. Respuesta entre los que no lo han probado nunca entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	101
1.1.157. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020	101
1.1.158. Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2019/2020	101
1.1.159. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido tabaco en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020	102
1.1.160. Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2019/2020	102

1.1.161. Prevalencia de consumo de cannabis y tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	102
1.1.162. Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	102
1.1.163. Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020	103
1.1.164. Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses en la población general de 15 a 64 años y en la población que ha fumado cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020	103
1.1.165. Prevalencia de binge drinking, borracheras, tabaco en los últimos 30 días y consumo de riesgo de alcohol, consumo de cigarrillos electrónicos, hipnosedantes sin receta, analgésicos opioides sin receta y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y en la población que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020	103
1.1.166. Prevalencia de cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y en la población que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020	104
1.1.167. Lugares donde han obtenido cannabis en los últimos 30 días las personas de 15 a 64 años que han consumido cannabis, según sexo (%). España, 2019/2020	104
1.1.168. Prevalencia de consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años. España, 2013-2019/2020	104
1.1.169. Prevalencia de consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo. España, 2013-2019/2020	105
1.1.170. Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario EDADES y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013-2019/2020	105
1.1.171. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2019/2020	105
1.1.172. Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario EDADES y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020	106
1.1.173. Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que presenta un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2019/2020	106
1.1.174. Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo. (%) España, 2017-2019/2020	107
1.1.175. Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020	107
1.1.176. Modo de consumo de cannabis en los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses y en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) (%). España, 2019/2020	107
1.1.177. Proporción de personas que consideran que la legalización del cannabis es muy importante para resolver el problema de las drogas ilegales en la población de 15 a 64 años según sexo (%). España, 2015-2019/2020	108

Consumo por tipo de droga: cocaína

1.1.178. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	108
1.1.179. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	109
1.1.180. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1999-2019/2020	109
1.1.181. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España 1999-2019/2020	110
1.1.182. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2019/2020	110
1.1.183. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2007-2019/2020	110
1.1.184. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2007-2019/2020	111
1.1.185. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses en la población de 15-34 años. España, 1997-2019/2020	111
1.1.186. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína base (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	111
1.1.187. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	112
1.1.188. Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	112
1.1.189. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España 1999-2019/2020	112
1.1.190. Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020	113
1.1.191. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	113

Consumo por tipo de droga: éxtasis

1.1.192. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio en el consumo de éxtasis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	114
1.1.193. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	114
1.1.194. Evolución de la prevalencia de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020	114
1.1.195. Evolución de la prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	114
1.1.196. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020	115

1.1.197. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020	115
1.1.198. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	116
1.1.199. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	116

Consumo por tipo de droga: GHB

1.1.200. Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020	116
---	-----

Consumo por tipo de droga: anfetaminas

1.1.201. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	117
1.1.202. Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	117
1.1.203. Evolución de la prevalencia de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020	118
1.1.204. Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	118
1.1.205. Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	118
1.1.206. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	118

Consumo por tipo de droga: metanfetaminas

1.1.207. Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019/2020	119
1.1.208. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	119
1.1.209. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020	119

Consumo por tipo de droga: alucinógenos

1.1.210. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020	120
1.1.211. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	120
1.1.212. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020	120
1.1.213. Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020	121
1.1.214. Evolución de la prevalencia de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020	121
1.1.215. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	121

Consumo por tipo de droga: setas mágicas

- 1.1.216. Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020 122
- 1.1.217. Prevalencia de consumo de setas mágicas, alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020 122
- 1.1.218. Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020 122

Consumo por tipo de droga: heroína

- 1.1.219. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo de heroína (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020 123
- 1.1.220. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2019/2020 123
- 1.1.221. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020 124

Consumo por tipo de droga: inhalables volátiles

- 1.1.222. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020 124

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

- 1.1.223. Prevalencia de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020 125
- 1.1.224. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020 125
- 1.1.225. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020 126
- 1.1.226. Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2019/2020 126
- 1.1.227. Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de diferentes sustancias psicoactivas (columna) según sustancia de consumo (fila) (%). España, 2019/2020 127
- 1.1.228. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020 127
- 1.1.229. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020 128
- 1.1.230. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020 128
- 1.1.231. Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2019/2020 128

1.1.232.	Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020 . .	129
1.1.233.	Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	129
1.1.234.	Evolución de la prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2019/2020	129
1.1.235.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que se ha emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020	130
1.1.236.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que ha hecho binge drinking o no o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020 . .	130
1.1.237.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha realizado un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020	130

Nuevas sustancias psicoactivas

1.1.238.	Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020	131
1.1.239.	Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	131
1.1.240.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en la población de 15 a 64 años (%). España, 2019/2020	131
1.1.241.	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas, ketamina o spice alguna vez en la vida (%). España, 2019/2020	132
1.1.242.	Prevalencia de consumo de cuatro o más sustancias psicoactivas alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se haya consumido en alguna ocasión nuevas sustancias psicoactivas en general, ketamina o spice (%). España, 2019/2020	132
1.1.243.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (%). España, 2019/2020	132
1.1.244.	Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, setas mágicas, metanfetaminas, heroína, inhalables volátiles y GHB alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020	133
1.1.245.	Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, setas mágicas, metanfetaminas, heroína, inhalables volátiles y GHB en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020	133
1.1.246.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2019/2020	134
1.1.247.	Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (%). España, 2019/2020	134
1.1.248.	Evolución del porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013-2019/2020	135

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.1.249. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) (%). España, 1997-2019/2020	135
1.1.250. Riesgo percibido ante el consumo de drogas u otros comportamientos (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2019/2020 . .	136
1.1.251. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2019/2020	137
1.1.252. Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir muchos o bastantes problemas), según edad. España, 2019/2020	137
1.1.253. Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir pocos problemas o ninguno). España, 2019/2020 . .	138
1.1.254. Evolución de la percepción del riesgo de fumar un paquete de tabaco diario (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020	138

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.1.255. Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1995-2019/2020	139
1.1.256. Percepción de disponibilidad de distintas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020 . .	139
1.1.257. Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020	140
1.1.258. Evolución de la prevalencia de uso de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020	140
1.1.259. Porcentaje de personas de 15-64 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2019/2020	141

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de la importancia del problema de consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.260. Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (%). España, 1997-2019/2020	141
1.1.261. Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	141
1.1.262. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2019/2020	142

1.1.263. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2019/2020	142
1.1.264. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), según sexo (%). España, 2019/2020	143

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.1.265. Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020	143
1.1.266. Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020	144
1.1.267. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2015-2019/2020	144
1.1.268. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España, 2015-2019/2020	145
1.1.269. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en el último año (%). España, 2019/2020	145
1.1.270. Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en el último año (%). España, 2019/2020	145

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre el estado de salud

1.1.271. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020	146
---	-----

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2020/2021

2. Problemas relacionados con las drogas 148

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2019 149

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2019

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1999-2019	149
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2019	150
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales, total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida. España, 1998-2019	151
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2019	152

2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2019	153
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2019 . .	154
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2019	155
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2019	156
2.1.9.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2019 . .	156
2.1.10.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2019 . .	157
2.1.11.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2019	158
2.1.12.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2019	159
2.1.13.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2019	160
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2019	161
2.1.15.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2019	162
2.1.16.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2019	163
2.1.17.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2019	164
2.1.18.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019	165
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019	166
2.1.20.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019	167
2.1.21.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019	168
2.1.22.	Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2019	169
2.1.23.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2019 . .	170
2.1.24.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España 2013-2019	171
2.1.25.	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2019	171
2.1.26.	Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2019	172

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2019

2.1.27.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2019	173
2.1.28.	Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, por sexo (%). España, 2019	174
2.1.29.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2019	175
2.1.30.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2019	175
2.1.31.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España) (%). España, 2019	176
2.1.32.	Número de casos y tasas (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2019	177
2.1.33.	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2019	177
2.1.34.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2019	180
2.1.35.	Características sociodemográficas y de consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2019	183
2.1.36.	Características sociodemográficas y de consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento, por sexo. España, 2019	185
2.1.37.	Edad media de inicio en el tratamiento actual, edad del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2019	188
2.1.38.	Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2019	188
2.1.39.	Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2019	189

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2019 . . 190

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2019

2.2.1.	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2019	190
2.2.2.	Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opioides. España, 2005-2019	191
2.2.3.	Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España, 2005-2019	191

2.2.4.	Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España, 1996-2019	192
2.2.5.	Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2019	193
2.2.6.	Evolución de la vía de administración de las distintas sustancias relacionadas con los episodios de urgencias (%). España, 2011-2019	194

Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas. Datos 2019

2.2.7.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2019 ..	195
2.2.8.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2019	196
2.2.9.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2019	196

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2019

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Evolutivo hasta 2019

2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2019	197
2.3.2.	Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2019	198

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

2.3.3.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2019	198
2.3.4.	Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España, 2019	200
2.3.5.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2019	201
2.3.6.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1996-2019	201
2.3.7.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España, 2019	202
2.3.8.	Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España, 2005-2019	202
2.3.9.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2003-2019	203
2.3.10.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España, 2005-2019	204
2.3.11.	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2019	204

2.3.12.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2019	205
2.3.13.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2005-2019	205
2.3.14.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2005-2019	206
2.3.15.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 2004-2019	206
2.3.16.	Evolución número de fallecidos por códigos CIE en el Registro General de Mortalidad. España 2010-2019	207
2.3.17.	Número de defunciones por códigos CIE en el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2019	207
2.3.18.	Número de defunciones por códigos CIE en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2019	208
2.3.19.	Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2019	208
2.3.20.	Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad de las 6 ciudades españolas. España, 2005-2019	209
2.3.21.	Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad-Registro Específico). España, 2005-2019	209
2.3.22.	Estimación del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2019	210

Información complementaria	211
-----------------------------------	------------

Páginas web de interés	212
----------------------------------	-----

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, analgésicos opioides, drogas ilegales y nuevas sustancias), otros trastornos comportamentales y los problemas asociados, en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2021*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2021*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1995 hasta 2019/2020. La fuente de información es la Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), en sus sucesivas ediciones. EDADES se realiza de forma bienal y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) contando con la estrecha colaboración de las comunidades y ciudades autónomas.

En el presente documento no se incluye información de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, se corresponden al año 2018/2019 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2020. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.


En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2019. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas e información relativa al consumo problemático de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las comunidades y ciudades autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNSD y de otras áreas del Ministerio de Sanidad.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/publicaciones/catalogo/catalogoPNSD/publicaciones/CinformesOED.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2019/2020

1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra válida de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años (número de personas). España, 1995-2019/2020.

1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
8.888	12.304	12.234	14.113	12.033	27.934	23.715	20.109	22.128	23.136	22.541	21.249	17.899

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.2.

Distribución de la muestra válida de la encuesta EDADES por comunidad autónoma (número de personas). España, 2019/2020.

CCAA	DGPNSD	Ampliación	Válidas	Error muestral (±)
Andalucía	1.656	–	1.656	2,4%
Aragón	549	–	549	4,2%
Asturias	619	389	1.008	3,1%
Islas Baleares	540	–	540	4,2%
Canarias	526	–	526	4,3%
Cantabria	339	220	559	4,1%
Castilla y León	837	458	1.295	2,7%
Castilla-La Mancha	684	330	1.014	3,1%
Cataluña	1.770	–	1.770	2,3%
Comunidad Valenciana	1.699	550	2.249	2,1%
Extremadura	755	–	755	3,6%
Galicia	917	359	1.276	2,7%
Comunidad de Madrid	1.331	367	1.698	2,4%
Murcia	460	297	757	3,6%
Navarra	269	210	479	4,5%
País Vasco	939	–	939	3,2%
La Rioja	210	240	450	4,6%
Ceuta	109	140	249	6,2%
Melilla	130	–	130	8,6%
Total	14.339	3.560	17.899	0,8%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.3.

Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (%). España, 2019/2020.

		Total	Hombres	Mujeres
Sexo	Hombre	50,2	100,0	0,0
	Mujer	49,8	0,0	100,0
Edad	15 a 24 años	14,6	15,0	14,3
	25 a 34 años	17,7	17,6	17,7
	35 a 44 años	23,7	24,0	23,4
	45 a 54 años	23,7	23,3	24,1
	55 a 64 años	20,3	20,1	20,5
Estado civil	Soltero/a	41,4	46,0	36,1
	Casado/a	48,6	45,6	51,7
	Separado/a - Divorciado/a	8,4	7,4	9,4
	Viudo/a	1,9	1,0	2,9
Nivel de estudios	Sin estudios / estudios primarios	11,5	11,6	11,3
	Estudios secundarios	66,6	68,2	64,9
	Estudios universitarios	22,0	20,2	23,8
Nacionalidad	Española	87,3	88,6	85,9
	Extranjera	12,7	11,4	14,1
Convivencia	Solo/a	12,9	15,8	9,9
	Cónyuge / pareja	62,4	56,7	68,1
	Familia de origen	23,1	25,9	20,3
	Otros	1,5	1,2	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.4.

Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España 2013-2019/2020.

	2013			2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	1,6	2,1	1,3	2,8	3,3	2,4	4,0	4,8	3,4	3,5	4,4	2,9
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	2,1	1,3	3,0	2,5	1,8	3,3	2,6	1,9	3,4
Cannabis	0,8	0,8	0,7	0,7	1,0	0,5	1,1	1,6	0,7	1,2	1,5	1,0
Cocaína en polvo	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

T: total; H: hombre; M: mujer

Nota: tener en cuenta que son valores redondeados a la hora de realizar sumatorios

Incidencia es el número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses. El denominador incluye aquellas personas que no tomaban la sustancia hace más de un año (los que no han consumido este año y los que han empezado este año)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.5.

Evolución de la incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según sexo (números absolutos). España 2013-2019/2020.

	2013			2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco	142.000	76.000	66.000	244.000	122.000	122.000	392.000	198.000	194.000	341.000	178.000	163.000
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	544.000	178.000	366.000	632.000	244.000	388.000	645.000	252.000	393.000
Cannabis	168.000	84.000	84.000	159.000	98.000	61.000	223.000	143.000	80.000	237.000	129.000	108.000
Cocaína en polvo	38.000	22.000	16.000	41.000	23.000	18.000	42.000	30.000	11.000	60.000	51.000	9.000

T: total; H: hombre; M: mujer

Nota: tener en cuenta que son valores redondeados a la hora de realizar sumatorios

Incidencia es el número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses. El denominador incluye aquellas personas que no tomaban la sustancia hace más de un año (los que no han consumido este año y los que han empezado este año)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64			15-34			35-64		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	93,0	95,5	90,4	91,5	93,4	89,6	93,6	96,5	90,8
Borracheras	66,6	78,2	54,8	69,7	76,7	62,5	65,1	78,9	51,2
Tabaco	70,0	74,9	65,1	63,9	67,9	59,8	72,9	78,3	67,6
Tabaco en pipas de agua	11,6	13,4	9,7	20,5	23,6	17,4	7,3	8,4	6,1
Cigarrillos electrónicos	10,5	12,0	8,9	16,7	20,2	13,1	7,5	8,1	7,0
Cigarrillos electrónicos con nicotina	7,4	8,8	6,0	11,1	13,8	8,3	5,6	6,4	4,9
Cigarrillos electrónicos sin nicotina	5,2	6,1	4,2	9,2	11,5	6,9	3,2	3,4	3,0
Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos	2,5	3,2	1,7	4,1	5,4	2,7	1,7	2,2	1,2
Hipnosedantes con o sin receta	22,5	18,3	26,8	13,1	10,5	15,8	27,0	22,0	31,9
Hipnosedantes sin receta	3,1	3,0	3,1	2,8	2,6	3,0	3,2	3,2	3,2
Analgésicos opioides con o sin receta	15,2	14,1	16,2	9,1	8,4	9,8	18,1	16,9	19,2
Analgésicos opioides sin receta	1,7	1,8	1,5	1,5	1,6	1,4	1,8	2,0	1,6
Cannabis	37,5	46,3	28,7	45,0	52,6	37,1	34,0	43,3	24,7
Cocaína en polvo	10,9	16,1	5,7	10,5	14,7	6,1	11,1	16,8	5,5
Cocaína base	1,4	2,1	0,8	1,1	1,3	0,9	1,6	2,4	0,7
Cocaína polvo y/o base	11,2	16,4	5,9	10,6	14,9	6,2	11,4	17,2	5,7
Éxtasis	5,0	7,5	2,4	5,4	7,4	3,2	4,8	7,5	2,0
Anfetaminas/speed	4,3	6,5	2,0	4,2	5,6	2,8	4,3	6,9	1,6
Alucinógenos	5,5	8,2	2,8	6,0	8,3	3,6	5,3	8,1	2,5
Heroína	0,7	1,2	0,3	0,2	0,3	0,1	1,0	1,6	0,3
Inhalables volátiles	0,8	1,2	0,3	0,9	1,4	0,5	0,7	1,1	0,2
GHB	0,9	1,5	0,3	0,8	1,2	0,3	1,0	1,7	0,3
Metanfetamina	1,2	1,8	0,5	1,3	2,0	0,7	1,1	1,8	0,4
Setas mágicas	3,5	5,3	1,7	4,4	6,0	2,8	3,1	5,0	1,2
Nuevas sustancias (NS1)	1,7	2,5	0,8	2,3	3,3	1,3	1,3	2,1	0,6
Alguna droga ilegal EMCDDA*	38,9	47,9	29,8	46,1	53,8	38,2	35,4	45,0	25,8

T: total; H: hombre; M: mujer

*Alguna droga ilegal EMCDDA definición del EMCDDA = No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64			15-34			35-64		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	77,2	82,7	71,6	79,3	84,1	74,2	76,2	82,0	70,4
Borracheras	19,4	25,7	13,1	34,2	41,6	26,6	12,4	18,0	6,7
Tabaco	39,4	44,4	34,2	41,9	47,7	36,0	38,1	42,8	33,4
Tabaco en pipas de agua	5,0	5,9	4,2	10,2	12,1	8,3	2,6	2,8	2,3
Cigarrillos electrónicos	4,1	5,0	3,2	7,6	9,4	5,7	2,5	2,9	2,1
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	9,4	14,7	6,7	5,4	8,0	14,6	11,3	17,8
Hipnosedantes sin receta	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,1
Analgésicos opioides con o sin receta	7,1	6,2	8,1	4,3	3,6	4,9	8,5	7,4	9,6
Analgésicos opioides sin receta	0,6	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7
Cannabis	10,5	14,6	6,3	19,1	25,7	12,2	6,4	9,3	3,5
Cocaína en polvo	2,5	4,0	0,9	3,1	4,9	1,3	2,2	3,6	0,8
Cocaína base	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,0
Cocaína polvo y/o base	2,5	4,1	1,0	3,2	4,9	1,4	2,2	3,7	0,8
Éxtasis	0,9	1,4	0,4	1,6	2,4	0,9	0,6	1,0	0,2
Anfetaminas/speed	0,7	0,9	0,4	1,1	1,4	0,7	0,5	0,7	0,2
Alucinógenos	0,6	1,0	0,2	1,1	1,7	0,5	0,3	0,7	0,0
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,4	0,5	0,2	0,0	0,1	0,0
GHB	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,1	0,1	0,2	0,0
Metanfetamina	0,3	0,4	0,2	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,1
Setas mágicas	0,4	0,6	0,1	0,7	1,0	0,3	0,2	0,5	0,0
Alguna droga ilegal EMCDDA*	11,5	16,2	6,9	20,2	27,2	13,0	7,4	10,8	4,0

T: total; H: hombre; M: mujer

*Alguna droga ilegal EMCDDA definición del EMCDDA = No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.8.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64			15-34			35-64		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	63,0	72,0	53,9	63,4	71,8	54,7	62,8	72,1	53,6
Borracheras	6,8	9,3	4,2	13,3	16,8	9,7	3,7	5,7	1,7
Tabaco	36,8	41,5	32,0	38,1	43,3	32,6	36,2	40,7	31,8
Cigarrillos de cajetilla	26,3	28,5	24,0	23,8	26,7	21,0	27,4	29,4	25,4
Tabaco de liar	6,0	7,4	4,7	7,2	8,1	6,4	5,5	7,0	3,9
De los 2 tipos	3,2	4,1	2,3	5,2	6,6	3,8	2,3	3,0	1,6
Cigarrillos electrónicos	1,8	2,4	1,2	2,8	3,7	1,8	1,3	1,7	0,9
Hipnosedantes con o sin receta	8,6	6,5	10,7	3,6	2,9	4,4	10,9	8,2	13,6
Hipnosedantes sin receta	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,6	0,5	0,7	0,4
Analgésicos opioides con o sin receta	3,6	3,0	4,3	1,6	1,5	1,7	4,6	3,8	5,5
Analgésicos opioides sin receta	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
Cannabis	8,0	11,4	4,7	14,2	19,6	8,5	5,1	7,4	2,8
Cocaína en polvo	1,1	1,9	0,3	1,2	2,0	0,4	1,1	1,9	0,2
Cocaína base	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0
Cocaína polvo y/o base	1,2	2,0	0,3	1,2	2,0	0,4	1,1	2,0	0,3
Éxtasis	0,3	0,6	0,1	0,6	0,8	0,3	0,2	0,4	0,0
Anfetaminas/speed	0,3	0,4	0,2	0,5	0,6	0,4	0,2	0,3	0,1
Alucinógenos	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,0
Heroína	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
GHB	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0
Alguna droga ilegal EMCDDA*	8,7	12,4	4,9	14,8	20,5	8,9	5,7	8,4	3,0

T: total; H: hombre; M: mujer

*Alguna droga ilegal EMCDDA definición del EMCDDA = No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.9.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64			15-34			35-64		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	8,8	14,2	3,4	2,7	4,2	1,3	11,7	19,0	4,5
Tabaco	32,3	36,8	27,8	31,4	36,2	26,5	32,7	37,1	28,4
Cigarrillos electrónicos	1,1	1,4	0,7	1,5	2,2	0,8	0,9	1,1	0,6
Hipnosedantes con o sin receta	6,4	4,8	8,1	2,1	1,8	2,4	8,5	6,2	10,7
Analgésicos opioides con o sin receta	2,1	1,6	2,7	0,8	0,8	0,7	2,8	2,0	3,6
Cannabis	2,9	4,5	1,4	5,3	7,8	2,7	1,8	2,9	0,8

T: total; H: hombre; M: mujer

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.10.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	70,0	39,4	36,8	32,3
Cigarrillos electrónicos	10,5	4,1	1,8	1,1
Alcohol	93,0	77,2	63,0	8,8
Borracheras	66,6	19,4	6,8	0,2
Hipnosedantes con o sin receta	22,5	12,0	8,6	6,4
Hipnosedantes sin receta	3,1	1,3	0,5	0,3
Analgésicos opioides con o sin receta	15,2	7,1	3,6	2,1
Analgésicos opioides sin receta	1,7	0,6	0,2	0,1
Cannabis	37,5	10,5	8,0	2,9
Éxtasis	5,0	0,9	0,3	-
Alucinógenos	5,5	0,6	0,2	-
Anfetaminas/speed	4,3	0,7	0,3	-
Cocaína polvo y/o base	11,2	2,5	1,2	-
Cocaína en polvo	10,9	2,5	1,1	-
Cocaína base	1,4	0,2	0,1	-
Setas mágicas	3,5	0,4	0,1	-
Metanfetaminas	1,2	0,3	0,1	-
GHB	0,9	0,1	0,0	-
Heroína	0,7	0,1	0,0	-
Inhalables volátiles	0,8	0,1	0,0	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.11.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Tabaco	-	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5	69,7	70,0
Alcohol	-	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5	91,2	93,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7	20,8	22,5
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,1	3,0	3,1
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5	35,2	37,5
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6	3,6	5,0
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8	4,5	5,5
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	8,3	10,2	8,8	10,3	9,1	10,3	11,2
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9	10,0	10,9
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8	1,3	1,4
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,9	2,0	2,4	3,5
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,6	1,2	1,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,9
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.12.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Tabaco	-	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2	40,9	39,4
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6	75,2	77,2
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0	11,1	12,0
Hipnosedantes sin receta	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	3,1	2,7	2,3	2,2	2,0	2,2	2,5
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9	2,0	2,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1	62,7	63,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1	7,5	8,6
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3	9,1	8,0
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0	0,9	1,1	1,2
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	1,1
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.14.


Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3	7,4	8,8
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9	2,1	2,1	2,9
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0	5,9	6,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.15.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (años). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.16.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2019/2020.

	Hombres	Mujeres
Tabaco	16,3	16,8
Alcohol	16,2	17,2
Cannabis	18,1	19,1
Inhalables volátiles	21,4	21,5
Anfetaminas	20,5	20,7
Alucinógenos	21,1	21,5
Cocaína en polvo	21,0	21,5
Éxtasis	20,7	20,9
Cocaína polvo y/o base	21,0	21,5
Setas mágicas	22,4	21,3
GHB	23,4	24,7
Heroína	22,0	25,0
Metanfetaminas	23,1	23,7
Cocaína base	21,9	21,4
Hipnosedantes sin receta	30,2	31,0
Hipnosedantes con o sin receta	34,0	34,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.17.

Evolución de la edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,6	16,6
Alcohol	-	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,7
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3	18,4	18,5
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4	20,5	20,1	21,5
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2	20,4	20,6
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3	20,9	21,2
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9	21,1	21,1
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7	21,1	20,7
Cocaína polvo y/o base	-	-	-	-	-	-	-	20,9	21,0	21,3	20,8	21,1	21,1
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2	22,7	22,6
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2	20,7	23,2	21,8
Hipnosedantes sin receta	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	-	29,1	29,5	27,8	31,3	32,5	31,6	30,6
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6	34,4	34,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.18.

Edad media de inicio de consumo de diferentes sustancias psicoactivas y otras adicciones entre la población de 15-64 años, según sexo (años). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Alcohol	16,6	15,9	17,3	16,7	16,2	17,2
Borracheras	-	-	-	17,5	17,2	17,8
Tabaco	16,6	16,3	16,8	16,6	16,3	16,8
Tabaco (consumo diario)	18,6	18,4	18,8	18,3	18,1	18,5
Cigarrillos electrónicos	33,0	31,9	34,4	30,4	29,8	31,4
Hipnosedantes con o sin receta	34,4	33,6	34,9	34,4	34,0	34,7
Hipnosedantes sin receta	31,6	30,1	33,0	30,6	30,2	31,0
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	32,6	32,0	33,1
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	27,7	28,5	26,5
Cannabis	18,4	18,0	19,1	18,5	18,1	19,1
Cocaína en polvo	21,1	20,8	21,7	21,1	21,0	21,5
Cocaína base	23,2	22,6	25,4	21,8	21,9	21,4
Cocaína polvo y/o base	21,1	20,9	21,8	21,1	21,0	21,5
Éxtasis	21,1	21,0	21,4	20,7	20,7	20,9
Anfetaminas	20,4	20,4	20,4	20,6	20,5	20,7
Alucinógenos	20,9	20,4	22,1	21,2	21,1	21,5
Heroína	22,7	22,7	22,4	22,6	22,0	25,0
Inhalables volátiles	20,1	20,2	19,8	21,5	21,4	21,5
GHB	22,4	22,8	20,7	23,7	23,4	24,7
Metanfetamina	23,1	23,0	23,5	23,3	23,1	23,7
Setas mágicas	22,1	21,7	23,3	22,2	22,4	21,3
Jugar dinero online	26,8	26,3	28,8	25,9	25,8	26,1
Jugar dinero presencial	22,8	21,8	23,9	22,7	21,9	23,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.19.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1995-2019/2020.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2017		2019	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6	65,4	76,2	62,3	73,4	63,9	72,9
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7	91,2	94,7	88,8	92,4	91,5	93,6
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	24,1	13,4	27,0	10,8	22,8	12,4	25,0	13,1	27,0
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,5	2,3	2,8	2,6	4,8	2,5	3,2	2,8	3,2
Cannabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0	38,8	27,8	42,0	31,8	45,0	34,0
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2	4,7	3,0	4,1	3,3	5,4	4,8
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1	4,5	3,4	4,7	4,3	6,0	5,3
Anfetaminas/ speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2	4,3	3,3	4,1	3,9	4,2	4,3
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	11,6	9,4	9,3	8,8	9,9	10,0	10,5	11,1
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,6	1,0	1,0	1,4	1,1	1,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	1,2	3,2	1,1	3,0	1,6	3,1	2,1	4,4	3,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	0,5	0,7	0,4	0,9	0,5	1,5	1,0	1,3	1,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,5	0,7	0,6	0,6	0,4	0,8	1,0
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9	0,2	0,9	0,2	0,7	0,2	1,0
Inhalables volátiles	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,1	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,6	0,9	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.20.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1995-2019/2020.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2017		2019	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2	40,8	39,9	41,5	40,6	41,9	38,1
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7	79,2	76,7	77,2	74,3	79,3	76,2
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	14,5	6,4	15,5	6,3	15,0	6,5	13,4	6,7	14,6
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	2,7	1,2	1,3	1,3	1,2
Cannabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8	17,1	5,5	18,3	7,4	19,1	6,4
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2	1,3	0,2	1,2	0,4	1,6	0,6
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1	1,1	0,3	0,9	0,2	1,1	0,3
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	1,1	0,5
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5	3,0	1,3	2,7	1,7	3,1	2,2
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,1	0,5	0,1	0,7	0,2	0,5	0,1	0,7	0,2
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.21.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (%). España, 1997-2019/2020.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2017		2019	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2	38,4	38,6	38,5	39,0	38,1	36,2
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9	61,6	62,4	62,7	62,8	63,4	62,8
Hipnosedantes																								
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	11,3	3,4	12,0	3,3	10,6	3,4	9,6	3,6	10,9
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	1,0	0,5	0,7	0,5	0,5
Cannabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5	12,9	4,4	14,6	6,3	14,2	5,1
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,4	0,1	0,5	0,2
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9	1,3	0,6	1,3	1,0	1,2	1,1
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.22.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019/2020.

	2011		2013		2015		2017		2019	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	77,6	65,7	77,5	68,6	77,1	67,9	74,8	64,5	74,9	65,1
Cigarrillos electrónicos	-	-	-	-	7,3	6,3	9,6	8,1	12,0	8,9
Alcohol	94,0	87,7	95,0	91,3	95,3	91,7	93,6	88,8	95,5	90,4
Hipnosedantes con o sin receta	13,7	25,4	16,8	27,6	13,6	23,9	15,9	25,6	18,3	26,8
Hipnosedantes sin receta	2,1	2,6	2,6	2,8	3,3	4,9	2,8	3,2	3,0	3,1
Analgésicos opioides con o sin receta	-	-	-	-	-	-	13,1	16,0	14,1	16,2
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,5
Cannabis	35,4	19,2	37,9	22,7	40,1	22,8	43,6	26,8	46,3	28,7
Éxtasis	5,1	2,0	6,3	2,2	5,3	1,8	5,3	1,9	7,5	2,4
Alucinógenos	4,4	1,4	5,8	1,8	5,7	1,8	6,6	2,3	8,2	2,8
Anfetaminas/speed	4,8	1,7	5,7	1,8	5,4	1,9	5,8	2,1	6,5	2,0
Cocaína polvo y/o base	12,8	4,7	15,0	5,4	13,4	4,7	14,6	5,9	16,4	5,9
Cocaína en polvo	12,7	4,7	14,9	5,4	13,3	4,6	14,3	5,7	16,1	5,7
Cocaína base	1,5	0,3	1,7	0,3	1,4	0,3	1,8	0,7	2,1	0,8
Setas mágicas	3,5	1,2	2,9	0,8	3,0	1,0	3,8	1,1	5,3	1,7
Metanfetaminas	1,2	0,3	0,8	0,1	1,0	0,2	1,9	0,5	1,8	0,5
GHB	-	-	0,9	0,2	1,0	0,2	0,7	0,2	1,5	0,3
Heroína	0,9	0,2	1,2	0,2	1,0	0,3	0,8	0,3	1,2	0,3
Inhalables volátiles	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,9	0,3	1,2	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.23.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2017		2019	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0	44,2	37,2	44,4	36,0	46,0	35,8	44,4	34,2
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9	83,2	73,4	82,9	72,1	81,3	69,2	82,7	71,6
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3	8,5	16,0	8,3	15,8	8,1	14,1	9,4	14,7
Hipnosedantes sin receta	8,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	2,9	1,2	1,4	1,3	1,2
Cannabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5	12,9	5,4	13,3	5,6	15,4	6,6	14,6	6,3
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3	1,0	0,3	1,4	0,4
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,5	0,1	0,8	0,3	0,7	0,2	1,0	0,2
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3	0,8	0,2	0,9	0,4
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	1,0	3,1	0,9	3,4	1,0	4,1	1,0
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	0,9	2,9	0,9	3,2	0,8	4,0	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	0,6	0,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	0,2
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.24.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		2017		2019	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,3	44,7	34,0	41,4	33,7	41,7	34,8	42,6	34,3	43,8	33,8	41,5	32,0
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,3	52,8	74,0	52,2	73,2	51,2	73,4	55,3	71,3	52,8	71,5	54,0	72,0	53,9
Hipnosedantes																								
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	5,4	10,8	3,2	7,0	5,2	11,4	5,8	12,1	5,4	10,8	5,4	9,7	6,5	10,7
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	1,1	0,5	0,8	0,6	0,4
Cannabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8	9,8	3,4	10,7	3,9	12,9	5,3	11,4	4,7
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,1
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,2
Cocaína																								
(polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,5	0,3	1,8	0,4	2,0	0,3
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,4	0,3	1,8	0,4	1,9	0,3
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.25.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Tamaño muestra	Edad media inicio consumo tabaco	Edad media inicio consumo tabaco diario	Edad media inicio consumo bebidas alcohólicas	Edad media inicio consumo cannabis
Andalucía	1.656	16,7	18,5	16,9	18,6
Aragón	549	16,0	17,4	16,5	18,3
Asturias	1.008	16,7	18,2	16,5	18,7
Baleares	540	16,1	18,5	16,3	17,7
Canarias	526	16,7	18,5	17,3	17,5
Cantabria	559	16,3	17,9	16,7	18,4
Castilla y León	1.295	16,5	17,9	16,4	18,6
Castilla-La Mancha	1.014	16,3	18,3	16,4	18,4
Cataluña	1.770	16,7	18,3	16,5	18,6
C. Valenciana	2.249	16,4	18,4	16,2	18,4
Extremadura	755	16,2	18,0	16,7	18,5
Galicia	1.276	16,6	19,0	17,0	18,6
Madrid	1.698	16,8	18,1	17,0	18,8
Murcia	757	16,4	17,7	16,4	18,2
Navarra	479	16,0	17,8	16,3	18,5
País Vasco	939	16,4	18,1	16,5	18,3
La Rioja	450	16,7	19,1	16,7	19,1
Ceuta	249	17,1	19,5	17,4	18,1
Melilla	130	17,9	18,7	17,5	19,4
Media España	17.899	16,6	18,3	16,7	18,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.26.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95%	IC95%	Prevalencia	IC95%	IC95%	Prevalencia	IC95%	IC95%
		inferior	superior		inferior	superior		inferior	superior
Andalucía	92,9	91,7	94,2	74,2	72,0	76,3	57,7	55,4	60,1
Aragón	94,4	92,5	96,3	82,1	78,9	85,3	68,0	64,1	71,9
Asturias	96,2	95,0	97,3	84,6	82,4	86,8	71,9	69,1	74,7
Baleares	92,7	90,5	94,9	78,6	75,1	82,0	65,4	61,4	69,4
Canarias	93,3	91,2	95,5	70,2	66,3	74,1	49,8	45,5	54,0
Cantabria	94,7	92,9	96,6	82,8	79,7	85,9	67,6	63,7	71,5
Castilla y León	95,8	94,7	96,9	80,1	77,9	82,3	65,6	63,0	68,2
Castilla-La Mancha	93,2	91,6	94,7	74,0	71,3	76,7	60,8	57,8	63,8
Cataluña	92,5	91,3	93,7	79,6	77,7	81,4	63,0	60,8	65,3
C. Valenciana	95,8	94,9	96,6	84,5	83,0	86,0	70,4	68,5	72,2
Extremadura	87,6	85,3	90,0	62,8	59,4	66,3	50,3	46,7	53,8
Galicia	90,3	88,7	92,0	74,3	71,9	76,7	63,9	61,3	66,6
Madrid	91,4	90,0	92,7	74,5	72,5	76,6	65,0	62,7	67,2
Murcia	95,2	93,7	96,7	81,6	78,8	84,4	67,9	64,6	71,3
Navarra	91,6	89,2	94,1	80,5	77,0	84,1	62,6	58,3	66,9
País Vasco	93,8	92,2	95,3	79,1	76,5	81,7	67,8	64,8	70,7
La Rioja	95,5	93,6	97,4	81,3	77,7	84,9	65,6	61,2	70,0
Ceuta	59,9	53,8	65,9	47,3	41,1	53,5	35,5	29,6	41,4
Melilla	56,8	48,3	65,4	44,1	35,6	52,7	39,1	30,7	47,4
Media España	93,0	92,6	93,3	77,2	76,6	77,8	63,0	62,3	63,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	95,3	90,5	78,5	69,8
Aragón	95,9	92,9	88,7	75,2
Asturias	97,1	95,2	88,7	80,5
Baleares	96,2	89,1	85,6	71,2
Canarias	94,5	92,2	77,0	63,2
Cantabria	96,4	93,0	84,4	81,2
Castilla y León	96,9	94,6	84,6	75,4
Castilla-La Mancha	96,3	89,8	80,8	66,9
Cataluña	95,0	90,0	84,5	74,5
C. Valenciana	97,5	94,0	89,4	79,5
Extremadura	93,9	81,1	79,2	45,8
Galicia	93,9	86,8	81,6	67,1
Madrid	94,9	88,0	80,0	69,3
Murcia	97,7	92,6	86,8	76,2
Navarra	93,8	89,5	86,9	74,0
País Vasco	95,8	91,8	83,9	74,2
La Rioja	97,1	93,9	87,1	75,3
Ceuta	60,8	58,8	46,2	48,4
Melilla	65,0	48,2	43,2	45,1
Total	95,5	90,4	82,7	71,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.28.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 30 días
Andalucía	57,7
Aragón	68,0
Asturias	71,9
Baleares	65,4
Canarias	49,8
Cantabria	67,6
Castilla y León	65,6
Castilla-La Mancha	60,8
Cataluña	63,0
C. Valenciana	70,4
Extremadura	50,3
Galicia	63,9
Madrid	65,0
Murcia	67,9
Navarra	62,6
País Vasco	67,8
La Rioja	65,6
Ceuta	35,5
Melilla	39,1
Media España	63,0

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ÚLTIMOS 30 DIAS

Media nacional 63,0%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.29.

Prevalencia de borracheras alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	1.656	59,6	57,3	62,0
Aragón	549	71,1	67,3	74,9
Asturias	1.008	64,3	61,3	67,2
Baleares	540	73,8	70,1	77,5
Canarias	526	72,2	68,4	76,0
Cantabria	559	69,8	66,0	73,6
Castilla y León	1.295	75,8	73,4	78,1
Castilla-LaMancha	1.014	64,0	61,1	67,0
Cataluña	1.770	71,2	69,1	73,3
C. Valenciana	2.249	74,2	72,4	76,0
Extremadura	755	58,6	55,1	62,1
Galicia	1.276	58,7	56,0	61,4
Madrid	1.698	59,9	57,6	62,2
Murcia	757	67,1	63,8	70,5
Navarra	479	74,5	70,6	78,4
País Vasco	939	72,9	70,0	75,7
La Rioja	450	71,3	67,1	75,4
Ceuta	249	39,2	33,2	45,3
Melilla	130	44,4	35,8	52,9
Total	17.899	66,6	65,9	67,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.30.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	13,6	12,0	15,3	3,9	3,0	4,9
Aragón	19,5	16,2	22,8	6,3	4,3	8,3
Asturias	19,1	16,7	21,6	6,0	4,5	7,5
Baleares	27,3	23,6	31,1	8,7	6,3	11,1
Canarias	16,4	13,2	19,5	7,1	4,9	9,2
Cantabria	17,7	14,5	20,8	5,4	3,6	7,3
Castilla y León	21,7	19,4	23,9	7,4	6,0	8,8
Castilla-La Mancha	20,8	18,3	23,3	7,8	6,2	9,5
Cataluña	22,3	20,4	24,3	8,7	7,4	10,0
C. Valenciana	22,6	20,8	24,3	7,0	6,0	8,1
Extremadura	19,1	16,3	21,9	6,1	4,4	7,8
Galicia	17,0	14,9	19,1	7,4	5,9	8,8
Madrid	18,5	16,6	20,3	6,6	5,4	7,7
Murcia	21,8	18,9	24,8	6,3	4,6	8,1
Navarra	27,7	23,7	31,7	8,9	6,3	11,4
País Vasco	22,6	19,9	25,3	8,7	6,9	10,5
La Rioja	26,0	22,0	30,1	9,8	7,0	12,5
Ceuta	14,7	10,3	19,1	3,5	1,2	5,8
Melilla	12,4	6,7	18,0	3,4	0,3	6,5
Media España	19,4	18,9	20,0	6,8	6,4	7,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.31.


Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 30 días
Andalucía	3,9
Aragón	6,3
Asturias	6,0
Baleares	8,7
Canarias	7,1
Cantabria	5,4
Castilla y León	7,4
Castilla-La Mancha	7,8
Cataluña	8,7
C. Valenciana	7,0
Extremadura	6,1
Galicia	7,5
Madrid	6,6
Murcia	6,3
Navarra	8,9
País Vasco	8,7
La Rioja	9,8
Ceuta	3,5
Melilla	3,4
Media España	6,8

PREVALENCIA DE BORRACHERAS ÚLTIMOS 30 DIAS

Media nacional 6,8%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.32.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 30 días
Andalucía	14,4
Aragón	13,5
Asturias	15,1
Baleares	18,5
Canarias	12,5
Cantabria	13,3
Castilla y León	19,6
Castilla-La Mancha	16,1
Cataluña	13,2
C. Valenciana	16,0
Extremadura	13,4
Galicia	14,4
Madrid	15,6
Murcia	20,3
Navarra	20,5
País Vasco	20,9
La Rioja	16,0
Ceuta	7,9
Melilla	20,4
Media España	15,4

PREVALENCIA DE BINGE DRINKING ÚLTIMOS 30 DIAS

Media nacional 15,4%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.33.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 12 meses
Andalucía	11,5
Aragón	6,9
Asturias	6,3
Baleares	7,7
Canarias	7,1
Cantabria	10,0
Castilla y León	8,6
Castilla-La Mancha	15,6
Cataluña	9,3
C. Valenciana	10,6
Extremadura	9,9
Galicia	8,3
Madrid	9,6
Murcia	12,6
Navarra	7,8
País Vasco	8,6
La Rioja	18,4
Ceuta	10,3
Melilla	8,9
Media España	9,9

PREVALENCIA DE BOTELLÓN ÚLTIMOS 12 MESES

Media nacional 9,9%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.34.

Prevalencia de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días			A diario últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	64,1	61,8	66,4	35,9	33,6	38,2	33,3	31,1	35,6	29,4	27,2	31,6
Aragón	65,9	62,0	69,9	31,8	27,9	35,7	29,1	25,3	32,9	24,2	20,6	27,7
Asturias	77,3	74,8	79,9	43,0	39,9	46,0	40,1	37,1	43,1	37,4	34,5	40,4
Baleares	78,8	75,3	82,2	46,8	42,6	51,0	42,3	38,2	46,5	33,6	29,6	37,6
Canarias	69,9	66,0	73,8	32,0	28,0	36,0	30,4	26,4	34,3	27,3	23,5	31,1
Cantabria	70,6	66,9	74,4	41,6	37,5	45,7	38,6	34,6	42,7	34,7	30,8	38,7
Castilla y León	72,9	70,4	75,3	36,5	33,9	39,1	33,8	31,2	36,3	29,7	27,2	32,2
Castilla-La Mancha	62,5	59,6	65,5	37,3	34,4	40,3	35,5	32,5	38,4	32,5	29,6	35,3
Cataluña	71,6	69,5	73,7	41,3	39,0	43,6	38,1	35,8	40,3	33,4	31,2	35,6
C. Valenciana	77,7	75,9	79,4	44,6	42,6	46,7	41,7	39,6	43,7	36,5	34,5	38,5
Extremadura	65,9	62,5	69,3	40,6	37,1	44,1	39,6	36,1	43,1	37,6	34,1	41,0
Galicia	69,8	67,3	72,3	38,5	35,8	41,1	36,4	33,8	39,0	31,3	28,8	33,9
Madrid	68,6	66,4	70,8	39,6	37,3	41,9	37,8	35,5	40,1	33,2	31,0	35,5
Murcia	78,7	75,8	81,6	46,9	43,4	50,5	43,5	40,0	47,1	37,7	34,2	41,2
Navarra	71,0	66,9	75,1	41,4	37,0	45,9	39,2	34,8	43,6	33,2	28,9	37,4
País Vasco	69,0	66,0	71,9	38,5	35,4	41,6	36,2	33,2	39,3	31,6	28,6	34,5
La Rioja	73,5	69,4	77,6	41,6	37,0	46,2	39,6	35,1	44,2	34,7	30,3	39,1
Ceuta	62,4	56,4	68,4	40,3	34,2	46,4	38,1	32,1	44,1	34,9	28,9	40,8
Melilla	52,1	43,5	60,7	32,6	24,6	40,7	30,0	22,1	37,8	23,1	15,8	30,3
Media España	70,0	69,3	70,7	39,4	38,6	40,1	36,8	36,1	37,5	32,3	31,6	33,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.35.

Prevalencias de consumo de tabaco entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días		A diario últimos 30 días	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	69,5	58,6	39,0	32,7	36,2	30,4	33,2	25,5
Aragón	67,8	64,0	33,5	29,9	30,8	27,4	25,1	23,2
Asturias	79,2	75,5	45,0	40,9	41,4	38,9	37,9	37,0
Baleares	82,0	75,5	49,7	43,7	45,3	39,2	36,9	30,2
Canarias	74,0	65,8	39,4	24,4	38,0	22,5	35,6	18,9
Cantabria	73,1	68,2	47,6	35,6	44,2	33,1	40,1	29,5
Castilla y León	75,3	70,3	40,1	32,8	37,0	30,5	32,5	26,8
Castilla-La Mancha	63,4	61,6	38,2	36,4	36,4	34,4	33,4	31,5
Cataluña	78,0	65,1	48,3	34,2	44,5	31,5	39,0	27,8
C. Valenciana	82,8	72,4	52,3	36,8	48,8	34,5	42,7	30,1
Extremadura	73,9	57,6	48,1	32,7	46,5	32,4	45,0	29,9
Galicia	73,6	66,0	42,0	35,0	39,9	33,0	35,0	27,7
Madrid	75,8	61,7	46,9	32,7	44,7	31,2	38,6	28,1
Murcia	81,5	75,8	50,2	43,4	46,0	40,9	39,9	35,4
Navarra	73,2	68,8	40,1	42,8	37,7	40,8	31,6	34,7
País Vasco	71,5	66,5	41,4	35,5	39,2	33,2	35,5	27,6
La Rioja	80,5	66,3	49,3	33,8	47,0	32,2	42,8	26,4
Ceuta	72,3	51,8	49,0	31,0	46,7	28,9	43,1	26,1
Melilla	65,1	38,2	40,5	24,3	39,4	20,0	28,4	17,4
Total	74,9	65,1	44,4	34,2	41,5	32,0	36,8	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.36.


Prevalencia de consumo de tabaco diario entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 30 días
Andalucía	29,4
Aragón	24,2
Asturias	37,4
Baleares	33,6
Canarias	27,3
Cantabria	34,7
Castilla y León	29,7
Castilla-La Mancha	32,5
Cataluña	33,4
C. Valenciana	36,5
Extremadura	37,6
Galicia	31,3
Madrid	33,2
Murcia	37,7
Navarra	33,2
País Vasco	31,6
La Rioja	34,7
Ceuta	34,9
Melilla	23,1
Media España	32,3

PREVALENCIA DE TABACO DIARIO

Media nacional 32,3%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.37.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020.

Alguna vez en la vida		
	Hombre	Mujer
Andalucía	12,1	10,0
Aragón	12,2	6,7
Asturias	10,6	11,4
Baleares	15,9	12,8
Canarias	6,9	5,7
Cantabria	5,5	8,3
Castilla y León	10,9	8,3
Castilla-La Mancha	5,1	4,4
Cataluña	12,4	8,8
C. Valenciana	16,7	12,9
Extremadura	6,8	2,9
Galicia	10,4	6,0
Madrid	13,1	8,1
Murcia	23,0	17,0
Navarra	11,4	12,1
País Vasco	6,7	5,0
La Rioja	11,4	10,7
Ceuta	7,5	7,4
Melilla	6,2	2,9
Total	12,0	8,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.38.

Prevalencia de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	25,3	23,2	27,4	6,3	5,1	7,4	4,2	3,3	5,2
Aragón	37,7	33,6	41,7	8,4	6,1	10,7	6,2	4,2	8,2
Asturias	40,6	37,6	43,7	7,7	6,1	9,3	5,1	3,7	6,4
Baleares	43,9	39,7	48,1	20,5	17,0	23,9	16,2	13,0	19,3
Canarias	25,8	22,0	29,5	7,8	5,5	10,1	5,8	3,8	7,8
Cantabria	47,1	42,9	51,2	6,6	4,6	8,7	4,1	2,5	5,8
Castilla y León	39,5	36,9	42,2	10,8	9,1	12,5	7,5	6,1	8,9
Castilla-La Mancha	30,3	27,5	33,2	6,3	4,8	7,8	4,9	3,5	6,2
Cataluña	48,6	46,3	50,9	14,1	12,5	15,7	10,9	9,5	12,4
C. Valenciana	44,8	42,8	46,9	13,4	12,0	14,8	10,3	9,1	11,6
Extremadura	24,6	21,6	27,7	8,4	6,4	10,3	5,9	4,2	7,5
Galicia	32,2	29,7	34,8	8,0	6,5	9,5	6,6	5,2	7,9
Madrid	37,9	35,6	40,2	10,8	9,3	12,3	8,7	7,4	10,1
Murcia	42,2	38,7	45,7	13,6	11,1	16,0	12,1	9,8	14,4
Navarra	49,6	45,1	54,0	13,1	10,1	16,1	8,6	6,1	11,2
País Vasco	45,0	41,9	48,2	12,2	10,2	14,3	9,7	7,8	11,6
La Rioja	46,0	41,4	50,6	14,5	11,3	17,8	10,7	7,8	13,5
Ceuta	19,2	14,3	24,1	6,1	3,2	9,1	6,1	3,2	9,1
Melilla	9,8	4,7	14,9	5,0	1,2	8,7	3,8	0,5	7,0
Media España	37,5	36,8	38,3	10,5	10,0	10,9	8,0	7,6	8,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.39.

Prevalencia de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	33,8	16,7	8,9	3,6
Aragón	46,7	28,3	13,0	3,6
Asturias	47,9	33,5	9,8	5,6
Baleares	54,1	33,4	26,0	14,8
Canarias	34,2	17,3	11,0	4,5
Cantabria	55,2	39,1	9,6	3,6
Castilla y León	47,7	31,1	16,3	5,0
Castilla-La Mancha	34,8	25,6	8,5	3,9
Cataluña	55,3	41,8	19,7	8,4
C. Valenciana	55,9	33,6	18,2	8,4
Extremadura	37,2	11,5	14,7	1,7
Galicia	40,7	23,9	10,8	5,3
Madrid	47,5	28,7	14,4	7,3
Murcia	55,1	28,5	18,8	8,0
Navarra	57,2	41,7	15,2	10,9
País Vasco	55,2	34,8	18,9	5,5
La Rioja	57,1	34,6	21,6	7,3
Ceuta	28,8	9,0	7,8	4,4
Melilla	19,0	0,0	9,7	0,0
Total	46,3	28,7	14,6	6,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.40.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Últimos 30 días
Andalucía	4,2
Aragón	6,2
Asturias	5,1
Baleares	16,2
Canarias	5,8
Cantabria	4,1
Castilla y León	7,5
Castilla-La Mancha	4,9
Cataluña	10,9
C. Valenciana	10,3
Extremadura	5,9
Galicia	6,6
Madrid	8,7
Murcia	12,1
Navarra	8,6
País Vasco	9,7
La Rioja	10,7
Ceuta	6,1
Melilla	3,8
Media España	8,0

CONSUMO DE CANNABIS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Media nacional 8,0%

- < media España
- > media España
- = media España



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.41.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior	Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	1.656	24,6	22,5	26,6	12,7	11,1	14,3
Aragón	549	20,9	17,5	24,3	12,5	9,8	15,3
Asturias	1.008	27,4	24,7	30,2	15,8	13,5	18,0
Baleares	540	26,9	23,1	30,6	12,5	9,7	15,3
Canarias	526	13,4	10,5	16,3	6,4	4,3	8,5
Cantabria	559	15,4	12,4	18,4	8,2	5,9	10,4
Castilla y León	1.295	23,7	21,4	26,0	12,7	10,9	14,6
Castilla-La Mancha	1.014	14,1	12,0	16,3	7,7	6,1	9,4
Cataluña	1.770	21,3	19,3	23,2	10,5	9,1	11,9
C. Valenciana	2.249	25,5	23,7	27,3	14,7	13,2	16,2
Extremadura	755	21,0	18,1	23,9	13,0	10,6	15,4
Galicia	1.276	25,6	23,2	27,9	13,6	11,8	15,5
Madrid	1.698	19,0	17,1	20,8	10,0	8,5	11,4
Murcia	757	36,3	32,9	39,8	19,6	16,8	22,4
Navarra	479	23,3	19,5	27,1	12,8	9,8	15,8
País Vasco	939	25,1	22,3	27,9	15,0	12,7	17,3
La Rioja	450	19,0	15,4	22,7	10,5	7,7	13,3
Ceuta	249	15,2	10,7	19,6	11,9	7,8	15,9
Melilla	130	7,5	3,0	12,0	4,6	1,0	8,2
Total	17.899	22,5	21,9	23,1	12,0	11,5	12,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.42.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Andalucía	21,6	27,6	10,5	15,0
Aragón	19,0	22,8	12,6	12,5
Asturias	17,9	36,8	8,6	22,9
Baleares	24,3	29,6	11,0	14,0
Canarias	9,1	17,8	2,6	10,3
Cantabria	10,9	19,9	3,2	13,0
Castilla y León	19,9	27,6	9,7	15,8
Castilla-La Mancha	9,9	18,6	6,2	9,3
Cataluña	17,8	24,8	8,7	12,3
C. Valenciana	22,0	29,0	11,2	18,2
Extremadura	13,7	28,6	8,1	18,0
Galicia	18,1	32,9	10,2	17,0
Madrid	14,1	23,6	7,5	12,3
Murcia	29,4	43,6	17,6	21,7
Navarra	21,3	25,4	11,3	14,4
País Vasco	18,7	31,5	10,7	19,2
La Rioja	19,8	18,2	12,5	8,5
Ceuta	9,4	21,3	6,5	17,6
Melilla	5,1	9,9	4,4	4,8
Total	18,3	26,8	9,4	14,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.43.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides entre la población de 15-64 años por comunidad/ciudad autónoma (%). España, 2019/2020.

	Tamaño muestra	Alguna vez en la vida		
		Prevalencia	IC95% inferior	IC95% superior
Andalucía	1.656	17,3	15,5	19,2
Aragón	549	9,0	6,6	11,4
Asturias	1.008	12,7	10,6	14,7
Baleares	540	25,8	22,2	29,5
Canarias	526	9,8	7,3	12,4
Cantabria	559	18,7	15,5	21,9
Castilla y León	1.295	20,0	17,8	22,1
Castilla-La Mancha	1.014	13,7	11,6	15,9
Cataluña	1.770	11,8	10,3	13,3
C. Valenciana	2.249	17,7	16,2	19,3
Extremadura	755	20,0	17,1	22,8
Galicia	1.276	11,1	9,4	12,8
Madrid	1.698	14,6	12,9	16,3
Murcia	757	24,2	21,2	27,3
Navarra	479	13,1	10,1	16,1
País Vasco	939	12,5	10,4	14,7
La Rioja	450	8,0	5,5	10,5
Ceuta	249	8,9	5,3	12,4
Melilla	130	12,4	6,7	18,1
Total	17.899	15,2	14,7	15,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.44.

Valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre la población de 15-64 años (%)* por comunidad/ciudad autónoma. España, 2019/2020.


	Campañas publicitarias	Educación en las escuelas	Tratamiento voluntario a consumidores	Tratamiento obligatorio a consumidores	Administración médica de metadona	Administración médica de heroína	Control policial y aduanero	Leyes estrictas contra las drogas	Legalización de cannabis	Legalización de todas las drogas
Andalucía	97,0	98,9	98,0	82,0	94,6	85,4	98,3	96,3	44,6	20,7
Aragón	96,3	98,3	99,0	91,6	96,9	92,1	98,5	97,4	57,9	36,2
Asturias	92,7	97,2	96	63,8	89,9	56,8	97,7	94,5	47,7	15,5
Baleares	97,8	100	99,0	86,3	95,8	85,4	97,8	96,3	71,4	50,8
Canarias	97,9	100,0	99	95,0	96,2	82,6	98,6	96,6	59,4	37,3
Cantabria	97,0	99,4	98,8	76,2	81,1	71,9	99,2	98,1	44,0	20,7
Castilla y León	96,7	98,8	98,8	84,2	88,6	67,3	99,0	96,3	37,5	14,2
Castilla-La Mancha	95,5	96,4	93	77,0	85,1	75,1	95,4	84,0	55,6	41,1
Cataluña	98,4	98,8	97,8	87,1	95,9	89,4	96,7	95,4	72,3	53,4
C. Valenciana	97,5	98,9	97,9	85,6	93,2	76,7	95,3	93,7	57,6	34,0
Extremadura	98,8	99,1	99,5	91,5	98,7	97,7	99,7	97,9	32,9	8,7
Galicia	93,6	98,3	97,8	82,8	90,2	76,2	96,6	93,9	55,1	31,3
Madrid	97,9	98,4	97,3	91,9	94,8	89,6	97,3	95,5	78,4	69,1
Murcia	95,5	97,5	98,1	73,6	89,2	72,3	94,3	94,0	59,8	24,1
Navarra	98,0	99,1	99	71,1	86,6	70,9	95,3	91,3	51,6	19,2
País Vasco	97,2	99,1	98,6	84,0	96,6	85,7	94,5	93,3	69,4	43,7
La Rioja	98,2	99,9	97,5	87,0	94,6	80,9	98,7	90,1	60,0	30,3
Ceuta	76,0	95,5	76,9	76,8	75,1	73,2	94,0	93,8	41,9	31,5
Melilla	98,5	99	97,1	96,7	94,8	85,1	99,3	94,4	56,9	47,8
Total	97,1	98,7	97,8	85,1	93,6	83,0	97,1	94,9	59,3	38,0

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.45.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas (%) y edad media en el inicio de consumo de bebidas alcohólicas (años) en la población de 15-64 años. España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5	91,2	93,0
Últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6	75,2	77,2
Últimos 30 días	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1	62,7	63,0
Diariamente en los últimos 30 días	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3	7,4	8,8
Edad media de inicio en el consumo	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.46.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2019/2020.



Hombres	23,3	49,5	18,3	3,2	2,5	3,8
Mujeres	16,1	28,1	9,3	2,3	1,2	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.47.


Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.

		1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	94,0	95,0	95,3	93,6	95,5
	Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	87,7	91,3	91,7	88,8	90,4
Últimos 12 meses	Hombre	79,3	86,4	83,2	85,2	84,5	84,0	80,4	84,4	83,2	83,2	82,9	81,3	82,7
	Mujer	58,0	70,5	67,2	70,9	68,4	69,2	66,4	72,7	69,9	73,4	72,1	69,2	71,6
Últimos 30 días	Hombre	-	75,8	74,4	76,4	75,8	76,0	71,4	74,0	73,2	73,4	71,3	71,5	72,0
	Mujer	-	52,1	49,1	50,9	52,1	52,9	49,0	52,2	51,2	55,3	52,8	54,0	53,9
Diariamente últimos 30 días	Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,0	14,5	11,5	14,2
	Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	4,5	4,1	3,3	3,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.48.

Prevalencia de consumo diario de alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019.



	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	15,3	15,0	14,5	11,5	14,2
Mujeres	5,0	4,5	4,1	3,3	3,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.49.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años que ha consumido bebidas alcohólicas en ese periodo, según tipo de bebida alcohólica consumida y según sexo (%). España, 2019/2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Vino	38,2	37,5	39,3
Cerveza	75,3	79,7	68,5
Combinados	26,7	29,4	22,6
vermú	5,3	5,1	5,6
Licores de frutas	3,6	4,0	3,0
Licores fuertes solos	4,8	6,2	2,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.50.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en fines de semana y días laborables en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Días laborables (de lunes a jueves)	9,2	11,6	6,8	17,3	23,5	11,1	21,7	31,0	12,0	23,9	33,7	14,4	30,4	44,4	16,5
Fines de semana (de viernes a domingo)	42,6	49,5	35,4	48,0	58,2	37,6	48,5	57,8	39,0	50,5	60,7	40,4	49,5	62,7	36,4

	15-64 años			15-17 años			18-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Días laborables (de lunes a jueves)	21,4	30,1	12,6	2,1	3,0	1,1	22,1	31,1	13,0
Fines de semana (de viernes a domingo)	48,2	58,3	38,0	22,2	28,5	15,8	49,1	59,4	38,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.51.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 7 días en la población de 15-64 años, según tipo de bebida alcohólica consumida en fin de semana y días laborables (%). España, 2019/2020.

	Fin de semana	Días laborables
Cerveza	75,6	78,8
Vino	39,0	49,4
Combinados	28,0	22,7
Vermú	5,4	7,1
Licores fuertes solos	5,0	7,6
Licores de frutas	3,7	4,6

Fin de semana: viernes, sábado y domingo. Días laborables: de lunes a jueves.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.52.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	93,0	95,5	90,4	88,7	90,2	87,1	93,9	96,1	91,7	93,1	95,3	90,9	94	96,1	91,9	93,8	98,3	89,3
Últimos 12 meses	77,2	82,7	71,6	79,3	81,9	76,7	79,2	86,1	72,3	77,9	82,7	73,0	76,7	81,6	71,9	73,6	81,6	65,6
Últimos 30 días	63,0	72,0	53,9	61,8	68,0	55,1	64,7	75	54,3	62,9	70,9	54,6	64,3	72,5	56,4	61	73,2	48,9
Diariamente en los últimos 30 días	8,8	14,2	3,4	1,3	1,9	0,6	4,0	6,1	1,8	8,4	13,5	3,1	10,9	18,0	4,0	16,6	26,8	6,5
Nunca	7,0	4,5	9,6	11,3	9,8	12,9	6,1	3,9	8,3	6,9	4,7	9,1	6,0	3,9	8,1	6,2	1,7	10,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.53.


Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo del consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Riesgo por consumir 5-6 cañas/copas												
el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45	49,3	43,5	45,8	49,1	50,2
Prevalencia de consumo												
últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6	75,2	77,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.54.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2019/2020.




	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Total	21,2	19,8	19,2	23,2	19,3	19,1	16,8	18,6	19,4
Hombres	29,6	27,2	25,8	30,5	25,9	25,4	22,3	24,1	25,7
Mujeres	12,7	12,3	12,5	15,5	12,6	12,6	11,2	13,1	13,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.55.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.




	Total	Hombres	Mujeres
15-24 años	38,3	44,2	32,1
25-34 años	30,8	39,4	22,3
35-44 años	18,2	26,0	10,2
45-54 años	11,7	17,3	6,3
55-64 años	6,2	9,2	3,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 1997-2019/2020.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres 15 a 34 años	39,1	38,3	36,3	40,7	40,3	38,9	44,0	41,3	43,2	37,5	38,7	41,6
Mujeres 15 a 34 años	19,1	19,6	18,1	21,0	20,9	23,2	25,9	23,5	25,5	22,6	24,6	26,6
Hombres 35 a 64 años	16,5	16,6	18,3	20,2	17,1	15,2	21,2	16,2	15,4	14,4	16,8	18,0
Mujeres 35 a 64 años	4,1	3,6	4,9	6,3	5,5	5,0	8,8	5,9	5,5	5,4	7,4	6,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.57.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Intoxicaciones etílicas en los últimos 30 días	6,8	9,3	4,2	15,7	19,0	12,1	11,3	14,9	7,7	5,5	8,0	2,9	3,5	5,8	1,2	1,8	2,7	0,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.58.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Intoxicaciones etílicas en los últimos 30 días	10,8	13,0	7,8	25,4	28,1	22,0	17,6	20,0	14,3	8,7	11,3	5,3	5,4	8,1	2,1	2,9	3,8	1,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.59.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días en la población de 15 a 64 años que se ha emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2019/2020.



	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Consumo de vino últimos 7 días	8,9	23,4	40,5	46,2	73,1
Consumo de cerveza últimos 7 días	58,5	75,0	82,1	83,6	65,8
Consumo de combinados últimos 7 días	67,0	48,9	39,1	38,9	37,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.60.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2003-2019/2020.



	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Total	15,5	11,6	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9	15,1	15,4
Hombres	23,3	17,9	18,3	21	20,7	20,8	23,5	20,4	20,9
Mujeres	7,5	5,4	6,7	8,6	9,5	10	12,3	9,7	9,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.61.


Evolución de la prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2011-2019/2020.

	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres 15 a 34 años	28,0	29,4	30,3	25,3	28,1
Mujeres 15 a 34 años	16,2	16,1	18,4	14,8	15,7
Hombres 35 a 64 años	15,8	16,0	20,0	17,9	17,4
Mujeres 35 a 64 años	5,8	6,6	9,1	7,2	7,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.62.

Prevalencia de consumo de alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.63.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.64.

Riesgo percibido ante el consumo de bebidas alcohólicas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no (%). España, 2019/2020.

	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	No se ha emborrachado en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	32,1	51,6
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas de vino cada día	40,2	48,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.65.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o no (%). España, 2019/2020.

	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	31,2	53,6
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas de vino cada día	36,9	54,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.66.

Prevalencia de botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hacer botellón	42,0	46,5	37,2	13,2	15,3	11,0	3,8	4,3	3,4	1,5	2,0	1,1	0,6	0,8	0,5	36,1	38,5	33,5

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.67.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Vino	7,6	14,8	23,2	23,1	29,0
Cerveza	43,3	56,0	55,7	45,4	37,9
Combinados	48,5	42,1	30,0	17,8	6,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.68.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según hayan hecho botellón en el último año o no (%). España, 2019/2020.

	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	36,4	51,8
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas de vino cada día	42,7	49,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.69.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya hecho botellón en el último año o no (%). España, 2019/2020.

	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Ningún consumo	0,0	16,7
Una sustancia	41,5	45,0
Dos sustancias	25,6	28,3
Tres sustancias	23,2	7,5
Cuatro o más sustancias	9,7	2,5

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes con o sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.70.

Razones referidas para el consumo de bebidas alcohólicas entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Le gusta cómo se siente después de beber	25,2	30,5	19,8	24,5	27,5	21,3	26,2	31,5	20,9	26,6	31,4	21,7	25,4	31,5	19,4	23,0	30,0	16,2
Es divertido y anima las fiestas	43,3	45,9	40,7	57,4	59,6	55,0	51,0	56,4	45,6	44,6	46,8	42,4	37,8	38,6	37,1	31,3	33,9	28,7
Sólo por emborracharse	1,5	2,0	1,0	3,3	4,1	2,5	2,0	2,4	1,6	1,2	2,0	0,5	1,2	1,9	0,6	0,5	0,5	0,4
Por encajar en un grupo o no sentirse excluido	13,4	13,9	12,9	18,7	19,2	18,3	13,9	15,3	12,4	12,8	13,5	12,1	12,5	11,6	13,4	11,0	12,0	10,1
Le ayuda a olvidarse de todo	2,6	3,1	2,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	2,2	2,4	3,0	1,8	3,0	3,6	2,3	2,2	3,2	1,2
Cree que es saludable o forma parte de una alimentación equilibrada	11,4	13,3	9,5	2,3	2,4	2,2	6,4	7,8	5,1	10,5	11,8	9,1	14,5	16,9	12,1	19,9	24,0	15,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.71.

Porcentaje de población que se muestra de acuerdo con determinadas políticas en materia de alcohol. Población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prohibir la publicidad	71,5	68,2	74,7	65,9	62,3	69,8	68,5	65,7	71,4	70,7	67,5	74,0	74,2	70,9	77,4	75,6	72,4	78,8
Envases con advertencias sobre daños	82,7	80,6	84,8	82,6	80,6	84,7	82,0	78,8	85,2	82,4	80,9	83,9	82,7	79,9	85,6	83,7	82,7	84,6
Patrocinio de deportistas prohibido	74,8	71,5	78,1	71,3	68,8	73,9	73,0	69,4	76,7	73,6	69,0	78,4	77,1	74,4	79,7	77,6	75,2	80,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.72.

Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según edad y sexo. España, 2017-2019/2020.

	2017*			2019		
	T	H	M	T	H	M
Porque le gusta cómo se siente después de beber	44,0	48,5	38,6	32,7	37,0	27,7
Porque es divertido o porque anima las fiestas y celebraciones	56,1	58,4	53,2	56,2	55,6	56,8
Sólo para emborracharse	12,0	14,4	9,1	2,0	2,5	1,4
Para encajar en un grupo que le gusta o para no sentirse excluido (en relación con los demás)	19,6	21,1	17,8	17,4	16,9	18,1
Porque le ayuda cuando se siente deprimido o cuando necesita olvidarse de todo	12,6	14,3	10,5	3,3	3,8	2,8
Porque cree que es saludable o porque forma parte de una alimentación equilibrada	17,2	18,6	15,4	14,8	16,1	13,3

* En 2017 se seleccionaron aquellos que respondieron siempre, casi siempre, la mitad de las veces o alguna vez.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.73.

Razones por las que las personas de 15 a 64 años consumen alcohol, según su consumo de alcohol. España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Población que se ha emborrachado en los últimos 30 días	Población que ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Población que ha hecho botellón en los últimos 12 meses	Población con un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)
Le gusta	32,7	49,8	44,9	37,1	54,0
Es divertido	56,2	67,6	64,8	72,9	65,7
Para emborracharse	2,0	9,4	5,2	5,3	8,2
Encajar en un grupo	17,4	17,3	19,0	20,8	20,4
Evitar depresión	3,3	8,1	6,1	4,6	14,4
Es saludable	14,8	4,5	9,5	2,5	9,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según edad y sexo. España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Se debería prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas	59,9	54,7	65,0	71,5	68,2	74,7
En los envases de las bebidas alcohólicas se deberían mostrar advertencias sobre los daños relacionados con el alcohol	78,4	75,2	81,7	82,7	80,6	84,8
El patrocinio de deportistas, equipos deportivos o eventos deportivos por parte de la industria del alcohol deberían estar prohibidos por ley	64,9	60,4	69,4	74,8	71,5	78,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.75.

Actitudes ante las políticas en materia de alcohol de las personas de 15 a 64 años, según su consumo de alcohol. España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Población que se ha emborrachado en los últimos 30 días	Población que ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	Población que ha hecho botellón en los últimos 12 meses	Población con un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)
Prohibir la publicidad	71,5	58,5	61,2	61,3	57,8
Envases con advertencias sobre daños	82,7	75,1	78,0	80,5	73,6
Patrocinio de deportistas prohibido	74,8	66,3	66,8	69,6	64,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.76.

Evolución de la prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2009-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.77.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) en la población de 15-64 años (porcentajes y estimación). España, 2009-2019/2020.

	2009	2013	2017	2019
Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)	4,8	5,0	5,1	4,2
Estimación del nº de personas con un consumo de riesgo de alcohol (números absolutos)*	1.563.180	1.585.010	1.583.826	1.311.545

* Aplicando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.78.

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2017-2019/2020.

		2017	2019
Hombre	15-24 años	9,8	10,0
	25-34 años	9,3	7,7
	35-44 años	8,0	6,3
	45-54 años	6,6	5,5
	55-64 años	5,0	5,1
Mujer	15-24 años	4,5	4,1
	25-34 años	3,0	2,4
	35-44 años	2,2	1,6
	45-54 años	2,7	0,9
	55-64 años	1,3	0,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.79.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥ 20), entre la población de 15 a 64 años que ha contestado la escala AUDIT, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)	5,6	8,2	2,5	9,2	12,4	5,5	6,5	9,1	3,4	5,3	7,8	2,2	4,2	6,9	1,3	4,1	6,4	1,3
Posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥ 20)	0,4	0,6	0,1	0,4	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	0,9	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.80.

Prevalencia de consumos intensivos de alcohol en la población de 15 a 64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) o no (AUDIT < 8) (%). España, 2019/2020.

	Consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)	No consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT < 8)
Borracheras últimos 30 días	47,4	6,6
Binge drinking últimos 30 días	84,3	16,5
Botellón últimos 12 meses	33,2	11,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.81.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según hayan tenido consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) o no (%). España, 2019/2020.

	Consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)	No consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT < 8)
Cannabis	34,5	8,3
Cocaína	12,6	0,8
Éxtasis	3,2	0,3
Anfetaminas	3,4	0,2
Alucinógenos	2,1	0,1
Heroína	0,7	0,0
Setas mágicas	1,5	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.82.

Prevalencia de consumos intensivos de alcohol (borracheras y binge drinking) en los últimos 30 días y botellón en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años y en la población que ha tenido un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) (%). España, 2017-2019/2020.

	2017		2019	
	Población 15-64 años	Consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)	Población 15-64 años	Consumidores de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8)
Borracheras	7,1	46,4	6,8	47,4
Binge drinking	15,1	73,8	15,4	84,3
Botellón	9,4	29,4	9,9	33,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.83.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 7 días entre los que han hecho un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Vino	10,7	25,1	36,2	43,9	60,7
Cerveza	67,7	85,6	84,7	87,4	76,2
Combinados	73,1	57,9	39,2	42,1	24,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.84.

Prevalencia del consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bebidas energéticas	12,3	15,3	9,1	32,2	38,3	25,7	18,6	24,5	12,6	9,3	11,7	6,8	6,1	7,7	4,5	2,9	3,2	2,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.85.

Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	24,7	25,6	23,1	28,0	28,9	26,7	25,5	27,2	22,3	20,9	22,2	18,5	19,3	18,5	20,7	20,2	20,0	20,4

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.86.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas en los últimos 30 días, entre la población de 15 a 64 años, según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020.

	Alcohol		Borracheras		Binge drinking		Tabaco		Hipnosedantes		Cannabis		Cocaína	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Bebidas energéticas	14,0	9,1	29,9	10,9	25,7	9,7	15,4	10,4	9,2	12,5	32,5	10,4	25,1	12,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.87.

Prevalencia del consumo de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que consumió bebidas energéticas según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020.

	Alcohol		Borracheras		Binge drinking		Tabaco		Hipnosedantes		Cannabis		Cocaína	
	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Bebidas energéticas mezcladas con alcohol	34,0		57,2	18,0	45,2	14,4	32,4	17,8	38,5	23,7	47,5	18,3	56,1	23,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.88.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales*) en la población de 15-64 años, según hayan consumido o no bebidas energéticas (%). España, 2019/2020.


	Población 15-64 años	Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas	Población 15-64 años que ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol
Ninguna sustancia	4,2	3,4	0,0
Una sola sustancia	19,8	17,4	13,0
Dos sustancias	32,8	26,8	18,9
Tres o más sustancias	43,1	52,4	68,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.89.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco (%) y edad media de inicio en el consumo (años), en la población de 15-64 años. España, 1997-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.90.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	55,0	50,3	51,5	53,0	47,2	46,0	48,4	44,2	44,2	44,4	46,0	44,4
Mujeres	38,7	39,2	40,5	42,6	37,5	37,6	37,0	36,0	37,2	36,0	35,8	34,2
Total	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2	40,9	39,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.91.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	51,4	45,0	46,5	47,9	43,1	42,6	44,7	41,4	41,7	42,6	43,8	41,5
Mujeres	34,4	35,2	36,3	37,9	33,6	34,7	34,0	33,7	34,8	34,3	33,8	32,0
Total	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5	38,8	36,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España 2011-2019/2020.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2019	26,5	30,3	22,5	35,5	41,2	29,8	34,8	40,0	29,4	34,0	37,3	30,8	28,9	33,4	24,4
2017	25,9	28,5	23,2	37,2	43,1	31,5	34,9	39,2	30,5	38,9	41,9	36,0	29,4	35,5	23,5
2015	23,9	25,3	22,4	34,1	38,7	29,4	32,8	36,1	29,2	34,8	37,5	32,4	25,3	30,5	19,7
2013	25,8	25,9	25,6	34,2	37,9	30,3	31,8	34,5	28,9	35,2	37,5	33,1	23,9	28,6	19,1
2011	26,8	28,7	24,8	34,2	37,3	31,0	33,7	38,1	29,0	32,3	35,3	29,4	21,9	27,5	16,3

	15-64 años			15-17 años			18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2019	32,3	36,8	27,8	14,3	15,5	13,1	33,0	37,6	28,3	31,4	36,2	26,5	32,7	37,1	28,4
2017	34,0	38,3	29,6	13,5	16,6	10,5	34,6	39,0	30,3	32,3	36,6	27,9	34,8	39,1	30,5
2015	30,8	34,2	27,3	7,5	6,4	8,5	31,5	35,1	28,0	29,7	32,9	26,5	31,4	35,0	27,8
2013	30,8	33,6	28,0	11,7	12,7	10,6	31,4	34,2	28,5	30,7	33,0	28,4	30,8	33,9	27,8
2011	30,4	34,1	26,7	13,8	12,1	10,8	31,0	35,3	28,4	31,3	33,9	28,5	29,9	34,2	25,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.93.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	32,3	26,5	35,5	34,8	34,0	28,9
Hombres	36,8	30,3	41,2	40,0	37,3	33,4
Mujeres	27,8	22,5	29,8	29,4	30,8	24,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.94.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres 15-34 años	41,4	36,3	39,8	40,0	37,1	31,5	35,9	33,9	33,0	32,9	36,6	36,2
Hombres 35-64 años	44,0	39,5	41,8	43,7	36,9	33,9	36,4	34,2	33,9	35,0	39,1	37,1
Mujeres 15-34 años	36,5	34,2	36,4	36,8	33,0	29,7	28,0	28,5	28,4	26,5	27,9	26,5
Mujeres 35-64 años	19,1	25,1	25,9	27,0	25,3	24,4	26,7	25,6	27,8	27,8	30,5	28,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.95.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	42,8	38,0	40,9	42,0	37,0	32,9	36,2	34,1	33,6	34,2	38,3	36,8
Mujeres	27,1	29,3	30,5	31,3	28,6	26,6	27,2	26,7	28,0	27,3	29,6	27,8
Total	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.96.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.97.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1997-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.98.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco que ha fumado, sexo y edad (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos de cajetilla	73,9	71,2	77,3	59,1	58,8	59,4	70,1	68,5	72,2	74,5	70,1	80,6	77,3	73,9	81,1	83,7	82,0	85,9
Tabaco de liar	17,0	18,4	15,2	23,8	22,8	25,2	17,4	17,3	17,5	17,9	20,3	14,7	16,1	19,0	12,7	11,4	12,7	9,7
Los 2 tipos	9,1	10,4	7,5	17,1	18,4	15,4	12,5	14,2	10,3	7,5	9,6	4,6	6,7	7,1	6,2	4,9	5,3	4,4

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.99.

Porcentaje de personas que se han planteado dejar de fumar entre los que han fumado a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar	61,6	59,8	64,0	49,3	46,6	53,0	67,2	66,1	68,7
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	37,2	35,8	39,1	27,4	25,7	29,8	41,7	40,6	43,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.100.

Porcentaje de fumadores que fuman por término medio una cantidad de cigarrillos determinada (%), y número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman (nº cigarrillos) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-17 (menores)			18-64 (mayores)		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
1-5 cigarrillos	24,8	22,3	28,1	53,8	48,7	59,7	24,3	21,8	27,5
6-10 cigarrillos	32,5	30,5	35,2	34,4	37,9	30,2	32,5	30,3	35,3
>10 cigarrillos	42,6	47,2	36,7	11,9	13,4	10,1	43,2	47,8	37,2
Nº medio cigarrillos fumados cada día que fumaba en los últimos 30 días	11,9	12,7	10,9	6,8	7,5	6,1	12,0	12,8	11,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.101.

Evolución del número medio de cigarrillos fumados cada día que fuman en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (nº cigarrillos). España, 2013-2019/2020.

	Total	Hombres	Mujeres
2013	12,6	13,4	11,7
2015	12,4	13,4	11,3
2017	12,5	13,5	11,2
2019	11,9	12,7	10,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.102.

Evolución del consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de cigarrillos fumados (%). España, 2015-2019/2020.

	Cigarrillos de cajetilla	Tabaco de liar	Los 2 tipos
2015	78,4	14,7	6,9
2017	77,0	15,4	7,6
2019	73,9	17,0	9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.103.

Prevalencia de consumo de tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Tabaco en pipas de agua alguna vez en la vida	11,6	13,4	9,7	22,1	24,5	19,6	19,2	22,7	15,6	11,8	13,1	10,5	6,3	7,2	5,3	3,2	4,3	2,0
Tabaco en pipas de agua últimos 12 meses	5,0	5,9	4,2	12,6	14,3	10,7	8,3	10,3	6,3	4,4	4,6	4,1	1,9	2,0	1,9	1,2	1,7	0,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.104.

Prevalencia de binge drinking, borracheras y consumo de cannabis en los últimos 30 días y consumo problemático de cannabis, consumo de cigarrillos electrónicos y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que ha consumido tabaco en pipas de agua en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Consumidores de tabaco en pipas de agua últimos 12 meses
Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	4,1	8,8
Binge drinking últimos 30 días	15,4	23,6
Borracheras últimos 30 días	6,8	11,8
Cannabis últimos 30 días	8,0	18,5
Consumo problemático cannabis (CAST≥4)	45,4	46,0
Policonsumo últimos 12 meses	8,2	20,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.105.

Prevalencia de consumidores de tabaco entre la población de 15-64 años que fuma cigarrillos u otro tipo de tabaco según se hayan planteado o hayan intentado dejar de fumar y según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado	45,4	43,7	47,5	38,2	36,9	39,9
Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado	21,2	21,1	21,4	22,9	22,6	23,3
No se han planteado dejar de fumar	33,4	35,2	31,1	38,9	40,5	36,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.106.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	10,5	12,0	8,9	17,5	21,2	13,6	16,0	19,4	12,6	9,4	11,0	7,8	8,1	7,6	8,6	4,6	5,1	4,1
Último año	4,1	5,0	3,2	9,0	10,6	7,4	6,4	8,4	4,3	3,4	4,5	2,2	2,4	2,3	2,6	1,5	1,5	1,4
Último mes	1,8	2,4	1,2	3,1	3,9	2,3	2,5	3,5	1,4	1,9	2,7	1,0	1,2	1,3	1,0	0,9	1,0	0,8
A diario	1,1	1,4	0,7	1,4	1,9	0,8	1,6	2,4	0,8	1,1	1,8	0,5	0,9	1,0	0,8	0,5	0,4	0,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.107.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (%) y edad media de inicio en el consumo (años). España, 2015-2019/2020.

	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	6,8	8,8	10,5
Últimos 12 meses	–	3,0	4,1
Últimos 30 días	–	1,5	1,8
Diariamente en los últimos 30 días	–	0,9	1,1
Edad media inicio en el consumo	–	33,0	30,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.108.

Evolución de la prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015	2017	2019
Total	6,8	8,8	10,5
Hombre	7,3	9,6	12,0
Mujer	6,3	8,1	8,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.109.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

		2019
Alguna vez en la vida	Hombre	12,0
	Mujer	8,9
Últimos 12 meses	Hombre	5,0
	Mujer	3,2
Últimos 30 días	Hombre	2,4
	Mujer	1,2
A diario últimos 30 días	Hombre	1,4
	Mujer	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.110.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años según el marco temporal de consumo de tabaco (%). España, 2019/2020.



	Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	Ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	Ha consumido tabaco en los últimos 30 días	Ha consumido tabaco a diario en los últimos 30 días
Total	14,4	21,0	20,7	20,6
Hombres	15,3	21,3	20,8	20,6
Mujeres	13,3	20,5	20,7	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.111.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Cigarrillo electrónico de los 2 tipos	1,2	1,5	1,0	2,5	3,2	1,7
Cigarrillo electrónico con nicotina	5,0	5,3	4,6	7,4	8,8	6,0
Cigarrillo electrónico sin nicotina	2,3	2,4	2,2	5,2	6,1	4,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.112.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	Total			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	48,9	47,9	50,3	38,8	38,9	38,5	47,3	45,3	50,6	56,9	57,8	55,5	54,0	53,8	54,2
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	26,7	24,4	30,0	36,5	35,2	38,7	27,4	26,3	29,2	19,7	16,4	24,5	23,2	15,8	29,4
Los 2 tipos	24,3	27,7	19,7	24,7	25,8	22,8	25,3	28,5	20,3	23,4	25,8	20,0	22,8	30,4	16,3

T = total; H = hombres; M = mujeres.

Nota: se excluye de la base el segmento de 55 a 64 años por presentar una base reducida.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.113.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020.

	Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	53,9	29,3	54,9	32,3
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	21,3	47,6	19,6	46,2
Los 2 tipos	24,8	23,1	25,5	21,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.114.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos, según contengan o no nicotina y según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Cigarrillo electrónico de los 2 tipos	14,5	16,1	12,7	24,3	27,7	19,7
Cigarrillo electrónico con nicotina	58,6	58,0	59,3	48,9	47,9	50,3
Cigarrillo electrónico sin nicotina	26,8	25,9	28,0	26,7	24,4	30,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.115.

Porcentaje de personas que utilizan los cigarrillos electrónicos como sustituto del tabaco, en la población de 15-64 años, según el tipo de cartuchos utilizados (%). España, 2019/2020.

Cartuchos con nicotina			Cartuchos sin nicotina		
T	H	M	T	H	M
52,3	49,9	55,5	35,9	31,0	41,6

T = total; H = hombres; M = mujeres;

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.116.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar entre los que fuman CE	48,3	46,6	50,6	25,0	23,4	27,7	44,7	45,4	43,7	60,4	61,3	59,0	62,7	60,0	65,0	66,3	64,4	68,5

T = total; H = hombres; M = mujeres; CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.117.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos para reducir el consumo de tabaco o dejar de fumar en la población de 15-64 años que ha fumado cigarrillos electrónicos, según sexo y edad (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos electrónicos para dejar de fumar entre los que fuman CE	54,1	50,8	58,1	48,3	46,6	50,6

T = total; H = hombres; M = mujeres; CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.118.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida o no (%). España, 2019/2020.


	Población 15-64 años		Consumidores de CE alguna vez en la vida	
	Muchos/bastantes problemas			
Problemas de salud o de otro tipo que puede significar fumar CE	73,9		62,3	

CE = cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.119.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años. España, 2005-2019/2020.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7	20,8	22,5
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0	11,1	12,0
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1	7,5	8,6
A diario o casi a diario en los últimos 30 días	-	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0	5,9	6,4
Edad media de inicio en el consumo	-	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6	34,4	34,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.120.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2005-2019/2020.

	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida								
Hombre	-	-	-	13,7	16,8	13,6	15,9	18,3
Mujer	-	-	-	25,4	27,6	23,9	25,6	26,8
Últimos 12 meses								
Hombre	3,5	6,8	4,6	7,6	8,5	8,3	8,1	9,4
Mujer	6,7	11,5	9,3	15,3	16,0	15,8	14,1	14,7
Últimos 30 días								
Hombre	2,3	4,3	3,2	5,2	5,8	5,4	5,4	6,5
Mujer	5,1	7,6	7,0	11,4	12,1	10,8	9,7	10,7
Diariamente en los últimos 30 días								
Hombre	-	-	-	2,3	4,3	4,0	4,0	4,8
Mujer	-	-	-	6,3	9,4	8,1	7,9	8,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.121.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.


	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	22,5	18,3	26,8	13,1	10,5	15,8	27,0	22,0	31,9
Último año	12,0	9,4	14,7	6,7	5,4	8,0	14,6	11,3	17,8
Último mes	8,6	6,5	10,7	3,6	2,9	4,4	10,9	8,2	13,6
A diario	6,4	4,8	8,1	2,1	1,8	2,4	8,5	6,2	10,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.122.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	4,5	6,2	9,3	11,9	13,0
Mujeres	6,5	9,2	13,0	18,8	22,2
Total	5,5	7,7	11,1	15,4	17,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.123.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020.

	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hipnosedantes con o sin receta últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0	11,1	12,0
Riesgo percibido	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	62,1	65,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.124.


Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020.

		Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos
2017	Población 15-64 años	11,0	2,2	0,6	0,5	0,4
	Hipnosedantes últimos 12 meses	13,9	5,7	1,5	1,3	1,1
	Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	33,8	22,1	6,9	5,7	4,7
2019	Población 15-64 años	10,5	2,5	0,9	0,7	0,6
	Hipnosedantes últimos 12 meses	15,4	5,8	2,3	2,1	1,7
	Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	42,7	26,2	11,3	11,4	9,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.125.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	2,3	3,4	6,4	8,5	10,0
Mujeres	3,4	5,2	8,7	14,2	18,7
Total	2,8	4,3	7,5	11,4	14,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.126.

Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta, según sexo (%). España, 2019/2020.

		Total	Hombre	Mujer
Lo tomo en mayor dosis porque la dosis que me ha recetado mi médico no me hace efecto	Mayor dosis	3,6	4,0	3,3
Lo tomo en menor dosis que la que me ha recomendado mi médico	Menor dosis	10,0	8,9	10,8
Lo tomo durante más tiempo porque si dejo de tomarlo me siento mal	Más tiempo	2,3	3,0	1,8
Lo tomo durante menos tiempo que lo que me ha recomendado mi médico	Menos tiempo	10,0	11,7	8,8
Lo tomo en la cantidad y durante el tiempo exacto que me ha recomendado mi médico	Dosis y tiempo exacto	77,9	76,0	79,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.127.


Modos en los que la población de 15-64 años toma hipnosedantes con o sin receta, según sexo (%). España, 2019/2020.

		Total	Hombre	Mujer
El médico me dijo que me lo tomara con una pauta fija (cada 8 horas, 1 al día...)	Pauta fija	76,7	74,5	78,1
El médico me dijo que me lo tomara cuando yo lo necesitara.	Según necesidad	16,3	17,7	15,3
Lo tomo según considero porque no me lo ha recetado ningún médico	Sin receta	7,0	7,8	6,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.128.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (%) y edad media de inicio en el consumo (años) en la población de 15-64 años (%). España, 2003-2019/2020.



	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	-	-	-	-	-	2,7	4,1	3,0	3,1
Últimos 12 meses	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3
Últimos 30 días	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9	0,7	0,5
Edad media de inicio consumo	-	-	-	-	-	31,3	32,5	31,6	30,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.129.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2005-2019/2020.

		1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	Hombre	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,6	3,3	2,8	3,0
	Mujer	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,8	4,9	3,2	3,1
Últimos 12 meses	Hombre	2,3	2,3	2,5	2,9	1,1	1,2	1,9	1,1	1,1	1,6	1,2	1,3
	Mujer	2,4	2,4	3,1	3,3	1,3	1,4	1,9	1,2	1,3	2,9	1,4	1,2
Últimos 30 días	Hombre	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,8	0,5	0,6
	Mujer	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	1,1	0,8	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.130.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.


	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez	3,1	3,0	3,1	2,8	2,6	3,0	3,2	3,2	3,2
Último año	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3	1,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.131.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo y edad (%). España, 2019/2020.



	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2	1,5
Mujeres	1,2	1,2	1,6	1,4	1,1	0,7
Total	1,3	1,2	1,4	1,4	1,1	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.132.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta o para uso no médico mezclados con alcohol y/o drogas ilegales entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en el último año, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Hipnosedantes sin receta y alcohol en los últimos 12 meses	23,2	27,6	18,7
Hipnosedantes sin receta y drogas ilegales en los últimos 12 meses	16,2	19,7	12,5
Hipnosedantes sin receta y alcohol y drogas ilegales en los últimos 12 meses	13,4	17,6	8,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.

Prevalencia de consumo de alcohol, drogas ilegales o alcohol y drogas ilegales junto con hipnosedantes sin receta o para uso no médico en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses según sexo (%). España, 2017- 2019/2020.


	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
Consumo de alcohol e hipnosedantes sin receta	20,2	32,0	9,5	23,2	27,6	18,7
Consumo de drogas ilegales e hipnosedantes sin receta	14,5	22,4	7,4	16,2	19,7	12,5
Consumo de alcohol y drogas ilegales e hipnosedantes sin receta	14,9	23,5	7,3	13,4	17,6	8,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3
Riesgo percibido por consumo hipnosedantes una vez o menos al mes	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	62,1	65,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.135.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y disponibilidad percibida ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con/sin receta en la población de 15-64 años (%). España, 2005-2019/2020.

	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3	1,3	1,3
Disponibilidad percibida	-	-	-	-	-	-	31,9	32,8	28,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.136.

Medios por los que consiguió, la última vez que tomó hipnosedantes sin receta entre la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida, según sexo y edad (%). España, 2017-2019/2020.

	2017	2019
A través de un traficante o a una persona desconocida	3,1	0,8
A través de internet	0,1	0,1
Lo compré en una farmacia sin receta	8,3	5,9
Lo conseguí de otra manera	3,9	10,0
A través de una receta médica que no me recetaron a mí*	35,8	11,0
A través de un amigo o familiar	48,8	72,2

* En 2017 la pregunta fue: A través de una receta médica que me recetaron a mi.

* En 2019 la pregunta fue: A través de una receta médica que no me recetaron a mi.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.137.

Evolución de la prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Alguna vez en la vida	14,5	13,1	16,0	15,2	14,1	16,2
Últimos 12 meses	6,7	5,9	7,4	7,1	6,2	8,1
Últimos 30 días	2,9	2,3	3,4	3,6	3,0	4,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.138.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	6,7	6,8	6,6	11,1	9,8	12,4	16,2	15,7	16,6	18,1	15,7	20,5	20,3	19,7	20,8
Últimos 12 meses	3,3	2,9	3,8	5,0	4,2	5,9	7,8	7,4	8,2	8,0	6,6	9,4	10,0	8,4	11,5
Últimos 30 días	1,2	1,0	1,3	2,0	1,9	2,1	3,9	3,8	4,1	4,2	3,3	5,1	5,9	4,3	7,4

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.139.

Evolución de la prevalencia de consumo de analgésicos opioides en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Tramadol	5,2	4,5	5,8	7,2	6,3	8,2
Codeína	10,0	9,1	11,0	7,9	7,4	8,5
Morfina	2,1	2,0	2,3	2,1	2,3	1,9
Fentanilo	0,3	0,3	0,2	0,5	0,6	0,5
Otros*	0,9	0,8	1,0	2,1	2,1	2,2

* En 2017 otros analgésicos opioides fueron: oxycodona, hidromorfona, petidina, tapentadol, metadona y buprenorfina.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.140.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides alguna vez en la vida en la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida, según sexo (%). España, 2017- 2019/2020.

	2017			2019		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Codeína	69,2	69,9	68,7	54,6	54,4	54,9
Tramadol	35,5	34,8	36,2	50,0	47,3	52,3
Otros*	6,1	6,2	6,1	14,2	14,9	13,6
Morfina	14,7	15,2	14,3	13,9	16,0	11,9
Fentanilo	1,9	2,5	1,4	3,6	4,4	2,9

* En 2017 otros analgésicos opioides fueron: Oxycodona, hidromorfona, petidina, tapentadol, metadona y buprenorfina.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.141.


Razones referidas para iniciar el consumo entre la población de 15-64 años que ha consumido analgésicos opioides, según sexo (%). España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
Dolor agudo	61,4	62,7	60,4	57,4	55,4	59,1
Dolor crónico	16,9	19,9	14,5	27,5	29,7	25,5
Después de una operación	16,1	13,5	18,1	20,5	18,6	22,2
Para tratar mi dolor porque no me funcionaban otros medicamentos	10,7	9,5	11,6	8,8	7,9	9,5
Otras razones	1,6	2,6	0,8	10,3	12,5	8,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.142.

Evolución del modo de consumo realizado entre la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida (%). España, 2017-2019/2020.



	2017	2019
Más tiempo	3,0	1,4
Mayor dosis	3,4	2,5
Menor dosis	8,8	5,4
Menos tiempo	12,8	7,3
Dosis y tiempo exactos	79,0	82,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.143.

Prevalencia de consumo de analgésicos opioides sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	1,7	1,8	1,5	1,6	1,8	1,3	1,4	1,5	1,4	2,0	2,0	2,0	1,8	2,1	1,5	1,5	1,7	1,2
Últimos 12 meses	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,8	0,4	0,4	0,4	0,8	0,7	1,0	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Últimos 30 días	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.144.

Prevalencia de consumo de drogas legales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020.

	2017		2019	
	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses
Alcohol	75,2	77,8	77,2	80,2
Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)	5,1	7,2	4,2	7,2
Borracheras	18,6	20,7	19,4	22,8
Hipnosedantes	11,1	34,3	12,0	38,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.145.


Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años y en los consumidores de analgésicos opioides en los últimos 12 meses (%). España, 2017-2019/2020.

	2017		2019	
	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses	Población 15-64 años	Analgésicos opioides últimos 12 meses
Cannabis	11,0	14,6	10,5	14,7
Cocaína polvo y/o base	2,2	4,2	2,5	6,4
Éxtasis	0,6	1,8	0,9	3,0
Anfetaminas	0,5	1,4	0,7	2,3
Alucinógenos	0,4	1,0	0,6	2,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.146.


Medios por los que consiguió analgésicos opioides sin receta en la población de 15 a 64 años que ha consumido analgésicos opioides alguna vez en la vida (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.147.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.




		1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	H	-	-	-	-	-	-	-	-	35,4	37,9	40,1	43,6	46,3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	22,7	22,8	26,8	28,7
Últimos 12 meses	H	10,7	10,7	9,6	13,0	16,2	15,7	13,6	14,8	13,6	12,9	13,3	15,4	14,6
	M	4,4	4,7	4,3	5,5	6,3	6,6	6,6	6,2	5,5	5,4	5,6	6,6	6,3
Últimos 30 días	H	-	6,7	6,2	9,4	11,3	12,5	10,0	11,0	10,2	9,8	10,7	12,9	11,4
	M	-	2,5	2,8	3,4	3,9	4,7	4,2	4,0	3,8	3,4	3,9	5,3	4,7
Diariamente en los últimos 30 días	H	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,0	3,4	3,4	4,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,9	0,8	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.148.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis (%) y edad media de inicio en el consumo de cannabis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	14,5	22,9	19,6	23,8	29	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5	35,2	37,5
Últimos 12 meses	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5
Últimos 30 días	-	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3	9,1	8,0
Diariamente en los últimos 30 días	-	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,7	2,0	1,7	1,9	2,1	2,1	2,9
Edad media de inicio consumo	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3	18,4	18,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.149.

Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

		15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	15-17 años	18-64 años
Alguna vez en la vida	Hombre	46,3	48,4	56,3	51,8	44,0	32,3	28,1	47,0
	Mujer	28,7	34,7	39,0	34,1	23,9	15,0	18,8	29,0
	Total	37,5	41,7	47,6	43,1	33,8	23,6	23,5	38,0
Últimos 12 meses	Hombre	14,6	28,7	23,2	15,3	8,0	3,5	17,0	14,6
	Mujer	6,3	15,1	9,9	4,9	3,7	1,7	9,8	6,2
	Total	10,5	22,1	16,6	10,2	5,8	2,6	13,5	10,4
Últimos 30 días	Hombre	11,4	21,8	17,8	12,1	6,4	2,8	10,7	11,4
	Mujer	4,7	9,7	7,6	3,9	2,9	1,6	6,7	4,6
	Total	8,0	15,9	12,7	8,0	4,6	2,2	8,8	8,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.150.


Evolución de la prevalencia de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 2001-2019/2020.

	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Población 15-34 años	17,3	20,1	20,3	18,8	19,4	17,0	17,0	17,1	18,3	19,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.151.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	14,6	28,7	23,2	15,3	8,0	3,5
Mujeres	6,3	15,1	9,9	4,9	3,7	1,7
Total	10,5	22,1	16,6	10,2	5,8	2,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.152.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	11,4	21,8	17,8	12,1	6,4	2,8
Mujeres	4,7	9,7	7,6	3,9	2,9	1,6
Total	8,0	15,9	12,7	8,0	4,6	2,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.153.

Evolución de las características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis últimos 30 días									
Principalmente marihuana	52,7	50,5	59,3	48,3	47,7	50,0	48,7	48,9	48,0
Principalmente hachís	17,0	17,7	15,1	21,9	20,5	25,9	20,6	19,2	24,5
De los dos tipos	30,3	31,9	25,7	29,8	31,8	24,2	30,8	31,9	27,5
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días									
Sí	89,5	90,1	87,7	92,9	92,9	92,9	86,9	87,4	85,6
No	0,5	9,9	12,3	7,1	7,1	7,1	13,1	12,6	14,4

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.154.

Evolución del número medio de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Número medio de porros consumidos	2,5	2,6	2,1	2,7	2,7	2,6	2,9	2,9	2,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.155.

Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2017-2019/2020.


	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto	97,9	98,6	96,2	97,9	97,8	98,2
Usando pipas de agua, bongos, cachimbas, shishas	4,4	4,3	4,8	4,4	4,9	2,7
Por vía oral: pasteles, galletas...	2,6	2,1	3,9	1,8	2,0	1,2
Usando cigarrillos electrónicos	0,5	0,5	0,5	2,0	2,1	1,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.156.

Porcentaje de personas que afirman que si fuese legal el consumo de hachís o marihuana lo probarían. Respuesta entre los que no lo han probado nunca entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.



	2017	2019
Total	2,4	1,2
Hombres	2,9	1,1
Mujeres	2,1	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.157.

Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020.


	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de tabaco en los consumidores de cannabis	82,2	82,4	81,9	90,6	91,9	87,5	86,7	88,2	83,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.158.

Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.159.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha consumido tabaco en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020.


	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis en los consumidores de tabaco	19,8	25,2	13,0	24,4	30,7	16,2	23,2	29,1	15,3

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.160.

Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.161.

Prevalencia de consumo de cannabis y tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis y tabaco últimos 12 meses	7,7	10,9	4,6	10,0	14,1	5,8	9,1	12,9	5,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.162.

Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días	6,4	9,5	3,2	7,9	11,4	4,4	6,2	9,1	3,3

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.163.

Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (%). España, 2015-2019/2020.

	2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de cannabis mezclado con spice alguna vez en la vida	0,8	1,1	0,4	0,4	0,7	0,1	0,9	1,6	0,4

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.164.

Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses en la población general de 15 a 64 años y en la población que ha fumado cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)
Dos sustancias	69,5	14,1	6,8
Tres sustancias	22,5	56,3	34,1
Cuatro o más sustancias	8,0	29,6	59,1

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.165.

Prevalencia de binge drinking, borracheras, tabaco en los últimos 30 días y consumo de riesgo de alcohol, consumo de cigarrillos electrónicos, hipnosedantes sin receta, analgésicos opioides sin receta y policonsumo de 3 o más sustancias en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y en la población que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST≥4)
Cigarrillos electrónicos últimos 12 meses	4,1	14,5	21,5
Tabaco últimos 30 días	36,8	82,8	95,9
Binge drinking últimos 30 días	25,1	53,1	63,7
Borracheras últimos 30 días	6,8	27,8	36,1
Consumo de riesgo de alcohol (AUDIT≥8)	4,2	17,5	27,5
Hipnosedantes sin receta últimos 12 meses	1,3	5,1	14,0
Analgésicos opioides sin receta últimos 12 meses	7,1	10,1	20,1
Policonsumo últimos 12 meses	14,5	84,8	93,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.166.

Prevalencia de cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses en la población general de 15-64 años y en la población que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)
Cocaína polvo y/o base	2,5	16,4	36,5
Éxtasis	0,9	7,5	20,2
Anfetaminas	0,7	4,9	13,1
Alucinógenos	0,6	4,8	12,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.167.

Lugares donde han obtenido cannabis en los últimos 30 días las personas de 15 a 64 años que han consumido cannabis, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Internet	2,8	2,8	2,8
Tienda de cannabis	3,0	3,2	2,5
Plantación propia	8,7	9,8	5,9
Club cannábico	12,8	13,0	12,1
Traficante o camello	42,6	45,3	35,4
Amigo	52,6	49,2	61,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.168.

Prevalencia de consumidores problemáticos de cannabis (CAST \geq 4) en la población de 15 a 64 años. España, 2013-2019/2020.

	2013	2015	2017	2019
Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) entre los que han contestado la escala CAST y han consumido cannabis en el último año	25,0	21,2	15,9	22,5
Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) entre toda la población de 15 a-64 años	2,2	1,8	1,6	1,9
Estimación número de consumidores problemáticos (CAST \geq 4) en la población de 15-64 años (números absolutos)	687.233	558.549	496.828	591.798
Total población de 15-64 años datos históricos INE*	31.964.326	30.689.506	30.844.228	30.879.932

* Datos de población general del INE.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo. España 2013-2019/2020.


	2013		2015		2017		2019	
	H	M	H	M	H	M	H	M
Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los que han contestado la escala CAST y han consumido cannabis en el último año	29,0	15,2	24,1	14,1	17,3	12,3	24,1	18,5
Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre toda la población de 15 a-64 años	3,5	0,8	2,9	0,7	2,5	0,7	3,0	0,9

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.170.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario EDADES y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013-2019/2020.



	2013	2015	2017	2019
% entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	25,0	21,2	15,9	22,5
% entre toda la población de 15-64 años	2,2	1,8	1,6	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.171.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2019/2020.

	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	Consumo de cannabis (CAST < 4)	Total población general
Alcohol	92,6	93,5	77,2
Borracheras	69,7	61,1	19,4
Botellón	31,7	27,7	9,9
Tabaco	96,4	94,3	39,4
Hipnosedantes con o sin receta	34,1	18,3	12,0
Cocaína (polvo y/o base)	36,5	21,5	2,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.172.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han contestado la escala CAST del cuestionario EDADES y entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020.



	2013		2015		2017		2019	
	H	M	H	M	H	M	H	M
% entre la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 12 meses	29,0	15,2	24,1	14,1	17,3	12,3	24,1	18,5
% entre toda la población de 15-64 años	3,5	0,8	2,9	0,7	2,5	0,7	3,0	0,9

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.173.

Prevalencia de borracheras y binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de botellón y policonsumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años y en la población que presenta un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)
Borracheras últimos 30 días	6,8	36,1
Binge drinking últimos 30 días	15,4	52,5
Botellón últimos 12 meses	9,9	31,7
2 drogas	28,1	6,8
3 drogas	9,1	34,1
4 drogas o más	3,2	59,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.174.

Características del consumo de cannabis entre la población de 15-64 años que tiene un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según sexo. (%) España, 2017-2019/2020.

	2017			2019		
	T	H	M	T	H	M
En forma de porro o canuto	95,0	94,7	96,4	96,6	96,7	96,5
Usando pipas de agua	5,3	6,0	2,7	4,2	4,8	2,0
Por vía oral: pasteles, galletas...	2,9	2,9	3,0	2,5	3,2	0,5
Usando cigarrillos electrónicos	0,0	0,0	0,0	4,3	4,5	3,5

T = total; H = hombres; M = mujeres.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.175.

Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2019/2020.

	Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	Consumo de cannabis (CAST <4)
Consumo de cannabis últimos 30 días		
Principalmente marihuana	43,5	51,0
Principalmente hachís	20,2	20,5
De los dos tipos	36,3	28,6
Consumo de cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días		
Sí	90,1	88,6
No	9,9	11,4
Media de porros consumidos al día	3,5	2,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.176.

Modo de consumo de cannabis en los consumidores de cannabis en los últimos 12 meses y en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) (%). España, 2019/2020.


	Consumidores de cannabis últimos 12 meses	Consumidores problemáticos de cannabis (CAST <4)
Cannabis + tabaco	86,9	90,1
De los 2 tipos	30,8	36,3
Marihuana	48,7	43,5
Hachís	20,6	20,2
Porro	97,9	96,6
Cachimbos	4,4	4,2
Vía oral	1,8	2,5
Cigarrillos electrónicos	2,0	4,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.177.


Proporción de personas que consideran que la legalización del cannabis es muy importante para resolver el problema de las drogas ilegales en la población de 15 a 64 años según sexo (%). España, 2015-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.178.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.179.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida													
Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	14,9	13,3	14,3	16,1
Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,4	4,6	5,7	5,7
Últimos 12 meses													
Hombre	2,7	2,6	2,3	3,8	4,1	4,6	4,4	4,2	3,6	3,3	2,9	3,2	4,0
Mujer	1,0	0,6	0,8	1,3	1,2	1,3	1,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9
Últimos 30 días													
Hombre	-	1,5	1,3	2,2	1,6	2,5	2,5	2,0	1,8	1,7	1,4	1,8	1,9
Mujer	-	0,2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.180.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1999-2019/2020.



	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	2,3	3,8	4,1	4,6	4,4	4,2	3,6	3,3	2,9	3,2	4,0
Mujeres	0,8	1,3	1,2	1,3	1,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.181.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España 1999-2019/2020.

	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
15-34 años	2,8	4,4	4,8	5,2	5,3	4,3	3,5	3,2	3,0	2,7	3,1
35-64 años	0,5	0,9	0,9	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,3	1,7	2,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.182.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (%). España, 2019/2020.

Sexo	Grupo de edad	Cocaína en polvo
Hombres	15-24 años	4,0
	25-34 años	5,6
	35-44 años	5,3
	45-54 años	4,0
	55-64 años	0,9
Mujeres	15-24 años	0,8
	25-34 años	1,7
	35-44 años	1,0
	45-54 años	0,6
	55-64 años	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.183.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2007-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.184.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2007-2019/2020.

		2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	Hombre	–	–	12,8	15,0	13,4	14,6	16,4
	Mujer	–	–	4,7	5,4	4,7	5,9	5,9
Últimos 12 meses	Hombre	4,7	4,2	3,6	3,3	3,1	3,4	4,1
	Mujer	1,6	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0
Últimos 30 días	Hombre	2,5	2,0	1,8	1,7	1,5	1,8	2,0
	Mujer	0,8	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.185.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses en la población de 15-34 años. España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
15-34 años	2,8	2,7	4,6	4,8	5,2	5,5	4,4	3,6	3,3	3,0	2,8	3,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.186.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base (%) y edad media de inicio en el consumo de cocaína base (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	1,0	0,8	1,3	1,4
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2
Últimos 30 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Edad media de inicio en el consumo	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	23,1	22,4	23,2	20,7	23,2	21,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES).

1.1.187.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.

		1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	Hombre	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	1,4	1,8	2,1
	Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,7	0,8
Últimos 12 meses	Hombre	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3
	Mujer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Últimos 30 días	Hombre	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
	Mujer	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.188.

Prevalencia de consumo de cocaína base alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.189.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España 1999-2019/2020.

	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	0,4	0,2	0,2	0,3	0,7	0,2	0,2	0,1	0,3	0,4	0,3
Mujeres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Total	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.190.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020.




	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	10,9	1,4	11,2
Últimos 12 meses	2,5	0,2	2,5
Últimos 30 días	1,1	0,1	1,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.191.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	2,5	2,5	3,7	3,2	2,4	0,8
Hombres	4,1	4,0	5,6	5,4	4,2	1,0
Mujeres	1,0	0,8	1,8	1,0	0,6	0,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.192.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis (%) y edad media de inicio en el consumo de éxtasis (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6	3,6	5,0
Últimos 12 meses	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9
Últimos 30 días	-	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Edad media de inicio consumo	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7	21,1	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.193.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Alguna vez en la vida	3,6	6,8	7,9	4,4	1,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.194.

Evolución de la prevalencia de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
15-34 años	1,8	1,6	3,7	2,9	2,5	2,3	1,8	1,4	1,5	1,3	1,2	1,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.195.


Prevalencia del consumo de éxtasis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombre	1,9	1,2	1,2	2,8	2,0	1,8	1,6	1,4	1,0	1,0	0,9	1,0	1,4
Mujer	0,7	0,5	0,5	0,7	0,8	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.196.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020.




* En 2019 el riesgo percibido es de cocaína u otras drogas ilegales.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.197.


Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.198.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.



	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,9	1,7	1,6	1,1	0,4	0,2
Hombres	1,4	2,4	2,3	1,8	0,7	0,2
Mujeres	0,4	0,9	0,8	0,3	0,0	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.199.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

		Consumo de éxtasis
Alguna vez en la vida	Hombres	7,5
	Mujeres	2,4
Últimos 12 meses	Hombres	1,4
	Mujeres	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.200.


Prevalencia de consumo de GHB alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020.

	2013			2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	0,6	0,9	0,2	0,6	1,0	0,2	0,5	0,7	0,2	0,9	1,5	0,3
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0
Últimos 30 días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.201.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas (%) y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,7	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3
Últimos 12 meses	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7
Últimos 30 días	-	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3
Edad media de inicio consumo	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2	20,4	20,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.202.

Prevalencia del consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	1,3	1,4	1,0	1,6	1,1	1,4	1,3	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9
Mujeres	0,7	0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.203.

Evolución de la prevalencia de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
15-34 años	1,8	1,3	2,2	1,6	2,1	1,7	1,4	1,1	1,2	1,0	0,9	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.204.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

Consumo de anfetaminas		
Alguna vez en la vida	Hombres	6,5
	Mujeres	2,0
Últimos 12 meses	Hombres	0,9
	Mujeres	0,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.205.


Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Alguna vez en la vida	2,5	5,6	6,4	4,2	1,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.206.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,7	1,0	1,1	0,7	0,5	0,1
Hombres	0,9	1,2	1,7	1,1	0,9	0,0
Mujeres	0,4	0,9	0,6	0,2	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.207.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2011-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.208.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	0,9	1,1	0,6	1,7	2,7	0,7	1,7	2,9	0,5	1,0	1,8	0,3	0,4	0,4	0,3	0,9	1,1	0,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.209.


Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.210.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos (%) y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.211.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

		Consumo de alucinógenos
Alguna vez en la vida	Hombres	8,2
	Mujeres	2,8
Últimos 12 meses	Hombres	1,0
	Mujeres	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.212.


Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad (%). España, 2019/2020.

	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Alguna vez en la vida	3,6	7,9	8,3	4,8	2,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.213.

Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Hombres	1,1	1,4	0,8	1,2	0,9	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5	0,8	0,7	1,0
Mujeres	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.214.


Evolución de la prevalencia de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15 a 34 años. España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
15-34 años	1,7	1,2	1,3	1,3	1,6	1,4	1,1	0,9	0,8	1,1	0,9	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.215.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,6	1,1	1,1	0,7	0,3	0,1
Hombres	1,0	1,9	1,5	1,2	0,6	0,1
Mujeres	0,2	0,3	0,7	0,1	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.216.

Prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020.



	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	2,1	1,9	2,0	2,4	3,5
Últimos 12 meses	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Últimos 30 días	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.217.

Prevalencia de consumo de setas mágicas, alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

		Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses
15-64 años	Total	3,5	0,4
	Hombres	5,3	0,6
	Mujeres	1,7	0,1
15-24 años	Total	2,7	0,7
	Hombres	3,4	1,2
	Mujeres	1,8	0,2
25-34 años	Total	5,8	0,6
	Hombres	8,2	0,9
	Mujeres	3,5	0,4
35-44 años	Total	5,3	0,4
	Hombres	8,1	0,8
	Mujeres	2,4	0,1
45-54 años	Total	2,6	0,2
	Hombres	4,7	0,4
	Mujeres	0,5	0,0
55-64 años	Total	1,1	0,1
	Hombres	1,7	0,1
	Mujeres	0,6	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.218.


Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2013-2019/2020.

		2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	Hombres	2,9	3,0	3,8	5,3
	Mujeres	0,8	1,0	1,1	1,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.219.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína (%) y edad media de inicio en el consumo de heroína (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alguna vez en la vida	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Últimos 12 meses	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Últimos 30 días	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Edad media de inicio consumo	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2	22,7	22,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.220.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Prevalencia de consumo	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Disponibilidad percibida	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6	27,4	30,3	20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.221.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.



* En 2019 el riesgo percibido es de cocaína u otras drogas ilegales

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.222.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles (%) y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles (años) en la población de 15-64 años. España, 1995-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.223.

Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



		Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-24 años	Hombre	14,6	39,1	20,2	19,4	6,7
	Mujer	19,8	43,5	22,4	11,6	2,7
25-34 años	Hombre	8,9	40,1	28,9	15,4	6,7
	Mujer	20,3	43,0	25,9	7,8	2,9
35-44 años	Hombre	9,9	44,1	29,4	10,9	5,8
	Mujer	18,3	45,6	28,5	5,8	1,8
45-54 años	Hombre	10,2	46,9	32,6	6,1	4,2
	Mujer	16,0	47,0	28,5	7,6	0,9
55-64 años	Hombre	12,1	47,9	32,7	5,8	1,4
	Mujer	20,8	46,2	27,0	5,5	0,5

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.224.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales*) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ninguna sustancia	4,2	2,8	5,7	14,9	11,0	18,8	24,5	18,2	30,9
Una sola sustancia	19,8	17,3	22,5	44,7	44,1	45,3	43,7	44,5	42,9
Dos sustancias	32,8	30,9	34,7	28,1	29,3	26,9	23,5	26,3	20,7
Tres sustancias	25,6	26,6	24,5	9,1	10,8	7,4	6,7	8,7	4,7
Cuatro o más sustancias	17,5	22,4	12,6	3,2	4,8	1,6	1,5	2,3	0,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.225.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas*, según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (%). España, 2019/2020.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	85,6	94,7	98,9	99,2
Tabaco	10,0	80,9	97,6	96,9
Cannabis	0,3	5,1	62,5	92,8
Éxtasis	0,0	0,0	0,4	25,7
Hipnosedantes con o sin receta	4,1	18,6	35,2	54,4
Hipnosedantes sin receta	0,1	1,2	3,0	16,6
Analgésicos opioides con o sin receta	5,5	8,1	13,5	20,1
Analgésicos opioides sin receta	0,2	0,6	1,2	5,9
Cocaína en polvo	0,0	0,5	4,5	53,7
Cocaína base	0,0	0,1	0,1	4,4
Anfetaminas/speed	0,0	0,0	0,3	17,4
Alucinógenos	0,0	0,0	0,3	16,6
Heroína	0,0	0,0	0,0	2,1
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,2	3,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.226.

Prevalencia de consumo de dos o más sustancias psicoactivas* según sustancia consumida en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2019/2020.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Alcohol	49,6	34,5	11,7	4,2
Tabaco	11,4	58,0	22,7	8,0
Cannabis	1,3	13,9	55,6	29,3
Éxtasis	0,0	1,2	3,8	94,9
Hipnosedantes con o sin receta	15,1	43,6	26,7	14,6
Hipnosedantes sin receta	4,7	28,6	22,7	44,0
Analgésicos opioides con o sin receta	37,3	34,4	18,5	9,8
Analgésicos opioides sin receta	18,6	29,4	19,2	32,8
Cocaína en polvo	0,6	6,6	17,8	75,0
Cocaína base	0,0	10,2	2,9	86,9
Anfetaminas	1,4	0,0	5,2	93,4
Alucinógenos	2,3	2,2	4,8	90,7
Heroína	0,0	0,0	0,0	100,0
Inhalables volátiles	0,0	1,7	10,4	88,0

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.227.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de diferentes sustancias psicoactivas (columna) según sustancia de consumo (fila) (%). España, 2019/2020.

	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Analgésicos opioides*	Analgésicos opioides**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles
Alcohol	100,0	84,7	75,1	93,2	80,2	91,6	93,7	97,3	100,0	97,3	99,4	97,6	96,9	100,0	94,5
Tabaco	43,2	100,0	48,9	66,6	49,8	63,4	86,7	86,6	86,0	86,2	89,5	87,3	81,1	100,0	92,3
Hipnosedantes*	11,7	14,9	100,0	100,0	38,9	44,9	17,8	27,9	56,1	28,0	30,6	39,3	35,5	91,9	37,7
Hipnosedantes**	1,5	2,1	10,5	100,0	4,9	26,7	5,1	13,1	31,4	13,0	15,8	22,1	19,4	46,9	25,1
Analgésicos opioides*	7,4	9,0	23,2	27,6	100,0	100,0	10,1	18,4	33,2	18,1	23,4	24,7	24,8	61,6	28,1
Analgésicos opioides**	0,7	1,0	2,4	13,5	9,0	100,0	2,2	5,8	27,4	5,7	12,2	12,6	15,2	42,2	19,5
Cannabis	12,7	23,2	15,4	42,7	14,7	36,8	100,0	68,7	82,0	68,4	87,0	78,5	83,1	94,3	81,4
Cocaína en polvo	3,1	5,4	5,7	25,9	6,4	22,8	16,2	100,0	72,9	98,2	61,7	75,7	58,5	95,3	51,5
Cocaína base	0,2	0,4	0,8	4,2	0,8	7,3	1,3	4,9	100,0	6,6	7,5	12,9	9,2	73,4	18,0
Cocaína polvo y/o base	3,2	5,5	5,8	26,2	6,4	22,8	16,4	100,0	100,0	100,0	61,7	75,7	58,5	95,3	51,5
Éxtasis	1,2	2,0	2,3	11,3	3,0	17,4	7,5	22,5	40,3	22,1	100,0	57,4	58,1	66,9	58,3
Anfetaminas	0,8	1,4	2,1	11,4	2,3	13,1	4,9	19,9	50,1	19,6	41,7	100,0	38,3	71,6	43,3
Alucinógenos	0,7	1,2	1,7	9,5	2,1	14,0	4,8	14,9	33,9	14,6	38,8	36,5	100,0	71,6	56,4
Heroína	0,1	0,2	0,5	2,5	0,6	4,4	0,6	2,6	29,2	2,5	4,9	7,2	8,0	100,0	15,0
Inhalables volátiles	0,2	0,3	0,4	2,8	0,5	4,2	1,1	2,9	14,9	2,8	8,9	9,1	13,2	31,3	100,0

* Con o sin receta. ** Sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.228.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Sólo alcohol	17,8	15,9	19,7	38,2	38,9	37,5	33,4	36,7	30,0
Ninguna sustancia	4,2	2,8	5,7	14,9	11,0	18,8	24,5	18,2	30,9
Una sola sustancia	19,8	17,3	22,5	44,7	44,1	45,3	43,7	44,5	42,9
Dos sustancias	32,8	30,9	34,7	28,1	29,3	26,9	23,5	26,3	20,7
Tres sustancias	25,6	26,6	24,5	9,1	10,8	7,4	6,7	8,7	4,7
Cuatro o más sustancias	17,5	22,4	12,6	3,2	4,8	1,6	1,5	2,3	0,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.229.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Sólo tabaco	1,2	0,9	1,4	4,4	3,9	5,0	7,7	6,2	9,1
Ninguna sustancia	4,2	2,8	5,7	14,9	11,0	18,8	24,5	18,2	30,9
Una sola sustancia	19,8	17,3	22,5	44,7	44,1	45,3	43,7	44,5	42,9
Dos sustancias	32,8	30,9	34,7	28,1	29,3	26,9	23,5	26,3	20,7
Tres sustancias	25,6	26,6	24,5	9,1	10,8	7,4	6,7	8,7	4,7
Cuatro o más sustancias	17,5	22,4	12,6	3,2	4,8	1,6	1,5	2,3	0,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.230.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Sólo alcohol y/o tabaco	44,9	42,3	47,4	64,0	66,7	61,2	59,7	65,0	54,4
Ninguna sustancia	4,2	2,8	5,7	14,9	11,0	18,8	24,5	18,2	30,9
Una sola sustancia	19,8	17,3	22,5	44,7	44,1	45,3	43,7	44,5	42,9
Dos sustancias	32,8	30,9	34,7	28,1	29,3	26,9	23,5	26,3	20,7
Tres sustancias	25,6	26,6	24,5	9,1	10,8	7,4	6,7	8,7	4,7
Cuatro o más sustancias	17,5	22,4	12,6	3,2	4,8	1,6	1,5	2,3	0,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.231.

Evolución de la prevalencia de consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2019/2020.


	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2015	2017	2019	2015	2017	2019	2015	2017	2019
Ninguna sustancia	4,4	6,0	4,2	14,2	16,5	14,9	24,7	25,2	24,5
Una sola sustancia	19,3	19,8	19,8	44,0	42,3	44,7	42,1	41,0	43,7
Dos sustancias	38,1	33,3	32,8	30,2	28,3	28,1	25,7	24,5	23,5
Tres sustancias	24,4	25,0	25,6	9,0	10,1	9,1	6,4	8,0	6,7
Cuatro o más sustancias	13,9	15,9	17,5	2,5	2,8	3,2	1,1	1,2	1,5

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.232.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años (%). España, 2019/2020.



* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.233.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales*) en la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ninguna sustancia	61,3	52,3	70,4	88,8	84,4	93,3	91,7	88,1	95,3
Una sola sustancia	26,5	29,8	23,3	8,9	12,0	5,9	7,3	10,3	4,4
Dos sustancias	5,8	8,3	3,2	1,3	2,2	0,5	0,7	1,2	0,2
Tres sustancias	2,0	2,8	1,2	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,1
Cuatro o más sustancias	4,3	6,8	1,9	0,4	0,7	0,1	0,1	0,2	0,0

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.234.

Evolución de la prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (ilegales*) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 2015-2019/2020.

	2015	2017	2019
Ninguna sustancia	90,0	88,3	88,8
Una sola sustancia	8,1	9,9	8,9
Dos sustancias	1,2	1,2	1,3
Tres sustancias	0,4	0,4	0,5
Cuatro o más sustancias	0,3	0,3	0,4

* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.235.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que se ha emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020.

	Sí borracheras últimos 12 meses	No borracheras últimos 12 meses
Hipnosedantes sin receta	3,7	0,7
Analgésicos opioides sin receta	1,6	0,4
Cannabis	32,7	5,2
Cocaína polvo y/o base	9,6	0,8
Éxtasis	3,9	0,2
Anfetaminas	2,8	0,2
Alucinógenos	2,4	0,2
Heroína	0,3	0,0

Nota: % de columna.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.236.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años que ha hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020.

	Sí binge drinking últimos 30 días	No binge drinking últimos 30 días
Hipnosedantes sin receta	1,9	0,3
Analgésicos opioides sin receta	0,8	0,1
Cannabis	24,2	5,0
Cocaína polvo y/o base	6,0	0,3
Éxtasis	1,7	0,1
Anfetaminas	1,3	0,1
Alucinógenos	0,8	0,1
Heroína	0,3	0,0

Nota: % de columna.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.237.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha realizado un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) o no en el mismo periodo (%). España, 2019/2020.

	Sí consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4)	No consumo problemático de cannabis (CAST <4)
Hipnosedantes sin receta	14,0	3,0
Analgésicos opioides sin receta	6,7	1,2
Cannabis	100,0	100,0
Cocaína polvo y/o base	36,5	13,6
Éxtasis	20,2	5,0
Anfetaminas	13,1	3,4
Alucinógenos	12,9	3,1
Heroína	3,0	0,0

Nota: % de columna.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.238.

Evolución de la prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 2011-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.239.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nuevas sustancias	1,7	2,5	0,8	1,7	2,4	1,0	2,8	4,0	1,6	2,1	3,4	0,8	1,1	1,5	0,7	0,7	1,0	0,3
Ketamina	0,9	1,4	0,4	0,7	1,1	0,3	1,7	2,2	1,2	1,3	2,1	0,5	0,7	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1
Spice	0,6	0,9	0,3	0,9	1,4	0,4	1,2	1,8	0,5	0,6	1,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4	0,1
Mefedrona	0,2	0,3	0,1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,1	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Ayahuasca	0,2	0,3	0,1	0,3	0,5	0,1	0,3	0,5	0,1	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1
Cocaína rosa	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	0,1	0,8	1,1	0,5	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.240.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* alguna vez en la vida entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en la población de 15 a 64 años (%). España, 2019/2020.

	Población 15-64 años	Nuevas sustancias psicoactivas
Una sola sustancia	19,8	3,0
Dos sustancias	32,8	5,1
Tres sustancias	25,6	7,2
Cuatro o más sustancias	17,5	84,7

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína en polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.241.


Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas, ketamina o spice alguna vez en la vida (%). España, 2019/2020.

	Nuevas sustancias psicoactivas	Ketamina	Spice
Alcohol	99,0	98,3	99,1
Tabaco	89,2	89,4	93,2
Anfetaminas/speed	63,1	81,4	65,2
Alucinógenos	76,1	100,0	78,8
Hipnosedantes con o sin receta	42,6	46,8	38,7
Cannabis	89,4	93,2	95,1
Éxtasis	64,9	81,5	70,9
Cocaína polvo y/o base	74,7	86,8	84,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.242.

Prevalencia de consumo de cuatro o más sustancias psicoactivas* alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se haya consumido en alguna ocasión nuevas sustancias psicoactivas en general, ketamina o spice (%). España, 2019/2020.



* Sustancias psicoactivas: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.243.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (%). España, 2019/2020.

	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales*	Ninguna sustancia legal e ilegal**
Ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida	99,6	93,9	0,0
No ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida	94,8	37,9	4,3


* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

** Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.244.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, setas mágicas, metanfeta- minas, heroína, inhalables volátiles y GHB alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8	4,5	5,5
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6	4,0	4,3
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6	3,6	5,0
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,9	2,0	2,4	3,5
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,6	1,2	1,2
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,5	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.245.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, setas mágicas, metanfeta- minas, heroína, inhalables volátiles y GHB en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,7
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,9
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,2	0,4	0,2	0,4
Metanfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.246.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2019/2020.




* Últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.247.

Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (%). España, 2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.248.

Evolución del porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013-2019/2020.

	2013			2015			2017			2019		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
NUNCA han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas	74,1	70,9	77,3	71,1	68,4	73,9	73,8	70,5	77,1	81,1	77,5	84,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.249.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) (%). España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6	97,0	93,4
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	78,8	79,6	83,5
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	62,1	65,3
Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,6
Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,7
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4	79,8	81,5	85,3
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	66,1	66,3
Consumir 1-2 cañas/copas cada día	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45	49,3	43,5	45,8	49,1	50,2
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6	93,0	92,2
Jugar a juegos con dinero o apuestas con una frecuencia al menos semanal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,4
Más de 3 horas diarias en internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.250.

Riesgo percibido ante el consumo de drogas u otros comportamientos (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2019/2020.



Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes*

93,4

Fumar paquete tabaco diario

92,2

Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más

85,7

Consumir cannabis una vez por semana o más

85,3

Consumir hipnosedantes una vez por semana o más

83,5

Fumar cigarrillos electrónicos

73,9

Jugar a juegos con dinero al menos semanalmente***

72,4

Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes

70,6

Más de 3 horas diarias en internet**

69,4

Consumir cannabis una vez o menos al mes

66,3

Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes

65,3

Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana

50,2

Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas cada día

48,3

* Otras drogas ilegales incluido en 2019.


** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales.

*** O apuestas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.251.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2019/2020.



* Otras drogas ilegales incluido en 2019.

** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales.

*** O apuestas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.252.

Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir muchos o bastantes problemas), según edad. España, 2019/2020.

	15-34 años	35-64 años
Fumar paquete tabaco diario	91,9	92,3
Fumar cigarrillos electrónicos	71,3	75,2
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	48,0	51,3
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas cada día	50,2	47,4
Consumir cannabis una vez o menos al mes	57,6	70,4
Consumir cannabis una vez por semana o más	81,5	87,1
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	66,3	64,7
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	85,0	82,8
Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes	71,7	70,1
Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más	86,5	85,4
Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes*	92,6	93,7
Jugar a juegos con dinero o apuestas al menos semanalmente	73,7	71,8
Más de 3 horas diarias en internet**	62,1	73,0

* Otras drogas ilegales incluido en 2019.

** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.253.

Riesgo percibido ante diversas conductas sobre adicciones (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta puede producir pocos problemas o ninguno). España, 2019/2020.

	Pocos problemas o ninguno
Fumar paquete tabaco diario	7,8
Fumar cigarrillos electrónicos	26,1
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	49,8
Tomarse más de 1 o 2 cañas/copas cada día	51,7
Consumir cannabis una vez o menos al mes	33,7
Consumir cannabis una vez por semana o más	14,7
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	34,7
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	16,5
Consumir analgésicos opioides una vez o menos al mes	29,4
Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más	14,3
Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes*	6,6
Jugar a juegos con dinero o apuestas al menos semanalmente	27,6
Más de 3 horas diarias en internet**	30,6


* Otras drogas ilegales incluido en 2019.

** Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.254.

Evolución de la percepción del riesgo de fumar un paquete de tabaco diario (proporción de personas que piensa que esa conducta puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (%). España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Prevalencia de consumo diario de tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8	34,0	32,3
Riesgo atribuido a fumar un paquete de tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6	93,0	92,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.255.

Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (%). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3	63,3	59,4
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5	30,6	26,7
Cocaína*	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0	42,3	42,1
Cocaína base	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6	27,4	30,3	20,5
Analgésicos opioides sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,4	25,7
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	32,8	28,6



* Hasta 2017, cocaína polvo y/o base; en 2019, cocaína polvo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.256.


Percepción de disponibilidad de distintas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Hombres	Mujeres
Cannabis	64,9	53,6
Éxtasis	30,5	22,7
Cocaína polvo	47,3	36,5
Cocaína base	28,0	21,4
Heroína	22,9	17,9
Hipnosedantes sin receta	30,9	26,3
Analgésicos opioides sin receta	27,9	23,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.257.

Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Disponibilidad percibida	52,1	51,8	59,5	59,2	66,4	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3	63,3	59,4
Riesgo percibido	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	66,1	66,3
Prevalencia de consumo	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.258.

Evolución de la prevalencia de uso de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo* ante su consumo una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2019/2020.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Disponibilidad percibida	52,1	51,8	59,5	59,2	66,4	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3	63,3	59,4
Riesgo percibido	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	66,1	66,3
Prevalencia de consumo	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5	11,0	10,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.259.

Porcentaje de personas de 15-64 años a los que les han ofrecido alguna vez en los últimos 12 meses alguna de las siguientes drogas, ya sea de forma gratuita o para comprar, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Total	Hombres	Mujeres
Cannabis	20,5	26,5	14,5
Cocaína polvo y/o base	10,1	14,0	6,2
Cocaína en polvo	8,1	11,5	4,6
Cocaína base	2,6	3,8	1,4
Alucinógenos	3,8	5,4	2,2
Anfetaminas o speed	3,0	4,1	1,9
Éxtasis	4,4	6,2	2,6
Heroína	1,7	2,4	1,0
Metanfetamina	2,2	3,1	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.260.

Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (%). España, 1997-2019/2020.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	26,0	24,9	20,4
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	37,7	40,0	33,5
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	36,3	35,1	46,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.261.


Importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.

Sexo	Edad	Algo o muy importante
Hombre	15-34 años	80,8
	35-64 años	78,3
Mujer	15-34 años	80,2
	35-64 años	80,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.262.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2019/2020.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.263.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2019/2020.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0	1,1	1,7	2,6
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3	0,8	1,2	2,3
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4	1,6	2,1	4,1
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8	2,6	3,1	5,0
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4	7,3	10,1	12,1
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9	6,1	7,5	11,3
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	45,1	51,2	56,7
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	34,9	38,3	45,3
Personas borrachas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	38,1	45,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.264.


Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive), según sexo (%). España, 2019/2020.

	Hombres	Mujeres
Jeringuillas en el suelo	2,3	2,7
Personas inyectándose drogas	2,3	2,3
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	4,4	3,7
Personas drogadas caídas en el suelo	4,9	4,9
Vendedores que ofrecen drogas	13,0	10,6
Personas esnifando drogas por la nariz	12,7	9,3
Personas fumando porros	57,8	54,3
Personas haciendo botellón	46,2	43,4
Personas borrachas	46,3	44,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.265.

Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (%). España, 1995-2019/2020.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4	90,8	90,0	89,2
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2	80,4	83,1	82,6
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81,0	78,7	80,7	83,6	81,5
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2	83,8	82,3	80,1
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77,0	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6	74,9	79,1	78,5
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3	69,3	69,1	65,7
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9	59,4	59,8	58,1
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1	58,1	57,3	55,2
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1	37,4	33,8	36,5
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6	21,0	18,1	24,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.266.

Valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según sexo (%). España, 2019/2020.

	Hombres	Mujeres
Educación en las escuelas	88,0	90,5
Tratamiento voluntario a consumidores	78,9	81,2
Control policial y aduanero	80,2	84,9
Campañas publicitarias	79,5	83,6
Leyes estrictas contra las drogas	75,3	81,7
Administración médica de metadona	64,2	67,2
Tratamiento obligatorio a consumidores	55,8	60,5
Administración médica de heroína	53,0	57,3
Legalización de cannabis	38,9	33,9
Legalización de todas las drogas	24,8	24,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.267.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad (%). España, 2015-2019/2020.

		2015	2017	2019
Legalización del cannabis	15-24 años	36,1	34,6	36,2
	25-34 años	38,9	34,8	37,0
	35-44 años	39,8	36,0	37,5
	45-54 años	37,0	34,5	36,2
	55-64 años	33,9	28,4	35,1
Legalización de todas las drogas	15-24 años	18,7	17,6	24,6
	25-34 años	20,5	17,3	22,7
	35-44 años	21,7	19,1	25,6
	45-54 años	21,6	19,1	25,8
	55-64 años	21,4	16,9	24,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.268.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según sexo (%). España, 2015-2019/2020.

		2015	2017	2019
Legalización del cannabis	Hombre	40,0	36,5	38,9
	Mujer	34,7	31,1	33,9
Legalización de todas las drogas	Hombre	20,8	18,3	24,8
	Mujer	21,1	17,9	24,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.269.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en el último año (%). España, 2019/2020.

	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
Han consumido cannabis en el último año (CAST \geq 4)*	8,8	20,5	66,8	3,9
Han consumido cannabis en el último año (CAST <4)	14,6	23,0	57,4	5,1
No han consumido cannabis en el último año	38,6	20,2	29,4	11,9

* Consumo problemático: CAST (Cannabis Abuse Screening Test) \geq 4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.270.

Evolución del porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en el último año (%). España, 2019/2020.


	Nada importante	Algo importante	Muy importante	NS/NC
No han consumido alguna droga ilegal en el último año	56,0	11,0	21,2	11,7
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	46,7	16,9	27,7	8,7

*Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.271.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según edad y sexo (%). España, 2019/2020.



		Muy buena / buena	Regular	Mala / muy mala
Hombres	15-19 años	94,4	5,6	0,0
	20-24 años	96,7	3,1	0,2
	25-29 años	94,8	4,9	0,3
	30-34 años	92,8	6,5	0,7
	35-39 años	89,1	10,3	0,6
	40-44 años	85,3	12,3	2,4
	45-49 años	83,6	13,7	2,7
	50-54 años	77,5	19,4	3,1
	55-59 años	73,8	22,8	3,4
	60-64 años	63,5	32,6	3,9
Mujeres	15-19 años	96,4	3,5	0,1
	20-24 años	95,2	4,8	0,0
	25-29 años	93,6	6,2	0,3
	30-34 años	91,3	7,9	0,9
	35-39 años	90,3	8,9	0,7
	40-44 años	88,6	10,1	1,4
	45-49 años	83,0	15,3	1,7
	50-54 años	76,9	20,8	2,3
	55-59 años	73,9	21,0	5,1
	60-64 años	66,2	30,3	3,59

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2020/2021

En 2020/21, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha llevado a cabo la décimocuarta edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El objetivo general de la misma es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Enseñanza Secundaria Obligatoria – ESO -, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional), en todo el territorio nacional, con la finalidad de conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1994) de los aspectos antes expuestos.

Al cierre de este informe los resultados de ESTUDES 2020/2021 no están disponibles, por lo que serán publicados en el próximo Informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2018, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm



Problemas
relacionados con
las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2019

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1999-2019.




Total admisiones		Total admisiones	
1999	51.482	2009	52.549
2000	49.487	2010	53.434
2001	49.376	2011	50.281
2002	46.744	2012	49.678
2003	50.103	2013	51.946
2004	51.936	2014	48.926
2005	50.630	2015	47.308
2006	49.283	2016	45.637
2007	50.555	2017	46.799
2008	53.155	2018	47.972
		2019	50.035

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales y por alcohol. España, 1998-2019.




	Drogas ilegales	Alcohol
1998	54.338	-
2002	46.744	-
2004	52.128	-
2005	50.630	18.950
2006	49.283	19.454
2007	50.555	19.224
2008	53.155	26.318
2009	52.549	27.958
2010	53.434	28.111
2011	50.281	29.014
2012	49.678	28.234
2013	51.946	28.652
2014	48.926	27.658
2015	47.308	27.469
2016	45.637	26.655
2017	46.799	25.753
2018	47.972	25.796
2019	50.035	27.209

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales, total, con tratamiento previo y tratados por primera vez en la vida. España, 1998-2019.




	Nº de admisiones ilegales	Primeras admisiones	Con tratamiento previo
1998	54.338	-	-
2002	46.744	22.064	-
2004	52.128	25.064	-
2005	50.630	24.553	23.714
2006	49.283	22.333	24.814
2007	50.555	23.034	25.392
2008	53.155	22.944	27.769
2009	52.549	24.605	25.098
2010	53.434	26.805	24.611
2011	50.281	24.999	23.232
2012	49.678	25.209	23.024
2013	51.946	28.239	22.577
2014	48.926	23.656	18.786
2015	47.308	23.777	19.519
2016	45.637	22.816	20.124
2017	46.799	23.738	21.353
2018	47.972	24.663	21.382
2019	50.035	27.492	20.689

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2019.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	30.146	2005	3.604	14.005	18.653
1992	20.017	15.956	37.239	2006	3.318	14.502	18.803
1993	18.977	16.703	37.188	2007	3.672	14.331	18.904
1994	18.770	17.526	37.225	2008	3.840	13.616	17.456
1995	17.878	20.369	40.007	2009	3.412	12.750	16.989
1996	16.647	28.382	46.635	2010	4.526	12.166	17.325
1997	12.993	30.173	44.089	2011	2.951	10.391	13.898
1998	11.867	30.756	43.598	2012	2.555	9.302	12.238
1999	10.473	26.031	37.417	2013	2.572	8.940	11.756
2000	8.151	26.412	34.563	2014*	2.356	8.555	10.911
2001	7.461	24.844	32.305	2015	2.202	7.713	10.978
2002	5.051	21.162	26.213	2016	2.353	7.907	10.807
2003	4.337	17.867	23.225	2017	2.259	7.775	10.384
2004	3.836	15.617	20.532	2018	2.223	7.530	10.086
				2019	2.384	7.177	9.904


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2019.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	–	2005	15.258	7.562	23.746
1992	932	367	–	2006	13.463	8.036	22.242
1993	1.146	431	–	2007	13.429	8.753	23.037
1994	1.265	491	–	2008	12.847	10.786	24.680
1995	1.415	516	–	2009	12.142	9.107	23.132
1996	1.892	932	–	2010	12.130	9.095	22.087
1997	3.129	1.402	–	2011	10.637	8.889	20.335
1998	4.174	1.838	–	2012	10.142	8.855	19.497
1999	6.126	2.576	–	2013	10.734	8.726	19.848
2000	5.499	2.773	–	2014*	9.683	8.182	17.864
2001	5.977	3.046	–	2015	8.445	7.248	17.327
2002	7.125	3.893	11.904	2016	9.052	7.678	17.889
2003	11.851	5.893	18.359	2017	10.393	9.025	20.168
2004	14.126	6.747	21.646	2018	10.871	9.226	20.981
				2019	12.491	8.989	22.345


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2019.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	–	2008	5.058	2.055	7.419
1997	1.768	387	–	2009	7.273	1.705	9.503
1998	2.412	407	–	2010	8.639	2.101	11.192
1999	2.335	418	–	2011	9.736	2.603	12.873
2000	2.487	408	–	2012	10.982	3.402	14.869
2001	2.966	540	–	2013	12.912	3.585	16.914
2002	3.972	665	4.772	2014*	12.968	3.510	16.478
2003	4.613	871	5.711	2015	11.185	3.448	15.676
2004	5.319	928	6.500	2016	9.278	3.208	13.304
2005	4.426	844	5.524	2017	9.122	3.314	12.932
2006	4.125	941	5.304	2018	9.485	3.386	13.459
2007	4.619	1.114	5.936	2019	10.378	3.306	14.202


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2019.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	–	2008	463	352	845
1997	144	111	–	2009	598	312	963
1998	197	143	–	2010	580	323	944
1999	165	147	–	2011	709	386	1.143
2000	214	154	–	2012	648	421	1.083
2001	299	170	–	2013	787	374	1.175
2002	350	242	–	2014*	871	321	1.192
2003	382	225	–	2015	742	256	1.068
2004	441	224	693	2016	772	282	1.105
2005	383	209	618	2017	721	269	1.032
2006	466	223	717	2018	744	261	1.050
2007	503	261	795	2019	715	242	992


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2019.




1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anfetaminas																							
319	323	347	339	288	255	342	266	330	386	426	415	400	461	501	595	512	671	635	636	699	608	662	716
Éxtasis																							
226	237	154	135	240	335	452	254	236	229	165	172	155	127	93	102	134	201	133	157	89	68	72	96
Alucinógenos																							
74	85	62	50	64	83	68	63	44	39	37	43	43	69	66	83	107	120	82	77	82	73	76	127

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2019.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2019.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469
2016	13.319	11.323	26.655
2017	13.060	11.556	25.753
2018	13.243	11.224	25.796
2019	14.907	11.215	27.209


* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de diferentes sustancias como droga principal. España, 2014-2019.




	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Metanfetamina	20	38	55	81	93	119
Fentanilo	28	44	70	66	100	103
Catinona	1	5	1	2	5	10
Mefedrona	0	8	0	35	38	74
Spice	2	3	5	1	5	8
Legal high	1	1	0	0	1	0
Tramadol	27	24	28	24	33	37

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2019.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621
2017	5.946	2.691
2018	5.223	2.161
2019	4.877	1.977


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2019.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416
2017	1.150	471
2018	1.039	392
2019	1.034	428


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2019.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7	2003	33,9	20,7
1988	25,4	19,8	2004	35,4	20,8
1989	25,7	19,8	2005	35,6	20,6
1990	26,2	20,0	2006	36,4	20,3
1991	26,4	20,3	2007	36,8	21,0
1992	26,6	20,3	2008	37,5	21,1
1993	27,2	20,3	2009	37,9	20,9
1994	27,8	20,6	2010	38,4	21,4
1995	28,5	20,6	2011	39,3	20,8
1996	29,3	20,6	2012	40,4	20,7
1997	30,0	20,7	2013	40,8	20,9
1998	30,7	20,6	2014	40,9	21,1
1999	31,3	20,8	2015	41,3	21,5
2000	32,0	20,6	2016	41,6	21,1
2001	32,0	20,8	2017	42,6	21,5
2002	33,6	20,9	2018	43,0	21,7
			2019	43,2	22,0

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2019.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6	2005	33,0	22,0
1992	26,0	20,6	2006	33,0	21,5
1993	26,4	20,7	2007	34,1	23,3
1994	27,3	21,0	2008	35,0	22,9
1995	27,9	21,2	2009	34,5	22,8
1996	28,6	21,3	2010	35,0	23,5
1997	29,2	21,4	2011	36,7	22,6
1998	29,9	21,2	2012	38,1	22,4
1999	30,3	21,8	2013	38,2	22,3
2000	30,9	22,1	2014	37,9	23,5
2001	31,4	22,3	2015	38,0	23,8
2002	31,8	22,6	2016	38,2	23,5
2003	31,9	22,3	2017	39,9	24,1
2004	33,0	22,8	2018	40,1	24,6
			2019	40,1	25,3

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2019.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9	2003	29,8	21,3
1988	26,1	21,3	2004	30,0	21,3
1989	26,2	21,2	2005	30,5	21,0
1990	26,5	21,4	2006	31,2	20,8
1991	27,0	21,9	2007	31,7	21,2
1992	27,6	22,1	2008	32,1	21,0
1993	27,9	22,0	2009	32,5	20,7
1994	28,5	22,0	2010	33,3	20,9
1995	29,1	22,5	2011	33,9	20,7
1996	29,3	22,3	2012	34,5	20,7
1997	29,1	22,2	2013	35,0	20,6
1998	29,1	22,1	2014	35,3	20,6
1999	28,6	21,7	2015	36,0	20,7
2000	29,1	21,5	2016	36,0	20,4
2001	29,8	21,6	2017	36,6	20,6
2002	29,8	21,9	2018	36,6	20,7
			2019	36,9	20,9

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2019.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo		Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9	2005	30,0	21,1
1992	27,2	22,3	2006	30,4	20,9
1993	27,6	22,3	2007	30,8	21,5
1994	28,2	22,2	2008	31,2	21,1
1995	28,6	22,6	2009	31,6	20,9
1996	28,8	22,4	2010	32,4	21,2
1997	28,6	22,4	2011	33,0	21,1
1998	28,4	22,2	2012	33,4	21,1
1999	27,8	21,9	2013	33,9	21,0
2000	28,2	21,6	2014	34,1	20,8
2001	29,0	21,8	2015	34,8	21,1
2002	28,8	21,7	2016	34,8	21,1
2003	28,8	21,5	2017	35,4	21,2
2004	29,1	21,4	2018	35,3	21,4
			2019	35,7	21,5

Notas: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada		Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6188	7164	822	2005	2487	544	350
1992	9585	8232	1219	2006	2320	486	303
1993	10493	7129	995	2007	2842	470	327
1994	10873	6435	978	2008	2891	455	285
1995	11161	5033	1028	2009	2719	386	256
1996	10934	4488	696	2010	3589	465	258
1997	8487	3011	887	2011	2211	365	201
1998	7884	2518	910	2012	1870	276	159
1999	7033	1969	968	2013	2047	283	175
2000	5917	1414	532	2014	1670	154	125
2001	5461	1276	471	2015	1831	167	145
2002	3540	894	399	2016	1982	186	146
2003	2805	748	386	2017	1870	209	147
2004	2690	648	358	2018	1892	141	128
				2019	2039	147	150

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración. FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada		Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8	2006	73,8	15,5	9,6
1992	50,0	42,9	6,4	2007	77,4	12,8	8,9
1993	56,1	38,1	5,3	2008	78,5	12,4	7,7
1994	59,2	35,0	5,3	2009	79,7	11,3	7,5
1995	64,5	29,1	5,9	2010	82,0	10,6	5,9
1996	67,0	27,5	4,3	2011	77,7	12,8	7,1
1997	67,2	23,8	7,0	2012	78,3	11,6	6,7
1998	68,3	21,8	7,9	2013	79,6	11,0	6,8
1999	69,3	19,4	9,5	2014	80,6	7,4	6,0
2000	74,1	17,7	6,7	2015	83,7	7,6	6,6
2001	74,9	17,5	6,5	2016	84,7	7,9	6,2
2002	71,8	18,1	8,1	2016	84,7	7,9	6,2
2003	69,3	18,5	9,5	2017	83,0	9,3	6,5
2004	68,0	16,4	9,0	2018	85,8	6,4	5,8
				2019	86,1	6,2	6,3

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.
 FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.20.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (general) , según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada		Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109	2005	12298	1755	793
1992	547	196	121	2006	11155	1617	103
1993	611	278	108	2007	11393	1295	130
1994	714	238	97	2008	10391	1276	117
1995	739	287	74	2009	10272	1139	136
1996	1307	413	82	2010	9952	1203	166
1997	2172	741	100	2011	8787	1205	97
1998	3073	856	128	2012	8346	781	95
1999	4777	1048	128	2013	8995	1320	129
2000	4067	1172	105	2014	6798	986	56
2001	4413	1284	91	2015	7005	1078	30
2002	5613	1403	156	2016	7564	1107	33
2003	9228	1242	485	2017	8730	1304	36
2004	11140	1837	693	2018	9030	1435	41
				2019	10464	1482	35

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2019.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada		Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2	2005	80,6	11,5	5,2
1992	62,7	22,5	13,9	2006	86,0	12,5	0,8
1993	60,8	27,7	10,7	2007	88,0	10,0	1,0
1994	67,4	22,5	9,2	2008	86,9	10,7	1,0
1995	66,5	25,8	6,7	2009	87,7	9,7	1,2
1996	71,7	22,6	4,5	2010	86,8	10,5	1,4
1997	71,0	24,2	3,3	2011	85,5	11,7	0,9
1998	74,8	20,8	3,3	2012	88,3	8,3	1,0
1999	79,5	17,4	2,1	2013	83,8	12,3	1,2
2000	75,2	21,7	1,9	2014	82,6	12,0	0,7
2001	75,2	21,9	1,6	2015	83,5	12,9	0,4
2002	77,0	19,2	2,1	2016	83,9	12,3	0,4
2003	83,0	11,2	4,4	2017	84,3	12,6	0,3
2004	80,9	13,3	4,8	2018	83,6	13,3	0,4
				2019	84,2	11,9	0,3

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.22.

Proporción de tratados por primera vez por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era parenteral, según CCAA. España, 1991-2019.



2.1.23.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2019.



	Opioides	Cocaína	Estimulantes sin cocaína	Cannabis	Hipnosedantes
2005	5,7	57,4	5,9	42,7	8,9
2006	6,1	58,7	5,2	44,1	9,0
2007	6,4	58,0	4,6	43,3	8,5
2008	6,1	66,1	4,3	49,1	10,6
2009	5,9	61,5	3,9	50,9	9,8
2010	6,6	63,4	4,3	52,0	9,9
2011	6,5	63,7	4,9	51,6	9,3
2012	7,1	62,1	4,6	52,9	10,1
2013	6,7	60,8	4,8	53,5	9,1
2014	4,5	56,7	2,8	48,3	8,1
2015	5,3	60,3	4,4	51,4	8,2
2016	4,4	62,3	4,1	51,1	7,3
2017	4,5	64	4	49,5	8
2018	4,1	64,5	3,9	50	6,3
2019	3,8	65,5	4,6	48,8	6,2

EL 72,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 27,4% restante (n = 7.467).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.


Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2013-2019.

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Sólo alcohol	21.264	74,2	21.264	76,9	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2	19.211	74,5	19.742	72,6
Alcohol y otras drogas	7.388	25,8	6.394	23,1	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8	6.585	25,5	7.467	27,4
Una droga más	5.134	17,9	4.725	17,1	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2	4.870	18,9	5.597	20,6
Dos drogas más	1.781	6,2	1.379	5,0	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4	1.452	5,6	1.569	5,8
Tres o más drogas	473	1,7	290	1,0	275	1,0	260	0,9	294	1,1	263	1,0	301	1,1

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2019.




Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total		
1996	35,9	43,4	37,1	2008	26,7	33,3	27,6
1997	32,4	41,0	33,7	2009	26,0	32,2	26,9
1998	32,4	39,7	33,6	2010	29,8	31,7	30,2
1999	31,9	40,2	33,0	2011	28,5	30,0	28,7
2000	32,7	37,9	33,5	2012	28,2	30,0	28,4
2001	32,7	40,2	33,7	2013	24,2	26,1	24,4
2002	30,9	38,9	32,0	2014	26,3	24,4	26,0
2003	31,5	39,3	32,6	2015	33,4	35,4	33,7
2004	27,7	38,3	29,3	2016	33,9	39,0	34,6
2005	31,5	39,5	32,7	2017	31,3	37,6	32,0
2006	32,7	37,4	33,4	2018	28,7	40,4	30,1
2007	30,0	36,2	30,9	2019	29,3	36,3	30,1

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017, 24,6% en 2018 y 28,7% en 2019.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Prevalencia (%) de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2019.



	<25 años	25-34 años	>34 años		<25 años	25-34 años	>34 años
1996	20,3	39,3	48,9	2008	3,2	16,9	35,6
1997	17,5	34	46,4	2009	2,2	15,2	34,7
1998	15,1	33,4	45,8	2010	8,1	14,8	38
1999	15,2	32	44	2011	9,9	14,5	35,6
2000	13,1	30,5	45,5	2012	8,6	11,7	35,4
2001	14	29,1	44,4	2013	4,7	8,9	30,4
2002	12,1	26,7	42,8	2014	5,9	12,0	31,2
2003	9,2	25,5	43,8	2015	11,5	12,1	38,4
2004	7,1	20,9	39,4	2016	3,1	16,0	39,3
2005	9,7	23,1	41,9	2017	4,2	19,7	35,1
2006	7,2	21,4	42,2	2018	0,0	19,7	31,3
2007	3,2	18,7	40,3	2019	7,3	18,4	33,3

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015, 30% en 2016, 26,4% en 2017, 24,6% en 2018 y 28,7% en 2019.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2019.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	22.345	28,9
Cocaína polvo	19.627	25,4
Cocaína base	2.710	3,5
Opioides	11.170	14,5
Heroína	9.904	12,8
Metadona (mal uso)	461	0,6
Otros opioides	805	1,0
Cannabis	14.202	18,4
Hipnosedantes	992	1,3
Estimulantes distintos de la cocaína	1.086	1,4
Anfetaminas/metanfetamina	839	1,1
Éxtasis y derivados	96	0,1
Otros estimulantes	151	0,2
Alucinógenos	127	0,2
Inhalantes volátiles	35	0,0
Otras drogas ilegales	78	0,1
Alcohol	27.209	35,2
Total drogas ilegales	50.035	-
Total drogas ilegales y alcohol	77.244	-

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y proporción de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, por sexo (%). España, 2019.


	Hombres		Mujeres	
	Número de admisiones	% respecto al total	Número de admisiones	% respecto al total
	a tratamiento	de admisiones	a tratamiento	de admisiones
Cocaína	19.040	30,7	3.289	21,8
Cocaína polvo	16.777	27,0	2.837	18,8
Cocaína base	2.256	3,6	451	3,0
Opioides	9.457	15,2	1.705	11,3
Heroína	8.513	13,7	1.383	9,2
Metadona (mal uso)	371	0,6	90	0,6
Otros opioides	573	0,9	232	1,5
Cannabis	11.294	18,2	2.894	19,2
Hipnosedantes	585	0,9	407	2,7
Estimulantes distintos de la cocaína	880	1,4	205	1,4
Anfetaminas/metanfetamina	668	1,1	171	1,1
Éxtasis y derivados	75	0,1	21	0,1
Otros estimulantes	137	0,2	13	0,1
Alucinógenos	116	0,2	11	0,1
Inhalantes volátiles	33	0,1	2	0,0
Otras drogas ilegales	56	0,1	22	0,1
Alcohol	20.620	33,2	6.572	43,5
Total drogas ilegales	41.461	–	8.535	–
Total drogas ilegales y alcohol	62.081	–	15.107	–

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2019.



* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2019.




* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede o no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol, en función del sexo (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2019.



	Todas las admisiones		Admitidos primera vez en la vida		Admitidos menores 18 años*		Nacidos fuera de España	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Opioides	22,8	20,0	11,3	10,6	0,5	0,4	23,3	21,4
Cocaína	45,9	38,5	47,1	38,4	2,5	2,0	35,8	38,5
Cannabis	27,2	33,9	36,7	42,0	94,9	96,1	34,2	33,7
Otros estimulantes	2,1	2,4	2,5	2,4	0,5	0,9	3,7	3,2
Hipnosedantes	1,4	4,8	1,8	6,1	0,6	0,4	2,0	2,8
Otras sustancias	0,6	0,3	0,6	0,5	1,0	0,2	1,0	0,4
Número de admisiones	41.461	8.535	22.251	5.221	2.517	694	4.886	971


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable sexo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Número de casos y tasas (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según comunidad/ciudad autónoma. España, 2019.



2.1.33.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2019.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	50.035	20.689	27.492	41.461	8.535
Tratamiento previo (%)					
Sí	42,9			44,2	36,7
No	57,1			55,8	63,3
Edad media (años)	35,6	39,3	32,8	35,6	35,3
Sexo (%)					
Hombre	82,9	85,4	81,0		
Mujer	17,1	14,6	19,0		
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8
Primaria	53,9	56,4	52,3	55,0	48,3
Secundaria	40,3	38,4	41,5	39,7	43,7
Estudios superiores	4,9	4,3	5,4	4,5	7,2
Situación laboral (%)					
Trabajando	36,8	33,6	39,1	38,5	28,9
Parado no habiendo trabajado antes	6,1	5,7	6,4	5,9	7,0
Parado habiendo trabajado antes	38,2	44,2	34,0	37,6	41,0
Otras	18,9	16,5	20,5	18,0	23,1

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	5,1	9,5	1,9	5,0	5,7
Médico general, Atención Primaria de Salud	13,1	8,8	16,2	13,0	13,7
Hospitales u otros servicios de salud	8,4	6,5	9,5	7,5	12,6
Servicios Sociales	3,4	2,2	4,3	2,4	8,1
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	6,0	8,3	4,0	6,7	2,7
Servicios legales o policiales	6,3	5,1	7,2	6,6	4,6
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares y amigos	12,3	7,2	16,4	12,7	10,4
Iniciativa propia	43,6	50,9	38,3	44,3	39,8
Servicios de educación	0,5	0,2	0,7	0,4	0,7
Otra	1,3	1,1	1,5	1,3	1,7
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	15,1	18,0	12,8	15,4	13,5
Únicamente con pareja	12,1	12,3	12,0	11,2	16,4
Únicamente con hijos/as	2,3	2,3	2,3	1,1	8,1
Con la pareja e hijos/as	17,3	16,1	18,4	17,7	15,5
Con padres o familia de origen	40,2	35,3	44,0	41,2	35,1
Con amigos/as	3,4	3,9	3,0	3,2	4,3
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	5,6	7,2	4,0	6,2	2,4
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,8	3,3	2,4	2,7	3,2
Otros. Especificar	1,2	1,6	1,0	1,1	1,7
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	87,2	83,0	90,8	86,6	90,3
Prisión, centro de reforma o de internamiento para menores	6,0	7,9	4,3	6,7	2,6
Otras instituciones	2,4	2,9	2,0	2,3	2,8
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,6	0,3	0,5	0,3
Alojamiento inestable/precario	3,0	4,3	1,9	3,0	3,0
Otros lugares	0,9	1,1	0,7	0,9	1,1
Español o extranjero (%)					
Español	88,1	90,6	86,4	88,0	88,4
Extranjero	11,9	9,4	13,6	12,0	11,6
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	22,3	37,3	11,2	22,8	20,0
Heroína	19,8	34,7	8,7	20,5	16,2
Metadona	0,9	1,0	0,8	0,9	1,1
Otros opioides	1,6	1,6	1,7	1,4	2,7
Cocaína	44,7	43,4	45,4	45,9	38,5
CLH Cocaína	39,3	37,3	40,6	40,5	33,2
Cocaína base	5,4	6,1	4,8	5,4	5,3
Cocaína otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Estimulantes distintos de cocaína	2,2	1,8	2,5	2,1	2,4
Anfetaminas	1,4	1,3	1,5	1,3	1,9
Metanfetaminas	0,2	0,1	0,3	0,3	0,1
MDMA y derivados	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Otros estimulantes	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
Hipnosedantes	2,0	1,2	2,6	1,4	4,8
Alucinógenos	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cannabis	28,4	16	37,7	27,2	33,9
Alcohol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras sustancias	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	20,1	19,8	20,3	19,7	21,8
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	47,3	44,5	49,3	46,6	50,2
4-6 días/semana	8,4	7,2	9,2	8,7	6,8
2-3 días/semana	14,8	12,7	16,4	15,3	12,9
1 día/semana	5,5	5,2	5,7	5,6	5,0
Menos de 1 día/semana	6,7	7	6,5	6,8	6,5
No consumió	17,3	23,3	12,9	17	18,6
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,0	4,4	7,1	5,2	9,7
Pulmonar	50,7	51,0	50,6	50,1	53,5
Intranasal	39,8	38,6	40,6	41,0	33,9
Parenteral	2,8	5,1	1,0	3,0	1,9
Otras	0,8	0,9	0,7	0,7	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	11,3	20,5	4,2	11,9	8,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	4,6	8,1	1,7	4,8	3,3
Prevalencia VIH mínima (%)	3,2	5,4	1,6	3,2	3,3
Prevalencia VIH máxima (%)	8,2	10,1	5,4	8,2	8,0
Prevalencia Hepatitis C mínima (%)	5,5	10,7	1,7	5,7	4,8
Prevalencia Hepatitis C máxima (%)	14,5	20,7	5,9	15,1	12,0
Prevalencia Hepatitis B mínima (%)	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3
Prevalencia Hepatitis B máxima (%)	2,1	2,6	1,6	2,2	1,5

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido).

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, mas no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.34.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2019.

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Total	27.209	20.620	6.572	11.215	14.907 (%)
Tratamiento previo (%)					
Sí	42,9	43,3	41,8	100,0	0,0
No	57,1	56,7	58,2	0,0	100,0
Edad media (años)	46,6	46,5	47,2	47,9	45,8
Sexo (%)					
Hombre	75,8	100,0	0,0	76,6	75,4
Mujer	24,2	0,0	100,0	23,4	24,6
Máximo nivel de estudios (%)					
Sin estudios	0,8	0,9	0,4	0,8	0,8
Primaria	45,3	48,2	36,1	47,0	44,3
Secundaria	43,7	42,5	47,2	43,2	43,7
Estudios superiores	10,3	8,4	16,3	9,1	11,1
Situación laboral (%)					
Trabajando	44,7	46,6	38,8	39,8	48,3
Parado no habiendo trabajado antes	2,6	2,4	3,5	2,6	2,7
Parado habiendo trabajado antes	33,3	32,2	36,9	36,4	30,7
Otras	19,3	18,9	20,8	21,2	18,2
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	2,9	2,8	3,3	4,7	1,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	27,8	28,0	27,0	21,8	32,3
Hospitales u otros servicios de salud	14,9	14,0	17,8	13,3	16,1
Servicios Sociales	4,8	4,1	7,0	4,5	5,0
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	1,7	2,1	,3	1,8	1,5
Servicios legales o policiales	2,1	2,5	1,0	1,9	2,3
Empresas o empleador	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4
Familiares y amigos	10,7	11,0	9,9	9,1	12,3
Iniciativa propia	32,9	33,3	31,8	40,8	26,6
Servicios de educación	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Otra	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	21,5	21,8	20,4	23,3	20,1
Únicamente con pareja	16,9	16,3	18,9	16,1	17,6
Únicamente con hijos/as	5,2	2,3	14,1	4,9	5,3
Con la pareja e hijos/as	24,7	25,3	22,7	22,4	26,5
Con padres o familia de origen	23,0	24,9	17,2	23,1	22,9
Con amigos/as	3,2	3,2	3,1	3,4	3,0
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	1,9	2,3	,5	2,1	1,7
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,5	2,8	1,8	3,4	1,9
Otros	1,2	1,1	1,3	1,3	1,0
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	92,0	90,9	95,5	90,1	93,7
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	1,8	2,3	,3	2,1	1,6
Otras instituciones	2,1	2,2	1,7	2,8	1,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4
Alojamiento inestable/precario	2,6	3,0	1,4	3,2	2,1
Otros lugares	1,0	1,0	0,8	1,3	0,7
Español o extranjero (%)					
Extranjero	14,6	13,7	17,7	11,2	17,3
Español	85,4	86,3	82,3	88,8	82,7
Otras sustancias consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	3,8	4,4	3,0	4,0	3,0
Cocaína	65,5	66,0	64,3	67,0	58,4
Estimulantes sin cocaína	4,6	4,2	4,6	4,5	5,0
Hipnosedantes	6,2	7,3	5,3	4,9	12,0
Alucinógenos	0,5	0,3	0,5	0,5	0,3
Sustancias volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2
Cannabis	48,8	46,2	50,7	49,8	44,5
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,3	0,3	0,3	0,8

	Total	Sexo*		Tratamiento previo*	
		Hombres	Mujeres	Sí	No
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	18,3	17,8	18,6	17,4	20,9
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	57,2	55,5	58,6	58,0	54,6
4-6 días a la semana	6,7	5,8	7,4	6,3	8,1
2-3 días a la semana	12,1	10,7	13,1	11,8	12,9
1 día a la semana	4,2	3,8	4,6	4,1	4,7
Menos de 1 día a la semana	5,0	5,7	4,5	4,9	5,3
No consumió	14,7	18,6	11,8	14,8	14,4
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	99,4	99,5	99,3	99,4	99,5
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3
Intranasal o esnifada	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Inyectada o parenteral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inyección alguna vez en la vida (%)					
Sí	2,7	3,7	2,0	3,0	1,7
Inyección últimos 12 meses (%)					
Sí	0,3%	0,4	0,2	0,4	0,1
Inyección últimos 30 días (%)					
Sí	0,2%	0,3	0,2	0,3	0,1
Prevalencia de VIH mínima (%)					
Positivo	1,0	1,1	0,9	1,0	0,8
Prevalencia de Hepatitis C mínima (%)					
Positivo	2,0	2,6	1,5	2,1	1,8
Prevalencia de Hepatitis B mínima (%)					
Portador crónico (HBs Ag positivo)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Inmune: vacunado (AC Anti HbS) o hepatitis B pasada (AC Anti HbC).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.35.

Características sociodemográficas y de consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2019.

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona
Total	27.209	19.627	14.202	9.904	2.710	992	1.086	805	461
Tratamiento previo (%)									
Sí	42,9	40,9	24,2	75,1	48,7	25,3	35,6	41,7	48,7
No	57,1	59,1	75,8	24,9	51,3	74,7	64,4	58,3	51,3
Sexo (%)									
Hombre	75,8	85,5	79,6	86,0	83,3	59,0	81,1	71,2	80,5
Mujer	24,2	14,5	20,4	14,0	16,7	41,0	18,9	28,8	19,5
Edad media (años)	46,6	36,7	26,9	43,2	37,9	42,5	35,5	45,5	46,0
Máximo nivel de estudios (%)									
Sin estudios	0,8	0,6	0,6	1,4	1,1	1,6	0,2	1,6	2,6
Primaria	45,3	48,4	54,0	65,4	59,8	50,0	35,6	52,1	68,4
Secundaria	43,7	45,0	41,3	30,4	36,1	37,6	49,6	37,6	26,9
Estudios superiores	10,3	6,0	4,1	2,7	2,9	10,8	14,6	8,7	2,1
Situación laboral (%)									
Trabajando	44,7	52,5	27,0	23,1	28,7	26,1	44,1	24,9	25,9
Parado no habiendo trabajado antes	2,6	3,1	8,9	7,7	6,8	9,5	4,1	3,4	9,8
Parado habiendo trabajado antes	33,3	35,9	29,7	51,6	51,0	39,0	41,3	37,4	43,1
Otras	19,3	8,6	34,3	17,6	13,6	25,5	10,4	34,2	21,2
Español o extranjero (%)									
Español	85,4	90,8	85,7	87,6	87,1	87,4	80,2	87,5	91,0
Extranjero	14,6	9,2	14,3	12,4	12,9	12,6	19,8	12,5	9,0
Fuente de referencia principal (%)									
Otros servicios de tto. de drogodependencias	2,9	3,5	1,9	12,0	4,8	2,9	6,1	13,3	18,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	27,8	15,5	14,7	5,0	10,4	23,2	14,6	22,9	3,3
Hospitales u otros servicios de salud	14,9	7,4	11,8	3,0	6,1	22,5	15,7	18,1	4,0
Servicios Sociales	4,8	2,0	6,8	1,6	2,9	3,0	3,0	0,8	0,9
Prisión, centro de reforma o internamiento menores	1,7	3,8	5,5	11,0	7,9	5,9	2,9	5,3	8,2
Servicios legales o policiales	2,1	4,4	11,8	2,7	7,8	2,2	6,6	1,1	1,1
Empresas o empleador	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Familiares y amigos	10,7	14,7	15,2	5,6	9,8	7,5	10,9	3,8	4,0
Iniciativa propia	32,9	47,7	28,6	57,6	48,4	31,2	38,0	33,4	58,4
Servicios de educación	0,2	0,1	1,4	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2
Otra	1,7	0,7	2,1	1,3	1,7	1,4	2,0	1,3	1,3
Nº de hijos	1,3	1,0	0,5	1,1	1,1	1,2	0,5	1,1	1,1

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Solo/a	21,5	13,8	10,1	22,2	18,6	21,4	20,7	19,2	21,9
Únicamente con pareja	16,9	13,8	8,2	12,8	11,3	15,2	14,2	20,5	18,8
Únicamente con hijos/as	5,2	2,6	1,6	2,3	1,8	5,8	2,6	3,1	4,5
Con la pareja e hijos/as	24,7	25,4	10,3	12,8	15,1	19,1	8,2	21,0	15,2
Con padres o familia de origen	23,0	35,4	56,9	30,3	35,0	26,0	37,2	23,1	27,1
Con amigos/as	3,2	2,7	2,9	4,5	4,4	3,8	8,8	3,2	4,3
Detenido (ej. centro penitenciario, centro de inserción social)	1,9	4,0	3,9	10,5	9,7	5,5	2,3	4,9	5,0
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,5	1,2	4,5	3,4	3,1	1,8	3,2	3,7	2,1
Otros	1,2	,9	1,6	1,2	1,1	1,3	2,9	1,3	1,2
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Casas, pisos, apartamentos	92,0	92,3	89,4	75,7	80,0	87,8	88,9	87,9	85,3
Prisión, centro reforma o internamiento menores	1,8	4,3	4,2	11,2	10,5	5,0	3,7	4,8	5,8
Otras instituciones	2,1	1,2	3,8	2,8	1,8	1,3	2,8	3,5	2,7
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,3	0,3	0,9	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4
Alojamiento inestable/precario	2,6	1,3	1,5	7,8	5,4	4,0	3,2	2,4	3,8
Otros lugares	1,0	0,5	0,9	1,5	1,6	1,3	0,7	0,9	2,0
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)									
Opioides	3,8	2,5	2,6	9,6	21,4	6,8	2,2	7,3	23,4
Cocaína	65,5	0,7	40,2	47,0	4,3	34,9	26,6	38,9	23,4
Estimulantes sin cocaína	4,6	4,7	10,9	1,2	2,6	5,9	11,1	2,0	0,4
Hipnosedantes	6,2	4,0	5,5	11,2	13,5	0,0	9,4	16,8	13,4
Alucinógenos	0,5	1,1	1,8	0,3	1,3	1,4	4,3	0,0	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,0	0,4	0,0	0,1	1,1	1,0	0,0	0,0
Cannabis	48,8	50,3	0,0	51,3	61,5	58,6	52,3	46,2	55,8
Alcohol	0,0	71,1	70,3	33,8	50,7	41,6	44,8	28,7	41,1
Otras sustancias psicoactivas	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	2,1	0,3	0,0
Edad de inicio droga principal (años)	18,3	20,8	15,7	22,0	21,3	29,3	23,6	31,5	29,4
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)									
Todos los días	57,2	24,9	68,2	57,9	42,3	87,2	25,8	70,3	88,6
4-6 días a la semana	6,7	12,5	5,3	4,8	11,2	2,5	10,2	1,7	0,7
2-3 días a la semana	12,1	25,0	7,8	6,5	16,0	2,6	20,3	3,4	0,7
1 día a la semana	4,2	9,7	2,2	2,3	6,1	1,1	10,1	1,4	0,7
Menos de 1 día a la semana	5,0	10,7	3,6	3,2	7,4	0,9	14,7	1,9	2,0
No consumió	14,7	17,1	12,8	25,3	16,9	5,7	19,0	21,3	7,4

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)									
Oral	99,4	3,0	1,8	0,8	0,3	98,4	21,7	46,3	88,1
Pulmonar o fumada	0,3	2,2	97,5	80,5	95,9	0,7	15,1	29,3	9,7
Intranasal o esnifada	0,2	93,3	0,5	6,4	3,1	0,7	57,0	6,8	0,2
Inyectada o parenteral	0,0	0,7	0,0	11,3	0,1	0,2	6,0	9,5	2,0
Otras	0,0	0,8	0,2	1,0	0,6	0,0	0,3	8,1	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	2,7	2,5	1,9	39,7	11,0	6,2	13,5	28,0	40,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,3	1,1	0,3	17,1	2,5	0,3	11,5	12,7	5,6
Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%)	0,2	0,9	0,2	14,8	1,1	0,2	9,5	11,4	4,1
Prevalencia mínima VIH (%)	1,0	1,3	0,9	8,8	2,8	2,5	12,8	6,2	12,6
Prevalencia máxima de VIH (%)	2,6	3,5	3,3	15,7	5,8	6,8	25,0	13,3	26,7
Prevalencia mínima Hepatitis C (%)	2,0	1,4	1,1	19,5	4,5	2,6	7,1	11,8	16,1
Prevalencia máxima Hepatitis C (%)	5,5	3,8	4,3	35,8	10,0	7,4	15,3	25,6	34,6
Prevalencia mínima Hepatitis B (%)	0,4	0,2	0,2	1,1	0,4	0,5	1,0	0,2	2,0
Prevalencia máxima Hepatitis B (%)	1,7	1,2	1,3	4,0	1,8	2,1	3,8	1,1	7,7

* Estimulantes sin cocaína.

Notas:

- Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos). En Hepatitis B, portador crónico entre el total (incluye portador crónico, inmune, no inmune, pendiente de resultado y desconocidos).
- Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en Hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.
- El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.36.

Características sociodemográficas y de consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento, por sexo. España, 2019.

	Alcohol		CLH Cocaína		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Total	20.620	6.572	16.777	2.837	11.294	2.894	8.513	1.383	2.256	451	585	407	880	205
Tratamiento previo (%)														
Sí	43,3	41,8	41,8	35,5	24,9	21,2	75,2	74,1	49,3	45,7	29,9	18,7	35,4	36,9
No	56,7	58,2	58,2	64,5	75,1	78,8	24,8	25,9	50,7	54,3	70,1	81,3	64,6	63,1
Edad media (años)	46,5	47,2	36,6	37,6	27,0	26,8	43,5	41,4	37,9	38,1	39,1	47,4	35,6	35,1
Máximo nivel de estudios (%)														
Sin estudios	0,9	0,4	0,6	0,7	0,7	0,4	1,4	1,4	1,2	0,9	1,1	2,3	0,2	0,0
Primaria	48,2	36,1	49,5	42,4	55,1	49,6	66,6	58,1	60,9	54,6	51,9	47,3	36,0	34,2
Secundaria	42,5	47,2	44,4	48,2	40,7	43,8	29,6	35,7	35,0	41,8	37,7	37,5	48,3	55,4
Estudios superiores	8,4	16,3	5,6	8,7	3,5	6,2	2,4	4,8	2,9	2,7	9,3	12,9	15,5	10,4

	Alcohol		CLH Cocaína		Cannabis		Heroína		Cocaína base		Hipnosedantes		Estimulantes*	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Situación laboral (%)														
Trabajando	46,6	38,8	54,6	39,8	27,3	25,9	24,0	17,8	30,7	18,5	27,1	24,6	45,8	36,7
Parado no habiendo trabajado antes	2,4	3,5	2,9	4,2	9,1	7,9	7,2	10,1	5,9	11,0	11,8	6,1	3,8	5,5
Parado habiendo trabajado antes	32,2	36,9	34,7	42,9	29,4	31,1	51,1	54,9	50,0	55,9	39,4	38,4	40,1	46,7
Otras	18,9	20,8	7,8	13,1	34,1	35,1	17,7	17,2	13,4	14,6	21,7	30,9	10,3	11,1
Español o extranjero (%)														
Español	86,3	82,3	91,2	88,2	85,0	88,5	87,5	87,6	86,6	89,8	83,3	93,3	79,2	84,7
Extranjero	13,7	17,7	8,8	11,8	15,0	11,5	12,5	12,4	13,4	10,2	16,7	6,7	20,8	15,3
Fuente de referencia principal (%)														
Otros servicios tto. drogodep.	2,8	3,3	3,3	4,2	1,9	2,2	11,4	15,3	4,5	6,5	3,6	1,7	6,0	6,4
Médico general, At. Primaria	28,0	27,0	15,6	15,2	14,8	14,5	5,0	4,9	10,2	11,2	23,3	23,1	14,6	14,7
Hospitales/otros servicios salud	14,0	17,8	6,8	10,8	10,9	15,3	2,9	4,1	5,7	7,8	19,0	27,6	15,7	15,7
Servicios Sociales	4,1	7,0	1,1	7,4	5,3	12,6	1,3	3,8	2,1	6,5	2,2	4,0	2,2	6,9
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	2,1	0,3	4,2	1,8	6,3	2,4	11,8	5,6	8,6	4,5	9,0	1,5	3,1	2,0
Servicios legales o policiales	2,5	1,0	4,6	3,2	12,7	8,2	2,8	1,8	8,3	5,4	3,3	0,7	7,2	3,9
Empresas o empleador	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0
Familiares y amigos	11,0	9,9	15,3	11,0	15,7	13,3	5,5	6,7	10,2	7,8	7,4	7,7	11,5	8,3
Iniciativa propia	33,3	31,8	48,2	44,7	29,0	27,2	57,9	56,1	48,4	48,9	30,3	32,3	37,2	41,2
Servicios de educación	0,2	0,1	0,1	0,1	1,3	1,7	0,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Otra	1,7	1,7	0,6	1,3	2,0	2,5	1,2	1,5	1,7	1,3	1,6	1,2	2,3	1,0
Nº de hijos														
	1,2	1,4	0,9	1,3	0,4	0,6	1,0	1,5	1,0	1,4	0,9	1,6	0,4	0,8
Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)														
Solo/a	21,8	20,4	13,8	13,8	10,2	9,6	23,1	16,9	18,5	19,1	23,2	18,6	21,5	17,2
Únicamente con pareja	16,3	18,9	13,6	15,5	7,4	11,8	11,0	24,1	10,1	17,0	11,4	20,7	14,1	14,7
Únicamente con hijos/as	2,3	14,1	1,3	10,5	0,7	5,3	1,4	7,9	0,9	6,2	1,6	12,1	1,2	8,8
Con la pareja e hijos/as	25,3	22,7	26,0	21,9	10,2	10,6	13,0	11,3	16,0	10,3	15,4	24,7	7,6	10,8
Con padres o familia de origen	24,9	17,2	36,4	29,2	58,3	51,5	31,5	22,6	36,3	28,5	32,0	17,3	38,0	33,8
Con amigos/as	3,2	3,1	2,5	4,2	2,8	3,5	4,3	5,8	3,9	6,9	5,0	2,1	9,1	6,9
Detenido (ej. centro penitenciario o inserción social)	2,3	0,5	4,4	1,5	4,5	1,7	11,4	5,2	10,5	5,7	7,1	3,1	2,6	1,0
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,8	1,8	1,1	2,0	4,5	4,2	3,3	4,2	2,9	3,9	2,5	0,8	3,3	2,5
Otros	1,1	1,3	0,8	1,3	1,5	1,9	1,1	2,0	0,9	2,3	1,8	0,5	2,5	4,4

2.1.37.

Edad media de inicio en el tratamiento actual, edad del primer uso y latencia primer uso hasta el tratamiento actual. España, 2019.

	Edad media de entrada a tratamiento	Edad media de primer uso	Latencia (inicio-entrada a tratamiento)
Opioides (total)	43,5	23,0	24,3
Heroína	43,2	22,0	24,9
Metadona	46,0	29,4	23,2
Buprenorfina	44,4	34,9	12,8
Fentanilo	50,6	44,5	8,0
Otros opioides	44,7	29,4	18,8
Cocaína (total)	36,9	20,9	17,5
Cocaína polvo	36,8	20,8	17,3
Cocaína base	37,9	21,3	19,1
Estimulantes distintos de cocaína	35,5	23,6	13,0
Anfetaminas	35,6	21,4	15,2
Metanfetamina	38,0	31,2	7,5
Éxtasis y derivados	30,5	22,7	10,8
Catinonas sintéticas	36,7	32,7	3,9
Otros estimulantes	36,1	23,1	14,7
Hipnosedantes	42,5	29,3	15,0
Alucinógenos	29,2	21,2	13,5
Inhalantes volátiles	23,8	18,2	9,6
Cannabis	27,0	15,7	12,6
Total	35,6	20,1	17,5

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.38.

Número de casos admitidos a tratamiento por grupos de edad en función de la droga principal. España, 2019.

	<15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	≥65	Desc.	Total
Opioides	3	37	204	587	1.141	1.718	2.123	2.391	1.777	821	271	93	4	11.170
Heroína	2	32	174	546	1.032	1.553	1.906	2.147	1.556	690	213	49	4	9.904
Metadona	0	1	4	6	38	59	83	108	89	53	16	4	0	461
Buprenorfina	0	0	2	0	2	4	6	0	4	3	1	1	0	23
Fentanilo	0	0	1	3	4	10	14	14	19	14	13	11	0	103
Otros opioides	1	4	23	32	65	92	114	122	109	61	28	28	0	679
Cocaína (total)	0	285	1.309	3.001	4.668	5.043	3.895	2.269	1.158	502	153	41	21	22.345
Cocaína CLH	0	249	1.144	2.655	4.163	4.500	3.456	1.902	972	409	128	32	17	19.627
Cocaína base	0	36	165	345	501	542	438	366	186	93	25	9	4	2.710
Estimulantes dif. cocaína	1	45	98	146	197	237	174	117	54	14	1	2	0	1.086
Anfetaminas	1	25	63	88	141	164	124	71	33	9	1	0	0	720
Metanfetaminas	0	0	5	15	21	32	17	18	9	1	0	1	0	119
Éxtasis	0	15	19	21	13	7	7	8	4	1	0	1	0	96
Catinonas sintéticas	0	0	3	14	14	23	15	12	3	0	0	0	0	84
Otros estimulantes	0	5	8	8	8	11	11	8	5	3	0	0	0	67
Hipnosedantes	1	35	71	84	111	124	146	122	106	83	37	72	0	992
Alucinógenos	0	13	25	35	28	13	7	2	2	1	1	0	0	127
Sustancias volátiles	1	20	1	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	35
Cannabis	319	4.438	2.477	2.092	1.665	1.272	820	525	319	173	62	22	18	14.202
Total	326	4.878	4.193	5.950	7.829	8.419	7.177	5.438	3.424	1.598	529	231	43	50.035

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.39.

Número de casos que entran a tratamiento en función de que presenten policonsumo* de sustancias, total y en función del tratamiento previo. España, 2019.

	Policonsumo Si	Policonsumo No	Total
Sin tratamiento previo	6.925	20.567	27.492
Con tratamiento previo	5.964	14.725	20.689
Desconocido	341	1.513	1.854
Total admisiones	13.230	36.805	50.035


Nota: Se utiliza el término "policonsumo" cuando el sujeto consume más de una sustancia y resulta "prácticamente imposible" identificar cuál es la droga principal. Es decir, cuál es la droga que el terapeuta considera que ha producido la dependencia o los problemas clínicos o sociales más importantes que han motivado la admisión a tratamiento.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2019

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España*, 1996-2019.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	
Alcohol**	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	
Otros opioides	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	
MDMA y derivados	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cannabis	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5	42,1	40,1	50,3	49,4	50,6
Cocaína	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7	43,4	42,5	50,2	52,0	50,7
Alcohol**	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7	39,7	43,9	37,1	39,0	40,3
Hipnosedantes	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5	18,0	20,5	16,9	17,9	19,5
Otros opioides	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1	9,9
Heroína	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4	7,0
Anfetaminas	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6	7,8
MDMA y derivados	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4	3,8
Alucinógenos	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,8
Inhalables volátiles	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5


* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Evolución del número de urgencias relacionadas con el uso de analgésicos opiáceos*. España, 2005-2019.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Urgencias	50	46	55	59	44	53	64	62	76	73	76	59	88	115	111

* Incluye morfina, Fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Proporción de urgencias por tipo de opiáceo notificado en el total de urgencias relacionadas con opiáceos. España*, 2005-2019.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Heroína	69,7	66,6	67,6	69,7	69,2	72,5	69,4	68,0	67,4	57,3	60,2	52,6	46,5	42,5	41,6
Otros opiáceos**	27,7	30,8	29,5	26,5	27,6	23,5	24,1	25,9	24,8	36,0	31,7	39,1	42,9	43,6	45,4
Analgésicos opiáceos***	2,6	2,7	2,9	3,8	3,3	4,0	6,6	6,1	7,8	6,7	8,2	8,2	10,7	14,0	13,0

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** Otros opiáceos: opiáceos distintos de la heroína y de los analgésicos opiáceos. Incluye: metadona, opio y otros opiáceos sin especificar.

*** Analgésicos opiáceos: incluye morfina, fentanilos, petidina, tramadol, buprenorfina, codeína, dextrometorfano, hidromorfona, oxycodona y tapentadol.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Número de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje según tipo de droga. España*, 1996-2019.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol**	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3
2016	4.565	42,5	43,9	40,1	20,5	8,6	7,5	7,7	3,2	1,5	0,3
2017	4.293	50,2	37,1	50,3	16,9	9,0	8,7	10,3	2,8	1,5	0,5
2018	5.027	52,0	39,0	49,4	17,9	7,4	7,6	10,1	3,4	1,4	0,5
2019	5.352	50,7	40,3	50,6	19,5	7,0	7,8	9,9	3,8	1,8	0,5

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2019.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715	6.441	5.238	4.565	4.293	5.027	5.352
Edad media (años)	27,8	28,1	29,1	29,4	30,3	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	33,2	34,1	34,3	34,6	34,8	34,1
Sexo (% de mujeres)	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1	24,5	22,6	22,6	22,7	25,3	25,7
Sustancias psicoactivas relacionadas con el episodio de urgencia (%)																							
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3	11,2	8,6	9,0	7,4	7,0
Otros opiodes	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6	7,4	7,7	10,3	10,1	9,9
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7	43,5	42,5	50,2	52,0	50,7
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6	8,0	7,5	8,7	7,6	7,8
MDMA y derivados	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5	3,7	3,2	2,8	3,4	3,8
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5	18,1	20,5	16,9	17,9	19,5
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5	42,2	40,1	50,3	49,4	50,6
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,8
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Alcohol**	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7	39,8	43,9	37,1	39,0	40,3
Resolución de la urgencia (%)																							
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8	69,8	72,2	71,6	71,1	72,7	73,0
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4	9,9	8,2	8,2	8,3	8,4	8,8
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8	15,9	16,0	17,0	17,1	15,2	15,1
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9	4,2	3,6	3,1	3,5	3,7	3,1

1. Incluye las sustancias para las que el médico expresa en la historia clínica una relación directa con la urgencia.

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias. ** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Evolución de la vía de administración de las distintas sustancias relacionadas con los episodios de urgencias (%). España, 2011-2019.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HEROÍNA									
Oral	1,6	0,8	0,2	1,5	1,5	2,2	2,7	9,0	5,3
Pulmonar o fumada	35,4	25,4	30,6	25,7	26,0	50,0	61,0	50,7	57,3
Intranasal o esnifada	6,8	8,9	9,5	5,2	5,3	6,7	5,1	11,9	13,6
Parenteral o inyectada	56,3	64,9	59,6	67,7	68,5	41,1	30,7	27,9	23,8
Otra vía	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
OTROS OPIOIDES									
Oral	94,5	96,8	98,7	89,3	85,0	91,3	95,1	95,9	95,0
Pulmonar o fumada	1,1	0,8	0,4	1,8	3,2	1,7	1,4	0,8	1,5
Intranasal o esnifada	1,8	1,0	0,1	0,0	2,4	0,4	0,0	0,6	0,5
Parenteral o inyectada	1,9	0,8	0,5	7,7	7,3	6,1	1,6	1,1	1,5
Otra vía	0,7	0,6	0,2	1,2	2,0	0,4	1,9	1,6	1,5
COCAÍNA									
Oral	1,4	1,0	0,5	2,3	2,0	3,3	2,5	1,6	2,1
Pulmonar o fumada	20,8	18,2	18,5	10,4	18,4	17,9	11,1	11,8	14,1
Intranasal o esnifada	61,9	57,5	61,2	72,7	71,6	73,5	85,6	85,1	81,9
Parenteral o inyectada	15,8	23,1	19,6	14,4	10,0	8,6	3,3	1,5	1,7
Otra vía	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
ANFETAMINAS									
Oral	81,6	78,0	69,9	71,9	68,2	65,9	72,3	75,0	73,2
Pulmonar o fumada	5,3	5,9	10,6	4,5	7,1	4,8	9,9	2,4	3,0
Intranasal o esnifada	12,5	16,1	18,7	21,9	24,7	27,8	17,7	22,6	23,4
Parenteral o inyectada	0,3	0,0	0,4	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,4
Otra vía	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MDMA									
Oral	97,3	97,4	98,6	95,3	92,1	98,1	100,0	96,2	96,2
Pulmonar o fumada	1,4	1,1	0,0	1,6	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Intranasal o esnifada	0,9	1,6	0,0	2,4	4,8	1,9	0,0	3,8	3,8
Parenteral o inyectada	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otra vía	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HIPNOSEDANTES									
Oral	99,5	99,3	99,5	98,8	99,3	99,5	98,5	99,1	99,1
Pulmonar o fumada	0,1	0,2	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,6	0,6
Intranasal o esnifada	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,0
Parenteral o inyectada	0,1	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3
Otra vía	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
CANNABIS									
Oral	2,6	2,4	2,2	5,3	4,3	5,1	1,8	4,8	4,8
Pulmonar o fumada	96,6	97,3	97,3	93,5	95,5	94,8	98,1	94,8	94,8
Intranasal o esnifada	0,6	0,3	0,4	0,7	0,2	0,1	0,0	0,2	0,2
Parenteral o inyectada	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Otra vía	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
ALUCINÓGENOS									
Oral	72,9	73,3	54,8	37,1	76,1	82,8	77,8	86,6	86,6
Pulmonar o fumada	15,3	2,7	11,3	2,2	13,0	3,4	0,0	6,7	6,7
Intranasal o esnifada	11,9	14,7	17,7	16,9	2,2	13,8	22,2	6,7	6,7
Parenteral o inyectada	0,0	6,7	16,1	43,8	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Otra vía	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España*, 2019.



* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.8.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España*, 2019.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol**	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Número de episodios	5.352	3.971	1.372	2.564	2.035	2.559	988	355	395	498	191	89	25
Edad media (años)	34,1	34,5	32,9	36,1	35,0	30,9	36,3	40,3	32,2	41,1	27,9	26,7	33,0
Sexo (%) mujeres	25,7			21,3	23,7	24,7	29,4	16,9	27,2	30,7	26,7	20,2	16,0
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	73,0	72,7	74,2	73,5	74,3	72,4	70,4	68,4	67,3	67,5	75,3	76,1	76,0
Alta voluntaria	8,8	9,3	7,2	9,6	10,3	6,9	8,7	10,8	7,9	10,0	13,2	9,1	16,0
Ingreso hospitalario	15,1	15,2	14,6	13,8	12,7	17,7	15,7	18,8	20,7	18,6	8,9	8,0	8,0
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,1	2,8	3,8	3,0	2,8	3,0	5,2	2,0	4,1	3,9	2,6	6,8	0,0

* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España*, 2019.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	50,7	53,1	43,4
Cannabis	50,6	50,8	50,2
Alcohol**	40,3	40,9	38,3
Hipnosedantes	19,5	18,4	23,1
Otros opioides	9,9	9,1	12,2
Anfetaminas	7,8	7,6	8,5
Heroína	7,0	7,8	4,8
MDMA y derivados	3,8	3,7	4,1
Alucinógenos	1,8	1,9	1,4
Inhalables volátiles	0,5	0,6	0,3

* Comunidades autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2019. Mortalidad relacionada con drogas

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 1983-2019.

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Estimación nacional	1.051	1.310	1.127	1.049	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	-	-	-	-	-	444	496	496	493	468	455	428	
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	395	421	339	306	291	284	268	229	270	212	242	218	
Registro General de Mortalidad (INE)	-	-	-	-	752	691	650	652	633	659	636	489	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Estimación nacional	703	773	739	706	736	707	727	767	936	866	782	777	1.015
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)	475	424	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210
Registro General de Mortalidad (INE)	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.


Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2019.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2019.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819
Sexo (%)																	
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1	81,6	80,8
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9	18,4	19,2
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5	44,9	44,4
Grupo de edad (años)																	
15-19 años	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0	0,3	0,8
20-24 años	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0	2,2	2,6
25-29 años	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5	4,4	4,1
30-34 años	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3	7,8	9,1
35-39 años	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14,0	15,9	13,0	12,7
40-44 años	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7	16,5	17,8
≥45 años	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6	55,8	52,9

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Estado civil (%)																	
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3	62,9	62,0
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9	17,2	20,1
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9	17,8	15,6
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9	2,1	2,4
Procedencia del cadáver (%)																	
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9	68,7	70,6
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0	2,6	3,6
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1	7,5	9,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0	2,6	2,2
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7	6,6	6,0
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7	5,6	3,1
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6	6,5	5,4
Evidencias de consumo reciente (%)																	
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1	80,4	85,4
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9	19,6	14,6
Evidencia de suicidio (%)																	
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9	18,4	23,2
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1	81,6	76,8
Signos recientes venopunción(%)																	
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3	11,3	12,8
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7	88,7	87,2
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)																	
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2	31,0	27,9
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8	69,0	72,1
Anticuerpos anti-VIH (%)																	
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1	25,8	18,0
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9	74,2	82,0

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.4.

Características de las personas fallecidas por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en función del sexo. España*, 2019.


		Hombres	Mujeres
Sexo	Hombre	741	0
	Mujer	0	176
Grupo de edad (%)	Menor de 20 años	0,5	1,7
	Entre 20 y 24 años	2,8	1,7
	Entre 25 y 29 años	4,3	3,4
	Entre 30 y 34 años	9,7	6,3
	Entre 35 y 39 años	13,6	8,0
	Entre 40 y 44 años	16,7	21,0
	45 años o más	51,0	56,3
	Desconocido	1,2	1,7
Estado civil (%)	Soltero	66,3	46,3
	Casado	18,2	26,8
	Separado legalmente/Divorciado	14,5	19,5
	Viudo	1,0	7,3
Procedencia del cadáver (%)	Domicilio	68,9	77,8
	Hotel/Pensión	3,6	3,6
	Calle	10,5	3,6
	Establecimiento público	2,3	1,8
	Hospital	5,7	6,6
	Cárcel	3,7	0,6
	Otro lugar	5,3	6,0
Evidencias de consumo reciente de sustancias psicoactivas (%)	Si	83,6	92,5
	No	16,4	7,5
Signos de autopsia compatible con muerte RASUPSI (%)	Si	80,6	83,4
	No	19,4	16,6
Diagnóstico forense de muerte (%)	Si	83,9	88,6
	No	16,1	11,4
Evidencias de suicidio (%)	Si	17,7	45,4
	No	82,3	54,6
Signos recientes de venopunciones (%)	Si	14,3	7,4
	No	85,7	92,6
Muerte cuya causa es una patología previa (%)	Si	30,0	20,5
	No	70,0	79,5
Anticuerpos del VIH (%)	Positivo	18,3	17,4
	Negativo	81,7	82,6

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2019.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.6.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2019.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Opioides	90,4	89,8	90,1	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8
Cocaína	32,7	41,4	51,2	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0
Hipnosedantes	47,7	58,6	47,4	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9
Anfetaminas	4,0	8,6	2,8	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6
Cannabis	6,5	12,2	11,3	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6
MDMA	0,1	1,5	0,0	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1
Alcohol**	27,7	28,6	26,2	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33	34,3	27,8
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opioides	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9	58,1	58,6	59,0
Cocaína	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7	53,2	61,6	60,3
Hipnosedantes	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3	68,0	63,2	66,8
Anfetaminas	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2	5,9	5,8	6,8
Cannabis	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4	20,7	24,8	25,5
MDMA	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8	1,7	4,3	2,3
Alcohol**	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9	44,0	47,5	39,7


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico en función del sexo. España*, 2019.



	Hombres	Mujeres	Total
Opioides	59,3	58,3	59,0
Cocaína	64,3	44,2	60,3
Hipnosedantes	63,6	79,8	66,8
Anfetaminas	7,2	5,5	6,8
Cannabis	28,6	13,5	25,5
Extasis	2,6	1,2	2,3
Alcohol**	38,7	43,6	39,7

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.8.


Porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína, opioides y/o diferentes combinaciones de estas sustancias). España*, 2005-2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo cocaína)	14,5	13,8	17,3	12,5	11,0	12,2	13,7	12,3	12,1	13,1	13,5	16,8	22,0	21,3	20,5
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5	26,8	26,0
Sólo cocaína	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5	5,5	5,5
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, pero excluyendo solo opioides)	25,7	32,0	22,9	28,5	31,4	33,3	38,7	35,1	38,2	26,9	32,0	30,1	27,4	21,9	22,6
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	29,7	36,7	30,7	35,8	39,6	39,7	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4	23,7	24,7
Sólo opioides	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0	1,8	2,1
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7	34,9	34,3
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, sin sólo opioides y cocaína)	39,6	29,4	29,3	26,4	31,9	33,5	31,1	34,7	29,3	29,0	27,2	29,3	24,2	30,7	31,7
Solo opioides y cocaína	9,2	10,5	11,6	13,9	9,6	6,0	3,9	4,8	5,0	5,0	3,7	4,4	3,5	4,1	2,6
Nº de defunciones con información toxicológica	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632	657	819
Número total de fallecidos	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696	732	920

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.9.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2003-2019.




	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409	318
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297	213
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292	258
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8	19
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123	100
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149	136
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Opioides	366	337	333	335	320	367	385	483	
Cocaína	280	236	269	253	269	336	405	494	
Benzodiazepinas	291	265	327	336	319	403	410	522	
Anfetaminas	18	27	41	23	31	37	38	56	
Cannabis	107	94	86	121	117	131	163	209	
Alcohol	138	136	212	206	215	278	312	325	
Casos analizados	478	437	520	518	501	632	657	819	

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opiáceo, aunque haya otras sustancias). España*, 2005-2019.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sólo metadona	0,6	2,8	4,2	2,4	2,6	2,7	2,2	1,1	2,1	1,5	0,6	1,0	0,9	0,8	1,3
Metadona	36,5	39,8	37,5	30,0	32,4	47,4	49,7	52,2	47,8	36,9	32,4	36,3	30,2	32,4	28,8
Metadona y no otro opiáceo	15,1	27,4	24,4	20,6	21,9	30,7	34,6	40,2	34,8	20,0	16,4	19,2	18,4	19,2	11,7

* Comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opiáceos, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1985-2019.



* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Calculados sobre los casos con alguna sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos). España, 2005-2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<15 años	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0
15-19 años	6	4	3	8	3	2	5	2	1	4	2	3	0	1	7
20-24 años	27	18	20	26	28	13	20	15	7	8	16	11	7	16	24
25-29 años	49	55	45	45	35	41	24	35	37	26	28	33	38	32	38
30-34 años	88	77	82	69	76	64	49	60	64	57	56	51	58	57	83
35-39 años	127	102	112	94	83	132	80	82	77	76	110	86	111	95	115
40-44 años	91	91	103	84	109	128	86	116	96	97	99	119	116	120	162
45-49 años	34	47	61	53	70	83	79	114	96	133	115	122	146	162	183
50-54 años	13	19	27	29	26	35	42	62	68	86	89	97	110	121	148
55-59 años	3	5	5	11	6	12	11	20	27	45	49	59	76	81	99
60-64 años	1	2	7	3	2	6	5	9	9	17	29	30	34	40	49
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.13.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en hombres). España, 2005-2019.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<15 años	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0
15-19 años	1	1	2	1	2	0	3	0	0	4
20-24 años	11	16	12	4	8	11	10	4	12	21
25-29 años	34	21	31	29	22	27	30	28	28	32
30-34 años	58	40	54	55	43	47	44	46	49	72
35-39 años	114	70	70	60	64	92	72	94	84	101
40-44 años	109	70	99	82	70	84	103	94	94	124
45-49 años	66	60	94	76	104	95	102	118	132	146
50-54 años	29	32	54	55	64	65	76	88	102	112
55-59 años	7	7	15	19	33	34	48	48	59	85
60-64 años	3	2	7	7	10	22	21	23	29	35
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.14.


Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad (número de casos en mujeres). España, 2005-2019.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<15 años	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15-19 años	1	2	0	0	2	2	0	0	0	3
20-24 años	2	4	3	3	0	5	1	3	4	3
25-29 años	7	3	4	8	3	1	3	10	4	6
30-34 años	6	8	5	9	10	9	7	12	8	11
35-39 años	18	10	11	17	8	18	14	16	11	14
40-44 años	19	13	16	14	22	15	16	22	25	37
45-49 años	16	17	20	20	21	20	20	28	30	37
50-54 años	6	9	8	12	15	23	21	22	19	35
55-59 años	4	3	5	8	9	15	11	28	22	14
60-64 años	3	2	2	2	3	7	9	11	11	13
≥65 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 2004-2019.




	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hombres	390	391	359	409	357	370	432	375	442	394	448	483	511	543	595	741
Mujeres	75	62	67	59	60	68	83	71	74	94	106	116	102	152	134	176
Total	468	455	428	475	424	438	517	408	519	489	556	600	613	696	732	920

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Evolución número de fallecidos por códigos CIE* en el Registro General de Mortalidad. España 2010-2019.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
F	47	27	33	22	23	24	25	13	39	24
X42	112	118	104	88	85	63	124	81	73	114
X44	230	211	239	289	338	285	329	330	332	388
X62	4	4	5	4	9	15	5	11	4	15
Y12	0	1	2	0	0	3	0	2	2	5


Edad 10-64 años.

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Datos Registro General de Mortalidad.

2.3.17.

Número de defunciones por códigos CIE* en el Registro General de Mortalidad, según sexo. España, 1999-2019.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hombres	657	610	558	564	552	568	539	417	462	470	366	330	291	324	333	376	321	403	348	374	447
Mujeres	95	81	92	88	81	91	97	72	57	70	76	63	70	59	70	79	69	80	89	76	99
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546

* Códigos CIE-10: F11-12, F14-16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.18.

Número de defunciones por códigos CIE* en el Registro General de Mortalidad, según edad. España, 1999-2019.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<35	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141	108	101	104	93	76	80	99	87	74	111
≥35	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301	285	260	279	310	379	310	384	350	376	435
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483	437	450	546

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.19.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2019.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Con opioides*	182	170	136	104	140	143	148	152	141	105	94	105	102	86	105
Sin opioides*	55	48	52	35	41	39	33	43	51	60	65	53	70	91	87
Casos con información	237	218	188	139	181	182	181	195	192	165	159	158	172	177	192
Total	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210

* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.20.

Distribución de las edades en los fallecidos del Registro Específico de Mortalidad de las 6 ciudades españolas*. España, 2005-2019.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<15 años		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0	0	2
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2	4	6
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11	7	13
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18	14	17
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31	18	23
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29	28	29
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30	41	43
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31	30	36
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26	21	27
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11	10	11
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	3	3
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189	177	210

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.21.


Evolución del índice de infranotificación (Registro General de Mortalidad - Registro Específico). España, 2005-2019.

Año	Índice de Infranotificación
2005	1,58
2006	1,68
2007	1,35
2008	1,43
2009	1,67
2010	1,80
2011	2,04
2012	1,85
2013	1,80
2014	1,69
2015	2,40
2016	1,79
2017	1,79
2018	1,76
2019	1,86

FUENTE: OEDA. Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones.

2.3.22.

Estimación del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas (estimación nacional). España, 1983-2019.



FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD

<http://www.mscbs.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<https://pnsd.sanidad.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/Paginas/hometabacos.aspx>

Informes Anuales de Recaudación Tributaria

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria.shtml

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

<https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx>

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

<https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/home.htm>

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

<https://www.ine.es/>

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII)

<https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

http://www.who.int/substance_abuse/en/

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)

INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)

THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)

HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO

EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>