

ESTADÍSTICAS 2015

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS

GESTION, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ-FRANCO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Juana VANRELL

Rosa ARANGUREN

Canarias

Nicolás AMADOR

Baltasar FERNÁNDEZ

Cantabria

M^a Carmen DIEGO

Inés RUIZ

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

Quintín MONTERO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIERREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Isabel CASCALES

Josefa DURÁN

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Elena ALDASORO

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las comunidades autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS (OEDT)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-16-001-3

Presentamos en este documento las Estadísticas del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) correspondiente al año 2015, año en el que celebramos el XXX aniversario de la creación del Plan Nacional sobre Drogas con el fin de coordinar y potenciar las políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo en España.

Para llevar a cabo esta labor, es imprescindible conocer el entorno de la manera más fiel posible, tanto de las prevalencias de consumo y uso, como de las opiniones y actitudes ante los mismos.

Solo con datos fiables y fidedignos es posible planificar y formular políticas en aras de minimizar los riesgos ante un problema que, 30 años después, ha variado en cuanto a sustancias predominantes, patrones de consumo o irrupción de otras conductas adictivas, pero que todavía sigue estando presente en nuestra sociedad.

Por ello, desde 1985, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas trabaja en actividades de recogida y análisis de datos y de difusión de la información, tanto de carácter estadístico como epidemiológico sobre el consumo de drogas y otras cuestiones relacionadas. A través del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), se publican las Estadísticas OEDT en el que damos cuenta de las principales actualizaciones de la información. Este año, siendo conscientes de la importancia de facilitar la información del modo más precoz posible y por tanto, con el fin de no demorar la publicación de los datos completos de las encuestas y estudios que se realizan, hemos optado por un formato más conciso, pero mucho más cercano en el tiempo.

Al igual que en los informes precedentes, ofrecemos información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas; información relativa a los problemas relacionados con las drogas, procedente de los indicadores: admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas y mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas; información sobre el Sistema Español de Alerta Temprana, implementado como instrumento para la evaluación, la vigilancia y el control tanto de nuevas sustancias psicoactivas como de cualquier circunstancia que pueda afectar de manera grave e inminente a la salud, tanto de los consumidores como del conjunto de la población; así como información procedente de otros indicadores relacionados con el Control de la Oferta.

Esta actualización, permite hacer un seguimiento del desarrollo de los trabajos del Plan de Acción sobre Drogas 2013-2016, que desarrolla la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 y evaluar los resultados de ambas, con vistas a continuar con la planificación del trabajo que desarrollaremos en el siguiente ciclo.

Por último, quiero manifestar mi agradecimiento a todos aquellos que han contribuido a la elaboración de esta publicación y especialmente a las personas integrantes del equipo del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías que, como es habitual, han desarrollado este trabajo de manera ejemplar y con gran profesionalidad.

Francisco de Asís Babín Vich
Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías

ESTADÍSTICAS 2015

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	18
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	19
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2013	20
Metodología	
1.1.1. Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2013	20
1.1.2. Características sociodemográficas de la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 ..	21
1.1.3. Con quién vive actualmente la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	21
1.1.4. Distribución de la muestra (nº de entrevistas) de la encuesta EDADES 2013, y errores muestrales, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013	22
Prevalencia de consumo de drogas 1995-2013: evolución temporal. Edad y sexo	
1.1.5. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	23
1.1.6. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	24
1.1.7. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	25
1.1.8. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	25
1.1.9. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	26
1.1.10. Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	26
1.1.11. Edad media (años) de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2013	27
1.1.12. Edad media de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2013	27
1.1.13. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	28
1.1.14. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	29

1.1.15.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	30
1.1.16.	Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	31
1.1.17.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (número estimado). España, 2013	31
1.1.18.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (tasa por mil habitantes) España, 2013	31
1.1.19.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (número estimado). España, 2013	32
1.1.20.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (tasa por mil habitantes) España, 2013	32
1.1.21.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013	32
1.1.22.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013	33
1.1.23.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2013	33
1.1.24.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2013	34
1.1.25.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2013	35

Prevalencia de consumo de drogas 2013: Comunidad/Ciudad Autónoma

1.1.26.	Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (años). España, 2013	36
1.1.27.	Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	37
1.1.28.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	37
1.1.29.	Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	38
1.1.30.	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013	38
1.1.31.	Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	39
1.1.32.	Prevalencias de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013	40
1.1.33.	Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013	41
1.1.34.	Prevalencias de hacer botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013	42
1.1.35.	Prevalencias de hacer botellón y consumir alcohol en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013	43
1.1.36.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	44
1.1.37.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	44

1.1.38.	Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	45
1.1.39.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	45
1.1.40.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013	46

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.1.41.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013 . .	46
1.1.42.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	47
1.1.43.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	47
1.1.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2013	48
1.1.45.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2013 . .	48
1.1.46.	Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013	49
1.1.47.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	49
1.1.48.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013 . .	50
1.1.49.	Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2013	50
1.1.50.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013	51
1.1.51.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	51
1.1.52.	Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2013	52
1.1.53.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	52
1.1.54.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013	53
1.1.55.	Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	53
1.1.56.	Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	54
1.1.57.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no. España, 2013	54

1.1.58.	Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre la población según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2013	55
1.1.59.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	55
1.1.60.	Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	56
1.1.61.	Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, borracheras en los últimos 30 días y binge drinking en los últimos 30 días entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes) entre la población de 15 a 64 años. España, 2013	56
1.1.62.	Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013	57
1.1.63.	Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje que se encuentra frecuente o muy frecuente cada situación en el lugar donde vive), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), (porcentajes). España, 2013	58
1.1.64.	Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013	58
1.1.65.	Características de la población de 15 a 64 años que ha que ha consumido alcohol en el último año según tenga un consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013	59
1.1.66.	Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	60
1.1.67.	Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	60

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.1.68.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	61
1.1.69.	Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	61
1.1.70.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013	62

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.1.71.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013	62
1.1.72.	Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	63
1.1.73.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	63

1.1.74.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en últimos 12 meses y últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013	64
1.1.75.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	64
1.1.76.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	65
1.1.77.	Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013	65
1.1.78.	Evolución de las prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años. España, 2005-2013	66
1.1.79.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	66
1.1.80.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	67
1.1.81.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013	67

Consumo por tipo de drogas: cannabis

1.1.82.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	68
1.1.83.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	68
1.1.84.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	69
1.1.85.	Continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	69
1.1.86.	Prevalencia de personas que han consumido tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013	70
1.1.87.	Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013	70
1.1.88.	Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala. España, 2013	70
1.1.89.	Prevalencia de consumo de riesgo, consumo de bajo riesgo y consumo no problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2013	71
1.1.90.	Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes). España, 2013	71
1.1.91.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. España, 2013	72
1.1.92.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes). España, 2013	73
1.1.93.	Características de la población de 15 a 64 años de edad que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST \geq 4) o no (CAST <4) y entre la población general (porcentajes). España, 2013	74

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.1.94. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	75
1.1.95. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 1999-2013	75
1.1.96. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2013	76
1.1.97. Continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013	76
1.1.98. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	77
1.1.99. Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	77
1.1.100. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	78

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

1.1.101. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	78
1.1.102. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	79
1.1.103. Prevalencia de consumo de éxtasis entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013	79

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

1.1.104. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	80
1.1.105. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	80
1.1.106. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013	81

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

1.1.107. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	81
1.1.108. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	82
1.1.109. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013	82

Consumo por tipo de drogas: heroína e inhalables volátiles

1.1.110. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	83
1.1.111. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	83
1.1.112. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013	84
1.1.113. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013	84

Patrones de consumo de drogas: policonsumo y uso inyectado

1.1.114. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013	85
1.1.115. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013	85
1.1.116. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013	86
1.1.117. Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, según edad y sexo en la población de 15-64 años. España, 2013	86
1.1.118. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013	87
1.1.119. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013	87
1.1.120. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes de columna) entre la población de 15-64 años. España, 2013	88
1.1.121. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2013	88
1.1.122. Proporción (% en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013	89
1.1.123. Proporción (% en filas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013	89
1.1.124. Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013	90
1.1.125. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras sustancias psicoactivas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según sexo y grupo de edad (porcentajes). España, 2013	90

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad y de riesgo

1.1.126. Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013	91
1.1.127. Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013	92
1.1.128. Proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes). España, 2013	92
1.1.129. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013	93
1.1.130. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013	94

1.1.131. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013	95
1.1.132. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo una vez o menos al mes de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013	95
1.1.133. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez por semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo y edad. España, 2013	96
1.1.134. Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013	96
1.1.135. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo. España, 2013	97
1.1.136. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez a la semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según edad. España, 2013	97
1.1.137. Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013	98
1.1.138. Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013	98

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: relación entre riesgo percibido, percepción de disponibilidad y prevalencia de consumo

1.1.139. Prevalencia de consumo de cannabis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013 . . .	99
1.1.140. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013	99
1.1.141. Prevalencia de consumo de éxtasis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013 . . .	100

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre la importancia del problema del consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.142. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las sustancias psicoactivas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2013	100
1.1.143. Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2013	101
1.1.144. Visibilidad en el entorno cercano de personas fumando porros o haciendo botellón (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 2013	102

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: vías de información sobre drogas

- 1.1.145. Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2013 102

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

- 1.1.146. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013 103
- 1.1.147. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2013 104
- 1.1.148. Valoración de la legalización del hachís y la marihuana como “muy importante” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 104

Percepción del estado de salud en consumidores de drogas

- 1.1.149. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años (porcentajes), según sexo y edad. España, 2013 105
- 1.1.150. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥ 8) o no (AUDIT < 8), por sexo. España, 2013 105
- 1.1.151. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥ 8) o no (AUDIT < 8), por edad. España, 2013 106
- 1.1.152. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥ 4) o no (CAST < 4), por sexo (%). España, 2013 106
- 1.1.153. Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥ 4) o no (CAST < 4), por edad (%). España, 2013 107
- 1.1.154. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según sexo (%). España, 2013 107
- 1.1.155. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según edad (%). España, 2013 108

Nuevas sustancias psicoactivas

- 1.1.156. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 108
- 1.1.157. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2013 109
- 1.1.158. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013 109
- 1.1.159. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, (porcentajes). España, 2011 y 2013 110
- 1.1.160. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2013 110
- 1.1.161. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-18 años (porcentajes). España, 2011 y 2013 111
- 1.1.162. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013 111
- 1.1.163. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2011 y 2013 112

1.1.164. Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2011 y 2013	112
1.1.165. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013	113
1.1.166. Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013	113
1.1.167. Lugar de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013	114
1.1.168. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice, metanfetamina, setas mágicas y salvia alguna vez en la vida (porcentaje de columna). España, 2013	114
1.1.169. Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2013	115
1.1.170. Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad. España, 2013	115
1.1.171. Estado civil y nivel de estudios de la población de 25 a 34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013	116
1.1.172. Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 25-34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013	116
1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014	117

2. Problemas relacionados con las drogas **118**

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2013 **119**

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2013

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2013	119
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2013 .	120
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2013 .	121
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2013	122
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2013	123
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2013	124
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2013	125
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2013 .	126
2.1.9. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2013	127
2.1.10. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2013	128
2.1.11. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2013	129

2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2013	130
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2013	131
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2013	132
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013	133
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013	134
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013	135
2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013	136
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2013	137
2.1.20.	Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión a tratamiento). España, 2005-2013	138
2.1.21.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2013	139
2.1.22.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2013	140

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2012-2013

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2012	141
2.1.24.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2013	141
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2012	142
2.1.26.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2012	143
2.1.27.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2013	144
2.1.28.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2013	145
2.1.29.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012	146
2.1.30.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013	146
2.1.31.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012	147

2.1.32.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013	149
2.1.33.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2012	151
2.1.34.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2013	151
2.1.35.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012	152
2.1.36.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013	154
2.1.37.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2012	156
2.1.38.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2013	158
2.1.39.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2012	161
2.1.40.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2013	162
2.1.41.	Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: estado serológico y vía de consumo según droga principal. España, 2013	163
2.1.42.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2013	164
2.1.43.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (número y %). España, 2005-2013	164
2.1.44.	Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, total y según sexo. 1996-2013	165
2.1.45.	Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, según edad. 1996-2013	165
2.2.	Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2013	166
2.2.1.	Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2013	166
2.2.2.	Número total y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2013	167
2.2.3.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2013	168
2.2.4.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2012	169
2.2.5.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2013	169
2.2.6.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2012	170
2.2.7.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2013	170
2.2.8.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2012	170
2.2.9.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España, 2013	171
2.2.10.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España, 2013	171

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999-2013 172

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas

2.3.1. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2013 172

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a drogas

2.3.2. Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2013 173

2.3.3. Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2013 174

2.3.4. Número y proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 2003-2013 175

2.3.5. Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y otras sustancias distintas de los opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1983-2013 176

2.3.6. Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y otras sustancias distintas de la cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiazepinas (BZD) y/o alcohol)). España, 1983-2013 .. 177

2.3.7. Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide, sólo metadona y benzodiazepinas). España, 1996-2013 178

Registro General de Mortalidad

2.3.8. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013 179

2.3.9. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según edad (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013 180

Información complementaria 181

Páginas web de interés 182

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2015*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2015*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1994 hasta 2013. Las fuentes de información son dos encuestas: Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES) y Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones.

EADDES y ESTUDES se realizan de forma bienal (un año EADDES y el siguiente ESTUDES), y se promueven y financian directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando, la segunda, con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento se presentan los datos de EADDES actualizados hasta el año 2013. No se incluye información de ESTUDES debido a que los resultados detallados hasta el año 2012 están disponibles en el *Informe* y en *Estadísticas 2013* y los de ESTUDES 2014 serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. No obstante, puede consultarse un avance de resultados de ESTUDES 2014 en la página web del Plan Nacional sobre Drogas.

En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2013. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”.


Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas, como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información.

En el informe previo *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2013*, se incluyeron datos de los indicadores hasta el año 2011. En el presente documento se presentan los datos actualizados hasta el año 2013 y se incluyen datos detallados del año 2012 y 2013.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998:

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>


Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2013

1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2013.



Año	Tamaño de la muestra
1995	8.888
1997	12.304
1999	12.234
2001	14.113
2003	12.033
2005	27.934
2007	23.715
2009	20.109
2011	22.128
2013	23.136

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.2.

Características sociodemográficas de la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.

		Porcentaje
SEXO	Hombre	50,4
	Mujer	49,6
EDAD	15 a 24 años	14,7
	25 a 34 años	21,1
	35 a 44 años	24,7
	45 a 54 años	22,2
	55 a 64 años	17,3
ESTADO CIVIL	Soltero/a	38,7
	Casado/a	52,3
	Separado/a - Divorciado/a	6,9
	Viudo/a	2,1
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	15,9
	Estudios secundarios	65,5
	Estudios universitarios	18,6
NACIONALIDAD	Española	87,5
	Extranjera	12,5

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.3.

Con quién vive actualmente la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.

	Porcentaje
Solo	9,9
Cónyuge / pareja	59,2
Padre	17,5
Madre	23,0
Hijos	42,6
Hermanos	12,6
Abuelos	1,3

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.4.

Distribución de la muestra (nº de entrevistas) de la encuesta EDADES 2013, y errores muestrales, por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013.

CCAA	DGPNSD ¹	Ampliación ²	Muestra final ³	Error muestral ⁴
Andalucía	2.155	–	2.155	2,1%
Aragón	858	–	858	3,3%
Asturias	778	–	778	3,5%
Baleares	812	–	812	3,4%
Canarias	1.084	813	1.897	2,3%
Cantabria	576	408	984	3,1%
Castilla-La Mancha	1.071	516	1.587	2,5%
Castilla y León	1.181	–	1.181	2,9%
Cataluña	2.019	–	2.019	2,2%
C. Valenciana	1.699	798	2.497	2,0%
Extremadura	788	–	788	3,5%
Galicia	1.236	754	1.990	2,2%
Madrid	1.930	–	1.930	2,2%
Murcia	911	–	911	3,2%
Navarra	604	–	604	4,0%
País Vasco	1.108	–	1.108	2,9%
La Rioja	420	–	420	4,8%
Ceuta	218	–	218	6,6%
Melilla	211	188	399	4,9%
Total	19.659	3.477	23.136	0,6%

1. Número de entrevistas financiadas por la DGPNSD.

2. Número de entrevistas financiadas por las CCAA/CA.


3. Muestra final. Número de entrevistas realizadas.

4. Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p=q=0,5$.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.5.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.




Sustancia psicoactiva	Prevalencia de consumo alguna vez en la vida (%)
Alcohol	93,1
Tabaco	73,1
Cannabis	30,4
Hipnosedantes (con o sin receta)	22,2
Cocaína (polvo y/o base)	10,3
Éxtasis	4,3
Alucinógenos	3,8
Anfetaminas/speed	3,8
Nuevas sustancias	3,0
Hipnosedantes (sin receta)	2,7
Setas mágicas	1,9
Ketamina	0,8
Heroína	0,7
Inhalables volátiles	0,6
GHB	0,6
Spice	0,5
Salvia	0,5
Metanfetamina	0,5
Nexus	0,2
Esteroides anabolizantes	0,2
Research chemicals	0,1
Mefedrona	0,1
Piperazinas	0,0
Legal highs	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



Sustancia psicoactiva	Prevalencia de consumo últimos 12 meses (%)
Alcohol	78,3
Tabaco	40,7
Hipnosedantes (con o sin receta)	12,2
Cannabis	9,2
Cocaína (polvo y/o base)	2,2
Hipnosedantes (sin receta)	1,2
Nuevas sustancias	0,7
Éxtasis	0,7
Anfetaminas/speed	0,6
Alucinógenos	0,3
Setas mágicas	0,2
Ketamina	0,1
Spice	0,1
Salvia	0,1
Metanfetamina	0,1
GHB	0,1
Heroína	0,1
Inhalables volátiles	0,1
Nexus	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0
Mefedrona	0,0
Piperazinas	0,0
Research chemicals	0,0
Legal highs	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	–	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1
Alcohol	–	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	8,3	10,2	8,8	10,3
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	7,0	13,0	11,0	17,1	20,1
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	–	4,6	6,0	6,3	7,9	9,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.8.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	–	46,8	44,7	46	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3	2,2
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8	10,6
Tranquilizantes (sin receta)	–	–	–	–	–	0,9	0,9	1,6	0,9	0,9
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4	5,5
Somníferos (sin receta)	–	–	–	–	–	0,8	0,8	1,1	0,6	0,6
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2
Hipnosedantes (sin receta)	12,3	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.9.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	1,3	1,1	1,0
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	2,7	4,7	4,0	6,9	7,7
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.10.

Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9
Tranquilizantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	2,6	2,3	4,0	5,9
Somníferos (con o sin receta)	–	–	–	–	–	1,1	1,4	1,7	3,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	3,1	2,7	4,6	6,8

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.11.

Edad media (años) de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2013.



1.1.12.

Edad media de inicio de consumo de sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2013.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4
Bebidas alcohólicas	–	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6
Inhalables volátiles	17,7	19	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	–	20,9	21,0	21,3
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2
Hipnosedantes (sin receta)	35,2	28,7	29,2	29,5	30,0	–	29,1	29,5	27,8	31,3
Hipnosedantes (con o sin receta)	–	–	–	–	–	–	33,8	34,5	34,5	35,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	93,1	95,0	91,3	89,9	93,8	93,4	94,2	93,3	75,2	93,7	92,2	93,7
Tabaco	73,1	77,5	68,6	61,5	73,4	74,6	78,5	73,4	42,9	74,0	68,5	75,6
Tranquilizantes (con o sin receta)	20,1	15,1	25,3	7,5	15,7	20,6	25,9	28,2	3,4	20,6	12,3	24,5
Somníferos (con o sin receta)	9,6	7,1	12,3	2,6	6,7	10,4	12,3	14,6	1,1	9,9	5,1	12,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	22,2	16,8	27,6	8,2	17,0	22,8	28,3	31,5	3,6	22,7	13,4	27,0
Tranquilizantes (sin receta)	2,2	2,1	2,2	1,2	2,3	2,6	2,2	2,1	0,8	2,2	1,9	2,3
Somníferos (sin receta)	1,5	1,5	1,5	0,6	1,3	2,0	1,3	1,8	0,1	1,5	1,0	1,7
Hipnosedantes (sin receta)	2,7	2,6	2,8	1,5	2,9	3,2	2,6	2,7	0,8	2,7	2,3	2,8
Cannabis	30,4	37,9	22,7	38,0	41,7	32,6	25,5	13,3	19,6	30,7	40,2	25,0
Cocaína en polvo	10,2	14,9	5,4	6,4	15,2	14,5	8,1	3,7	1,4	10,5	11,6	9,4
Cocaína base	1,0	1,7	0,3	0,5	1,1	1,5	1,1	0,5	0,5	1,0	0,9	1,1
Cocaína (polvo y/o base)	10,3	15,0	5,4	6,6	15,3	14,6	8,2	3,8	1,6	10,5	11,7	9,5
Éxtasis	4,3	6,3	2,2	3,8	7,8	6,3	1,9	0,6	1,1	4,4	6,2	3,2
Anfetaminas/speed	3,8	5,7	1,8	2,9	6,2	5,1	2,6	1,3	0,9	3,9	4,9	3,2
Alucinógenos	3,8	5,8	1,8	3,0	6,3	5,4	2,3	0,9	1,3	3,9	5,0	3,1
Heroína	0,7	1,2	0,2	0,2	0,4	1,2	1,1	0,2	0,0	0,7	0,3	0,9
Inhalables volátiles	0,6	0,9	0,3	0,3	1,0	0,9	0,5	0,0	0,1	0,6	0,7	0,5
Nuevas sustancias	3,0	4,6	1,3	3,6	5,8	3,3	1,3	0,6	1,3	3,0	4,9	1,9
Ketamina	0,8	1,4	0,3	1,0	1,6	1,2	0,2	0,2	0,8	0,8	1,3	0,6
GHB	0,6	0,9	0,2	0,2	1,0	0,9	0,3	0,1	0,0	0,6	0,7	0,5
Spice	0,5	0,9	0,2	0,4	1,0	0,8	0,3	0,1	0,1	0,6	0,7	0,4
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	0,3	0,5	0,7	0,4
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	2,2	3,8	2,1	0,7	0,3	0,7	1,9	3,2	1,1
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,1	0,5	0,8	0,3
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.14.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	78,3	83,2	73,4	81,3	81,3	78,1	77,3	73,9	66,2	78,7	81,3	76,7
Tabaco	40,7	44,2	37,2	40,7	45,3	41,2	43,7	30,7	28,3	41,1	43,4	39,2
Hacer botellón	12,6	14,4	10,7	52,2	17,4	3,3	1,4	0,9	44,7	11,7	31,6	2,0
Hacer botellón y beber alcohol	11,1	12,9	9,3	48,6	15,7	2,5	0,5	0,3	40,8	10,3	29,1	1,2
Borracheras	19,1	25,4	12,6	41,4	29,7	16,3	8,9	4,0	26,3	18,8	34,5	10,4
Tranquilizantes (con o sin receta)	10,6	7,3	14,0	3,8	6,9	9,7	14,5	17,4	1,9	10,9	5,6	13,4
Somníferos (con o sin receta)	5,5	3,7	7,3	1,5	3,0	5,2	7,1	9,9	1,0	5,6	2,4	7,1
Hipnosedantes (con o sin receta)	12,2	8,5	16,0	4,4	7,8	11,1	16,6	20,5	2,1	12,5	6,4	15,5
Tranquilizantes (sin receta)	0,9	0,8	1,0	0,6	1,0	1,1	0,9	1,0	0,6	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	0,6	0,6	0,7	0,3	0,6	0,9	0,6	0,7	0,1	0,7	0,5	0,7
Hipnosedantes (sin receta)	1,2	1,1	1,3	0,6	1,4	1,5	1,1	1,3	0,6	1,2	1,1	1,3
Cannabis	9,2	12,9	5,4	21,0	14,3	7,2	4,5	1,8	14,5	9,1	17,0	4,8
Cocaína en polvo	2,1	3,3	0,9	2,6	3,6	2,7	1,1	0,4	0,8	2,2	3,2	1,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	2,2	3,3	1,0	2,7	3,7	2,7	1,1	0,4	1,0	2,2	3,3	1,5
Éxtasis	0,7	1,0	0,3	1,6	1,4	0,4	0,1	0,1	0,5	0,7	1,5	0,2
Anfetaminas/speed	0,6	0,8	0,4	1,5	1,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,6	1,2	0,3
Alucinógenos	0,3	0,5	0,1	1,1	0,5	0,2	0,0	0,0	1,1	0,3	0,8	0,1
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Nuevas sustancias	0,7	1,1	0,3	1,7	1,2	0,6	0,1	0,1	0,9	0,7	1,4	0,3
Ketamina	0,1	0,2	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,5	0,1	0,3	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Spice	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,1	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
Setas mágicas	0,2	0,3	0,1	0,6	0,5	0,1	0,0	0,0	0,3	0,2	0,5	0,1
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.15.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	64,4	73,4	55,3	64,5	66,0	64,4	64,6	62,2	41,3	65,1	65,4	63,9
Tabaco	38,3	41,7	34,8	36,5	42,7	38,9	41,9	28,9	21,2	38,8	40,2	37,2
Binge drinking	15,5	20,8	10,0	25,0	21,3	13,6	11,1	8,2	13,3	15,5	22,8	11,3
Borracheras	7,0	9,5	4,5	18,1	11,1	4,9	2,7	1,3	10,7	6,9	14,0	3,1
Tranquilizantes (con o sin receta)	7,7	5,1	10,4	1,9	3,6	6,8	11,2	14,5	1,6	7,9	2,9	10,4
Somníferos (con o sin receta)	4,0	2,6	5,5	0,8	1,8	3,5	5,6	8,2	0,6	4,1	1,4	5,5
Hipnosedantes (con o sin receta)	8,9	5,8	12,1	2,2	4,2	7,7	12,7	17,2	1,8	9,1	3,4	12,0
Tranquilizantes (sin receta)	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3	0,5	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3	0,5
Somníferos (sin receta)	0,3	0,3	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3
Hipnosedantes (sin receta)	0,6	0,6	0,5	0,3	0,5	0,7	0,5	0,7	0,3	0,6	0,4	0,6
Cannabis	6,6	9,8	3,4	14,7	10,5	5,4	3,3	1,2	7,7	6,6	12,2	3,5
Cocaína en polvo	1,0	1,7	0,4	0,8	1,5	1,5	0,8	0,2	0,2	1,0	1,2	0,9
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	1,0	1,7	0,4	0,8	1,5	1,5	0,8	0,2	0,2	1,0	1,2	0,9
Éxtasis	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,3	0,4	0,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,3	0,5	0,1
Alucinógenos	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias	0,3	0,5	0,2	0,8	0,5	0,3	0,1	0,0	0,2	0,3	0,6	0,2
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Piperazinas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Setas mágicas	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0
Research chemicals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.16.

Prevalencia de consumo diario de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL	SEXO		EDAD								
		Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64	15-34	35-64
Alcohol	9,8	15,0	4,5	0,9	4,5	8,0	15,4	19,3	0,2	10,1	3,0	13,6
Tabaco	30,8	33,6	28,0	25,8	34,2	31,8	35,2	23,9	11,7	31,4	30,7	30,8
Tranquilizantes (con o sin receta)	5,9	3,7	8,1	1,2	2,3	5,0	8,9	11,6	0,9	6,0	1,9	8,1
Somníferos (con o sin receta)	3,1	1,9	4,3	0,5	1,1	2,5	4,7	6,3	0,4	3,2	0,9	4,3
Hipnosedantes (con o sin receta)	6,8	4,3	9,4	1,4	2,6	5,6	10,2	13,8	1,1	7,0	2,1	9,4
Cannabis	1,9	3,0	0,9	3,6	3,4	1,7	1,0	0,4	2,0	1,9	3,5	1,1

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.17.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (número estimado). España, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Tabaco	142.282	76.539	65.743
Cannabis	168.677	83.932	84.745
Cocaína (polvo)	38.551	21.784	16.767

Incidencia = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.18.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (tasa por mil habitantes) España, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Tabaco	4,4	4,7	4,2
Cannabis	5,3	5,2	5,4
Cocaína (polvo)	1,2	1,3	1,1

Tasa = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses (total y por sexo) DIVIDIDO entre la población (total y por sexo) del padrón continuo (INE) a 1 enero 2012 MULTIPLICADO por 1.000.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.19.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (número estimado). España, 2013.

	Total	Menores edad	Mayores edad
	(15-64 años)	(15-17 años)	(18-64 años)
Tabaco	142.282	80.925	61.357
Cannabis	168.677	61.085	107.592
Cocaína (polvo)	38.551	3.442	35.109

Incidencia = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.20.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (tasa por mil habitantes) España, 2013.

	Total	Menores edad	Mayores edad					
	(15-64)	(15-17)	(18-64)	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Tabaco	4,4	62,3	2,1	27,5	1,0	0,7	0,0	0,0
Cannabis	5,3	47,0	3,6	30,5	1,6	1,2	0,3	0,1
Cocaína (polvo)	1,2	2,6	1,1	6,5	1,0	0,1	0,0	0,0

Tasa = número de personas que inician el consumo en los últimos 12 meses (total y por edad) DIVIDIDO entre la población (total y por edad del padrón continuo (INE) a 1 enero 2012 MULTIPLICADO por 1.000.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.21.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7
Cannabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	12,0	9,4
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9
Inhalables volátiles	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,0	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16,0	7,1	13,8	10,7	21,0	12,3	24,0
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3	5,1	12,2

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.22.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7
Cannabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4	5,6	13,4
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9	2,4	7,1
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9	0,8	1,0
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7	0,5	0,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.23.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9
Cannabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tranquilizantes (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5	2,9	10,4
Somníferos (con/sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1,0	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7	1,4	5,5

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.24.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1995-2013.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0	44,2	37,2
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9	83,2	73,4
Cannabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5	12,9	5,4
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4	1,0	0,3
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,5	0,1
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	1,0
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2	7,3	14,0
Tranquilizantes (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0	0,8	1,0
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9	3,7	7,3
Somníferos (sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7	0,6	0,7
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3	8,5	16,0
Hipnosedantes (sin receta)	8,2	1,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2	1,1	1,3

H = Hombres; M = Mujeres.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.25.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7	41,7	34,8
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2	73,4	55,3
Cannabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8	9,8	3,4
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Tranquilizantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6	5,1	10,4
Somníferos (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7	2,6	5,5
Hipnosedantes (con o sin receta)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4	5,8	12,1

H = Hombres; M = Mujeres.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.26.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (años). España, 2013.

	Edad media inicio en consumo de tabaco	Edad media inicio en consumo de tabaco diario	Edad media inicio en consumo de alcohol	Edad media inicio en consumo de cannabis
Andalucía	16,3	19,0	16,8	18,6
Aragón	16,2	18,2	16,2	19,1
Asturias	16,0	18,3	16,5	18,5
Baleares	16,6	18,2	16,7	18,7
Canarias	16,5	18,3	17,1	18,6
Cantabria	15,9	18,0	16,4	18,4
Castilla-La Mancha	16,6	18,5	16,7	18,4
Castilla y León	16,1	18,3	16,1	19,5
Cataluña	16,5	18,3	16,7	18,5
C. Valenciana	16,3	18,6	16,4	18,5
Extremadura	15,8	18,3	16,5	18,0
Galicia	16,3	19,2	16,2	18,6
Madrid	16,6	18,7	17,2	18,3
Murcia	16,3	17,5	16,5	18,7
Navarra	16,5	19,9	16,3	18,8
País Vasco	16,3	18,6	16,6	18,7
La Rioja	16,2	18,8	16,5	19,1
Ceuta	18,0	21,5	17,8	20,5
Melilla	16,6	19,0	17,3	19,0
Media España	16,4	18,6	16,7	18,6

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.27.


Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Andalucía	92,3	79,4	65,3
Aragón	95,0	84,3	68,6
Asturias	97,3	87,0	71,9
Baleares	93,1	80,6	65,5
Canarias	91,6	72,3	55,6
Cantabria	93,3	74,8	48,4
Castilla-La Mancha	90,8	66,8	53,8
Castilla y León	95,4	78,7	62,9
Cataluña	91,3	77,9	65,8
C. Valenciana	94,7	81,2	65,6
Extremadura	94,3	74,1	56,0
Galicia	95,5	79,9	66,9
Madrid	93,9	77,7	65,6
Murcia	89,2	73,1	65,5
Navarra	92,1	81,9	65,2
País Vasco	96,9	84,9	69,8
La Rioja	89,2	81,7	69,9
Ceuta	70,0	45,7	35,7
Melilla	65,5	46,0	37,0
Media España	93,1	78,3	64,4

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.28.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.29.

Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.30.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.


	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	21,9	29,2	14,6
Aragón	19,7	24,4	14,7
Asturias	14,8	22,2	7,6
Baleares	18,1	22,0	14,0
Canarias	17,5	24,3	10,5
Cantabria	16,3	22,2	10,4
Castilla-La Mancha	11,4	15,1	7,4
Castilla y León	14,7	18,3	10,8
Cataluña	18,7	24,4	12,8
C. Valenciana	18,7	25,1	12,2
Extremadura	22,0	32,2	11,4
Galicia	21,9	30,7	13,2
Madrid	17,0	23,3	10,9
Murcia	21,7	27,6	15,4
Navarra	32,9	39,2	26,4
País Vasco	22,1	29,9	14,2
La Rioja	24,0	32,3	15,4
Ceuta	11,8	17,5	5,5
Melilla	12,3	16,3	7,8
Media España	19,1	25,4	12,6

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.31.

Prevalencias de borracheras en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.

	Últimos 12 meses
Andalucía	21,9
Aragón	19,7
Asturias	14,8
Baleares	18,1
Canarias	17,5
Cantabria	16,3
Castilla-La Mancha	11,4
Castilla y León	14,7
Cataluña	18,7
C. Valenciana	18,7
Extremadura	22,0
Galicia	21,9
Madrid	17,0
Murcia	21,7
Navarra	32,9
Pais Vasco	22,1
La Rioja	24,0
Ceuta	11,8
Melilla	12,3
Media España	19,1



1.1.32.

Prevalencias de borracheras en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.


	TOTAL últimos 30 días	HOMBRES últimos 30 días	MUJERES últimos 30 días
Andalucía	7,7	10,6	4,7
Aragón	7,4	8,2	6,5
Asturias	4,5	6,5	2,4
Baleares	7,0	8,2	5,8
Canarias	6,9	10,0	3,7
Cantabria	8,2	10,8	5,5
Castilla-La Mancha	5,3	6,7	3,7
Castilla y León	6,7	8,1	5,2
Cataluña	7,4	10,2	4,5
C. Valenciana	5,1	7,0	3,3
Extremadura	7,9	11,3	4,2
Galicia	8,2	11,9	4,6
Madrid	6,5	8,6	4,6
Murcia	8,4	10,5	6,2
Navarra	11,3	15,3	7,1
País Vasco	7,3	10,9	3,7
La Rioja	9,8	15,2	4,2
Ceuta	3,7	5,7	1,6
Melilla	4,2	4,6	3,6
Media España	7,0	9,5	4,5

Media nacional 7,0%

< media España

> media España

= media España




FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.33.

Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.


	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Andalucía	19,2	25,6	12,7
Aragón	17,6	23,3	11,4
Asturias	11,2	15,2	7,3
Baleares	9,7	12,7	6,5
Canarias	14,7	22,0	7,2
Cantabria	9,1	12,1	6,1
Castilla-La Mancha	12,1	16,8	7,0
Castilla y León	13,3	17,3	9,0
Cataluña	13,6	17,6	9,5
C. Valenciana	9,1	13,4	4,9
Extremadura	18,3	26,6	9,5
Galicia	16,2	23,8	8,5
Madrid	20,3	27,0	13,9
Murcia	11,4	14,3	8,4
Navarra	16,3	17,3	15,2
País Vasco	19,0	25,8	12,0
La Rioja	19,9	26,2	13,3
Ceuta	5,1	7,5	2,4
Melilla	6,9	9,1	4,5
Media España	15,5	20,8	10,0



1.1.34.

Prevalencias de hacer botellón en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.


	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	16,4	18,6	14,2
Aragón	13,0	14,0	12,0
Asturias	8,0	9,2	6,9
Baleares	8,3	9,8	6,8
Canarias	11,1	13,5	8,7
Cantabria	9,4	11,9	6,8
Castilla-La Mancha	12,5	13,3	11,7
Castilla y León	11,3	13,4	9,2
Cataluña	11,0	12,4	9,5
C. Valenciana	11,2	13,5	8,8
Extremadura	24,3	25,7	22,8
Galicia	10,5	13,1	7,9
Madrid	11,2	12,8	9,7
Murcia	18,8	21,9	15,6
Navarra	10,6	10,1	11,1
País Vasco	10,8	12,0	9,5
La Rioja	14,1	18,9	9,0
Ceuta	11,7	14,0	9,0
Melilla	9,5	12,1	6,5
Media España	12,6	14,4	10,7



1.1.35.


Prevalencias de hacer botellón y consumir alcohol en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según sexo (porcentajes). España, 2013.

	TOTAL últimos 12 meses	HOMBRES últimos 12 meses	MUJERES últimos 12 meses
Andalucía	14,8	17,0	12,5
Aragón	10,4	11,2	9,4
Asturias	7,9	9,1	6,7
Baleares	7,7	8,8	6,6
Canarias	9,8	11,8	7,8
Cantabria	9,0	11,4	6,5
Castilla-La Mancha	10,0	11,3	8,6
Castilla y León	10,3	11,7	8,9
Cataluña	9,1	10,4	7,8
C. Valenciana	10,4	12,6	8,1
Extremadura	21,1	23,8	18,2
Galicia	9,8	12,2	7,5
Madrid	9,8	11,4	8,3
Murcia	16,8	19,7	13,7
Navarra	10,5	9,8	11,1
País Vasco	10,0	11,0	9,0
La Rioja	13,5	17,6	9,0
Ceuta	11,0	12,7	9,0
Melilla	8,3	10,3	6,0
Media España	11,1	12,9	9,3




1.1.36.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.37.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.38.


Prevalencias de consumo de cannabis entre la población de 15-64 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Andalucía	25,1	8,0	5,5
Aragón	29,2	7,7	5,3
Asturias	27,9	5,4	3,3
Baleares	32,4	12,9	10,7
Canarias	33,8	9,3	6,8
Cantabria	36,2	6,0	4,5
Castilla-La Mancha	23,5	6,4	4,6
Castilla y León	25,3	6,1	3,2
Cataluña	35,1	11,9	8,9
C. Valenciana	34,6	10,8	7,7
Extremadura	29,9	8,4	5,5
Galicia	30,5	8,4	6,1
Madrid	30,1	9,1	7,0
Murcia	26,6	9,4	7,5
Navarra	31,2	10,3	7,4
País Vasco	36,9	10,3	7,2
La Rioja	34,6	11,1	6,6
Ceuta	16,2	3,7	3,4
Melilla	16,0	5,8	4,2
Media España	30,4	9,2	6,6

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.39.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.




1.1.40.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años según Comunidad/Ciudad Autónoma (porcentajes). España, 2013.



1.1.41.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas y edad media de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.42.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Alguna vez en la vida	91,0	88,8	95,2	92,3	94,1	92,7	96,2	92,3	97,8	88,7
Últimos 12 meses	83,1	79,4	86,5	75,9	82,3	73,5	82,5	72,5	81,1	66,6
Últimos 30 días	68,0	60,8	74,8	57,0	72,9	55,2	75,2	54,5	74,5	49,8
Diariamente en los últimos 30 días	1,3	0,5	7,2	1,7	11,9	3,8	23,9	7,3	29,7	8,7
Nunca	9,0	11,2	4,8	7,7	5,9	7,3	3,8	7,7	2,2	11,3

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.43.

Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.44.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2013.

	15 - 64 años			15 - 34 años			35 - 64 años		
	Días laborables	Jueves	Fin de semana	Días laborables	Jueves	Fin de semana	Días laborables	Jueves	Fin de semana
Vino/champán	20,7	20,3	39,0	6,9	6,8	20,0	27,9	27,5	49,8
Cerveza/sidra	32,3	34,5	69,5	25,5	29,6	68,3	35,9	37,0	70,3
Aperitivos/vermut	0,5	0,5	3,3	0,4	0,4	2,1	0,5	0,6	4,0
Combinados/cubatas	1,2	2,7	35,7	1,4	4,6	59,9	1,2	1,7	21,9
Licores de frutas	0,3	0,4	2,7	0,3	0,6	3,2	0,2	0,2	2,3
Licores fuertes	0,9	1,0	5,9	0,4	0,7	6,5	1,1	1,2	5,6
Cualquier bebida alcohólica	45,7	47,9	99,1	29,9	34,6	99,3	53,9	54,9	99,0

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES)

1.1.45.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.46.

Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.47.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.48.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.49.

Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	
Borracheras																			
últimos 30 días	10,9	13,0	8,1	28,2	32,6	23,0	16,9	21,0	11,4	7,6	9,1	5,4	4,1	5,6	2,3	2,1	2,7	1,1	

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.50.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.51.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.52.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2013.



1.1.53.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



1.1.54.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.55.

Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Hacer botellón	52,2	56,2	47,9	17,4	21,3	13,4	3,3	4,3	2,2	1,4	1,3	1,5	0,9	1,2	0,5	51,4	53,7	49,0
Hacer botellón y beber alcohol	48,6	52,2	44,7	15,7	19,9	11,4	2,5	3,3	1,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,1	47,6	49,4	45,8

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Prevalencia de hacer botellón y del consumo de bebidas alcohólicas en botellones, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.57.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)*, según haya hecho botellón en el último año o no. España, 2013.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	29,4	45,3	30,3	51,4
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	87,8	91,1	89,2	92,4

* Eliminando los casos que han contestado Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.58.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre la población según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Ninguna sustancia	1,2	14,4	0,9	26,4
Una sustancia	37,8	45,6	39,9	45,3
Dos sustancias	32,6	30,3	31,1	19,1
Tres sustancias	20,2	7,9	21,1	7,9
Cuatro sustancias	4,7	1,4	3,7	0,9
Cinco o más sustancias	3,5	0,5	3,2	0,4

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.59.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥ 20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Consumo riesgo																		
(AUDIT ≥ 8)	6,4	9,7	2,6	11,8	16,0	7,1	7,5	11,7	2,4	5,1	8,0	1,6	4,6	6,8	2,1	4,3	7,5	0,3
Posible dependencia																		
(AUDIT ≥ 20)	0,5	0,8	0,1	0,6	0,9	0,3	0,4	0,6	0,2	0,3	0,6	0,0	0,7	1,1	0,1	0,5	0,9	0,0

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.60.

Prevalencia del consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) y de posible dependencia al alcohol (AUDIT ≥ 20), entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



1.1.61.

Prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, borracheras en los últimos 30 días y binge drinking en los últimos 30 días entre la población que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) o no (AUDIT < 8) (porcentajes) entre la población de 15 a 64 años. España, 2013.

	Consumidores de riesgo (AUDIT ≥ 8)	No consumidores de riesgo (AUDIT < 8)
Borracheras últimos 12 meses	77,8	21,0
Binge drinking últimos 30 días	87,5	15,5
Borracheras últimos 30 días	53,1	6,1

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.62.

Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo	No consumidores de riesgo
	(AUDIT \geq 8)	(AUDIT <8)
Fumar un paquete de tabaco diario	82,2	88,7
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	20,3	39,2
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	74,2	90,9
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	33,3	58,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	56,7	81,9
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	50,8	54,8
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	72,3	77,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	57,8	72,5
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	86,1	95,1
Consumir éxtasis una vez por semana o más	97,1	99,1
Probar cocaína una o dos veces en su vida	52,6	70,2
Consumir cocaína una vez o menos al mes	81,1	93,8
Consumir cocaína una vez por semana o más	96,4	99,1
Consumir heroína una vez o menos al mes	94,5	97,2
Consumir heroína una vez por semana o más	98,5	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) una vez o menos al mes	86,0	94,3
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	80,2	88,9
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	92,1	97,3
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	98,0	99,6
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	87,8	96,4
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	96,2	98,9
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	84,7	94,7
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	94,9	98,9
Consumir ketamina una vez o menos al mes	92,7	97,5
Consumir ketamina una vez por semana o más	98,2	99,7

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.63.

Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje que se encuentra frecuente o muy frecuente cada situación en el lugar donde vive), en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT), según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) o no (AUDIT <8), (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (AUDIT \geq 8)	No consumidores de riesgo (AUDIT <8)
Jeringuillas en el suelo	2,6	1,8
Personas inyectándose drogas	2,4	1,1
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio	4,6	2,2
Personas drogadas caídas en el suelo	7,9	3,3
Vendedores que ofrecen drogas	16,4	9,2
Personas esnifando drogas por la nariz (por ejemplo en el baño de bares o discotecas, en portales, coches, etc.)	19,4	7,6
Personas fumando porros	68,3	53,6
Personas haciendo botellón	53,6	43,0

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.64.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha consumido alcohol en el último año (y contesta AUDIT) según se presente un consumo de riesgo de alcohol (AUDIT \geq 8) o no (AUDIT <8) (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (AUDIT \geq 8)	No consumidores de riesgo (AUDIT <8)
Solo alcohol y/o tabaco y/o hipnosedantes y/o inhalables volátiles	56,8	90,1
Una sustancia	25,6	8,3
Dos sustancias	10,3	1,1
Tres sustancias	3,7	0,3
Cuatro sustancias	2,1	0,1
Cinco o más sustancias	1,4	0,0

* Cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.65.

Características de la población de 15 a 64 años que ha que ha consumido alcohol en el último año según tenga un consumo de riesgo (AUDIT \geq 8) o no (AUDIT $<$ 8) (porcentajes). España, 2013.

	18 a 24 años		25 a 34 años		35 a 44 años		45 a 54 años		55 a 64 años	
	AUDIT \geq 8	AUDIT $<$ 8	AUDIT \geq 8	AUDIT $<$ 8	AUDIT \geq 8	AUDIT $<$ 8	AUDIT \geq 8	AUDIT $<$ 8	AUDIT \geq 8	AUDIT $<$ 8
Sexo										
Hombre	71,1	49,8	85,3	52,1	85,6	52,9	78,1	51,1	96,5	53,8
Mujer	28,9	50,2	14,7	47,9	14,4	47,1	21,9	48,9	3,5	46,2
Situación laboral										
Trabajando	16,1	17,5	45,6	56,5	61,4	61,2	51,0	56,7	37,0	33,5
Parado	25,6	18,4	36,4	28,9	31,7	27,0	23,8	23,6	18,7	14,5
Nivel de estudios										
Primarios	15,9	11,2	13,3	6,1	19,6	8,6	24,5	14,4	32,9	30,1
Secundarios	78,9	81,5	70,4	65,9	69,2	65,3	65,4	66,2	50,1	54,4
Universitarios	5,2	7,4	16,4	28,0	11,2	26,1	10,1	19,4	17,0	15,5
Estado civil										
Soltero	97,6	94,9	77,0	65,2	44,8	26,9	19,4	14,5	15,3	8,5
Casado	1,9	4,8	18,0	32,3	43,5	64,0	58,0	72,9	59,6	76,1
Separado/Divorciado	0,5	0,2	3,9	2,4	11,5	8,5	19,9	11,1	19,8	8,9
Nº de días que ha consumido alcohol en los últimos 30 días										
Entre 1 y 3 días	19,9	39,1	12,6	31,4	10,7	28,0	4,7	24,1	3,1	20,6
Entre 4 y 9 días	49,4	28,3	34,4	28,9	19,2	28,3	7,7	22,8	8,3	20,0
Entre 10 y 19 días	16,6	7,6	21,7	12,2	19,2	11,8	13,4	12,1	12,1	11,1
Entre 20 y 29 días	5,5	1,4	12,6	3,1	12,1	4,7	21,4	5,4	14,7	7,0
30 días	3,4	0,9	16,7	4,7	35,0	8,9	49,5	18,7	61,8	25,2
No he tomado bebidas alcohólicas durante los últimos 30 días	5,3	22,7	2,1	19,6	3,7	18,3	3,3	16,9	0,0	16,2
Borracheras										
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	93,6	45,7	88,4	33,0	77,0	18,1	59,6	9,3	38,5	4,0
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	70,0	16,2	59,9	10,2	50,7	3,9	36,4	2,0	21,9	0,9
Binge drinking: ha hecho binge drinking en los últimos 30 días										
	87,9	23,6	87,7	21,8	88,9	14,0	84,7	11,1	87,4	8,0
Percepción de riesgo										
% que opina que tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana puede causar bastantes o muchos problemas	19,9	37,1	17,3	34,9	19,5	36,3	20,8	42,4	29,4	46,7
% que opina que tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día puede causar bastantes o muchos problemas	81,5	90,7	75,5	90,3	74,3	90,6	64,0	91,2	66,5	92,2

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.66.

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Prevalencia bebedores de riesgo	5,0	8,0	1,9	9,5	13,3	5,6	6,1	10,1	1,8	4,0	6,6	1,2	3,5	5,6	1,5	3,2	6,1	0,2

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.67.


Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥ 8) entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.69.

Prevalencia de consumo diario de tabaco en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.70.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.71.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013.



1.1.72.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 a 64 años			15 a 34 años			35 a 64 años		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Hipnosedantes con o sin receta									
Alguna vez	22,2	16,8	27,6	13,4	11,0	15,9	27,0	20,0	34,1
Último año	12,2	8,5	16,0	6,4	4,8	8,0	15,5	10,6	20,5
Último mes	8,9	5,8	12,1	3,4	2,6	4,2	12,0	7,6	16,4
A diario	6,8	4,3	9,4	2,1	1,5	2,8	9,4	5,8	13,0
Tranquilizantes/sedantes con o sin receta									
Alguna vez	20,1	15,1	25,3	12,3	10,1	14,7	24,5	17,9	31,1
Último año	10,6	7,3	14,0	5,6	4,2	7,1	13,4	9,0	17,9
Último mes	7,7	5,1	10,4	2,9	2,3	3,5	10,4	6,6	14,2
A diario	5,9	3,7	8,1	1,9	1,3	2,4	8,1	5,1	11,2
Somníferos con o sin receta									
Alguna vez	9,6	7,1	12,3	5,1	3,8	6,3	12,2	8,9	15,6
Último año	5,5	3,7	7,3	2,4	1,8	3,1	7,1	4,8	9,5
Último mes	4,0	2,6	5,5	1,4	1,0	1,8	5,5	3,4	7,5
A diario	3,1	1,9	4,3	0,9	0,7	1,1	4,3	2,6	6,0

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.73.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en últimos 12 meses y últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013.




	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
Hombres	8,5	5,8
Mujeres	16,0	12,1
Total	12,2	8,9

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.75.


Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.76.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.77.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2013.



1.1.78.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años. España, 2005-2013.



1.1.79.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.


	15 a 64 años			15 a 34 años			35 a 64 años		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Hipnosedantes sin receta									
Alguna vez	2,7	2,6	2,8	2,3	2,1	2,6	2,8	2,8	2,9
Último año	1,2	1,1	1,3	1,1	0,9	1,3	1,3	1,2	1,4
Último mes	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,6
Tranquilizantes sin receta									
Alguna vez	2,2	2,1	2,2	1,9	1,8	2,0	2,3	2,3	2,3
Último año	0,9	0,8	1,0	0,8	0,6	1,1	1,0	1,0	1,0
Último mes	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,5
Somníferos sin receta									
Alguna vez	1,5	1,5	1,5	1,0	0,9	1,2	1,7	1,8	1,6
Último año	0,6	0,6	0,7	0,5	0,3	0,6	0,7	0,7	0,8
Último mes	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,2

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.80.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.81.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ha consumido hipnosedantes sin receta	No ha consumido hipnosedantes sin receta
Ninguna sustancia	0,0	13,8
Una sustancia	11,0	44,8
Dos sustancias	38,1	30,1
Tres sustancias	27,8	9,0
Cuatro sustancias	13,8	1,6
Cinco o más sustancias	9,3	0,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.82.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.83.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.84.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.85.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.



1.1.86.

Prevalencia de personas que han consumido tabaco y cannabis en los últimos 12 meses según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
7,8	11,0	4,6	17,0	21,9	11,9	12,4	18,3	6,4	6,2	9,1	3,2	4,1	5,5	2,8	1,5	2,5	0,5	11,5	14,2	8,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.87.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 30 días según sexo y edad en la población de 15 a 64 años (%). España, 2013.


15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-17 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
5,8	8,7	2,9	12,5	17,1	7,7	9,3	14,2	4,3	4,8	7,2	2,1	2,9	4,5	1,5	1,0	1,8	0,2	6,6	9,4	3,6

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.88.

Categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado la escala. España, 2013.



1.1.89.

Prevalencia de consumo de riesgo, consumo de bajo riesgo y consumo no problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según sexo y edad (%). España, 2013.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años			15-17 años		
	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M
Consumo riesgo (% positivos CAST \geq 4)	25,0	29,0	15,2	24,0	26,7	17,1	27,1	33,3	11,4	20,4	25,5	10,2
Consumo bajo riesgo (% positivos CAST = 2 o 3)	27,8	30,1	22,0	29,4	32,1	22,9	24,5	26,2	20,1	23,5	23,5	23,4
Consumo no problemático (% positivos CAST = 0 o 1)	47,2	40,9	62,8	46,6	41,1	60,0	48,4	40,5	68,5	56,1	51,0	66,4

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.90.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general (porcentajes)*. España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST \geq 4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Cannabis	91,4	90,8	64,6
Heroína	47,3	38,1	31,6
Cocaína	76,6	70,8	46,9
Alucinógenos	56,0	47,6	33,0
Éxtasis u otras drogas de síntesis	60,3	48,6	32,7
GHB o éxtasis líquido	48,0	35,4	27,5
Anfetaminas o speed	61,7	50,0	32,6
Setas mágicas	48,7	40,5	27,7
Ketamina	46,2	34,5	26,2

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.91.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST \geq 4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Fumar un paquete de tabaco diario	77,8	83,1	88,7
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	22,6	22,9	43,5
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	79,9	85,6	90,7
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	11,6	15,3	61,2
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	29,3	44,1	82,4
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	51,6	46,6	57,6
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	75,0	75,3	78,5
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	45,7	49,0	74,8
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	77,0	86,6	95,1
Consumir éxtasis una vez por semana o más	94,8	96,8	99,0
Probar cocaína una o dos veces en su vida	39,4	43,8	72,4
Consumir cocaína una vez o menos al mes	72,5	81,1	93,8
Consumir cocaína una vez por semana o más	95,8	96,7	99,0
Consumir heroína una vez o menos al mes	93,3	94,6	97,2
Consumir heroína una vez por semana o más	98,7	99,1	99,6
Consumir alucinógenos (ácidos, tripsis, LSD) una vez o menos al mes	81,5	86,7	94,4
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	77,6	80,4	89,5
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	87,6	93,4	97,2
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	96,2	99,0	99,5
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	81,8	90,0	96,3
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	94,9	97,3	98,9
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	79,1	84,0	94,8
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	94,3	95,9	98,8
Consumir ketamina una vez o menos al mes	90,7	94,0	97,4
Consumir ketamina una vez por semana o más	97,8	98,9	99,6

% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años que ha contestado a CAST, según tengan un consumo de riesgo de cannabis o no, y entre la población general. (porcentajes). España, 2013.

	Consumidores de riesgo (CAST ≥4)	No consumidores de riesgo (CAST <4)	Población general
Alcohol	88,7	96,7	78,3
Tabaco	91,4	84,1	40,7
Hipnosedantes	19,0	11,1	12,2
Cocaína (polvo y/o base)	29,0	14,6	2,2
Éxtasis	9,3	4,4	0,7
Anfetaminas/speed	9,6	4,4	0,6
Alucinógenos	4,5	2,8	0,3
Heroína	1,5	0,3	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,5	0,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.93.

Características de la población de 15 a 64 años de edad que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥ 4) o no (CAST < 4) y entre la población general (porcentajes). España, 2013.

	15 a 24 años			25 a 34 años			35 a 64 años		
	CAST ≥ 4	CAST < 4	P. GRAL.	CAST ≥ 4	CAST < 4	P. GRAL.	CAST ≥ 4	CAST < 4	P. GRAL.
Sexo									
Hombre	76,1	64,1	51,1	82,0	72,9	50,6	88,2	66,0	50,2
Mujer	23,9	35,9	48,9	18,0	27,1	49,4	11,8	34,0	49,8
Situación laboral									
Trabajando	14,6	18,6	16,6	38,3	49,6	53,6	34,9	52,8	48,7
Parado	37,6	24,2	20,1	47,9	36,1	30,0	41,7	34,4	22,7
Nivel de estudios									
Primarios	26,6	12,8	14,2	14,9	7,3	7,7	18,5	14,5	19,0
Secundarios	72,7	80,7	79,1	78,0	67,5	66,9	71,0	66,1	61,9
Universitarios	0,8	6,5	6,8	7,2	25,2	25,4	10,5	19,4	19,1
Nº de días que ha consumido cannabis en los últimos 30 días									
Entre 1-3 días	7,4	25,7	4,3	10,0	21,9	2,5	7,7	25,7	1,0
Entre 4-9 días	14,0	15,2	3,1	7,1	12,7	1,7	14,0	13,7	0,7
Entre 10-19 días	13,2	12,1	2,4	12,4	12,4	1,7	18,9	7,4	0,5
Entre 20-29 días	12,0	4,3	1,3	13,9	6,6	1,1	12,4	5,1	0,3
30 días	45,8	9,5	3,6	48,3	17,3	3,4	41,9	17,0	1,1
No ha consumido cannabis o marihuana en los últimos 30 días	7,7	33,2	23,2	8,2	29,1	31,1	5,1	31,0	21,4
Nunca ha consumido cannabis	0,0	0,0	62,1	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	75,1
Percepción de riesgo									
Porcentaje que opina que fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes puede causar bastantes o muchos problemas	5,3	19,1	52,3	11,6	15,3	51,8	16,6	11,3	66,4
Porcentaje que opina que fumar hachís o marihuana una vez por semana o más puede causar bastantes o muchos problemas	24,7	49,4	77,7	29,6	45,3	77,4	32,9	37,2	85,2
Borracheras									
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	78,9	73,1	41,4	60,7	65,2	29,7	48,2	40,6	10,4
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	48,9	41,2	18,1	29,9	28,4	11,1	24,3	17,1	3,1
Binge drinking: Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días									
	62,8	50,7	25,0	49,9	47,2	21,3	45,0	36,5	11,3
Consumo de otras drogas ilegales (cocaína polvo, base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos). Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses									
	28,4	14,2	4,1	41,3	19,2	4,6	35,1	21,4	1,8
Consumo de spice. Ha consumido alguna vez en la vida									
	1,4	1,7	0,4	8,5	3,2	1,0	10,8	3,3	0,4

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.94.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.95.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según sexo. España, 1999-2013.



1.1.96.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad. España, 1999-2013.




1.1.97.

Continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2013.




1.1.98.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.99.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.




1.1.100.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.101.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.102.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.103.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.104.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.105.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.106.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.107.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




1.1.108.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.109.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 2013.




1.1.110.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.111.

Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.112.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.113.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según grupo de edad y sexo (porcentajes). España, 2013.



1.1.114.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años, según sexo. España, 2013.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ninguna sustancia	4,4	3,3	5,6	13,6	10,4	16,9	23,0	17,2	29,0
Una sola sustancia	19,6	17,4	21,8	44,3	44,5	44,2	43,3	44,6	42,0
Dos sustancias	36,3	35,9	36,8	30,2	31,1	29,3	26,2	28,5	23,9
Tres sustancias	24,3	24,1	24,5	9,3	10,3	8,2	6,2	7,8	4,6
Cuatro sustancias	8,2	9,2	7,1	1,8	2,5	1,0	1,0	1,5	0,4
Cinco o más sustancias	7,2	10,2	4,1	0,9	1,2	0,5	0,3	0,4	0,2


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.115.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* alguna vez en la vida en la población de 15-64 años. España, 2013.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.116.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* alguna vez en la vida (porcentajes) en la población de 15-64 años. España, 2013.



1.1.117.

Porcentaje de no consumidores y de consumidores de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses, según edad y sexo en la población de 15-64 años. España, 2013.




	15-24 años		25-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Ninguna droga	12,9	17	8,6	16,8	10,4	16,9	9,7	15,2	11,4	19,4
Una droga	40,7	42,6	39,3	43,2	45,3	46,1	45,4	42,1	51,6	46,6
Dos drogas	23,5	26,4	31,2	30,6	32,2	28,8	35,3	32,1	30,7	26,9
Tres drogas	18,1	10,6	14,5	7,3	7,9	6,9	7,1	9,8	6,1	6,9

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles. H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.118.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013.



1.1.119.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes) entre la población de 15-64 años que ha consumido alguna sustancia psicoactiva. España, 2013.



1.1.120.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas* según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes de columna) entre la población de 15-64 años. España, 2013.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	85,6	95,0	98,6	99,5	98,6
Tabaco	9,8	82,3	96,7	97,1	94,3
Cannabis	0,2	4,2	58,5	92,8	94,1
Éxtasis	0,0	0,1	0,9	7,2	48,1
Hipnosedantes	4,5	17,9	40,6	41,0	42,5
Cocaína en polvo	0,0	0,3	4,1	52,7	84,4
Cocaína base	0,0	0,0	0,2	0,9	6,5
Anfetaminas/speed	0,0	0,1	0,3	4,2	57,2
Alucinógenos	0,0	0,1	0,3	4,5	25,4
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	5,3
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.121.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2013.

	15-17	18-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Ninguna sustancia	30,9	13,1	14,9	12,6	13,5	12,5	15,4
Una sola sustancia	39,6	44,5	41,7	41,2	45,7	43,7	49,1
Dos sustancias	17,3	30,6	24,9	30,9	30,5	33,7	28,8
Tres sustancias	10,1	9,2	14,4	11,0	7,4	8,5	6,5
Cuatro sustancias	1,5	1,8	2,3	2,8	2,1	1,3	0,1
Cinco o más sustancias	0,6	0,9	1,8	1,5	0,7	0,3	0,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.122.

Proporción (% en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Éxtasis	Hipnosedantes*	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos
Alcohol	100,0	85,4	94,3	95,8	73,4	96,8	94,2	98,2
Tabaco	44,4	100,0	85,3	81,3	47,2	84,6	84,0	82,9
Cánnabis	11,1	19,3	100,0	74,7	9,6	75,4	81,2	82,3
Éxtasis	0,8	1,3	5,3	100,0	1,1	15,8	46,4	45,1
Hipnosedantes*	11,5	14,2	12,8	21,3	100,0	20,5	21,6	12,5
Cocaína (polvo y/o base)	2,7	4,5	17,7	51,6	3,6	100,0	66,3	46,5
Anfetaminas/speed	0,7	1,3	5,5	43,8	1,1	19,2	100,0	53,4
Alucinógenos	0,4	0,7	3,1	23,1	0,4	7,4	29,5	100,0

* Hipnosedantes (con o sin receta). Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.123.

Proporción (% en filas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes, cocaína, anfetaminas/speed y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2013.

	Alcohol	Tabaco	Cannabis	Éxtasis	Hipnosedantes*	Cocaína (polvo y/o base)	Anfetaminas/speed	Alucinógenos
Alcohol	100,0	44,4	11,1	0,8	11,5	2,7	0,7	0,4
Tabaco	85,4	100,0	19,3	1,3	14,2	4,5	1,3	0,7
Cánnabis	94,3	85,3	100,0	5,3	12,8	17,7	5,5	3,1
Éxtasis	95,8	81,3	74,7	100,0	21,3	51,6	43,8	23,1
Hipnosedantes*	73,4	47,2	9,6	1,1	100,0	3,6	1,1	0,4
Cocaína (polvo y/o base)	96,8	84,6	75,4	15,8	20,5	100,0	19,2	7,4
Anfetaminas/speed	94,2	84,0	81,2	46,4	21,6	66,3	100,0	29,5
Alucinógenos	98,2	82,9	82,3	45,1	12,5	46,5	53,4	100,0

* Hipnosedantes (con o sin receta). Hipnosedantes incluye tranquilizantes y/o somníferos.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.124.

Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes).
España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Estado civil				
Soltero/a	35,1	37,8	53,6	74,0
Casado/a	57,0	51,7	35,5	16,1
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	7,9	10,5	10,9	9,9
Nivel de estudios				
Primarios	16,6	15,2	14,9	13,1
Secundarios	62,7	68,6	70,6	72,8
Universitarios	20,7	16,2	14,5	14,1
Percepción estado de salud				
Buena/muy buena	85,4	82,1	79,4	77,7
Regular	12,4	14,8	16,9	17,3
Mala/muy mala	2,2	3,0	3,7	5,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.125.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de heroína, cocaína u otras sustancias psicoactivas ilegales a través de inyección en la población de 15-64 años, según sexo y grupo de edad (porcentajes).
España, 2013.

Total	Hombre	Mujer	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	15-17 años	18-64 años
0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,5	0,8	0,2	0,0	0,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.126.

Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas*) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas** consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Fumar un paquete de tabaco diario	92,1	85,0	81,3	82,1
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	51,3	36,0	26,5	20,4
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	92,7	89,0	86,4	82,2
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	70,8	56,3	31,5	12,8
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	89,4	80,7	58,5	34,3
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	63,0	53,1	43,2	40,2
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez por semana o más	82,2	75,5	68,1	67,9
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	80,2	72,4	59,1	37,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	96,9	95,1	90,2	73,2
Consumir éxtasis una vez por semana o más	99,5	99,0	97,9	92,9
Probar cocaína una o dos veces en su vida	78,2	70,4	55,1	27,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	96,2	94,4	86,6	61,6
Consumir cocaína una vez por semana o más	99,6	99,0	97,6	92,9
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,7	97,4	95,5	91,1
Consumir heroína una vez por semana o más	99,8	99,5	99,3	98,0
Consumir alucinógenos (ácidos, tripis, LSD) una vez o menos al mes	95,6	95,0	89,9	77,6
Probar cocaína en forma de base o crack 1 ó 2 veces en su vida	91,1	89,4	85,3	72,1
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	97,7	97,8	94,9	85,8
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	99,8	99,5	99,1	96,8
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	97,5	96,8	92,3	78,9
Consumir anfetaminas o speed una vez por semana o más	99,2	99,0	97,8	94,2
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	96,4	95,3	88,3	74,3
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	99,4	98,8	97,3	92,2
Consumir ketamina una vez o menos al mes	97,9	97,8	95,5	88,1
Consumir ketamina una vez por semana o más	99,8	99,6	99,2	96,9

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

** Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes (con o sin receta), cannabis, cocaína (polvo y/o base), éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.127.

Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil*) entre la población de 15 a 64 años según el número de sustancias psicoactivas** consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2013.

	Ninguna o una sustancia (no policonsumo)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Hachís, cannabis, marihuana	58,3	68,2	82,5	91,4
Heroína	29,0	33,3	38,7	40,9
Cocaína	40,6	50,0	64,0	79,2
Alucinógenos (LSD, ácido, tripi...)	28,8	34,8	45,6	53,2
Éxtasis u otras drogas de síntesis	28,2	34,6	45,7	58,5
GHB o éxtasis líquido	24,6	29,0	36,0	40,6
Anfetaminas o speed	28,0	33,9	46,5	61,2
Setas mágicas	24,4	28,5	38,8	44,6
Ketamina	23,4	27,3	35,2	40,0


* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos de ns/nc

** Alcohol, tabaco, hipnosedantes en general, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.128.

Proporción de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir bastantes o muchos problemas (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.129.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas)*. España, 1997-2013.


	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	Diferencia 2013-2011	Diferencia 2013-1997
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6	0,0	0,2
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	-0,8	-0,4
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99,0	99,1	99,0	-0,1	0,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	-0,7	0,3
Probar cocaína una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	77,4	76,5	72,4	-4,1	-
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0	0,1	0,4
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	-0,3	2,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	76,7	78,2	74,8	-3,4	-
Consumir alucinógenos una vez/semana o más	99,1	99,4	98,5	99,1	99,2	-	-	-	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	-2,2	-1,6
Consumir tranquil./som. una vez/semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	-1,4	-2,9
Consumir tranquil./som. una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	-4,9	-2,8
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4	-3,1	-1,6
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	-8,2	-7,7
Probar cocaína base 1 o 2 veces en su vida	-	-	-	-	-	-	95,7	91,8	89,5	-2,3	-
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	-1,0	1,5
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	-5,8	-2,1
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	-0,4	9,0
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	99,4	99,5	0,1	-
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	97,8	97,2	-0,6	-

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.130.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99,0	99,1	99,0
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4
Consumir tranquilizantes/somníferos una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5
Consumir tranquilizantes/somníferos una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83,0	81,6	85,5	82,4
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.131.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Fumar un paquete de tabaco diario	88,7	86,9	90,6	89,1	88,0	88,6	88,2	90,2	91,5	88,6
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	43,5	38,4	48,8	41,2	38,1	42,0	46,2	51,1	51,6	43,3
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	90,7	88,4	93,0	90,9	89,9	90,7	90,7	91,7	94,7	90,6
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	74,8	72,2	77,4	69,6	69,3	72,6	77,7	85,6	73,5	74,8
Probar cocaína una o dos veces en su vida	72,4	69,0	75,8	67,9	67,3	69,9	75,0	82,7	73,3	72,3
Probar cocaína en forma de base o crack una o dos veces en su vida	89,5	88,6	90,5	87,5	87,6	89,5	90,1	93,2	89,6	89,5

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.132.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo una vez o menos al mes de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Fumar hachís o marihuana	61,2	55,9	66,6	52,3	51,8	59,4	66,5	76,6	64,1	61,1
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos	57,6	57,7	57,5	60,3	59,0	56,3	56,0	57,6	68,1	57,3
Consumir éxtasis	95,1	94,1	96,2	93,7	93,6	94,6	95,9	97,8	95,8	95,1
Consumir cocaína	93,8	92,7	95,0	92,4	92,2	93,1	94,5	97,3	93,2	93,9
Consumir heroína	97,2	97,0	97,5	96,3	96,5	97,1	97,6	98,5	95,8	97,3
Consumir alucinógenos	94,4	93,7	95,2	92,6	92,7	93,9	95,7	97,3	93,3	94,5
Consumir GHB o éxtasis líquido	97,2	96,8	97,6	96,3	96,5	97,0	97,5	98,7	97,5	97,2
Consumir anfetaminas o speed	96,3	95,5	97,1	95,5	95,3	95,9	96,9	98,2	96,8	96,3
Consumir setas mágicas	94,8	93,8	95,7	93,2	93,4	94,2	95,7	97,5	95,3	94,7
Consumir ketamina	97,4	97,0	97,8	96,8	96,8	97,2	97,6	98,5	97,5	97,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez por semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo y edad. España, 2013.

	15-64			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-17	18-64
	Total	H	M	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Fumar hachís o marihuana	61,2	55,9	66,6	52,3	51,8	59,4	66,5	76,6	64,1	61,1
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos	57,6	57,7	57,5	60,3	59,0	56,3	56,0	57,6	68,1	57,3
Consumir éxtasis	95,1	94,1	96,2	93,7	93,6	94,6	95,9	97,8	95,8	95,1
Consumir cocaína	93,8	92,7	95,0	92,4	92,2	93,1	94,5	97,3	93,2	93,9
Consumir heroína	97,2	97,0	97,5	96,3	96,5	97,1	97,6	98,5	95,8	97,3
Consumir alucinógenos	94,4	93,7	95,2	92,6	92,7	93,9	95,7	97,3	93,3	94,5
Consumir GHB o éxtasis líquido	97,2	96,8	97,6	96,3	96,5	97,0	97,5	98,7	97,5	97,2
Consumir anfetaminas o speed	96,3	95,5	97,1	95,5	95,3	95,9	96,9	98,2	96,8	96,3
Consumir setas mágicas	94,8	93,8	95,7	93,2	93,4	94,2	95,7	97,5	95,3	94,7
Consumir ketamina	97,4	97,0	97,8	96,8	96,8	97,2	97,6	98,5	97,5	97,4

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.


Evolución de la prevalencia de consumo de un paquete de tabaco diario en los últimos 30 días y riesgo percibido ante el consumo diario de tabaco (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2013.



FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.135.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según sexo. España, 2013.



1.1.136.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez a la semana o más). Porcentaje de la población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas, según edad. España, 2013.



1.1.137.

Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013.



1.1.138.

Evolución de la percepción de disponibilidad de drogas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil)*, entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2013.


	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7
Cocaína	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6
Alucinógenos (LSD)	37,1	37,0	37,2	42,7	40,0	44,8	40,2	48,7	45,4	33,0
GHB o éxtasis líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5
Anfetaminas o speed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7
Ketamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2

*% válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos de ns/nc

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.139.

Prevalencia de consumo de cannabis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.




1.1.140.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.



1.1.141.

Prevalencia de consumo de éxtasis (últimos 12 meses), disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo (consumir una vez o menos al mes puede producir bastantes/muchos problemas) entre la población de 15 a 64 años. España, 1997-2013.



1.1.142.


Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las sustancias psicoactivas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2013.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	Diferencia 2011-2013
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	-4,5
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	5,3
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	-0,8

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.143.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2013.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10,0	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.144.

Visibilidad en el entorno cercano de personas fumando porros o haciendo botellón (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive)*. España, 2013.




1.1.145.

Principales vías de información por las que la población de 15-64 años ha recibido información sobre drogas y por las que le gustaría recibir una información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados con ellas y sus formas de consumo. España, 2013.



1.1.146.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2013.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81,0	78,7
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77,0	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.147.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995, 2003 y 2013.



1.1.148.

Valoración de la legalización del hachís y la marihuana como “muy importante” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	Hombre	Mujer	15 a 24 años	25 a 34 años	35 a 44 años	45 a 54 años	55 a 64 años
Muy importante	35,5	30,5	32,5	35,1	35,5	33,0	27,4
Algo importante	22,9	19,7	22,3	23,8	21,7	19,6	19,1
Nada importante	41,5	49,8	45,2	41,1	42,8	47,4	53,5

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.149.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años (porcentajes)*, según sexo y edad. España, 2013.




1.1.150.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), por sexo. España, 2013.




1.1.151.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en el último año según tenga consumo de riesgo (AUDIT ≥8) o no (AUDIT <8), por edad. España, 2013.




1.1.152.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥4) o no (CAST <4), por sexo (%). España, 2013.




1.1.153.

Percepción del estado de salud, en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en el último año según tenga consumo de riesgo (CAST ≥ 4) o no (CAST < 4), por edad (%). España, 2013.




1.1.154.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según sexo (%). España, 2013.



1.1.155.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años según hayan consumido cocaína (polvo y/o base) en el último año o no, según edad (%). España, 2013.



1.1.156.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años			15-17 años			18-24 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	3,0	4,6	1,3	1,3	2,1	0,4	4,1	5,9	2,3	4,9	7,2	2,5	1,9	3,1	0,7
Últimos 12 meses	0,7	1,1	0,3	0,9	1,6	0,2	1,8	2,5	1,2	1,4	2,1	0,7	0,3	0,4	0,1
Últimos 30 días	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	1,0	1,3	0,6	0,6	0,9	0,3	0,2	0,2	0,1

Pregunta cuestionario: En la actualidad se encuentran disponibles nuevas sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste si las ha consumido alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días.

Total = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.157.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2013.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
Ketamina	0,8	1,4	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,6	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,5	0,9	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.158.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2013.

	15-64 años			15-18 años			15-34 años			35-64 años		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
Ketamina	0,8	1,4	0,3	0,9	1,7	0,0	1,3	2,1	0,6	0,6	1,0	0,2
GHB	0,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,7	1,1	0,2	0,5	0,7	0,2
Spice	0,5	0,9	0,2	0,5	0,3	0,7	0,7	1,2	0,3	0,4	0,7	0,2
Piperazinas	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,3	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1
Metanfetamina	0,5	0,8	0,1	0,2	0,4	0,0	0,7	1,2	0,3	0,4	0,7	0,1
Setas mágicas	1,9	2,9	0,8	1,1	1,9	0,2	3,2	4,7	1,5	1,1	1,9	0,4
Research chemicals	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Legal highs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,2	0,3	0,7	0,0	0,8	1,3	0,3	0,3	0,6	0,1
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).


1.1.159.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, (porcentajes). España, 2011 y 2013.




1.1.160.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2013.




1.1.161.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-18 años (porcentajes). España, 2011 y 2013.



1.1.162.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



1.1.163.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según edad (porcentajes). España, 2011 y 2013.

	2011								2013							
	15-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-34	35-64	15-64	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	15-34	35-64
Ketamina	1,0	1,4	2,0	1,0	0,4	0,0	1,8	0,5	0,8	1,0	1,6	1,2	0,2	0,2	1,3	0,6
GHB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,2	1,0	0,9	0,3	0,1	0,7	0,5
Spice	0,8	1,0	1,4	0,9	0,4	0,1	1,2	0,5	0,5	0,4	1,0	0,8	0,3	0,1	0,7	0,4
Piperazinas	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,1	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,2	0,2	0,5	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,2	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,3	0,1
Metanfetamina	0,8	0,9	1,2	1,0	0,3	0,1	1,1	0,5	0,5	0,5	0,9	0,7	0,2	0,1	0,7	0,4
Setas mágicas	2,4	3,3	4,9	2,1	1,0	0,1	4,3	1,2	1,9	2,2	3,8	2,1	0,7	0,3	3,2	1,1
Research chemicals	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Legal highs	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,9	1,1	1,8	0,8	0,3	0,1	1,5	0,5	0,5	0,4	1,1	0,6	0,2	0,1	0,8	0,3
Esteroides anabolizantes	0,3	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.164.

Prevalencias de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años según sexo (porcentajes). España, 2011 y 2013.

	2011		2013	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Ketamina	1,5	0,5	1,4	0,3
GHB	-	-	0,9	0,2
Spice	1,2	0,3	0,9	0,2
Piperazinas	0,2	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,2	0,0	0,1	0,0
Nexus	0,3	0,1	0,3	0,1
Metanfetamina	1,2	0,3	0,8	0,1
Setas mágicas	3,5	1,2	2,9	0,8
Research chemicals	0,1	0,0	0,1	0,0
Legal highs	0,1	0,1	0,0	0,0
Salvia	1,3	0,4	0,8	0,2
Esteroides anabolizantes	0,5	0,1	0,3	0,1

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.165.

Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de nuevas sustancias psicoactivas (porcentaje* de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo y edad. España, 2013.

	15-64 AÑOS			GRUPOS DE EDAD				
	Total	Hombre	Mujer	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64
Consumir GHB una vez o menos al mes	92,6	92,3	92,8	92,4	93,7	92,4	92,9	91,0
Consumir GHB una vez por semana o más	94,9	95,0	94,9	95,4	96,7	94,7	95,4	92,1
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	89,9	89,0	90,8	88,9	90,4	89,9	90,5	89,2
Consumir setas mágicas una vez por semana o más	93,7	93,4	94,1	93,8	95,3	94,1	93,9	90,8
Consumir ketamina una vez o menos al mes	90,6	90,1	91,1	90,8	92,5	90,8	90,3	88,1
Consumir ketamina una vez por semana o más	92,7	92,6	92,9	93,5	95,2	92,8	92,3	89,4

* % teniendo en cuenta todas las respuestas, incluido Ns/Nc.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.166.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes)*. España, 2013.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
GHB	27,5	29,8	25,1	28,1	29,5	26,7	31,2	34,1	28,2	29,8	33,0	26,3	26,4	27,8	25,0	19,7	21,7	17,8
Setas mágicas	27,7	30,3	24,9	30,4	32,1	28,5	32,3	36,5	28,0	28,7	31,6	25,4	25,9	27,3	24,5	19,3	21,3	17,3
Ketamina	26,2	28,3	24,0	27,1	28,6	25,4	29,8	33,0	26,4	28,1	30,7	25,2	25,2	26,4	24,1	18,9	20,3	17,6


* Eliminando los casos que señalan que han contestado Ns/Nc

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.167.

Lugar de obtención de nuevas sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2013.



1.1.168.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice, metanfetamina, setas mágicas y salvia alguna vez en la vida (porcentaje de columna). España, 2013.

	Nuevas sustancias*	Ketamina	GHB	Spice	Metanfetamina	Setas mágicas	Salvia
Alcohol	99,8	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tabaco	96,9	97,5	99,0	97,2	97,2	97,0	98,4
Inhalables volátiles	13,3	24,1	24,5	21,7	25,2	16,4	21,3
Anfetaminas/speed	58,4	82,7	79,8	70,3	87,3	63,3	65,7
Alucinógenos	66,9	84,2	80,3	71,2	78,9	82,0	69,4
Heroína	12,8	20,0	26,1	28,5	25,8	13,5	9,7
Tranquilizantes	34,0	37,5	46,4	43,0	49,6	33,8	33,5
Somníferos	23,6	28,4	38,8	30,9	37,7	24,4	26,8
Hipnosedantes	37,6	39,2	49,2	43,5	51,1	38,6	34,2
Cannabis	96,1	96,3	95,1	97,1	96,5	98,5	97,1
Éxtasis	60,5	86,9	89,0	74,4	81,4	63,4	68,0
Cocaína en polvo	78,1	95,5	93,8	91,4	94,7	80,9	78,5
Cocaína base	18,4	28,0	34,0	33,6	40,0	19,2	17,9
Cocaína (polvo y/o base)	78,6	95,5	93,8	91,4	95,2	81,7	79,1


Interpretación: El 99,7% de las personas que han consumido ketamina alguna vez en la vida, también ha consumido alcohol.

* Sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis, etc.) y que se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumo de una o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2013.



1.1.170.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según sexo y edad. España, 2013.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			Menores (15-17)		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
74,1	70,9	77,3	69,1	66,5	71,9	70,3	66,5	74,2	72,2	68,1	76,7	76,3	74,4	78,0	82,9	80,2	85,6	75,6	72,2	79,2

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDT. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.171.


Estado civil y nivel de estudios de la población de 25 a 34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013.

	Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	No ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida
Estado civil		
Soltero/a	80,1	61,1
Casado/a	16,6	36,3
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	3,3	2,6
Nivel de estudios		
Primarios	7,0	7,7
Secundarios	74,1	66,5
Universitarios	18,8	25,7

FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.172.

Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 25-34 años según haya consumido alguna vez en la vida nuevas sustancias psicoactivas o no (porcentajes). España, 2013.



FUENTE: OEDT Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2014

En 2014, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ha llevado a cabo la undécima edición de la encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

Su objetivo es estudiar la situación y la evolución de los consumos, la edad de inicio, el riesgo atribuido a las diferentes sustancias psicoactivas y las medidas que los estudiantes consideran más efectivas para prevenir los consumos de drogas y los problemas asociados a éstos.

El universo son los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias en España en régimen general. La muestra del año 2014 fue de 37.486 alumnos.

En el presente documento no se incluye información de ESTUDES debido a que los resultados detallados hasta el año 2012 están disponibles en el *Informe* y en *Estadísticas 2013* y los de ESTUDES 2014 serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. No obstante, puede consultarse un avance de resultados de ESTUDES 2014 en la página web del Plan Nacional sobre Drogas:

http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2016_ESTUDES_2014-2015.pdf


A large, stylized number '2' in a dark purple color, positioned on the right side of the page. The '2' is composed of thick, rounded strokes. The top part is a semi-circle, the middle is a curved line, and the bottom is a horizontal bar.

Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2013

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2013.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	-
1992	20.017	15.956	-
1993	18.977	16.703	-
1994	18.770	17.526	-
1995	17.878	20.369	-
1996	16.647	28.382	-
1997	12.993	30.173	-
1998	11.867	30.756	-
1999	10.473	26.031	-
2000	8.151	26.412	-
2001	7.461	24.844	-
2002	5.051	21.162	-
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2013.




	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2013.




	Admisión a tratamiento (droga principal)	Admisión a tratamiento (droga secundaria)
2005	8	50
2006	10	59
2007	22	107
2008	20	112
2009	43	130
2010	46	132
2011	54	157
2012	66	164
2013	70	141

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652

Notas: En 2008 se inició el registro de las admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol en todas las CCAA (hasta el 2007 eran datos parciales de algunas CCAA). El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de desconocidos. En 2008 y 2009 algunas CCAA no recogían información desagregada por primer tratamiento/tratamiento previo en las admisiones por abuso o dependencia de alcohol.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2013.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237

Notas: Las estimaciones del número de inyectores admitidos a tratamiento para el conjunto de España se han obtenido multiplicando el número de admitidos a tratamiento en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses previos a la admisión (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2013.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530

Notas: Las estimaciones del número de inyectores admitidos a tratamiento para el conjunto de España se han obtenido multiplicando el número de admitidos a tratamiento en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses previos a la admisión (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,6	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,8
2011	33,9	20,7
2012	34,4	20,7
2013	35,0	20,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	34,0	21,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por heroína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del período considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por heroína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por cocaína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por cocaína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del período considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2013.



2.1.20.

Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión a tratamiento). España, 2005-2013.




	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9	11,8	5,2	0,9
2007	58	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2

El 74,2% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo ha consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 25,8% restante (n = 7.388) que ha consumido alcohol y otras drogas (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2013.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores (últimos 12 meses) admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012 y 26,4% en 2013.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2013.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32,0	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores (últimos 12 meses) admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012 y 26,4% en 2013.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2012.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	19.497	25,0
Cocaína polvo	18.746	24,1
Cocaína base	744	1,0
Opioides	13.333	17,1
Heroína	12.238	15,7
Metadona (mal uso)	563	0,7
Otros opioides	532	0,7
Cannabis	14.869	19,1
Hipnosedantes	1.083	1,4
Estimulantes	678	0,9
Anfetaminas	512	0,7
Éxtasis y derivados	134	0,2
Otros estimulantes	32	0,0
Alucinógenos	107	0,1
Inhalantes volátiles	38	0,0
Otras drogas ilegales	73	0,1
Alcohol	28.234	36,2
Total drogas ilegales	49.678	63,8
Total drogas ilegales y alcohol	77.912	100,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2013.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	19.848	24,6
Cocaína polvo	19.046	23,6
Cocaína base	794	1,0
Opioides	12.863	16,0
Heroína	11.756	14,6
Metadona (mal uso)	492	0,6
Otros opioides	615	0,8
Cannabis	16.914	21,0
Hipnosedantes	1.175	1,5
Estimulantes	923	1,1
Anfetaminas	671	0,8
Éxtasis y derivados	201	0,2
Otros estimulantes	51	0,1
Alucinógenos	120	0,1
Inhalantes volátiles	26	0,0
Otras drogas ilegales	77	0,1
Alcohol	28.652	35,5
Total drogas ilegales	51.946	64,5
Total drogas ilegales y alcohol	80.598	100,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2012.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	17,2	7,2	0,6	18,2
Cocaína	25,0	25,3	2,3	21,9
Cannabis	19,1	27,4	91,2	18,2
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	0,9	1,1	0,3	0,8
Alcohol	36,2	37,0	3,8	39,6
Número de admisiones	77.912	40.025	2.345	7.096

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2012.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	26,8	11,4	0,6	26,4
Cocaína	39,2	40,2	2,4	37,0
Cannabis	29,9	43,6	94,9	33,1
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,4	1,7	0,4	0,8
Número de admisiones	49.678	25.209	2.255	4.489

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2013.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	16,0	7,1	0,5	14,6
Cocaína	24,6	24,8	2,7	20,9
Cannabis	21,0	29,8	92,8	21,3
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,1	1,4	0,4	0,5
Alcohol	35,5	34,9	2,3	41,2
Número de admisiones	80.598	43.360	2.389	7.215

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2013.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	24,8	10,9	0,5	24,8
Cocaína	38,2	38,0	2,8	35,5
Cannabis	32,6	45,7	95,0	36,2
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,8	2,1	0,4	0,9
Número de admisiones	51.946	28.239	2.334	4.239

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.29.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.



2.1.30.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013.



2.1.31.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	49.678	23.024	25.209	41.697	7.750
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	52,3	-	-	52,0	54,1
Edad media (años)	33,4	36,9	30,2	33,3	34,0
Mujeres (%)	15,7	15,1	16,2	-	-
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	1,1	0,9	1,1	1,0
Enseñanza primaria	46,7	47,7	45,8	47,5	41,7
Enseñanzas secundarias	47,3	46,6	47,8	46,9	49,6
Estudios universitarios	4,5	4,0	4,9	4,0	7,2
Otros	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	26,3	24,4	27,9	27,1	22,5
Parado no habiendo trabajado	7,2	6,7	7,7	6,9	8,6
Parado habiendo trabajado	46,1	50,6	42,3	46,4	44,2
Otras	20,4	18,3	22,1	19,6	24,6
Nacidos fuera de España (%)	9,3	7,6	10,7	9,2	9,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	7,1	12,7	2,4	6,6	10,0
Médicos generales, atención primaria de salud	10,7	7,3	13,5	10,5	12,3
Hospitales u otros servicios de salud	5,6	4,6	6,5	5,1	8,4
Servicios sociales	3,4	2,7	3,9	2,7	6,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	7,1	9,1	5,6	7,6	4,4
Servicios legales o policiales	12,0	7,9	14,8	12,9	7,2
Empresas o empleadores	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares o amigos/as	13,5	8,7	17,8	13,8	12,4
Iniciativa propia	37,7	44,5	32,5	38,1	35,6
Otras	2,7	2,4	2,8	2,6	2,8
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	11,9	14,1	9,8	12,1	10,8
Únicamente con pareja	9,9	10,5	9,5	9,2	14,0
Únicamente con hijos	6,4	5,9	6,4	5,4	12,1
Con pareja e hijos/as	15,2	15,0	15,5	15,2	15,0
Con padres o familia de origen	42,1	36,8	47,3	43,7	33,6
Con amigos	2,7	2,9	2,6	2,5	4,0
Otros	11,8	14,8	9,0	12,1	10,6
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	86,6	82,5	90,8	86,2	89,2
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	6,8	8,3	5,3	7,4	3,2
Otras instituciones	1,9	2,7	1,2	1,8	2,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6
Alojamientos inestables/precarios	2,2	3,2	1,2	2,1	2,5
Otros lugares	1,9	2,5	1,2	1,9	2,0

2.1.31. (continuación)

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	26,8	43,7	11,4	26,5	28,6
Heroína	24,6	40,4	10,1	24,5	25,4
Metadona	1,1	1,8	0,6	1,0	1,7
Otros Opioides	1,1	1,5	0,6	1,0	1,5
Cocaína	39,2	38,5	40,2	40,0	35,5
Cocaína CLH	37,8	36,7	38,9	38,5	33,9
Cocaína base	1,5	1,8	1,3	1,5	1,6
Otros estimulantes	1,4	1,0	1,7	1,3	1,7
Anfetaminas	1,0	0,8	1,2	1,0	1,4
Éxtasis y derivados	0,3	0,1	0,4	0,3	0,2
Otros estimulantes	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Hipnosedantes	2,2	1,8	2,6	1,6	5,5
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepinas	1,9	1,6	2,3	1,4	4,8
Otros hipnosedantes	0,2	0,2	0,2	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros alucinógenos	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Cannabis	29,9	14,8	43,6	30,3	28,0
Otras sustancias	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,4	19,7	19,1	19,1	21,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	44,2	40,1	47,5	43,6	47,8
4-6 días/semana	6,6	5,8	7,3	6,7	5,9
2-3 días/semana	13,1	11,0	14,8	13,4	11,3
1 día/semana	5,4	5,1	5,7	5,5	4,9
Menos de 1 día/semana	7,4	8,1	6,9	7,5	6,6
No consumió	23,2	30,0	17,8	23,2	23,5
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	5,8	5,7	6,0	5,0	10,5
Pulmonar	53,1	50,5	55,2	53,3	51,6
Intranasal	34,8	33,0	36,5	35,4	31,6
Parenteral	5,4	9,7	1,6	5,5	5,4
Otras	0,9	1,1	0,7	0,9	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	15,3	26,4	5,5	15,2	15,7
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	5,2	8,7	2,1	5,1	5,4
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	5,3	9,3	1,6	4,9	7,3
Negativo (análisis últimos 6 meses)	20,6	24,7	17,1	20,5	21,5
Negativo (sin fecha de análisis)	20,5	26,6	15,6	20,5	20,6
Sin análisis o resultado desconocido	53,6	39,3	65,8	54,1	50,6

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	51.946	22.577	28.239	43.487	8.159
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,6	-	-	44,9	41,7
Edad media (años)	33,6	37,3	30,7	33,5	34,1
Mujeres (%)	15,8	14,8	16,5	-	-
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
Enseñanza primaria	46,0	47,2	45,2	46,8	41,5
Enseñanzas secundarias	48,0	47,2	48,5	47,7	49,8
Estudios universitarios	4,5	4,0	4,8	4,0	7,1
Otros	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	25,7	24,0	27,1	26,5	22,0
Parado no habiendo trabajado	7,3	6,6	7,8	7,1	8,1
Parado habiendo trabajado	41,4	45,2	38,7	41,9	38,5
Otras	25,6	24,2	26,4	24,5	31,3
Nacidos fuera de España (%)	8,3	7,1	9,2	8,3	8,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	11,2	17,5	6,4	10,8	13,7
Médicos generales, atención primaria de salud	9,4	6,2	11,8	9,1	10,9
Hospitales u otros servicios de salud	5,7	6,3	5,3	5,2	8,8
Servicios sociales	4,4	3,2	5,3	3,9	7,6
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	9,1	11,1	7,6	9,5	7,2
Servicios legales o policiales	11,6	6,9	15,0	12,4	7,6
Empresas o empleadores	1,5	1,7	1,3	1,6	1,0
Familiares o amigos/as	12,1	7,3	15,8	12,3	11,1
Iniciativa propia	32,9	38,2	29,2	33,4	30,1
Otras	1,9	1,6	2,2	1,9	1,9
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	11,7	14,1	9,9	12,0	10,7
Únicamente con pareja	9,6	10,4	9,0	8,8	14,3
Únicamente con hijos	5,4	5,3	5,4	4,4	10,7
Con pareja e hijos/as	15,8	15,3	16,4	15,8	16,3
Con padres o familia de origen	43,7	37,6	48,7	45,5	34,0
Con amigos	2,6	2,8	2,4	2,5	3,3
Otros	11,0	14,5	8,2	11,1	10,7
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	88,7	84,1	92,7	88,5	90,3
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	4,9	6,8	3,3	5,3	2,4
Otras instituciones	1,8	2,7	1,1	1,8	2,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,2	3,2	1,4	2,2	2,6
Otros lugares	1,8	2,5	1,2	1,8	2,0

2.1.32. (continuación)

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	24,8	42,1	10,9	24,7	24,9
Heroína	22,6	39,6	9,1	22,8	21,5
Metadona	0,9	1,1	0,8	0,9	1,3
Otros Opioides	1,2	1,4	1,0	1,0	2,1
Cocaína	38,2	38,6	38,0	39,0	34,1
Cocaína CLH	36,7	37,3	36,3	37,4	32,8
Cocaína base	1,5	1,4	1,7	1,6	1,3
Otros estimulantes	1,8	1,3	2,1	1,7	2,1
Anfetaminas	1,3	1,2	1,4	1,3	1,5
Éxtasis y derivados	0,4	0,1	0,6	0,4	0,5
Otros estimulantes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Hipnosedantes	2,3	1,7	2,8	1,5	6,1
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepinas	2,0	1,5	2,5	1,4	5,3
Otros hipnosedantes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros alucinógenos	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cannabis	32,6	15,9	45,7	32,6	32,1
Otras sustancias	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,4	19,7	19,0	19,0	21,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,7	42,9	49,3	46,0	50,0
4-6 días/semana	7,1	6,2	7,7	7,4	5,6
2-3 días/semana	13,1	11,0	14,7	13,3	11,9
1 día/semana	5,5	4,9	5,9	5,5	5,2
Menos de 1 día/semana	6,9	7,3	6,7	7,0	6,2
No consumió	20,8	27,6	15,8	20,8	21,1
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,1	5,1	6,9	5,1	11,3
Pulmonar	54,7	51,5	57,1	55,0	53,0
Intranasal	33,4	33,2	33,8	34,1	30,1
Parenteral	4,8	8,8	1,5	4,8	4,5
Otras	1,0	1,4	0,7	1,0	1,2
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	13,5	24,3	5,2	13,8	12,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	4,3	7,4	1,9	4,4	3,9
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	4,4	8,1	1,4	4,3	5,2
Negativo (análisis últimos 6 meses)	19,0	23,6	15,4	18,9	20,1
Negativo (sin fecha de análisis)	20,4	27,5	15,2	20,6	19,3
Sin análisis o resultado desconocido	56,1	40,7	68,0	56,2	55,3

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2012.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	20.546	72,8
Han consumido alcohol y otras drogas	7.688	27,2
Alcohol y 1 droga	5.254	18,6
Alcohol y 2 drogas	1.897	6,7
Alcohol y 3 o más drogas	537	1,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.34.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2013.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.264	74,2
Han consumido alcohol y otras drogas	7.388	25,8
Alcohol y 1 droga	5.134	17,9
Alcohol y 2 drogas	1.781	6,2
Alcohol y 3 o más drogas	473	1,7

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.35.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012.

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	28.234	12.714	14.816	22.257	5.815
Tratados por primera vez por alcohol (%)	53,8	–	–	53,7	54,2
Edad media (años)	44,3	45,0	43,7	44,2	44,7
Mujeres (%)	20,7	20,5	20,9	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	0,8	1,1	1,0	0,8
Enseñanza primaria	44,8	45,0	44,6	46,8	36,6
Enseñanzas secundarias	45,3	45,7	44,8	44,6	48,1
Estudios universitarios	7,9	7,4	8,4	6,7	12,7
Otros	1,0	1,1	1,0	0,9	1,8
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	33,9	30,9	36,5	35,0	30,2
Parado no habiendo trabajado	2,9	2,8	3,0	2,6	4,0
Parado habiendo trabajado	43,5	45,4	41,9	43,7	42,5
Otras	19,7	21,0	18,6	18,7	23,4
Nacidos fuera de España (%)	11,5	10,3	12,4	10,9	14,1
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,2	6,5	2,3	4,0	5,2
Médicos generales, atención primaria de salud	25,5	18,7	31,1	25,5	25,2
Hospitales u otros servicios de salud	11,4	10,1	12,4	10,7	13,7
Servicios sociales	5,5	5,3	5,8	5,1	7,4
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	1,6	1,5	1,7	1,9	0,5
Servicios legales o policiales	2,2	1,9	2,2	2,5	0,9
Empresas o empleadores	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Familiares o amigos/as	14,2	12,5	15,9	14,5	13,5
Iniciativa propia	32,5	40,9	25,6	32,9	31,2
Otras	2,6	2,3	2,7	2,6	2,3

2.1.35. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,3	20,4	16,7	18,9	16,2
Únicamente con pareja	11,7	11,3	12,1	11,0	14,5
Únicamente con hijos	8,0	8,2	7,7	6,0	16,0
Con pareja e hijos/as	26,7	23,5	29,6	27,0	25,1
Con padres o familia de origen	24,7	24,7	24,8	26,3	18,5
Con amigos	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7
Otros	8,2	9,4	6,8	8,6	7,0
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,5	90,0	93,3	90,7	94,5
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,7	1,5	1,6	1,9	0,5
Otras instituciones	1,8	2,6	1,1	1,9	1,4
Pensiones, hoteles, hostales	0,7	0,9	0,5	0,7	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,1	2,5	1,7	2,2	1,5
Otros lugares	2,3	2,4	1,7	2,5	1,6
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,4	18,2	18,5	17,6	21,2
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	59,0	57,3	60,4	59,9	55,9
4-6 días/semana	5,9	5,6	6,1	5,7	6,7
2-3 días/semana	11,6	9,9	13,1	11,4	12,5
1 día/semana	4,5	3,9	4,9	4,4	5,0
Menos de 1 día/semana	5,3	5,9	4,7	5,2	5,7
No consumió	13,7	17,3	10,7	13,5	14,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,6	5,3	2,1	3,8	2,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	1,0	1,2	0,7	1,0	0,7
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	1,1	1,6	0,7	1,1	1,2
Negativo (análisis últimos 6 meses)	17,2	18,6	15,9	17,0	17,9
Negativo (sin fecha de análisis)	18,8	23,6	15,0	18,6	19,3
Sin análisis o resultado desconocido	63,0	56,2	68,4	63,2	61,7

Nota: El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.36.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013.

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	28.652	12.978	15.121	22.198	6.292
Tratados por primera vez por alcohol (%)	53,8	–	–	53,8	53,8
Edad media (años)	44,9	45,8	44,1	44,8	45,4
Mujeres (%)	22,1	22,1	22,1	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	0,8	1,2	1,1	0,7
Enseñanza primaria	43,8	43,9	43,8	45,8	36,7
Enseñanzas secundarias	45,6	46,6	44,8	45,0	48,0
Estudios universitarios	8,5	7,8	9,0	7,1	13,2
Otros	1,1	0,9	1,3	1,0	1,4
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	33,2	29,7	36,1	34,4	29,2
Parado no habiendo trabajado	2,7	2,6	2,7	2,4	3,5
Parado habiendo trabajado	36,1	37,0	35,4	36,4	34,8
Otras	28,1	30,7	25,7	26,8	32,6
Nacidos fuera de España (%)	10,7	8,3	12,5	10,1	12,6
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	10,6	14,0	7,6	10,2	12,5
Médicos generales, atención primaria de salud	19,9	14,0	24,5	20,3	18,0
Hospitales u otros servicios de salud	9,8	10,0	9,7	9,1	12,3
Servicios sociales	10,1	8,5	11,4	9,5	12,6
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	5,9	5,6	6,1	6,0	5,8
Servicios legales o policiales	3,4	3,1	3,6	3,5	2,8
Empresas o empleadores	1,2	1,2	1,2	1,4	0,8
Familiares o amigos/as	11,9	10,3	13,4	12,2	10,6
Iniciativa propia	25,3	31,4	20,4	25,9	22,9
Otras	1,9	1,7	2,0	1,9	1,7

2.1.36. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,4	20,0	17,0	19,0	16,3
Únicamente con pareja	11,7	11,2	12,3	10,7	15,3
Únicamente con hijos	7,2	7,2	7,1	5,1	14,6
Con pareja e hijos/as	26,4	24,0	28,4	26,9	24,2
Con padres o familia de origen	25,6	25,5	25,7	27,2	19,6
Con amigos	2,2	2,1	2,3	2,2	2,3
Otros	8,6	10,0	7,1	8,8	7,8
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,8	90,2	93,4	91,0	94,8
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,4	1,4	1,3	1,6	0,5
Otras instituciones	1,8	2,4	1,3	1,9	1,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,8	0,5	0,7	0,4
Alojamientos inestables/precarios	2,3	2,6	2,0	2,5	1,4
Otros lugares	2,1	2,6	1,6	2,3	1,5
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,8	18,5	19,0	17,9	21,8
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,9	56,1	61,1	59,8	55,4
4-6 días/semana	6,2	6,2	6,2	5,9	7,2
2-3 días/semana	11,1	9,6	12,4	10,7	12,5
1 día/semana	4,6	4,2	4,9	4,4	5,2
Menos de 1 día/semana	5,2	5,5	4,9	5,0	5,7
No consumió	14,1	18,4	10,5	14,1	14,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,3	4,8	2,0	3,5	2,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,8	1,0	0,6	0,8	0,7
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	2,9	3,2	2,6	3,0	2,6
Negativo (análisis últimos 6 meses)	46,6	43,1	50,5	46,9	45,8
Negativo (sin fecha de análisis)	31,4	33,1	29,5	31,0	32,7
Sin análisis o resultado desconocido	19,0	20,6	17,5	19,1	18,9

Nota: El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.37.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2012.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	19.497	14.869	13.333	12.238	1.083	965	563	512	134	107	38
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	53,4	76,3	22,2	21,5	60,6	61,8	26,8	62,3	78,0	78,6	66,7
Edad media (años)	34,5	25,5	40,5	40,4	38,5	38,2	41,1	32,4	27,0	28,9	23,2
Mujeres (%)	14,2	14,6	16,7	16,2	39,6	38,5	22,8	20,7	14,2	13,3	5,3
Máximo nivel de estudios completado (%)											
Sin estudios	0,8	0,5	1,9	2,0	2,4	2,5	2,1	0,4	0,0	0,0	5,9
Enseñanza primaria	42,1	47,3	53,3	53,3	48,2	49,1	58,7	34,5	39,7	25,7	64,7
Enseñanzas secundarias	51,0	47,8	41,0	41,3	39,2	38,6	35,0	59,4	50,4	67,6	23,5
Estudios universitarios	5,5	3,9	3,3	3,1	8,8	8,4	3,8	5,3	8,4	6,7	5,9
Otros	0,6	0,5	0,4	0,4	1,4	1,4	0,4	0,4	1,5	0,0	0,0
Situación laboral principal (%)											
Trabajando	37,3	19,1	18,3	18,2	17,8	16,4	19,8	35,4	27,5	34,6	5,6
Parado no habiendo trabajado	4,1	10,8	7,7	7,8	8,3	8,5	6,2	6,7	3,8	11,5	19,4
Parado habiendo trabajado	47,1	37,6	54,2	54,6	47,8	49,1	50,6	46,6	41,2	38,5	25,0
Otras	11,5	32,4	19,9	19,4	26,1	26,0	23,3	11,3	27,5	15,4	50,0
Nacidos fuera de España (%)	8,7	10,3	9,1	9,1	7,9	7,5	6,1	5,1	6,1	5,3	73,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	5,4	2,5	16,1	15,2	4,3	4,3	28,5	6,2	2,7	3,0	0,0
Médicos generales, atención primaria salud	12,5	11,6	5,6	5,3	21,4	20,1	4,0	15,1	9,7	13,1	8,7
Hospitales u otros servicios de salud	5,3	6,6	3,5	3,0	15,6	15,7	6,0	11,1	3,5	7,1	8,7
Servicios sociales	2,7	5,2	2,2	2,3	3,5	3,7	1,8	1,5	1,8	3,0	17,4
Prisiones, centros de menores	6,1	4,6	12,0	12,7	5,4	5,9	6,9	4,7	2,7	5,1	39,1
Servicios legales o policiales	8,1	22,8	5,1	5,3	4,1	4,6	3,1	10,6	34,5	10,1	8,7
Empresas o empleadores	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,9	0,0	0,0
Familiares o amigos/as	15,3	17,5	5,9	6,1	10,8	10,8	3,1	15,7	18,6	14,1	0,0
Iniciativa propia	42,6	25,6	46,6	46,9	31,9	31,7	45,2	31,7	24,8	40,4	17,4
Otras	1,9	3,4	3,0	3,1	2,8	3,0	1,3	2,8	0,9	4,0	0,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	12,0	7,4	16,4	16,4	15,6	15,3	15,6	14,5	10,5	13,6	8,6
Únicamente con pareja	11,7	6,1	11,5	11,2	11,2	11,4	15,0	9,6	8,1	8,7	2,9
Únicamente con hijos	6,7	7,1	5,0	5,0	6,6	6,2	4,0	5,5	3,2	13,6	5,7
Con pareja e hijos/as	20,8	9,3	13,5	13,1	19,6	18,8	19,0	7,9	8,9	9,7	5,7
Con padres o familia de origen	36,7	59,1	31,2	31,4	33,1	33,2	29,8	46,6	58,1	41,7	22,9
Con amigos	2,4	2,3	3,6	3,6	1,7	1,8	4,5	4,9	3,2	6,8	2,9
Otros	9,8	8,7	18,7	19,2	12,3	13,3	12,1	11,0	8,1	5,8	51,4

2.1.37. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	89,6	92,9	74,9	74,1	86,8	85,6	84,9	88,9	92,9	94,2	38,9
Prisiones, centros de menores	6,1	3,3	11,9	12,3	6,7	7,5	7,0	5,2	5,6	2,9	19,4
Otras instituciones	1,4	1,6	3,0	3,0	2,3	2,4	1,8	1,8	0,0	1,0	25,0
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,3	1,0	1,1	0,7	0,8	0,6	0,8	0,0	1,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	1,2	0,7	5,4	5,7	1,9	1,9	2,9	1,6	1,6	1,0	8,3
Otros lugares	1,3	1,3	3,8	3,8	1,7	1,8	2,7	1,6	0,0	0,0	8,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)											
	20,7	15,5	21,2	20,7	27,1	27,1	28,5	20,0	19,7	20,7	15,3
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	1,7	2,3	6,2	1,0	97,9	97,8	92,1	20,0	89,7	43,7	0,0
Pulmonar	14,5	96,8	67,8	72,0	1,2	1,3	4,7	2,4	2,4	10,7	62,9
Intranasal	81,1	0,6	6,4	6,5	0,1	0,1	1,3	76,7	7,9	44,7	28,6
Parenteral	2,0	0,0	17,8	18,6	0,6	0,6	1,7	0,6	0,0	1,0	0,0
Otras	0,7	0,3	1,8	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	8,6
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	20,4	67,7	49,1	46,7	78,3	79,9	87,6	29,5	7,1	29,1	25,0
4-6 días/semana	9,8	5,1	3,9	4,1	3,1	2,9	2,2	8,9	3,6	9,3	8,3
2-3 días/semana	22,7	8,0	4,9	5,2	2,9	2,9	1,4	27,3	22,3	11,6	8,3
1 día/semana	9,6	3,0	2,4	2,4	1,5	1,2	1,0	7,2	10,7	14,0	0,0
Menos de 1 día/semana	12,5	3,8	4,4	4,6	2,3	2,1	1,4	8,5	19,6	12,8	25,0
No consumió	25,0	12,5	35,3	36,9	11,8	11,1	6,4	18,6	36,6	23,3	33,3
Otras drogas consumidas en los 30 días previos a la admisión de tratamiento (%)											
1. Opiáceos	8,3	3,6	11,7	11,4	14,3	14,3	18,6	4,3	5,4	4,0	5,0
11. Heroína	7,4	2,9	0,8	-	8,8	9,1	17,6	3,1	4,3	1,3	5,0
12. Metadona	0,7	0,1	7,3	7,7	2,4	2,4	-	0,3	0,0	0,0	0,0
13. Otros opiáceos	0,5	0,6	3,6	3,8	3,2	2,8	1,0	0,9	1,1	2,7	0,0
2. Cocaína	0,4	34,6	56,1	57,8	32,7	32,2	24,7	30,5	37,0	37,3	35,0
21. Cocaína CIH	0,2	34,3	51,8	53,4	31,1	30,6	21,7	30,5	37,0	37,3	35,0
22. Base cocaína	0,2	0,4	4,5	4,6	1,8	1,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Estimulantes	9,7	10,0	3,2	3,3	4,6	4,4	0,7	6,6	8,7	25,3	10,0
31. Anfetaminas	4,5	5,1	2,1	2,1	2,7	2,8	0,3	-	6,4	36,2	5,7
32. Éxtasis y derivados	5,4	4,6	1,0	1,1	1,3	1,2	0,3	7,1	-	8,6	2,9
33. Otros estimulantes	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,4	0,0
4. Hipnóticos y sedantes	6,8	5,0	19,9	19,8	0,6	0,4	24,1	5,1	7,6	6,7	10,0
41. Barbitúricos	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42. Benzodiazepinas	6,3	5,5	19,1	19,0	1,1	-	22,4	1,2	3,8	1,7	8,6
43. Otros hipnosedantes	0,4	0,5	0,7	0,6	0,4	0,4	1,7	0,5	1,3	1,7	0,0

2.1.37. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
5. Alucinógenos	2,1	2,9	1,1	1,1	0,4	0,0	0,0	7,4	5,4	0,0	0,0
51. LSD	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	6,9	0,0
52. Otros alucinógenos	1,9	2,3	0,9	0,9	0,9	0,8	0,0	5,4	2,6	0,0	2,9
6. Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Cannabis	50,1	-	45,9	45,6	58,8	61,3	52,2	62,4	57,6	61,3	65,0
8. Alcohol	73,6	80,6	37,6	37,5	54,2	54,0	40,3	56,7	63,0	60,0	60,0
9. Otras sustancias	1,0	1,1	1,4	1,5	0,8	0,7	0,0	0,9	0,0	2,7	5,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	6,1	2,7	43,7	44,0	10,3	10,9	43,3	7,4	3,7	5,6	5,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	2,5	0,7	14,5	15,1	4,3	4,5	6,2	1,4	0,7	2,8	0,0
Estado serológico frente al VIH (%)											
Positivo	2,0	0,7	15,6	15,7	4,3	4,5	15,6	1,4	0,7	2,8	0,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	24,2	13,3	24,2	24,8	15,1	15,1	16,3	19,9	16,4	23,4	28,9
Negativo (sin fecha de análisis)	22,2	13,2	26,4	26,5	19,2	19,9	25,8	18,4	15,7	12,1	18,4
Sin análisis o resultado desconocido	51,7	72,8	33,7	33,0	61,4	60,5	42,3	60,4	67,2	61,7	52,6

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.38.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2013.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	19.848	16.914	12.863	11.756	1.175	1.062	492	671	201	120	26
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,2	78,3	24,4	22,3	67,8	67,0	45,6	60,0	86,1	63,2	69,2
Edad media (años)	35,0	26,0	40,8	40,8	40,8	40,5	42,0	32,3	28,7	31,1	24,5
Mujeres (%)	14,1	15,6	15,9	15,0	42,4	41,1	22,1	18,5	19,1	15,8	3,8
Máximo nivel de estudios completado (%)											
Sin estudios	0,8	0,5	1,9	1,9	1,6	1,5	3,4	0,3	0,0	0,8	8,0
Enseñanza primaria	41,9	46,0	53,2	53,4	49,0	48,3	57,2	32,6	38,0	36,1	56,0
Enseñanzas secundarias	51,5	48,8	41,3	41,5	40,3	41,8	36,9	61,1	56,8	54,6	36,0
Estudios universitarios	5,3	4,2	3,1	2,8	8,6	8,1	2,3	5,4	5,2	8,4	0,0
Otros	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0

2.1.38. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Situación laboral principal (%)											
Trabajando	37,3	18,8	16,9	16,9	19,3	19,2	15,0	36,1	24,7	26,1	7,7
Parado no habiendo trabajado	4,4	10,4	7,6	7,7	8,4	8,1	6,5	5,7	9,3	5,9	30,8
Parado habiendo trabajado	41,5	34,3	50,7	51,2	41,6	42,8	50,9	44,2	42,8	37,8	23,1
Otras	16,8	36,6	24,7	24,2	30,7	30,0	27,6	14,1	23,2	30,3	38,5
Nacidos fuera de España (%)											
	7,8	9,3	8,3	8,4	6,5	6,5	4,6	4,2	3,1	11,7	47,8
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	11,4	5,7	19,5	19,7	6,3	5,7	20,5	9,8	8,3	10,8	0,0
Médicos generales, atención primaria salud	10,0	11,0	5,2	4,7	19,0	18,3	3,6	12,2	7,1	9,0	5,3
Hospitales u otros servicios de salud	5,3	5,7	5,5	5,0	10,6	11,0	7,7	11,4	1,8	9,9	10,5
Servicios sociales	4,5	5,7	2,6	2,4	5,7	5,4	1,7	3,3	5,3	6,3	5,3
Prisiones, centros de menores	8,1	7,2	13,2	13,5	11,5	11,9	14,3	5,5	10,1	5,4	26,3
Servicios legales o policiales	8,1	21,5	3,6	3,7	3,9	4,1	3,2	14,3	29,6	16,2	15,8
Empresas o empleadores	1,4	1,6	1,9	2,0	0,1	0,1	0,9	0,7	0,6	0,0	0,0
Familiares o amigos/as	13,5	15,3	5,2	5,3	11,7	11,8	3,4	14,6	12,4	13,5	5,3
Iniciativa propia	36,7	23,1	41,9	42,1	30,1	30,4	43,9	26,0	24,9	27,0	5,3
Otras	1,1	3,3	1,5	1,4	1,1	1,2	0,9	2,3	0,0	1,8	26,3
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	12,3	7,4	16,4	16,6	14,2	13,9	13,9	15,8	9,3	11,9	3,8
Únicamente con pareja	11,4	6,2	11,5	11,2	11,0	11,4	14,6	7,6	8,2	7,6	3,8
Únicamente con hijos	5,7	5,4	4,7	4,7	7,5	6,9	4,8	4,1	4,1	6,8	0,0
Con pareja e hijos/as	22,0	9,8	14,1	13,5	23,2	22,7	18,2	10,9	7,7	7,6	7,7
Con padres o familia de origen	37,4	59,9	32,6	32,8	31,5	32,1	30,8	47,9	61,3	47,5	34,6
Con amigos	2,3	2,3	3,7	3,8	1,7	1,6	3,9	3,6	2,6	6,8	3,8
Otros	8,9	9,1	17,0	17,3	11,0	11,5	13,9	10,2	6,7	11,9	46,2
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	91,7	93,0	78,2	77,6	89,1	88,6	82,0	90,3	96,4	93,2	53,8
Prisiones, centros de menores	3,9	3,1	9,0	9,3	4,4	4,5	7,0	3,2	1,5	4,2	19,2
Otras instituciones	1,4	1,4	3,1	3,2	1,4	1,5	1,6	1,1	1,0	0,8	19,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,2	0,9	0,9	0,7	0,8	1,3	0,3	0,5	0,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	1,5	0,9	5,3	5,5	1,8	2,0	3,6	2,6	0,0	0,8	3,8
Otros lugares	1,1	1,4	3,4	3,5	2,6	2,6	4,5	2,6	0,5	0,8	3,8
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)											
	20,6	15,6	21,4	20,9	28,1	27,8	28,6	20,3	20,1	21,9	15,2
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	2,0	2,3	5,7	0,8	97,9	97,9	89,3	23,1	86,3	39,3	4,2
Pulmonar	14,5	96,9	69,9	74,0	1,0	1,1	6,7	4,5	3,3	10,3	54,2
Intranasal	80,3	0,5	6,3	6,5	0,6	0,6	1,1	71,1	9,8	45,3	33,3
Parenteral	2,3	0,0	15,8	16,6	0,2	0,2	2,4	1,2	0,0	4,3	0,0
Otras	0,9	0,3	2,2	2,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,9	8,3

2.1.38. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	22,3	67,3	53,4	51,3	83,3	83,5	88,6	25,6	13,8	33,0	44,4
4-6 días/semana	10,4	5,5	4,5	4,8	2,0	2,0	1,7	11,0	2,4	11,3	0,0
2-3 días/semana	22,6	8,1	5,6	5,8	3,2	3,1	1,2	25,4	18,6	21,7	22,2
1 día/semana	10,4	2,7	2,0	2,0	0,6	0,5	1,2	9,0	7,2	2,8	5,6
Menos de 1 día/semana	12,2	3,5	3,7	3,8	1,3	1,2	1,2	9,4	18,6	8,5	5,6
No consumió	22,1	12,9	30,8	32,2	9,6	9,7	6,2	19,6	39,5	22,6	22,2
Otras drogas consumidas en los 30 días previos a la admisión de tratamiento (%)											
1. Opiáceos	8,0	3,3	10,9	10,5	14,0	14,6	24,4	4,2	2,3	3,8	0,0
11. Heroína	7,1	2,7	1,0	0,0	9,1	9,3	23,2	3,5	1,5	3,8	0,0
12. Metadona	0,5	0,2	7,3	7,7	3,0	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
13. Otros opiáceos	0,4	0,5	2,6	2,8	1,9	2,0	1,2	0,4	0,8	0,0	0,0
2. Cocaína	0,5	33,2	53,6	54,7	35,1	36,4	26,8	31,8	44,6	50,6	30,8
21. Cocaína CIH	0,3	32,7	48,9	50,0	32,3	33,4	21,3	31,8	43,1	49,4	30,8
22. Base cocaína	0,2	0,5	4,7	4,7	2,8	3,0	5,5	0,0	1,5	1,3	0,0
3. Estimulantes	10,0	10,7	3,4	3,4	4,7	4,9	0,8	7,5	10,0	29,1	23,1
31. Anfetaminas	4,6	5,4	2,2	2,2	3,0	3,2	0,8	-	7,7	15,2	15,4
32. MDMA y derivados	5,0	5,0	1,1	1,1	1,5	1,4	0,0	6,1	-	12,7	0,0
33. Otros estimulantes	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	1,3	2,3	1,3	7,7
4. Hipnóticos y sedantes	7,0	4,7	18,6	18,5	0,8	0,4	20,5	4,2	3,1	1,3	7,7
41. Barbitúricos	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42. Benzodiazepinas	6,5	4,5	17,9	17,8	0,4	-	20,5	3,7	3,1	1,3	7,7
43. Otros hipnosedantes	0,4	0,1	0,5	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
5. Alucinógenos	2,0	2,0	1,0	1,1	0,4	0,4	0,0	6,6	10,8	1,3	0,0
51. LSD	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	1,3	0,0
52. Otros alucinógenos	1,8	1,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,0	5,9	9,2	0,0	0,0
6. Inhalables volátiles	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Cannabis	49,9	-	46,9	46,8	54,2	55,1	50,8	62,3	60,8	49,4	69,2
8. Alcohol	73,6	80,2	38,1	38,1	57,0	55,9	37,4	62,5	53,1	59,5	46,2
9. Otras sustancias	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	5,7	2,6	41,1	41,7	8,2	8,8	40,0	6,3	6,5	3,3	3,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	2,2	0,8	12,7	13,2	1,2	1,3	4,7	2,8	1,5	2,5	0,0
Estado serológico frente al VIH (%)											
Positivo	1,9	0,7	13,6	13,7	2,8	2,9	15,2	0,7	2,5	3,3	0,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	22,7	12,5	22,6	23,0	14,2	14,0	16,9	18,8	12,4	15,8	23,1
Negativo (sin fecha de análisis)	21,3	13,4	28,7	29,2	18,8	19,4	24,8	21,3	12,4	22,5	19,2
Sin análisis o resultado desconocido	54,1	73,4	35,1	34,1	64,2	63,7	43,1	59,2	72,6	58,3	57,7

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.39.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2012.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo		Total	Tratamiento previo	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	2.562	2.001	523	7.580	6.073	1.393
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.910	1.583	309	5.957	5.011	862
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,4	30,3	19,1	33,1	34,4	25,2
Hombres inyectores (nº)	2.130	1.681	419	6.326	5.057	1.180
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.594	1.328	251	4.953	4.153	734
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,2	29,7	19,5	32,0	33,2	24,7
Mujeres inyectoras (nº)	420	313	99	1218	989	206
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	313	252	58	981	837	127
Prevalencia de infección por VIH (%)	30	33,3	17,2	39,1	40,9	28,3
Inyectores < 25 años (nº)	165	80	82	216	106	107
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	93	54	37	116	68	46
Prevalencia de infección por VIH (%)	8,6	13,0	2,7	8,6	13,2	2,2
Inyectores 25-34 años (nº)	667	482	170	1250	926	304
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	452	357	89	889	717	161
Prevalencia de infección por VIH (%)	11,7	13,2	4,5	13,6	15,2	5,6
Inyectores > 34 años (nº)	1.728	1.438	270	6.107	5.037	980
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.363	1.171	182	4.945	4.222	653
Prevalencia de infección por VIH (%)	35,4	36,3	29,7	37,2	38,0	31,7
Inyectores < 2 años de uso de la droga principal	39	13	25	68	31	36
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	18	9	8	37	24	12
Prevalencia de infección por VIH (%)	22,2	11,1	25,0	27,0	25,0	25,0
Inyectores ≥ 2 años de uso de la droga principal	2.029	1.670	328	5.375	4.609	679
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.572	1.346	211	4.426	3.891	472
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,8	30,0	21,3	32,1	33,2	23,1
Inyectores consumidores de opiáceos	2.121	1.752	342	6.325	5.307	930
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.635	1.408	216	5.103	4.435	602
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,9	31,7	25,5	35,0	35,6	28,9
Inyectores no consumidores de opiáceos	441	249	181	1.255	766	463
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	275	175	93	854	576	260
Prevalencia de infección por VIH (%)	13,5	18,9	4,3	21,9	24,7	16,5

Notas:

- El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.
- Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.
- No se incluyen datos de algunas Comunidades/Ciudades Autónomas, debido a problemas de calidad de la variable "tiempo desde la última inyección de cualquier sustancia psicoactiva".
- Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.40.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2013.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo		Total	Tratamiento previo	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	2.237	1.663	530	7.026	5.484	1.457
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.646	1.317	302	5.439	4.488	892
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,4	26,2	16,6	30,6	31,9	23,7
Hombres inyectores (nº)	1.896	1.431	432	5.982	4.678	1.239
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.404	1.131	253	4.633	3.818	771
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,2	25,8	17,8	29,7	30,9	24,4
Mujeres inyectoras (nº)	322	216	97	1.005	772	217
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	230	176	48	782	649	120
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,1	29,5	10,4	35,5	38,2	19,2
Inyectores < 25 años (nº)	152	53	92	209	80	119
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	64	30	31	93	51	37
Prevalencia de infección por VIH (%)	4,7	6,7	0,0	5,4	5,9	2,7
Inyectores 25-34 años (nº)	583	374	197	1095	756	324
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	383	275	103	762	581	173
Prevalencia de infección por VIH (%)	8,9	10,5	4,9	11,8	13,1	6,9
Inyectores > 34 años (nº)	1.502	1.236	241	5.722	4.648	1.014
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.199	1.012	168	4.584	3.856	682
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,4	31,0	26,8	34,2	35,1	29,0
Inyectores < 2 años de uso de la droga principal	45	14	30	74	30	43
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	21	9	12	36	18	18
Prevalencia de infección por VIH (%)	9,5	22,2	0,0	13,9	27,8	0,0
Inyectores 2 o más años de uso de la droga principal	1.784	1.422	325	4.971	4.249	653
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.372	1.143	204	4.041	3.550	442
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,8	26,1	17,2	29,8	31,2	18,1
Inyectores consumidores de opiáceos	1.767	1.416	325	5.723	4.756	912
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.381	1.158	203	4.587	3.950	595
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,3	27,2	20,2	32,0	32,8	26,4
Inyectores no consumidores de opiáceos	470	247	205	1.303	728	545
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	265	159	99	852	538	297
Prevalencia de infección por VIH (%)	14,7	18,9	9,1	22,8	25,5	18,2

Notas:

- El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.
- Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.
- No se incluyen datos de algunas Comunidades/Ciudades Autónomas, debido a problemas de calidad de la variable "tiempo desde la última inyección de cualquier sustancia psicoactiva".
- Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.41.


Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: estado serológico y vía de consumo según droga principal. España, 2013.

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	Cocaína CLH	Cocaína base	Otros estimulantes	Anfetaminas	Éxtasis y derivados	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Alucinógenos	In. volátiles	Cannabis
Nº de casos	12.863	11.756	492	615	19.848	19.046	794	923	671	201	1.175	1.062	120	26	16.914
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	21,4	20,9	28,6	26,6	20,6	20,6	21,9	20,5	20,3	20,1	28,1	27,8	21,9	15,2	15,6
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)															
Oral	5,7	0,8	89,3	37,7	2,0	2,1	0,4	38,4	23,1	86,3	97,9	97,9	39,3	4,2	2,3
Pulmonar	69,9	74,0	6,7	38,1	14,5	11,3	89,7	4,2	4,5	3,3	1,0	1,1	10,3	54,2	96,9
Intranasal	6,3	6,5	1,1	7,3	80,3	83,3	8,4	56,3	71,1	9,8	0,6	0,6	45,3	33,3	0,5
Parenteral	15,8	16,6	2,4	10,9	2,3	2,3	0,4	0,9	1,2	0,0	0,2	0,2	4,3	0,0	0,0
Otras	2,2	2,1	0,4	6,0	0,9	0,9	1,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,9	8,3	0,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	41,1	41,7	40,0	30,6	5,7	5,4	12,8	6,3	6,3	6,5	8,2	8,8	3,3	3,8	2,6
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	12,7	13,2	4,7	9,4	2,2	2,2	2,6	2,4	2,8	1,5	1,2	1,3	2,5	0,0	0,8
Estado serológico frente al VIH (%)															
Positivo	13,6	13,7	15,2	10,1	1,9	1,8	3,5	1,3	0,7	2,5	2,8	2,9	3,3	0,0	0,7
Negativo (análisis últimos 6 meses)	22,6	23,0	16,9	19,5	22,7	23,1	14,4	17,2	18,8	12,4	14,2	14,0	15,8	23,1	12,5
Negativo (sin fecha de análisis)	28,7	29,2	24,8	22,4	21,3	21,0	27,0	19,1	21,3	12,4	18,8	19,4	22,5	19,2	13,4
Sin análisis o resultado desconocido	35,1	34,1	43,1	48,0	54,1	54,1	55,2	62,4	59,2	72,6	64,2	63,7	58,3	57,7	73,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.42.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2013.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Porcentaje inyectores (alguna vez en la vida) que conocen estado serológico (VIH)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4
Porcentaje inyectores (último año previo a admisión) que conocen estado serológico (VIH)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6
Prevalencia (%) de VIH en inyectores alguna vez en la vida	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6
Prevalencia (%) de VIH en inyectores último año previo a admisión	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.43.


Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (número y %). España, 2005-2013.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646
Conocen su estado serológico frente a VIH (%)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439
Conocen su estado serológico frente a VIH (%)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.44.

Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, total y según sexo. 1996-2013.




	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hombre	35,9	32,4	32,4	31,9	32,7	32,7	30,9	31,5	27,7	31,5	32,7	30,0	26,7	26,0	29,8	28,5	28,2	24,2
Mujer	43,4	41,0	39,7	40,2	37,9	40,2	38,9	39,3	38,3	39,5	37,4	36,2	33,3	32,2	31,7	30,0	30,0	26,1
Total	37,1	33,7	33,6	33,0	33,5	33,7	32,0	32,6	29,3	32,7	33,4	30,9	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.45.

Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, según edad. 1996-2013.




	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
< 25	20,3	17,5	15,1	15,2	13,1	14,0	12,1	9,2	7,1	9,7	7,2	3,2	3,2	2,2	8,1	9,9	8,6	4,7
25-34	39,3	34,0	33,4	32,0	30,5	29,1	26,7	25,5	20,9	23,1	21,4	18,7	16,9	15,2	14,8	14,5	11,7	8,9
> 34	48,9	46,4	45,8	44,0	45,5	44,4	42,8	43,8	39,4	41,9	42,2	40,3	35,6	34,7	38	35,6	35,4	30,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2013

2.2.1.

Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2013.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9
Alcohol	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0
Éxtasis y der.	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6
I. volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2

Número total y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2013.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles	Otras sustancias
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2	4,1
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1	3,2
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3	4,9
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1	1,3
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3	0,8
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9	1,6
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2	1,8
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6	8,7
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5	3,3
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4	4,9
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5	6,0
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5	1,8
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5	1,2
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4	1,8
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3	2,2
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5	3,3
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4	2,5

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas. El sumatorio puede no ser del 100% debido a que no se presentan todas las drogas y algunas drogas pueden aparecer en más de un episodio.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2013.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715
Edad media (años)	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0
Sexo (%)																	
Mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1
Condición legal (%)																	
Detenido	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8
Resolución urgencia (%)																	
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2012.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.999	4.419	1.557	2.452	2.082	1.760	976	695	476	327	245	136	29
Edad media (años)	32,8	33,2	31,7	34,0	34,2	30,1	36,0	37,3	29,2	38,2	27,0	28,0	28,7
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	22,7	22,3	20,2	28,9	23,6	26,5	27,0	23,3	25,0	37,9
Detenidos (%)	4,1	5,0	1,6	3,5	2,4	4,6	5,3	5,5	1,7	6,2	1,2	2,2	10,3
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	75,9	74,8	78,9	75,1	75,2	74,8	68,4	69,8	77,3	71,7	74,0	76,2	75,0
Alta voluntaria	8,2	8,7	7,0	8,1	8,8	6,0	9,4	9,3	6,9	7,9	17,2	11,9	8,3
Ingreso hospitalario	12,5	13,0	11,3	12,8	12,5	15,3	16,5	18,2	12,9	15,0	7,7	8,9	16,7
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	1,0	0,0
Traslado a otro centro	3,2	3,4	2,8	4,0	3,3	3,9	5,7	2,5	2,6	5,0	1,2	2,0	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2013.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.715	4.219	1.490	2.490	2.143	1.919	985	659	500	316	265	145	21
Edad media (años)	33,0	33,4	31,9	33,9	34,2	29,5	35,6	37,4	29,3	39,2	27,3	27,8	30,4
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	24,6	24,6	24,6	29,5	21,9	26,2	28,5	28,0	22,9	33,3
Detenidos (%)	3,8	4,4	2,0	4,2	3,4	4,5	4,6	3,8	2,6	6,7	3,4	3,4	0,0
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	72,8	72,6	73,3	71,4	74,2	74,5	65,6	62,4	77,5	65,7	78,4	63,1	63,2
Alta voluntaria	9,4	9,6	8,8	9,8	10,3	6,7	10,6	8,8	8,1	11,2	11,6	16,5	5,3
Ingreso hospitalario	14,8	14,9	14,4	15,4	12,8	15,4	20,3	24,2	11,3	19,8	8,0	17,5	15,8
Muerte en urgencias	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	2,9	2,8	3,3	3,4	2,6	3,4	3,4	4,0	2,8	3,3	2,0	2,9	15,8

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España* 2012.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	2,1	6,4	99,1	1,5	79,1	93,8	96,1	67,3
Pulmonar o fumada	12,0	93,1	0,4	19,4	5,5	1,2	1,6	4,1
Intranasal o esnifada	66,3	0,5	0,1	8,0	14,1	0,3	2,4	18,4
Parenteral o inyectada	19,4	0,0	0,4	70,9	1,2	3,0	0,0	8,2
Otra vía	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8	0,0	2,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.7.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España* 2013.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	0,5	2,2	99,5	0,2	69,9	98,7	98,6	54,8
Pulmonar o fumada	18,5	97,3	0,2	30,6	10,6	0,4	0,0	11,3
Intranasal o esnifada	61,2	0,4	0,0	9,5	18,7	0,1	0,0	17,7
Parenteral o inyectada	19,6	0,1	0,3	59,6	0,4	0,5	0,7	16,1
Otra vía	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4	0,2	0,7	0,0

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.8.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España* 2012.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	46,0	47,0	42,5
Alcohol	39,0	40,1	35,5
Cannabis	33,3	34,9	27,2
Hipnosedantes	18,3	17,2	21,6
Heroína	13,0	13,2	12,5
Anfetaminas	8,9	8,7	9,7
Otros opioides	6,1	5,9	6,8
Éxtasis y derivados	4,6	4,7	4,4
Otras sustancias	3,3	2,6	5,4
Alucinógenos	2,5	2,5	2,6
Inhalables volátiles	0,5	0,4	0,8

Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España*, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	44,9	45,9	42,3
Alcohol	38,7	39,4	36,3
Cannabis	34,6	35,3	32,6
Hipnosedantes	17,8	17,0	20,1
Heroína	11,9	12,6	10,0
Anfetaminas	9,0	9,0	9,1
Otros opioides	5,7	5,5	6,2
Éxtasis y derivados	4,8	4,6	5,1
Otras sustancias	2,5	2,1	3,7
Alucinógenos	2,6	2,7	2,3
Inhalables volátiles	0,4	0,3	0,5


Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.10.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España*, 2013.



	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Total	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	4,8	2,6	0,4
Hombres	45,9	39,4	35,3	17,0	12,6	9,0	4,6	2,7	0,3
Mujeres	42,3	36,3	32,6	20,1	10,0	9,1	5,1	2,3	0,5


* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999- 2013

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2013.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051	1.310	1.127	1.049
Seis ciudades españolas	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395	421	339	306
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Estimación nacional	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	
Seis ciudades españolas	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	
Indicador mortalidad	-	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	
INE	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	

Estimación Nacional: Estimación del Observatorio Español de la droga y las toxicomanías (OEDT) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDT y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística)

Registro específico de mortalidad: seis ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de seis ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro específico de mortalidad: CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro general de mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística). Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

2.3.2.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2013.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453**	519	489
Sexo (%)											
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7
Grupo de edad (años)											
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6
>= 45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3
Estado civil (%)											
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,1
Procedencia del cadáver (%)											
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0
Evidencias de consumo reciente (%)											
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2
Evidencia de suicidio (%)											
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9
Signos recientes venopunción (%)											
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)											
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0
Anticuerpos anti-VIH (%)											
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5


* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

** El número de fallecidos incluye 45 casos de Galicia de los que no se dispone de información desagregada para el resto de las variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1983-2013.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Opioides	98,0	98,8	93,9	100,0	92,4	96,6	94,8	96,0	93,1	94,9	92,8	92,9	93,4	90,4	89,8	90,1
Cocaína	2,0	12,5	11,0	11,5	19,3	18,4	29,6	24,8	21,6	26,0	30,9	28,8	24,7	32,7	41,4	51,2
Hipnosedantes	13,7	22,5	41,5	46,0	33,8	40,2	43,8	47,4	37,2	37,9	37,4	48,4	54,8	47,7	58,6	47,4
Anfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,8	3,2	4,3	4,9	4,0	8,6	2,8
Cannabis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,2	11,3
Éxtasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	0,0
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	28,6	26,2
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Opioides	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	
Cocaína	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	
Hipnosedantes	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	
Anfetaminas	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	
Cannabis	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	
Éxtasis	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	
Alcohol	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33,0	34,3	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.4.

Número y proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 2003-2013.

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides	376	76,7	349	74,9	356	78,2	338	78,7	340	72,8	324	77,7
Cocaína	305	62,2	280	60,1	315	69,2	250	60,0	313	67,0	251	60,2
Barbitúricos	1	0,2	2	0,4	5	1,1	4	1,0	0	0,0	0	0,0
Benzodiazepinas	234	47,8	225	48,3	241	53,0	203	48,7	212	45,4	186	44,6
Anfetaminas	15	3,1	12	2,6	12	2,6	15	3,6	17	3,6	9	2,2
Éxtasis y derivados	8	1,6	9	1,9	2	0,4	7	1,7	5	1,1	6	1,4
Cannabis	82	16,7	78	16,7	95	20,9	70	16,8	68	14,6	65	15,6
Alucinógenos	2	0,4	5	1,1	0	0,0	1	0,2	2	0,4	3	0,7
S. volátiles	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	7	1,5	0	0,0
Alcohol	191	39,0	167	35,8	150	33,0	143	34,3	130	27,8	108	25,9
Casos analizados	490	100,0	466	100,0	455	100,0	428	100	475	100,0	424	100,0
	2009		2010		2011		2012		2013			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides			346	81,0	409	79,1	318	78,1	366	76,6	337	77,3
Cocaína			247	57,8	297	57,4	213	52,3	280	58,6	236	54,1
Barbitúricos			2	0,5	2	0,4	4	1,0	2	0,4	6	1,4
Benzodiazepinas			180	42,2	292	56,5	258	63,4	291	60,9	265	60,8
Anfetaminas			13	3,0	8	1,5	19	4,7	18	3,8	27	6,2
Éxtasis y derivados			4	0,9	4	0,8	7	1,7	8	1,7	5	1,1
Cannabis			88	20,6	123	23,8	100	24,6	107	22,4	94	21,6
Alucinógenos			0	0,0	2	0,4	2	0,5	3	0,6	1	0,2
S. volátiles			0	0,0	0	0,0	3	0,7	0	0,0	1	20,0
Alcohol			120	28,1	149	28,8	136	33,4	138	28,9	136	31,2
Casos analizados			427	97,5	517	100,0	408**	100,0	478	92,1	437	89,4


* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

** No se incluyen 45 casos de Galicia, ya que no se dispone de información desagregada por drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.5.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y otras sustancias distintas de los opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1983-2013.




	Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol		Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol
1983	0,0	0,0	-	1999	8,8	4,1	-
1984	0,0	0,0	-	2000	6,1	2,9	-
1985	2,1	0,7	-	2001	7,9	3,2	-
1986	0,0	0,0	-	2002	11,3	2,6	-
1987	1,7	0,9	-	2003	16,4	7,5	-
1988	0,9	0,0	-	2004	15,0	6,8	-
1989	1,8	1,3	-	2005	20,6	6,8	4,1
1990	0,4	0,0	-	2006	18,5	4,7	3,7
1991	1,0	0,0	-	2007	25,1	7,8	2,9
1992	0,6	0,4	-	2008	19,3	6,4	4,0
1993	3,3	1,2	-	2009	16,4	5,4	4,7
1994	2,8	0,6	-	2010	18,2	5,8	2,1
1995	3,5	1,2	-	2011	17,1	3,4	4,6
1996	3,9	2,3	-	2012	19,9	7,1	7,6
1997	5,5	2,4	-	2013	19,7	3,8	3,2
1998	7,3	3,1	-				

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.6.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y otras sustancias distintas de la cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiacepinas (BZD) y/o alcohol)). España*, 1983-2013.



	Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol		Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol
1983	59,8	46,3	–	1999	31,5	7,6	–
1984	49,6	28,1	–	2000	40,3	9,2	–
1985	49,7	25,2	–	2001	41,7	8,7	–
1986	49,2	20,2	–	2002	40,5	7,1	–
1987	47,0	23,9	–	2003	30,8	5,9	–
1988	42,4	20,8	–	2004	29,7	6,4	–
1989	35,2	14,1	–	2005	26,6	4,1	16,9
1990	46,6	20,6	–	2006	36,8	4,7	17,6
1991	31,3	11,5	–	2007	30,7	7,8	14,5
1992	35,4	14,2	–	2008	34,3	7,0	15,3
1993	44,0	18,1	–	2009	37,8	7,5	13,9
1994	55,8	13,1	–	2010	39,8	6,3	16,0
1995	59,8	9,0	–	2011	42,9	4,4	16,9
1996	55,1	17,7	–	2012	37,9	2,7	24,3
1997	45,4	12,6	–	2013	42,8	4,6	29,3
1998	41,7	10,8	–				

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.7.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide, sólo metadona y benzodiazepinas). España*, 1996-2013.


Año	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	–	–	–
1997	0,9	–	–	–
1998	0,9	–	–	–
1999	0,4	–	–	–
2000	1,2	–	–	–
2001	2,7	–	–	–
2002	1,8	–	–	–
2003	0,6	–	–	–
2004	0,4	–	–	–
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.8.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013.



	Hombres	Mujeres	Total
1999	657	95	752
2000	610	81	691
2001	558	92	650
2002	564	88	652
2003	552	81	633
2004	568	91	659
2005	539	97	636
2006	417	72	489
2007	462	57	519
2008	470	70	540
2009	366	76	442
2010	330	63	393
2011	291	70	361
2012	324	59	383
2013	333	70	403

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.9.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según edad (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013.



	< 35 años	≥ 35 años	Total
1999	505	247	752
2000	429	262	691
2001	391	259	650
2002	349	303	652
2003	310	323	633
2004	285	374	659
2005	262	374	636
2006	200	289	489
2007	192	327	519
2008	193	347	540
2009	141	301	442
2010	108	285	393
2011	101	260	361
2012	104	279	383
2013	93	310	403

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

<http://www.msssi.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

<http://www.intelpage.info/centro-de-inteligencia-contra-el-terrorismo-y-el-crimen-organizado-citco.html>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

<http://www.minhap.gob.es/>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.cmtabacos.es/>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

<http://www.mineco.gob.es/>

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

http://www.who.int/substance_abuse/en/

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO
EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

http://ec.europa.eu/public_opinion/