

ESTADÍSTICAS 2017

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Rosario SENDINO. Directora de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación Adjunta al Delegado del Gobierno.

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Aurora RUIZ. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Canarias

Baltasar FERNÁNDEZ

Amelia M^a HERNÁNDEZ

Luz Marina MORENO

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Berta HERNÁNDEZ

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier ROCA

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Extremadura

Antonia María VAS

M^a Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara FERREIRA

Madrid

Ana RUIZ

M^a Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Andrés ALCARAZ

Pedro PARDO

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

M^a Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Ministerio de Justicia.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@msssi.es

Internet: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-18-111-2

En un ejercicio en el que corresponde planificar y aprobar una nueva Estrategia Nacional que va a regir las políticas de adicciones durante los próximos ocho años, cobra un sentido especial la necesidad de disponer de información fiable, contrastada y actualizada.

La actualización de los datos y la información resultante de los mismos es fundamental para aproximarse a un mejor diagnóstico y comprensión de los fenómenos, permitir evaluar globalmente las políticas y las intervenciones, así como para poner de manifiesto las nuevas necesidades y oportunidades de mejora. Por tanto, resulta esencial para formular las políticas, los planes y los programas, y tomar decisiones sobre sus contenidos.

En este documento que tengo el placer de prologar un año más, se ofrece una información relevante que debemos poner en valor como instrumento de planificación, ya que contiene los elementos necesarios para evaluar la situación real en nuestro país, tanto desde el punto de vista de la reducción de la demanda de drogas, como del de reducción de la oferta de las mismas. Además, ofrece información sobre nuevas sustancias psicoactivas detectadas en territorio español y eventos relacionados con el consumo de las mismas de especial significación en Salud Pública, a través de los datos obtenidos en el Sistema Español de Alerta Temprana, proporcionando un conocimiento fundamental para poder dar respuestas adecuadas e integrales a estos fenómenos.

Quiero resaltar que esta publicación es el resultado del esfuerzo colectivo de muchos profesionales, voluntarios, organizaciones sociales e instituciones, que nos aportan los datos necesarios para su análisis y elaboración. A todos ellos, y muy especialmente a las personas integrantes del equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, quiero manifestar un año más mi agradecimiento por la realización de un trabajo ejemplar, elaborado con el máximo rigor.

Francisco de Asís Babín Vich
Delegado del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2017

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

Presentación	3
Introducción	19
1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas	20
1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015	21
Metodología	
1.1.1. Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2015	21
1.1.2. Distribución de la muestra de la encuesta EDADES por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015	22
1.1.3. Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (porcentajes). España, 2015	23
Prevalencia de consumo de drogas 1995-2015: evolución temporal. Edad y sexo	
1.1.4. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	24
1.1.5. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	24
1.1.6. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	25
1.1.7. Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	25
1.1.8. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	26
1.1.9. Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2015	26
1.1.10. Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2015	27
1.1.11. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015	27
1.1.12. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015	28
1.1.13. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015	29

1.1.14.	Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015	30
1.1.15.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015	31
1.1.16.	Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2015	32
1.1.17.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España 2015	32
1.1.18.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	33
1.1.19.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	35
1.1.20.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	37
1.1.21.	Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	39
1.1.22.	Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	40
1.1.23.	Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	41
1.1.24.	Prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	42
1.1.25.	Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de personas). España, 2015	42

Consumo por tipo de drogas: bebidas alcohólicas

1.1.26.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y edad media en el inicio de consumo de alcohol en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	43
1.1.27.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	43
1.1.28.	Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	44
1.1.29.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	44
1.1.30.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015	45
1.1.31.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	45
1.1.32.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2015	46
1.1.33.	Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	46
1.1.34.	Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días según hayan consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días o no, en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	47
1.1.35.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2003-2015	47

1.1.36.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	48
1.1.37.	Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	48
1.1.38.	Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	49
1.1.39.	Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	49
1.1.40.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	50
1.1.41.	Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	50
1.1.42.	Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	51
1.1.43.	Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	51
1.1.44.	Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015	52
1.1.45.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	52
1.1.46.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	52
1.1.47.	Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	53
1.1.48.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no. España, 2015	53
1.1.49.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho binge drinking en los últimos 30 días o no. España, 2015	53
1.1.50.	Prevalencia de botellón y del consumo de alcohol en botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	54
1.1.51.	Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015	54
1.1.52.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población, según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015 .	54

Consumo por tipo de drogas: tabaco

1.1.53.	Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	55
1.1.54.	Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	55

1.1.55.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015	56
1.1.56.	Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015	56
1.1.57.	Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	57
1.1.58.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015	57
1.1.59.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de formato de consumo que ha utilizado para fumar, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	58
1.1.60.	Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015	58

Consumo por tipo de drogas: cigarrillos electrónicos

1.1.61.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan nicotina, edad y sexo (porcentajes). España, 2015	59
1.1.62.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	59
1.1.63.	Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los que han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los que nunca han fumado (porcentajes). España, 2015	60
1.1.64.	Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años, según hayan consumido tabaco o no (porcentajes). España, 2015	60
1.1.65.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	61
1.1.66.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	61
1.1.67.	Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido cannabis en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	61

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

1.1.68.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	62
1.1.69.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	62
1.1.70.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta e hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	63
1.1.71.	Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	63
1.1.72.	Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	64
1.1.73.	Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V \geq 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	64

1.1.74.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	65
1.1.75.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	65
1.1.76.	Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, según sexo (porcentajes). España, 2015	66
1.1.77.	Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2015	66
1.1.78.	Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	67
1.1.79.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y riesgo percibido ante el consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	67
1.1.80.	Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015	68
1.1.81.	Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	68
1.1.82.	Perfil de la población que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses, según registren consumo problemático de hipnosedantes DSM-V >2 o no (porcentajes). España, 2015	69
1.1.83.	Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V ≥ 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	70
1.1.84.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad (proporción de personas que piensan que adquirir la sustancia es fácil o muy fácil), según DSM-V ≥ 2 o no (porcentajes). España, 2015	70
1.1.85.	Prevalencia de borracheras y de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha respondido a la escala DSM-V para hipnosedantes, según el resultado sea DSM-V ≥ 2 o <2 (porcentajes). España, 2015	70

Consumo por tipo de drogas: cannabis

1.1.86.	Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	71
1.1.87.	Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	71
1.1.88.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	72
1.1.89.	Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	72
1.1.90.	Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	73
1.1.91.	Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	73
1.1.92.	Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	74
1.1.93.	Prevalencia y continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2015	75

1.1.94.	Prevalencia de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según el consumo de cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	75
1.1.95.	Número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	76
1.1.96.	Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015	76
1.1.97.	Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015	76
1.1.98.	Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	77
1.1.99.	Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	77
1.1.100.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	78
1.1.101.	Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	78
1.1.102.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo (porcentajes). España 2013, 2015	78
1.1.103.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años (porcentaje y estimación). España, 2013-2015	79
1.1.104.	Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2013-2015	79
1.1.105.	Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	80
1.1.106.	Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad, según puntuación en escala CAST (porcentajes). España, 2015	80
1.1.107.	Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	80
1.1.108.	Distribución según sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, frecuencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de consumo de otras drogas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según la puntuación obtenida, y entre la población general (porcentajes). España, 2015	81
1.1.109.	Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015	82

Consumo por tipo de drogas: cocaína

1.1.110.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	82
1.1.111.	Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	83
1.1.112.	Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	83
1.1.113.	Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	84

1.1.114. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	84
1.1.115. Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	85
1.1.116. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1999-2015	85
1.1.117. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1999-2015	86
1.1.118. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015 . . .	86
1.1.119. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	87
1.1.120. Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	87
1.1.121. Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	88
1.1.122. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	88

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

1.1.123. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	89
1.1.124. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	89
1.1.125. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	90
1.1.126. Prevalencia de consumo de éxtasis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	90
1.1.127. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de éxtasis una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	91
1.1.128. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	91
1.1.129. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de éxtasis (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido éxtasis alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	92

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

1.1.130. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	92
1.1.131. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	93
1.1.132. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	93

1.1.133. Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	94
1.1.134. Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	94
1.1.135. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de anfetaminas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido anfetaminas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	95
1.1.136. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	95

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos

1.1.137. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	96
1.1.138. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	96
1.1.139. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	97
1.1.140. Prevalencia de consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	97
1.1.141. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de alucinógenos (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido alucinógenos alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	98
1.1.142. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de alucinógenos una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	98
1.1.143. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de alucinógenos (conseguirlos en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	99
1.1.144. Prevalencia de consumo de setas alucinógenas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	99
1.1.145. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de setas alucinógenas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	100

Consumo por tipo de drogas: heroína

1.1.146. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	100
1.1.147. Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	101
1.1.148. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de heroína una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	101
1.1.149. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015	102

Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

1.1.150. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015 . . .	102
1.1.151. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	103

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

1.1.152. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	103
1.1.153. Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	104
1.1.154. Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	104
1.1.155. Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	105
1.1.156. Prevalencias de consumo de diferente sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	106
1.1.157. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	107
1.1.158. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	107
1.1.159. Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015	108
1.1.160. Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2015	109
1.1.161. Proporción porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 30 días). España, 2015	109
1.1.162. Prevalencia de binge drinking y de intoxicaciones etílicas, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	110
1.1.163. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015	110
1.1.164. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015	111
1.1.165. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015	111
1.1.166. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	112
1.1.167. Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	112
1.1.168. Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	113

Nuevas sustancias psicoactivas

1.1.169. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	114
1.1.170. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	114
1.1.171. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011-2015	115
1.1.172. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015	115
1.1.173. Distribución de la población de 15-44 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no, según sexo, estado civil y nivel de estudios (porcentajes). España, 2015	116
1.1.174. Edad de inicio en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015	116
1.1.175. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	117
1.1.176. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	117
1.1.177. Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según edad y sexo. España, 2015	117
1.1.178. Riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad y sexo. España, 2015	118
1.1.179. Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se hayan consumido alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	118
1.1.180. Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas como GHB y ketamina (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	119
1.1.181. Vías de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	119
1.1.182. Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice o salvia alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	119
1.1.183. Prevalencia de consumo de cinco o más sustancias psicoactivas alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se hayan consumido en alguna ocasión nuevas sustancias, ketamina, GHB, spice o salvia (porcentajes). España, 2015	120
1.1.184. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales en los últimos 12 meses en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015	120
1.1.185. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2015	121
1.1.186. Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según haya consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015	122

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

1.1.187. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	123
1.1.188. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos, bastantes, pocos o ningún problema). España, 2015	124
1.1.189. Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2015	124
1.1.190. Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015	125
1.1.191. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos), (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	126
1.1.192. Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015	126
1.1.193. Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	127
1.1.194. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015	127
1.1.195. Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad (porcentajes). España, 2015	128

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

1.1.196. Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2015	129
---	-----

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción sobre la importancia del problema del consumo de drogas y visibilidad del problema

1.1.197. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2015	129
1.1.198. Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2015	130

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

1.1.199. Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015	131
1.1.200. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	132
1.1.201. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	132

1.1.202. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015	133
--	-----

Percepción del estado de salud en consumidores de drogas

1.1.203. Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2015	133
1.1.204. Percepción de estado de salud bueno o muy bueno en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015	134
1.1.205. Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años, según se hayan consumido sustancias psicoactivas en los últimos 30 días o no (porcentajes fila). España, 2015	135

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

2. Problemas relacionados con las drogas 137

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2015 138

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2015

2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2015	138
2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2015	139
2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2015	140
2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2015	141
2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2015	142
2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2015	143
2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2015	144
2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2015	144
2.1.9. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos). España, 1996-2015	145
2.1.10. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos por primera vez). España, 1996-2015	146
2.1.11. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2015	147
2.1.12. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2015	148
2.1.13. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2015	149
2.1.14. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (tratados por primera vez). España, 1991-2015	150
2.1.15. Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	151
2.1.16. Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	152
2.1.17. Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	153

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015	154
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2015	155
2.1.20.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2015	156
2.1.21.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2015	157
2.1.22.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2015	158

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2015

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2015	159
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2015	160
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2015	161
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015	162
2.1.27.	Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015	163
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015	165
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015	166
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2015	168
2.1.31.	Prevalencia y conocimiento del estado serológico sobre infección por VIH, hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC) entre los inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas (nº absolutos y %). España, 2015	174
2.1.32.	Prevalencia de infección y conocimiento de estado serológico sobre VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada alguna vez en la vida o último año (%). España, 2005-2015	175
2.1.33.	Evolución del número de inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (nº absolutos y %). España, 2005-2015	175

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2015 176

2.2.1.	Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España, 1996-2015	176
2.2.2.	Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España, 1996-2015	177

2.2.3.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2015	178
2.2.4.	Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España, 2015	178
2.2.5.	Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España, 2015 . .	179
2.2.6.	Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2015	179
2.3.	Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999-2015	180
2.3.1.	Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2015	180
Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas		
2.3.2.	Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2015	181
2.3.3.	Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2015	182
2.3.4.	Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos identificado mediante análisis toxicológico. España, 2004-2015 . .	183
2.3.5.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España, 2005-2015	183
2.3.6.	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (sólo cocaína, cocaína y no opioides, cocaína y alcohol). España, 1985-2015	184
2.3.7.	Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2015	184
2.3.8.	Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta opioides (sólo opioides, opioides y no cocaína, opioides y cocaína). España, 1984-2015	185
2.3.9.	Distribución de los fallecidos en los que se detecta opioides en función de otras sustancias detectadas. España, 2015	185
2.3.10.	Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide —independientemente de otras sustancias— y sólo metadona y benzodiazepinas). España, 1996-2015	186
Registro General de Mortalidad		
2.3.11.	Evolución del número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 1999-2015	187
2.3.12.	Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2015	187
Información complementaria		188
Páginas web de interés		189

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), nuevas adicciones y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2017*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2017*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1995 hasta 2015. La fuente de información es la Encuestas sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), en sus sucesivas ediciones.

EDADES se realiza de forma bienal, y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento no se incluye información de ESTUDES, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, se corresponden al año 2014 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2016 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.


En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2015. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998.

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>


Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2015

1.1.1.

Evolución del tamaño de muestra de la encuesta EDADES en la población de 15 a 64 años. España, 1995-2015.



	Tamaño muestra (personas)
1995	8.888
1997	12.304
1999	12.234
2001	14.113
2003	12.033
2005	27.934
2007	23.715
2009	20.109
2011	22.128
2013	23.136
2015	22.541

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.2.

Distribución de la muestra de la encuesta EDADES por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015.

CCAA	DGPNSD ¹	Ampliación ²	Muestra final ³	Error muestral ⁴
Andalucía	2.207	-	2.207	2,1%
Aragón	860	-	860	3,3%
Asturias	777	-	777	3,5%
Islas Baleares	802	-	802	3,5%
Canarias	1.125	-	1.125	2,9%
Cantabria	572	410	982	3,1%
Castilla y León	1.174	-	1.174	2,9%
Castilla-La Mancha	1.078	493	1.571	2,5%
Cataluña	2.041	-	2.041	2,2%
Comunidad Valenciana	1.674	754	2.428	2,0%
Extremadura	794	-	794	3,5%
Galicia	1.249	766	2.015	2,2%
Comunidad de Madrid	1.932	-	1.932	2,2%
Murcia	937	-	937	3,2%
Navarra	595	-	595	4,0%
País Vasco	1.121	-	1.121	2,9%
La Rioja	420	319	739	3,6%
Ceuta	225	-	225	6,5%
Melilla	216	-	216	6,7%
Total	19.799	2.742	22.541	0,7%

1. Número de entrevistas financiadas por la DGPNSD.

2. Número de entrevistas financiadas por las CCAA.

3. Muestra final. Número de entrevistas realizadas.

4. Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95% y $p = q = 0,5$.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.3.

Distribución de la muestra de la población de 15-64 años de la encuesta EDADES según sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, nacionalidad y situación de convivencia (porcentajes). España, 2015.

		Porcentaje
SEXO	Hombre	50,3
	Mujer	49,7
EDAD	15 - 24 años	14,5
	25 - 34 años	19,4
	35 - 44 años	24,8
	45 - 54 años	22,6
	55 - 64 años	18,6
ESTADO CIVIL	Soltero/a	38,7
	Casado/a	51,4
	Separado/a - Divorciado/a	7,7
	Viudo/a	2,2
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	14,8
	Estudios secundarios	65,7
	Estudios universitarios	19,5
NACIONALIDAD	Española	88,5
	Extranjera	11,5
CONVIVENCIA*	Solo	11,3
	Cónyuge / pareja	58,4
	Padre	16,8
	Madre	22,4
	Hijos	42,0
	Hermanos	12,3
	Abuelos	1,1

* La suma de porcentajes puede superar el 100% por tratarse de una pregunta en la que es posible seleccionar varias opciones de respuesta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.4.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años (porcentajes).
España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	–	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Alcohol	–	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
Cannabis	14,5	22,9	19,6	23,8	29,0	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Éxtasis	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6
Alucinógenos	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8
Anfetaminas/speed	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,3	3,8	3,6
Cocaína en polvo	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Cocaína base	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	8,3	10,2	8,8	10,3	9,1
Heroína	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Inhalables volátiles	0,7	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	1,1	0,6	0,8	0,6	0,5
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Tranquilizantes con o sin receta	–	–	–	–	–	7,0	13,0	11,0	17,1	20,1	–
Somníferos con o sin receta	–	–	–	–	–	4,6	6,0	6,3	7,9	9,6	–
Hipnosedantes sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	2,7	4,1
Tranquilizantes sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	2,2	–
Somníferos sin receta	–	–	–	–	–	–	–	–	1,3	1,5	–

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.5.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes).
España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	–	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Alcohol	68,5	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
Cannabis	7,5	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Éxtasis	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,1	0,8	0,7	0,7	0,6
Alucinógenos	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Anfetaminas/speed	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Cocaína en polvo	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	3,1	2,7	2,3	2,2	2,0
Heroína	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Tranquilizantes con o sin receta	–	–	–	–	–	3,9	6,9	5,5	9,8	10,6	–
Somníferos con o sin receta	–	–	–	–	–	2,7	3,8	3,6	4,4	5,5	–
Hipnosedantes sin receta	–	2,3	2,3	2,8	3,1	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3
Tranquilizantes sin receta	–	2,0	2,0	2,5	2,5	0,9	0,9	1,6	0,9	0,9	–
Somníferos sin receta	–	1,2	1,3	1,6	1,6	0,8	0,8	1,1	0,6	0,6	–

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.6.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Alcohol	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
Cannabis	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,2	7,6	7,0	6,6	7,3
Éxtasis	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2
Alucinógenos	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Cocaína en polvo	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
Cocaína base	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0	0,9
Heroína	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	2,7	4,7	4,0	6,9	7,7	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	2,0	2,5	2,7	3,4	4,0	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,9
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,3	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.7.

Prevalencia de consumo diario de drogas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Alcohol	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3
Cannabis	0,7	0,8	1,5	1,5	2,0	1,6	2,0	1,7	1,9	2,1
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	2,1	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	1,7	2,6	2,3	4,0	5,9	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	1,1	1,1	1,4	1,7	3,1	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.8.


Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.

	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días	A diario en los últimos 30 días
Tabaco	72,5	40,2	38,5	30,8
Alcohol	93,5	77,6	62,1	9,3
Cannabis	31,5	9,5	7,3	2,1
Éxtasis	3,6	0,6	0,2	-
Alucinógenos	3,8	0,6	0,2	-
Anfetaminas/speed	3,6	0,5	0,2	-
Cocaína en polvo	8,9	1,9	0,9	-
Cocaína base	0,8	0,2	0,1	-
Cocaína polvo y/o base	9,1	2,0	0,9	-
Heroína	0,6	0,1	0,1	-
Inhalables volátiles	0,5	0,1	0,0	-
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	12,0	8,1	6,0
Hipnosedantes sin receta	4,1	2,3	0,9	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.9.

Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.10.

Edad media de inicio (años) en el consumo de distintas drogas psicoactivas entre la población de 15-64 años. España, 1995-2015.

	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Tabaco	15,9	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4
Alcohol	–	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6
Cannabis	18,3	18,9	18,7	18,5	18,5	18,3	18,6	18,6	18,7	18,6	18,3
Cocaína en polvo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9
Heroína	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2
Anfetaminas	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2
Alucinógenos	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3
Inhalables volátiles	17,7	19,0	18,1	17,5	17,5	17,8	19,7	19,2	19,7	19,4	20,5
Cocaína base	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	21,4	23,1	22,4	23,2	20,7
Cocaína (polvo y/o base)	–	–	–	–	–	–	–	20,9	21,0	21,3	20,8
Éxtasis	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7
Hipnosedantes con o sin receta	–	–	–	–	–	32,4	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6
Hipnosedantes sin receta	–	28,7	29,2	29,5	30,0	28,5	29,1	29,5	27,8	31,3	32,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.11.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015.

	2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M
Tabaco	77,6	65,7	77,5	68,6	77,1	67,9
Alcohol	94,0	87,7	95,0	91,3	95,3	91,7
Cannabis	35,4	19,2	37,9	22,7	40,1	22,8
Éxtasis	5,1	2,0	6,3	2,2	5,3	1,8
Alucinógenos	4,4	1,4	5,8	1,8	5,7	1,8
Anfetaminas/speed	4,8	1,7	5,7	1,8	5,4	1,9
Cocaína en polvo	12,7	4,7	14,9	5,4	13,3	4,6
Cocaína base	1,5	0,3	1,7	0,3	1,4	0,3
Cocaína polvo y/o base	12,8	4,7	15,0	5,4	13,4	4,7
Heroína	0,9	0,2	1,2	0,2	1,0	0,3
Inhalables volátiles	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2
Hipnosedantes con o sin receta	13,7	25,4	16,8	27,6	13,6	23,9
Hipnosedantes sin receta	2,1	2,6	2,6	2,8	3,3	4,9

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	-	-	55,0	38,7	50,3	39,2	51,5	40,5	53,0	42,6	47,2	37,5	46,0	37,6	48,4	37,0	44,2	36,0	44,2	37,2	44,4	36,0
Alcohol	79,3	58,0	86,4	70,5	83,2	67,2	85,2	70,9	84,5	68,4	84,0	69,2	80,4	66,4	84,4	72,7	83,2	69,9	83,2	73,4	82,9	72,1
Cannabis	10,7	4,4	10,7	4,7	9,6	4,3	13,0	5,5	16,2	6,3	15,7	6,6	13,6	6,6	14,8	6,2	13,6	5,5	12,9	5,4	13,3	5,6
Éxtasis	1,9	0,7	1,2	0,5	1,2	0,5	2,8	0,7	2,0	0,8	1,8	0,6	1,6	0,5	1,4	0,3	1,0	0,4	1,0	0,3	0,9	0,3
Alucinógenos	1,1	0,4	1,4	0,4	0,8	0,4	1,2	0,2	0,9	0,3	1,1	0,4	0,9	0,3	0,7	0,2	0,6	0,2	0,5	0,1	0,8	0,3
Anfetaminas/speed	1,3	0,7	1,4	0,4	1,0	0,4	1,6	0,6	1,1	0,5	1,4	0,5	1,3	0,3	1,0	0,3	0,9	0,3	0,8	0,4	0,8	0,3
Cocaína en polvo	2,7	1,0	2,6	0,6	2,3	0,8	3,8	1,3	4,1	1,2	4,6	1,3	4,4	1,5	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	0,9	2,9	0,9
Cocaína base	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	1,6	4,2	1,0	3,6	0,9	3,3	1,0	3,1	0,9
Heroína	0,8	0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0
Inhalables	0,2	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Hipnosedantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,7	6,8	11,5	4,6	9,3	7,6	15,3	8,5	16,0	8,3	15,8
Tranquilizantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,2	4,7	9,1	3,4	7,6	6,4	13,2	7,3	14,0	-	-
Somníferos																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	2,8	4,3	2,6	4,6	3,1	5,9	3,7	7,3	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	2,3	2,4	2,3	2,4	2,5	3,1	2,9	3,3	1,1	1,3	1,2	1,4	1,9	1,9	1,1	1,2	1,1	1,3	1,6	2,9
Tranquilizantes sin receta	-	-	2,0	2,1	1,9	2,2	2,2	2,8	2,5	2,5	0,8	1,0	0,9	0,9	1,5	1,7	0,9	1,0	0,8	1,0	-	-
Somníferos sin receta	-	-	1,2	1,2	1,4	1,2	1,4	1,8	1,5	1,9	0,7	0,9	0,6	0,8	1,1	1,0	0,5	0,7	0,6	0,7	-	-

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Tabaco	51,4	34,4	45,0	35,2	46,5	36,3	47,9	37,9	43,1	33,6	42,6	34,7	44,7	34,0	41,4	33,7	41,7	34,8	42,6	34,3
Alcohol	75,8	52,1	74,4	49,1	76,4	50,9	75,8	52,1	76,0	52,9	71,4	49,0	74,0	52,2	73,2	51,2	73,4	55,3	71,3	52,8
Cannabis	6,7	2,5	6,2	2,8	9,4	3,4	11,3	3,9	12,5	4,7	10,0	4,2	11,0	4,0	10,2	3,8	9,8	3,4	10,7	3,9
Éxtasis	0,5	0,1	0,3	0,2	1,3	0,3	0,5	0,2	0,9	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1
Alucinógenos	0,3	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,1
Anfetaminas/speed	0,4	0,1	0,4	0,2	0,9	0,2	0,4	0,1	0,6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,2	0,4	0,1	0,4	0,1	0,3	0,1
Cocaína en polvo	1,5	0,2	1,3	0,4	2,2	0,5	1,6	0,5	2,5	0,7	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,4	0,3
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Cocaína (polvo y/o base)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	0,8	2,0	0,4	1,8	0,5	1,7	0,4	1,5	0,3
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,1	4,3	7,6	3,2	7,0	5,2	11,4	5,8	12,1	5,4	10,8
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,3	6,3	2,4	5,7	4,4	9,6	5,1	10,4	-	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	2,0	3,0	1,9	3,5	2,1	4,7	2,6	5,5	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	1,1
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,5	0,4	-	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,3	0,2	-	-

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.14.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015		
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	
Tabaco	-	-	72,7	66,9	65,2	64,7	69,4	67,6	69,2	68,7	67,9	70,7	66,6	69,8	70,1	78,3	67,8	74,2	68,5	75,6	65,4	76,2	
Alcohol	-	-	91,4	89,9	87,4	87,2	89,3	88,8	88,9	88,3	93,2	94,1	87,7	88,3	92,2	95,5	89,5	91,7	92,2	93,7	91,2	94,7	
Cannabis	22,9	6,1	32,4	14,4	28,1	12,3	34,3	15,3	39,0	21,0	39,4	20,4	37,5	20,2	42,4	25,2	36,9	21,6	40,2	25,0	38,8	27,8	
Éxtasis	3,5	0,5	4,8	0,4	4,4	0,7	7,7	1,0	8,3	1,6	7,6	1,9	7,2	2,2	8,4	2,6	5,7	2,3	6,2	3,2	4,7	3,0	
Alucinógenos	3,3	0,9	4,7	1,3	2,9	1,0	4,6	1,3	4,7	1,6	5,4	1,9	5,9	2,3	5,7	2,4	4,4	2,0	5,0	3,1	4,5	3,4	
Anfetaminas/speed	3,7	1,0	4,2	1,3	3,1	1,3	4,6	1,5	4,7	1,9	5,2	2,0	5,6	2,6	5,7	2,4	4,6	2,4	4,9	3,2	4,3	3,3	
Cocaína en polvo	5,4	1,4	5,5	1,6	4,7	1,8	7,7	2,4	8,9	3,6	10,4	4,4	11,4	5,5	13,5	7,9	11,0	7,4	11,6	9,4	9,3	8,8	
Cocaína base	0,5	0,1	0,7	0,2	0,6	0,2	0,7	0,3	0,7	0,3	0,7	0,6	2,3	1,5	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	1,1	0,6	1,0	
Heroína	1,4	0,2	0,9	0,3	0,6	0,3	0,7	0,5	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,9	0,2	0,9	
Inhalables	1,1	0,3	1,3	0,3	0,9	0,4	1,5	0,2	1,7	0,5	1,2	0,5	1,7	0,8	1,1	0,4	1,1	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	
Hipnosedantes																							
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	10,6	10,6	19,6	8,8	16,5	12,1	24,1	13,0	27,0	10,8	22,8	
Tranquilizantes																							
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,4	8,8	16,0	7,1	13,8	10,7	21,0	12,3	24,5	-	-	
Somníferos																							
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	3,7	7,6	4,0	8,0	3,9	10,3	5,1	12,2	-	-	
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,5	2,3	2,8	2,6	4,8	
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	1,9	2,3	-	-	
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,4	1,0	1,7	-	-	

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.15.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1995-2015.

	1995		1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	-	-	54,5	39,9	49,5	40,6	52,0	41,2	52,8	43,8	47,3	38,8	46,2	38,8	45,3	41,1	43,8	37,9	43,4	39,2	40,8	39,9
Alcohol	72,9	64,1	82,5	74,9	79,0	71,8	81,5	75,2	79,5	74,2	79,4	74,7	76,9	71,1	80,1	77,7	79,1	75,1	81,3	76,7	79,2	76,7
Cannabis	12,7	2,3	14,2	1,8	12,6	2,2	16,7	3,3	20,1	4,2	19,8	4,7	18,9	3,9	19,4	4,6	17,0	5,1	17,0	4,8	17,1	5,5
Éxtasis	2,4	0,1	1,8	0,0	1,6	0,1	3,7	0,2	2,9	0,1	2,4	0,4	2,4	0,4	1,8	0,2	1,4	0,2	1,5	0,2	1,3	0,2
Alucinógenos	1,3	0,2	1,8	0,1	1,2	0,2	1,3	0,2	1,1	0,2	1,5	0,1	1,4	0,1	1,1	0,1	0,9	0,1	0,8	0,1	1,1	0,3
Anfetaminas/speed	1,8	0,2	1,8	0,1	1,3	0,2	2,2	0,2	1,6	0,2	1,9	0,3	1,7	0,2	1,4	0,1	1,1	0,3	1,2	0,3	1,0	0,3
Cocaína en polvo	3,1	0,5	2,9	0,5	2,8	0,5	4,5	0,9	4,8	0,9	5,2	1,3	5,3	1,3	4,3	1,5	3,5	1,4	3,2	1,5	3,0	1,3
Cocaína base	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2
Heroína	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Inhalables	0,2	0,1	0,4	0,0	0,1	0,1	0,3	0,0	0,2	0,0	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Hipnosedantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,4	5,8	11,4	4,0	9,1	6,3	14,5	6,4	15,5	6,3	15,0
Tranquilizantes																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,8	4,4	8,4	3,1	7,1	5,5	12,4	5,6	13,4	-	-
Somníferos																						
con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,6	1,8	4,6	1,9	4,7	2,0	5,9	2,4	7,1	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	2,3	2,4	1,9	2,7	2,8	2,9	2,5	3,6	1,0	1,3	1,3	1,1	1,8	1,9	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	2,7
Tranquilizantes sin receta	-	-	1,9	2,2	1,8	2,3	2,5	2,4	1,9	3,1	0,7	0,9	1,1	0,8	1,6	1,5	1,0	0,9	0,8	1,0	-	-
Somníferos sin receta	-	-	1,0	1,4	1,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,9	0,6	0,9	0,7	0,7	1,0	1,1	0,5	0,7	0,5	0,7	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.16.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997		1999		2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2015	
	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64	15-34	35-64
Tabaco	49,6	36,9	43,7	36,9	46,3	37,5	47,2	39,5	42,3	35,5	42,2	36,3	40,9	38,4	40,4	35,9	40,2	37,2	38,4	38,6
Alcohol	66,7	61,6	64,4	59,4	65,7	62,1	65,8	62,7	66,3	63,4	61,7	59,4	63,1	63,3	63,7	61,5	65,4	63,9	61,6	62,4
Cannabis	8,5	1,1	7,9	1,5	11,5	2,3	13,4	2,9	15,4	3,6	13,5	2,8	14,1	3,2	12,5	3,7	12,2	3,5	12,9	4,4
Éxtasis	0,6	0,0	0,5	0,0	1,5	0,2	0,7	0,0	1,1	0,2	0,8	0,2	0,8	0,1	0,6	0,1	0,4	0,1	0,5	0,1
Alucinógenos	0,4	0,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,1	0,2	0,0	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,5	0,0	0,5	0,1	1,1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	0,5	0,1	0,7	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1	0,5	0,1
Cocaína en polvo	1,6	0,2	1,5	0,3	2,4	0,5	1,9	0,4	2,8	0,7	2,9	0,7	2,0	0,7	1,7	0,8	1,2	0,9	1,3	0,6
Cocaína base	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Heroína	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Inhalables	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hipnosedantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	5,0	2,8	8,1	2,4	7,0	3,4	11,3	3,4	12,0	3,3	10,6
Tranquilizantes con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	2,5	6,2	1,8	5,5	2,8	9,5	2,9	10,4	-	-
Somníferos con o sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	2,9	1,0	3,6	1,2	3,7	1,3	4,7	1,4	5,5	-	-
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,8	0,4	0,6	0,7	1,0
Tranquilizantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,6	0,3	0,5	-	-
Somníferos sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,2	0,3	-	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.17.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas a diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	9,3	14,5	4,1	1,4	2,0	0,9	4,5	7,4	1,7	7,6	11,8	3,0	12,1	18,8	6,1	19,6	30,2	8,2
Tabaco	30,8	34,2	27,3	23,9	25,3	22,4	34,1	38,7	29,4	32,8	36,1	29,2	34,8	37,5	32,4	25,3	30,5	19,7
Hipnosedantes con o sin receta	6,0	4,0	8,1	1,1	0,8	1,4	2,5	1,7	3,3	4,9	3,8	6,1	8,4	5,4	11,0	12,1	7,2	17,2
Cannabis	2,1	3,4	0,9	3,7	5,2	2,0	3,8	5,8	1,7	2,1	3,5	0,7	1,1	1,9	0,3	0,5	0,9	0,0
	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años								
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M						
Alcohol	1,0	0,7	1,3	9,6	14,9	4,2	3,2	5,0	1,3	12,5	19,3	5,5						
Tabaco	7,5	6,4	8,5	31,5	35,1	28,0	29,7	32,9	26,5	31,4	35,0	27,8						
Hipnosedantes con o sin receta	0,9	0,2	1,5	6,2	4,1	8,3	1,9	1,3	2,5	8,1	5,3	10,9						
Cannabis	0,9	1,7	0,2	2,2	3,4	0,9	3,7	5,6	1,9	1,3	2,2	0,4						

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.18.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	93,5	95,3	91,7	87,5	89,0	86,0	93,9	95,8	91,9	94,5	95,7	93,2	95,6	97,0	94,3	94,0	97,3	90,5
Tabaco	72,5	77,1	67,9	57,4	60,0	54,7	71,3	74,9	67,7	74,2	77,7	70,4	79,5	82,4	77,0	74,8	86,1	62,9
Cigarrillos electrónicos	6,8	7,3	6,3	7,9	8,9	6,9	8,5	9,7	7,2	6,4	6,5	6,3	6,7	6,7	6,6	5,0	5,4	4,6
Cigarrillos electrónicos con nicotina	5,3	5,8	4,8	5,7	6,6	4,7	6,6	7,7	5,5	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	4,1	4,8	3,4
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	13,6	23,9	7,1	5,8	8,6	13,5	10,7	16,3	19,3	15,7	23,2	24,0	16,6	30,7	25,8	16,3	35,8
Hipnosedantes sin receta	4,1	3,3	4,9	1,6	1,3	2,0	3,4	3,0	3,8	4,2	3,7	4,8	5,4	3,8	6,9	4,8	3,9	5,8
Cannabis	31,5	40,1	22,8	35,5	42,8	27,8	41,3	49,6	32,9	35,4	44,9	25,3	29,1	39,3	20,0	16,0	22,9	8,6
Cocaína en polvo	8,9	13,3	4,6	5,1	7,1	3,0	12,4	17,7	7,0	12,4	18,9	5,6	9,1	13,6	5,0	3,5	5,6	1,3
Cocaína base	0,8	1,4	0,3	0,5	0,8	0,2	0,6	0,9	0,3	1,1	1,9	0,3	1,2	2,2	0,3	0,5	0,7	0,2
Cocaína polvo y/o base	9,1	13,4	4,7	5,3	7,4	3,2	12,4	17,8	7,1	12,6	19,1	5,7	9,3	13,9	5,2	3,6	5,6	1,4
Éxtasis	3,6	5,3	1,8	3,2	4,4	2,0	5,8	8,4	3,2	5,1	7,7	2,4	2,5	3,9	1,2	0,8	1,1	0,4
Anfetaminas/speed	3,6	5,4	1,9	3,0	3,9	1,9	5,4	7,8	2,9	4,8	7,3	2,0	3,3	4,9	1,8	1,3	2,0	0,6
Alucinógenos	3,8	5,7	1,8	3,1	3,9	2,4	5,6	8,3	2,9	5,3	8,3	2,1	3,0	5,0	1,2	1,2	1,9	0,5
Heroína	0,6	1,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,3	0,5	0,1	0,7	1,1	0,3	1,2	2,0	0,5	0,6	0,9	0,3
Inhalables volátiles	0,5	0,7	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,8	0,3	0,8	1,1	0,4	0,5	0,9	0,2	0,1	0,2	0,0
Drogas inyectadas	0,5	0,6	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,5	0,4	0,6	0,3	0,9	1,4	0,4	0,5	0,8	0,2
Nuevas sustancias*	3,4	5,0	1,8	3,9	4,8	2,9	5,5	8,4	2,6	4,6	6,8	2,3	2,2	3,6	1,0	0,6	0,9	0,3
Ketamina	0,7	1,1	0,3	0,7	0,8	0,5	1,2	1,9	0,6	1,2	1,9	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
GHB	0,6	1,0	0,2	0,4	0,6	0,2	0,9	1,5	0,4	1,1	2,0	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0
Spice	0,8	1,1	0,5	0,5	0,7	0,3	1,2	1,9	0,6	1,1	1,6	0,7	0,7	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2
Mefedrona	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,6	1,0	0,2	0,7	1,1	0,2	1,0	1,6	0,4	0,9	1,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Setas mágicas	2,0	3,0	1,0	2,2	2,6	1,8	3,5	5,4	1,7	3,0	4,6	1,3	1,1	1,8	0,5	0,2	0,4	0,1
Salvia	0,5	0,8	0,1	0,6	1,1	0,0	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.18. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	66,6	65,0	68,2	94,4	96,2	92,5	91,2	92,9	89,4	94,7	96,6	92,9
Tabaco	31,1	32,2	30,2	73,8	78,4	69,1	65,4	68,5	62,2	76,2	81,6	70,7
Cigarrillos electrónicos	5,3	5,1	5,4	6,9	7,4	6,3	8,2	9,3	7,1	6,1	6,2	5,9
Cigarrillos electrónicos con nicotina	3,8	3,5	4,0	5,4	5,8	4,9	6,2	7,2	5,2	4,8	5,0	4,7
Hipnosedantes con o sin receta	3,7	3,6	3,8	19,1	13,9	24,5	10,8	8,6	13,0	22,8	16,2	29,4
Hipnosedantes sin receta	1,1	1,0	1,1	4,2	3,3	5,0	2,6	2,3	3,0	4,8	3,8	5,8
Cannabis	15,8	17,8	13,9	32,0	40,8	23,1	38,8	46,6	30,8	27,8	36,7	18,8
Cocaína en polvo	0,9	0,9	0,9	9,2	13,6	4,7	9,3	13,1	5,3	8,8	13,3	4,2
Cocaína base	0,3	0,6	0,0	0,8	1,4	0,3	0,6	0,8	0,3	1,0	1,6	0,3
Cocaína polvo y/o base	1,1	1,4	0,9	9,4	13,8	4,8	9,4	13,3	5,4	9,0	13,5	4,3
Éxtasis	1,0	1,4	0,6	3,6	5,4	1,9	4,7	6,7	2,7	3,0	4,6	1,4
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,2	3,7	5,5	1,9	4,3	6,2	2,5	3,3	5,0	1,5
Alucinógenos	1,2	0,6	1,6	3,8	5,9	1,8	4,5	6,4	2,6	3,4	5,4	1,3
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,7	1,0	0,3	0,2	0,4	0,1	0,9	1,3	0,4
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,6	0,3	0,5	0,8	0,2
Drogas inyectadas	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,3	0,3	0,2	0,4	0,6	0,9	0,3
Nuevas sustancias*	1,9	0,8	2,8	3,4	5,1	1,7	4,8	6,8	2,7	2,7	4,0	1,3
Ketamina	0,1	0,2	0,0	0,7	1,1	0,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,9	0,2
GHB	0,1	0,3	0,0	0,6	1,1	0,2	0,7	1,1	0,3	0,6	1,0	0,1
Spice	0,0	0,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,9	1,4	0,5	0,7	1,0	0,5
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Metanfetamina	0,1	0,1	0,2	0,6	1,0	0,2	0,9	1,4	0,3	0,5	0,8	0,2
Setas mágicas	0,9	0,1	1,7	2,1	3,1	1,0	3,0	4,2	1,7	1,6	2,5	0,7
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,5	0,8	0,1	0,7	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.19.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	77,6	82,9	72,1	78,4	80,5	76,1	79,8	86,1	73,4	77,8	82,6	72,6	79,1	84,2	74,5	72,3	80,5	63,7
Borracheras	16,8	22,3	11,2	35,1	41,3	28,5	26,5	34,6	18,3	14,8	21,3	8,0	9,1	13,8	4,8	4,5	6,0	2,9
Botellón	9,4	11,0	7,7	42,1	46,2	37,8	12,5	16,2	8,8	2,1	3,0	1,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,5	0,6
Botellón y alcohol	8,9	10,5	7,2	40,0	43,9	35,9	11,9	15,6	8,1	1,9	2,7	1,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,5
Tabaco	40,2	44,4	36,0	36,4	38,5	34,1	44,1	49,5	38,7	41,9	46,0	37,4	43,9	47,0	41,1	32,4	38,7	25,7
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	8,3	15,8	4,4	3,3	5,6	7,7	5,9	9,5	11,7	9,3	14,2	15,6	10,2	20,5	18,5	11,0	26,5
Hipnosedantes sin receta	2,3	1,6	2,9	0,9	0,5	1,4	1,8	1,4	2,2	2,4	2,0	2,7	2,9	1,7	3,9	3,0	2,2	3,7
Cannabis	9,5	13,3	5,6	19,9	25,4	14,2	15,0	21,3	8,7	8,9	12,9	4,6	4,7	7,4	2,3	2,0	2,6	1,4
Cocaína en polvo	1,9	2,9	0,9	2,6	3,6	1,6	3,2	5,1	1,3	2,3	3,7	0,9	1,1	1,6	0,5	0,4	0,6	0,1
Cocaína base	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Cocaína polvo y/o base	2,0	3,1	0,9	2,7	3,8	1,6	3,3	5,2	1,3	2,5	3,8	1,0	1,3	2,0	0,7	0,4	0,6	0,1
Éxtasis	0,6	0,9	0,3	1,7	2,3	1,0	1,0	1,5	0,5	0,4	0,7	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2
Anfetaminas/speed	0,5	0,8	0,3	1,2	1,5	0,8	1,0	1,4	0,5	0,5	0,9	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	0,6	0,8	0,3	1,5	1,7	1,2	0,8	1,1	0,4	0,7	1,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Drogas inyectadas	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,9	1,3	0,4	2,0	2,6	1,5	1,2	2,0	0,4	0,9	1,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1
Ketamina	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,4	0,5	0,2	1,2	1,2	1,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,3	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.19. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	58,0	54,6	61,2	78,2	83,7	72,5	79,2	83,7	74,6	76,7	82,5	70,9
Borracheras	18,0	17,4	18,6	16,8	22,5	11,0	30,2	37,5	22,6	10,0	14,4	5,4
Botellón	31,7	30,4	32,9	8,7	10,4	6,9	25,2	29,2	21,1	1,2	1,5	1,0
Botellón y alcohol	29,5	26,4	32,2	8,2	10,0	6,4	23,9	27,9	19,9	1,1	1,4	0,8
Tabaco	20,6	18,2	22,7	40,8	45,2	36,4	40,8	44,7	36,7	39,9	44,2	35,6
Hipnosedantes con o sin receta	2,1	1,4	2,7	12,3	8,5	16,2	6,3	4,8	7,9	15,0	10,1	19,9
Hipnosedantes sin receta	0,4	0,3	0,6	2,3	1,7	3,0	1,4	1,0	1,9	2,7	2,0	3,4
Cannabis	12,6	12,5	12,8	9,4	13,3	5,4	17,1	23,1	11,0	5,5	8,2	2,9
Cocaína en polvo	0,4	0,8	0,0	1,9	3,0	0,9	3,0	4,5	1,4	1,3	2,1	0,6
Cocaína base	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1
Cocaína polvo y/o base	0,6	1,3	0,0	2,1	3,1	1,0	3,0	4,6	1,5	1,5	2,3	0,7
Éxtasis	0,8	1,0	0,6	0,6	0,9	0,3	1,3	1,9	0,7	0,2	0,4	0,1
Anfetaminas/speed	0,2	0,4	0,0	0,5	0,8	0,3	1,0	1,4	0,6	0,3	0,4	0,1
Alucinógenos	0,5	0,3	0,7	0,6	0,8	0,3	1,1	1,3	0,8	0,3	0,5	0,1
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Drogas inyectadas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,7	0,4	1,0	0,9	1,3	0,4	1,6	2,3	0,9	0,5	0,8	0,2
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spice	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Metanfetamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0
Setas mágicas	0,4	0,0	0,7	0,4	0,5	0,2	0,7	0,9	0,6	0,2	0,3	0,1
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.20.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	62,1	71,3	52,8	59,5	63,8	54,9	63,1	73,0	53,2	62,5	70,6	53,8	65,2	75,3	56,1	58,7	71,8	44,9
Borracheras	6,5	8,8	4,3	14,9	18,2	11,5	9,9	13,1	6,6	4,9	7,2	2,4	3,6	5,5	1,9	2,2	2,8	1,7
Binge drinking	17,9	23,5	12,3	26,8	30,6	22,8	22,6	30,0	15,2	17,3	23,0	11,1	15,4	21,0	10,3	10,0	14,7	5,0
Bebidas energéticas	10,9	13,4	8,5	28,9	32,7	24,9	16,5	20,8	12,1	8,8	10,9	6,5	4,2	5,7	2,8	2,2	2,6	1,9
Bebidas energéticas + alcohol	2,8	3,5	2,0	8,0	9,3	6,5	4,2	5,2	3,1	1,8	2,6	0,9	1,1	1,4	0,7	0,7	0,8	0,6
Tabaco	38,5	42,6	34,3	33,1	34,8	31,2	42,4	48,0	36,7	40,4	44,6	36,0	42,6	45,7	39,8	31,2	37,2	24,7
Hipnosedantes con o sin receta	8,1	5,4	10,8	1,9	1,3	2,6	4,3	3,4	5,3	7,3	6,0	8,6	10,9	7,0	14,4	14,6	8,1	21,4
Hipnosedantes sin receta	0,9	0,8	1,1	0,6	0,3	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,7	1,2	0,7	1,7	1,0	0,8	1,2
Cannabis	7,3	10,7	3,9	14,9	19,7	9,8	11,5	17,0	5,9	6,9	10,5	3,0	4,0	6,5	1,7	1,8	2,4	1,1
Cocaína en polvo	0,9	1,4	0,3	1,0	1,5	0,5	1,5	2,4	0,5	1,1	1,9	0,4	0,5	0,9	0,2	0,1	0,2	0,0
Cocaína base	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,9	1,5	0,3	1,0	1,5	0,5	1,5	2,4	0,5	1,1	1,9	0,4	0,7	1,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Éxtasis	0,2	0,3	0,1	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
Anfetaminas/speed	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alucinógenos	0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	0,4	0,4	0,6	0,1	0,2	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Heroína	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nuevas sustancias*	0,4	0,6	0,2	0,8	1,0	0,6	0,6	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas mágicas	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Contestar las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.20. (continuación)

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alcohol	33,5	30,7	36,0	63,0	72,5	53,3	61,6	69,0	53,9	62,4	72,5	52,2
Borracheras	7,8	6,9	8,7	6,5	8,8	4,1	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0
Binge drinking	10,3	10,0	10,5	18,2	23,9	12,3	24,4	30,3	18,4	14,6	20,0	9,1
Bebidas energéticas	31,7	33,0	30,6	10,3	12,8	7,8	21,8	25,9	17,5	5,4	6,8	3,9
Bebidas energéticas + alcohol	5,6	4,7	6,5	2,7	3,5	1,9	5,8	7,0	4,6	1,2	1,7	0,7
Tabaco	15,2	12,0	18,2	39,2	43,5	34,9	38,4	42,3	34,4	38,6	42,8	34,3
Hipnosedantes con o sin receta	1,3	0,6	2,1	8,3	5,5	11,1	3,3	2,5	4,1	10,6	6,9	14,3
Hipnosedantes sin receta	0,4	0,2	0,6	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9	1,0	0,8	1,2
Cannabis	7,6	6,8	8,4	7,3	10,9	3,7	12,9	18,2	7,6	4,4	6,9	2,0
Cocaína en polvo	0,3	0,6	0,0	0,9	1,4	0,3	1,3	2,0	0,5	0,6	1,1	0,2
Cocaína base	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,3	0,6	0,0	0,9	1,5	0,3	1,3	2,1	0,5	0,7	1,2	0,2
Éxtasis	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,5	0,7	0,4	0,1	0,2	0,0
Anfetaminas/speed	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,1	0,5	0,6	0,3	0,1	0,2	0,0
Alucinógenos	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,1	0,4	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0
Heroína	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nuevas sustancias*	0,3	0,4	0,3	0,4	0,6	0,1	0,7	1,1	0,3	0,2	0,4	0,1
Ketamina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Spice	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Mefedrona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Metanfetamina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Setas mágicas	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
Salvia	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.21.

Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (alguna vez en la vida)		Prevalencia (alguna vez en la vida)	
Alcohol	93,5	Nuevas sustancias*	3,4
Tabaco	72,5	Setas mágicas	2,0
Cannabis	31,5	Cocaína base	0,8
Hipnosedantes con o sin receta	18,7	Spice	0,8
Cocaína polvo y/o base	9,1	Ketamina	0,7
Cocaína en polvo	8,9	Heroína	0,6
Cigarrillos electrónicos	6,8	GHB	0,6
Cigarrillos electrónicos con nicotina	5,3	Metanfetamina	0,6
Hipnosedantes sin receta	4,1	Inhalables volátiles	0,5
Alucinógenos	3,8	Salvia	0,5
Éxtasis	3,6	Mefedrona	0,2
Anfetaminas/speed	3,6	Esteroides anabolizantes	0,2

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADDES).

1.1.22.

Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (últimos 12 meses)		Prevalencia (últimos 12 meses)	
Alcohol	77,6	Alucinógenos	0,6
Tabaco	40,2	Anfetaminas/speed	0,5
Borracheras	16,8	Setas mágicas	0,4
Hipnosedantes con o sin receta	12,0	Cocaína base	0,2
Cannabis	9,5	Heroína	0,1
Botellón	9,4	Inhalables volátiles	0,1
Botellón y alcohol	8,9	Ketamina	0,1
Hipnosedantes sin receta	2,3	GHB	0,1
Cocaína polvo y/o base	2,0	Spice	0,1
Cocaína en polvo	1,9	Metanfetamina	0,1
Nuevas sustancias*	0,9	Salvia	0,1
Éxtasis	0,6	Mefedrona	0,0
		Esteroides anabolizantes	0,0

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.23.

Prevalencias de consumo de drogas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




Prevalencia (últimos 30 días)		Prevalencia (últimos 30 días)	
Alcohol	62,1	Éxtasis	0,2
Tabaco	38,5	Anfetaminas/speed	0,2
Binge drinking	17,9	Alucinógenos	0,2
Bebidas energéticas	10,9	Cocaína base	0,1
Hipnosedantes con o sin receta	8,1	Heroína	0,1
Cannabis	7,3	Setas mágicas	0,1
Borracheras	6,5	Salvia	0,1
Cannabis + tabaco	6,4	Inhalables volátiles	0,0
Bebidas energéticas + alcohol	2,8	Ketamina	0,0
Hipnosedantes sin receta	0,9	GHB	0,0
Cocaína en polvo	0,9	Spice	0,0
Cocaína polvo y/o base	0,9	Mefedrona	0,0
Nuevas sustancias*	0,4	Metanfetamina	0,0
		Esteroides anabolizantes	0,0

* Prevalencia obtenida de la pregunta del cuestionario NS1: "En la actualidad se encuentran disponibles NUEVAS sustancias que imitan el efecto de drogas ilegales (cannabis, cocaína, éxtasis...). Estas nuevas sustancias se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc. Conteste las siguientes preguntas referentes a estas nuevas sustancias."

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.24.

Prevalencias de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




	Prevalencia (a diario, últimos 30 días)
Tabaco	30,8
Alcohol	9,3
Hipnosedantes con o sin receta	6,0
Cannabis	2,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.25.

Incidencia del consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de personas). España, 2015.




	Hombres	Mujeres
Tabaco	122	122
Hipnosedantes con o sin receta	178	366
Cannabis	98	61
Cocaína en general	31	18
Cocaína en polvo	23	18
Cocaína base	8	0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol y edad media en el inicio de consumo de alcohol en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	90,6	87,3	89,0	88,6	93,7	88,0	94,2	90,9	93,1	93,5
Últimos 12 meses	78,5	75,2	78,1	76,6	76,7	72,9	78,7	76,6	78,3	77,6
Últimos 30 días	64,0	61,8	63,7	64,1	64,6	60,0	63,3	62,3	64,4	62,1
Diariamente en los últimos 30 días	12,7	13,7	15,7	14,1	14,9	10,2	11,0	10,2	9,8	9,3
Edad media de inicio en el consumo	16,8	16,9	16,9	16,7	16,7	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.27.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años	15-17 años	18-64 años
Hombres	63,8	73,0	70,6	75,3	71,8	30,7	72,5
Mujeres	54,9	53,2	53,8	56,1	44,9	36,0	53,3
Total	59,5	63,1	62,5	65,2	58,7	33,5	63,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.28.


Prevalencia de consumo diario de bebidas alcohólicas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.29.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, en la población de 15-64 años, según tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.30.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres 15-34 años	39,1	38,3	36,3	40,7	40,3	38,9	44,0	41,3	43,2	37,5
Mujeres 15-34 años	19,1	19,6	18,1	21,0	20,9	23,2	25,9	23,5	25,5	22,6
Hombres 35-64 años	16,5	16,6	18,3	20,2	17,1	15,2	21,2	16,2	15,4	14,4
Mujeres 35-64 años	4,1	3,6	4,9	6,3	5,5	5,0	8,8	5,9	5,5	5,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.31.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Más de una vez al mes	5,3	3,9	3,8	5,1	5,0	5,1	4,8	5,4	4,4	3,6
Menos frecuencia	13,4	14,7	14,3	15,7	14,8	14,1	18,4	13,9	14,7	12,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.32.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking y de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en la población de 15-64 años en los últimos 30 días y en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 1999-2015.




	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Binge drinking últimos 30 días	-	-	5,3	4,9	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9
Borracheras últimos 30 días	-	-	-	-	-	-	-	7,0	6,5
Borracheras últimos 12 meses	19,3	18,4	20,8	19,8	19,1	23,2	19,3	19,1	16,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.33.


Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.34.

Prevalencia de consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días según hayan consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días o no, en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Consumo de CANNABIS en los últimos 30 días	20,8	4,4
Consumo de COCAÍNA EN GENERAL en los últimos 30 días	4,1	0,2
Consumo de ÉXTASIS U OTRAS DROGAS DE SÍNTESIS en los últimos 30 días	1,1	0,1
Consumo de ANFETAMINAS O SPEED en los últimos 30 días	1,0	0,0
Consumo de ALUCINÓGENOS en los últimos 30 días	0,8	0,1
Consumo de HEROÍNA en los últimos 30 días	0,2	0,0
Consumo de INHALABLES VOLÁTILES en los últimos 30 días	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.35.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en atracón o binge drinking en los últimos 30 días en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2003-2015.




	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Binge drinking últimos 30 días	5,3	4,9	12,6	14,9	15,2	15,5	17,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.36.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en atracón (binge drinking) en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Consumo de vino últimos 30 días	19,3	39,2	51,5	61,6	71,3
Consumo de cerveza últimos 30 días	76,5	84,4	89,6	89,8	80,2
Consumo de combinados últimos 30 días	84,5	74,7	55,1	48,5	44,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.37.

Prevalencia de consumo de vino, cerveza y combinados en los últimos 30 días entre los que se han emborrachado en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Consumo de vino últimos 30 días	22,5	42,0	48,1	59,4	66,8
Consumo de cerveza últimos 30 días	74,6	86,1	91,2	88,0	70,0
Consumo de combinados últimos 30 días	87,6	79,2	64,2	45,0	53,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.38.

Prevalencia de consumo de distintos tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.39.

Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.40.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.41.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.42.

Prevalencias de consumo de alcohol entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	87,5	89,0	86,0	93,9	95,8	91,9	94,5	95,7	93,2	95,6	97,0	94,3	94,0	97,3	90,5
Últimos 12 meses	78,4	80,5	76,1	79,8	86,1	73,4	77,8	82,6	72,6	79,1	84,2	74,5	72,3	80,5	63,7
Últimos 30 días	59,5	63,8	54,9	63,1	73,0	53,2	62,5	70,6	53,8	65,2	75,3	56,1	58,7	71,8	44,9
Diariamente en últimos 30 días	1,4	2,0	0,9	4,5	7,4	1,7	7,6	11,8	3,0	12,1	18,8	6,1	19,6	30,2	8,2
Nunca	12,5	11,0	14,0	6,1	4,2	8,1	5,5	4,3	6,8	4,4	3,0	5,7	6,0	2,7	9,5
	15-64 años			15-17 años			18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	93,5	95,3	91,7	66,6	65,0	68,2	94,4	96,2	92,5	91,2	92,9	89,4	94,7	96,6	92,9
Últimos 12 meses	77,6	82,9	72,1	58,0	54,6	61,2	78,2	83,7	72,5	79,2	83,7	74,6	76,7	82,5	70,9
Últimos 30 días	62,1	71,3	52,8	33,5	30,7	36,0	63,0	72,5	53,3	61,6	69,0	53,9	62,4	72,5	52,2
Diariamente en últimos 30 días	9,3	14,5	4,1	1,0	0,7	1,3	9,6	14,9	4,2	3,2	5,0	1,3	12,5	19,3	5,5
Nunca	6,5	4,7	8,3	33,4	35,0	31,8	5,6	3,8	7,5	8,8	7,1	10,6	5,3	3,4	7,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.43.

Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días, según grupo de edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años		15-17 años		18-64 años		15-34 años		35-64 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	15,6	27,8	0,7	3,1	16,0	28,6	6,4	15,8	20,3	33,9
Cerveza/sidra	24,5	45,1	4,1	15,2	25,1	46,0	20,4	45,0	26,6	45,2
vermú/jerez/fino	1,3	3,8	0,0	0,2	1,4	3,9	0,8	2,9	1,6	4,2
Combinados/cubatas	3,1	24,0	0,9	23,7	3,2	24,0	3,7	37,7	2,8	16,9
Licores de frutas	1,0	2,7	0,5	1,6	1,0	2,7	1,0	3,0	1,0	2,5
Licores fuertes	1,6	5,1	0,3	2,9	1,7	5,2	1,1	5,5	1,9	5,0
Calimochó	0,5	1,6	0,0	4,4	0,5	1,5	0,6	3,6	0,4	0,6
Sangría	0,7	1,4	0,2	1,9	0,7	1,4	0,8	2,4	0,7	0,9
Cualquier bebida alcohólica	31,8	60,1	5,5	30,2	32,6	61,0	23,0	59,7	36,3	60,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.44.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y tipo de bebida (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años		25-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana	Días laborables	Fin de semana
Vino/champán	3,6	8,7	8,5	21,2	14,0	27,5	20,0	36,5	29,0	39,4
Cerveza/sidra	15,1	39,5	24,3	49,0	26,4	48,1	28,6	49,1	24,4	36,5
vermú/jerez/fino	0,5	1,6	1,0	3,8	1,3	4,2	1,6	4,4	2,0	4,2
Combinados/cubatas	4,0	42,6	3,4	34,1	3,4	22,5	2,8	16,7	2,2	9,6
Licores de frutas	1,0	3,5	0,9	2,7	0,7	2,5	1,3	3,1	1,0	1,8
Licores fuertes	0,9	5,7	1,2	5,2	1,3	4,5	1,9	5,2	2,7	5,3
Calimocho	0,7	5,6	0,5	2,0	0,5	1,0	0,3	0,6	0,3	0,2
Sangría	0,9	3,1	0,7	1,9	0,7	1,1	0,7	0,7	0,6	1,0
Cualquier bebida alcohólica	17,6	57,7	27,0	61,1	32,1	60,3	37,0	63,5	41,2	56,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.45.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-34 años			35-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
16,8	22,3	11,2	30,2	37,5	22,6	10,0	14,4	5,4	35,1	41,3	28,5	26,5	34,6	18,3	14,8	21,3	8,0	9,1	13,8	4,8	4,5	6,0	2,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.46.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-34 años			35-64 años		
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
6,5	8,8	4,3	14,9	18,2	11,5	9,9	13,1	6,6	4,9	7,2	2,4	3,6	5,5	1,9	2,2	2,8	1,7	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0
MENORES: 15-17 años			MAYORES: 18-64 años						15-34 años			35-64 años											
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M									
7,8	6,9	8,7	6,5	8,8	4,1	12,0	15,3	8,7	3,7	5,4	2,0												

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.47.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días en la población de 15-64 años que ha consumido alcohol en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-34 años			35-64 años					
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
10,6	12,4	8,1	25,4	28,8	21,3	15,7	18,0	12,5	7,8	10,2	4,5	5,6	7,4	3,5	3,9	3,9	3,8	19,7	22,3	16,3	6,0	7,5	3,9			
MENORES: 15-17 años						MAYORES: 18-64 años						15-34 años						35-64 años								
T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
24,0	23,3	24,5				10,4	12,2	7,8				19,7	22,3	16,3				6,0	7,5	3,9						

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.48.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya emborrachado en los últimos 30 días o no. España, 2015.

	Se ha emborrachado en los últimos 30 días	No se ha emborrachado en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	19,0	47,5
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	78,1	90,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.49.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho binge drinking en los últimos 30 días o no. España, 2015.

	Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	No ha hecho binge drinking en los últimos 30 días
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	20,8	51,2
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	76,9	92,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.50.

Prevalencia de botellón y del consumo de alcohol en botellón, en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			15-18 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hacer botellón	42,1	46,2	37,8	12,5	16,2	8,8	2,1	3,0	1,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,5	0,6	39,6	41,7	37,3
Hacer botellón y beber alcohol	40,0	43,9	35,9	11,9	15,6	8,1	1,9	2,7	1,1	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,5	37,0	38,3	35,6

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.51.

Riesgo percibido ante el consumo de alcohol (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	26,7	47,6	27,8	55,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	84,2	90,6	86,3	93,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.52.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población, según haya hecho botellón en el último año o no (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años		15-24 años	
	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año	Ha hecho botellón en el último año	No ha hecho botellón en el último año
Ningún consumo	1,2	15,3	1,1	30,5
Una sustancia	40,5	44,5	43,0	40,7
Dos sustancias	28,0	30,5	27,8	19,0
Tres sustancias	20,9	7,8	21,6	8,0
Cuatro sustancias	4,9	1,3	3,2	1,0
Cinco o más sustancias	4,5	0,5	3,3	0,8

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes con o sin receta, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.53.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	69,7	64,9	68,4	68,9	69,5	68,5	75,0	71,7	73,1	72,5
Últimos 12 meses	46,8	44,7	46,0	47,8	42,4	41,7	42,8	40,2	40,7	40,2
Últimos 30 días	42,9	40,1	41,4	42,9	38,4	38,8	39,4	37,6	38,3	38,5
Diariamente en los últimos 30 días	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Edad media inicio en el consumo	16,6	16,7	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4
Edad media inicio consumo diario de tabaco	-	-	-	-	-	-	19,3	18,5	18,6	18,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.54.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	30,8	23,9	34,1	32,8	34,8	25,3
Hombres	34,2	25,3	38,7	36,1	37,5	30,5
Mujeres	27,3	22,4	29,4	29,2	32,4	19,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.55.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres 15-34 años	41,4	36,3	39,8	40,0	37,1	31,5	35,9	33,9	33,0	32,9
Mujeres 15-34 años	36,5	34,2	36,4	36,8	33,0	29,7	28,0	28,5	28,4	26,5
Hombres 35-64 años	44,0	39,5	41,8	43,7	36,9	33,9	36,4	34,2	33,9	35,0
Mujeres 35-64 años	19,1	25,1	25,9	27,0	25,3	24,4	26,7	25,6	27,8	27,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.56.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Hombres	42,8	38,0	40,9	42,0	37,0	32,9	36,2	34,1	33,6	34,2
Mujeres	27,1	29,3	30,5	31,3	28,6	26,6	27,2	26,7	28,0	27,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.57.

Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo diario de tabaco	34,9	33,6	35,7	36,7	32,8	29,6	31,8	30,4	30,8	30,8
Riesgo atribuido a fumar paquete de tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.58.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.59.

Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según el tipo de formato de consumo que ha utilizado para fumar, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cigarrillos de cajetilla	78,4	76,8	80,4	67,9	66,3	69,8	72,8	68,6	78,3	78,8	79,2	78,3	83,3	81,0	85,6	86,2	85,8	86,8
Tabaco de liar	14,7	15,4	13,9	19,3	18,7	20,0	18,6	20,8	15,6	15,0	14,5	15,7	11,8	13,2	10,3	9,8	10,1	9,5
Los 2 tipos	6,9	7,8	5,7	12,8	15,0	10,2	8,7	10,6	6,1	6,2	6,3	5,9	4,9	5,7	4,1	4,0	4,1	3,7

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.60.


Prevalencia de consumo de tabaco durante los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según tipo de tabaco consumido (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.61.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según contengan nicotina, edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.62.


Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.63.


Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los que han usado cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida y prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los que nunca han fumado (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.64.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre la población de 15-64 años, según hayan consumido tabaco o no (porcentajes). España, 2015.



	Ha consumido cigarrillos electrónicos	No ha consumido cigarrillos electrónicos
Ha consumido tabaco alguna vez en la vida	9,1	0,5
Ha consumido tabaco en los últimos 12 meses	14,8	1,5
Ha consumido tabaco en los últimos 30 días	14,9	1,8
Ha consumido tabaco a diario en los últimos 30 días	16,1	2,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.65.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	Total			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	60,8	60,9	60,6	55,4	57,0	53,2	60,7	60,8	60,5	62,0	62,8	61,1	60,1	57,2	62,7
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	20,3	19,4	21,3	25,9	24,5	27,9	19,6	17,9	21,9	17,8	17,9	17,6	21,5	23,7	19,5
Los 2 tipos	19,0	19,7	18,1	18,7	18,5	18,9	19,7	21,3	17,6	20,3	19,3	21,3	18,4	19,1	17,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

Nota: se excluye de la base el segmento de 55 a 64 años por presentar una base reducida

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.66.

Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido tabaco en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	Consumo de tabaco en los últimos 12 meses		Consumo de tabaco en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	64,7	35,3	64,8	39,7
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	17,8	37,2	17,4	35,7
Los 2 tipos	17,6	27,5	17,8	24,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.67.


Consumo de cigarrillos electrónicos con o sin nicotina en la población de 15-64 años que ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez, según se haya consumido cannabis en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	Consumo de cannabis en los últimos 12 meses		Consumo de cannabis en los últimos 30 días	
	Sí	No	Sí	No
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos con nicotina	65,5	59,7	66,6	59,8
Cartuchos o líquidos para cigarrillos electrónicos sin nicotina	15,3	21,7	12,6	21,9
Los 2 tipos	19,2	18,6	20,7	18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.68.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y edad media de inicio en el consumo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
A diario o casi a diario en los últimos 30 días	-	3,1	2,7	4,6	6,8	6,0
Edad media de inicio en el consumo	-	33,8	34,5	34,5	35,2	35,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.69.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Hipnosedantes con o sin receta									
Alguna vez	18,7	13,6	23,9	10,8	8,6	13,0	22,8	16,2	29,4
Último año	12,0	8,3	15,8	6,3	4,8	7,9	15,0	10,1	19,9
Último mes	8,1	5,4	10,8	3,3	2,5	4,1	10,6	6,9	14,3
A diario	6,0	4,0	8,1	1,9	1,3	2,5	8,1	5,3	10,9
Hipnosedantes sin receta									
Alguna vez	4,1	3,3	4,9	2,6	2,3	3,0	4,8	3,8	5,8
Último año	2,3	1,6	2,9	1,4	1,0	1,9	2,7	2,0	3,4
Último mes	0,9	0,8	1,1	0,7	0,6	0,9	1,0	0,8	1,2
A diario*	-	-	-	-	-	-	-	-	-


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* No se recoge esta información en el cuestionario

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.70.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta e hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses	1,2	1,3	1,9	1,2	1,2	2,3
Riesgo percibido por consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.71.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses entre la población de 15 a 64 años, según haya consumido hipnosedantes sin receta o no en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.


	Ha consumido hipnosedantes sin receta	No ha consumido hipnosedantes sin receta
Ningún consumo	0,0	14,6
Una sustancia	17,5	44,7
Dos sustancias	38,6	30,0
Tres sustancias	28,6	8,5
Cuatro sustancias	7,3	1,5
Cinco o más sustancias	8,0	0,7

* Alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.72.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes con o sin receta en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida (A)	8,7	15,4	13,4	19,5	22,2	18,7
Últimos 12 meses (B)	5,1	8,6	7,1	11,4	12,2	12,0
Últimos 30 días (C)	3,7	5,9	5,2	8,3	8,9	8,1
B/A*100	58,6	55,8	53,0	58,4	55,2	64,2
C/B*100	72,5	68,6	73,2	72,5	72,8	67,5
C/A*100	42,5	38,3	38,8	42,4	40,2	43,3

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y la había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y la había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y la había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.73.


Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V \geq 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.74.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	12,0	4,4	7,7	11,7	15,6	18,5
Hombres	8,3	3,3	5,9	9,3	10,2	11,0
Mujeres	15,8	5,6	9,5	14,2	20,5	26,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.75.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	8,1	1,9	4,3	7,3	10,9	14,6
Hombres	5,4	1,3	3,4	6,0	7,0	8,1
Mujeres	10,8	2,6	5,3	8,6	14,4	21,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.76.

Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	5,9	13,9	28,8	26,1	25,2
Mujeres	5,1	11,7	21,7	31,0	30,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.77.

Distribución por edad de la población de 15-64 años que ha consumido hipnosedantes con o sin receta en los últimos 30 días, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	3,6	12,3	28,3	27,4	28,5
Mujeres	3,4	9,4	19,2	32,0	36,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.78.


Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.79.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta y riesgo percibido ante el consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.80.


Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2005-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.81.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.82.

Perfil de la población que ha consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses, según registren consumo problemático de hipnosedantes DSM-V>2 o no (porcentajes). España, 2015.

		Consumo problemático DSM-V ≥2	Resto DSM-V <2
SEXO	Hombre	40,8	31,9
	Mujer	59,2	68,1
EDAD	15 a 24 años	4,7	5,3
	25 a 34 años	11,2	12,8
	35 a 44 años	26,5	22,8
	45 a 54 años	32,7	28,5
	55 a 64 años	24,9	30,6
ESTADO CIVIL	Soltero/a	30,6	27,3
	Casado/a	49,9	55,7
	Separado/a - Divorciado/a	13,6	11,9
	Viudo/a	5,9	5,1
CONVIVENCIA	Solo	17,5	11,8
	Cónyuge - pareja	53,1	61,8
	Padre	9,4	8,9
	Madre	17,7	15,5
	Hijos	39,0	49,0
	Hermanos	7,6	7,0
	Abuelos	0,7	0,7
NIVEL DE ESTUDIOS	Sin estudios / estudios primarios	25,3	19,8
	Estudios secundarios	60,5	64,0
	Estudios universitarios	14,2	16,1
SITUACIÓN LABORAL	Trabajando	31,3	41,0
	Con empleo, pero temporalmente ausente del mismo	3,2	1,9
	Parado que ha trabajado antes	23,3	19,9
	Parado que busca su primer empleo	1,4	0,8
	Jubilado	8,6	8,8
	Incapacitado permanente	13,9	4,6
	Cursando algún estudio	2,6	3,4
	Dedicado principalmente a labores del hogar (actividad no económica)	14,3	18,9
	Otra situación sin ejercer actualmente actividad económica alguna	1,4	0,9
CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Ha consumido hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días		11,6	6,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.83.

Prevalencia del consumo problemático de hipnosedantes (DSM-V ≥ 2) en la población de 15 a 64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo problemático de hipnosedantes	2,5	2,0	3,0	0,8	0,7	1,0	1,5	1,2	1,7	2,7	2,6	2,7	3,6	3,1	4,2	3,4	2,1	4,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.84.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y percepción de disponibilidad (proporción de personas que piensan que adquirir la sustancia es fácil o muy fácil), según DSM-V ≥ 2 o no (porcentajes). España, 2015.

	DSM-V ≥ 2 (consumo problemático hipnosedantes)	DSM-V < 2 (consumo no problemático hipnosedantes)	No consumidores (15 a 64 años)*
PERCEPCIÓN DE RIESGO			
Fumar un paquete de tabaco diario	85,8	92,2	91,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	42,9	48,9	45,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	89,4	90,7	90,0
Fumar cannabis una vez por semana o más	73,7	79,7	80,0
Tomar hipnosedantes de una a tres veces por semana	49,5	53,7	82,0
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	65,7	73,0	93,7
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	93,6	95,8	94,5
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,3	94,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,8	97,9	97,3
PERCEPCIÓN DE DISPONIBILIDAD			
Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta	48,5	32,9	31,3

* Población de 15 a 64 años que no ha contestado el DSM-V (no consumidores)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.85.

Prevalencia de borracheras y de consumo de tabaco en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha respondido a la escala DSM-V para hipnosedantes, según el resultado sea DSM-V ≥ 2 o < 2 (porcentajes). España, 2015.

	DSM-V ≥ 2 (consumo problemático de hipnosedantes)	DSM-V < 2 (consumo no problemático de hipnosedantes)
Borracheras	18,9	12,2
Tabaco	52,9	46,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.86.


Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis y edad media de inicio en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.87.


Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.88.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	9,5	19,9	15,0	8,9	4,7	2,0
Hombres	13,3	25,4	21,3	12,9	7,4	2,6
Mujeres	5,6	14,2	8,7	4,6	2,3	1,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.89.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	7,3	14,9	11,5	6,9	4,0	1,8
Hombres	10,7	19,7	17,0	10,5	6,5	2,4
Mujeres	3,9	9,8	5,9	3,0	1,7	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.90.

Evolución de la prevalencia de uso de cannabis en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Disponibilidad	52,1	51,8	59,5	59,2	66,4	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3
Riesgo	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5
Prevalencia de consumo 12 meses	7,7	7,0	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.91.

Prevalencia de consumo de cannabis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
15-24 años	42,8	27,8	25,4	14,2	19,7	9,8
25-34 años	49,6	32,9	21,3	8,7	17,0	5,9
35-44 años	44,9	25,3	12,9	4,6	10,5	3,0
45-54 años	39,3	20,0	7,4	2,3	6,5	1,7
55-64 años	22,9	8,6	2,6	1,4	2,4	1,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.92.

Características del consumo de cannabis en la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumo cannabis últimos 30 días															
Principalmente marihuana	57,9	53,0	68,6	53,5	52,2	57,3	49,6	48,7	53,2	44,7	43,4	49,2	50,6	52,2	47,6
Principalmente hachis	12,8	14,4	9,2	17,3	17,2	17,6	18,7	18,2	20,5	24,5	25,7	20,2	14,8	15,7	13,1
De los dos tipos	29,4	32,6	22,3	29,3	30,6	25,1	31,7	33,0	26,2	30,8	30,8	30,6	34,5	32,2	39,3
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días															
Sí	89,4	89,7	88,7	92,0	93,2	88,4	86,5	86,3	87,5	89,9	90,8	86,6	86,8	89,9	77,4
No	10,6	10,3	11,3	8,0	6,8	11,6	13,5	13,7	12,5	10,1	9,2	13,4	13,2	10,1	22,6
Media de porros consumidos al día	2,5	2,7	2,1	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	2,0	2,3	2,4	1,8	2,4	2,6	1,8

	15-64 años			15-34 años			35-64 años				
	T	H	M	T	H	M	T	H	M		
Consumo cannabis últimos 30 días											
Principalmente marihuana	52,7	50,5	59,3		55,6	52,6	63,5		48,3	47,5	51,0
Principalmente hachis	17,0	17,7	15,1		15,0	15,9	13,0		20,0	20,3	19,2
De los dos tipos	30,3	31,9	25,7		29,3	31,6	23,6		31,7	32,3	29,7
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días											
Sí	89,5	90,1	87,7		90,7	91,5	88,5		87,6	88,0	85,9
No	10,5	9,9	12,3		9,3	8,5	11,5		12,4	12,0	14,1
Media de porros consumidos al día	2,5	2,6	2,1		2,5	2,5	2,6		2,4	2,5	1,9


	MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años				
	T	H	M	T	H	M		
Consumo cannabis últimos 30 días								
Principalmente marihuana			58,1	35,7	74,1	52,6	50,7	58,1
Principalmente hachis			13,1	17,4	10,0	17,1	17,7	15,5
De los dos tipos			28,8	46,9	15,9	30,3	31,6	26,4
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días								
Sí			92,8	97,1	89,4	89,4	90,0	87,5
No			7,2	2,9	10,6	10,6	10,0	12,5
Media de porros consumidos al día			2,4	3,2	1,9	2,5	2,6	2,1

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.93.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cannabis en la población de 15-64 años. España, 1995-2015.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	14,5	22,9	19,6	23,8	29	28,6	27,3	32,1	27,4	30,4	31,5
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	7,5	7,7	7	9,2	11,3	11,2	10,1	10,6	9,6	9,2	9,5
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	–	4,6	4,5	6,4	7,6	8,7	7,1	7,6	7,0	6,6	7,3
B/A*100	51,7	33,6	35,7	38,7	39,0	39,2	37,0	33,0	35,2	30,3	30,0
C/B*100	–	59,7	64,3	69,6	67,3	77,7	70,3	71,7	73,1	72,2	77,5
C/A*100	–	20,1	23,0	26,9	26,2	30,4	26,0	23,7	25,7	21,8	23,3

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.
 C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis en los últimos 12 meses y lo había consumido también en los últimos 30 días.
 C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cannabis alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.94.

Prevalencia de problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas alguna vez en la vida entre la población de 15-64 años, según el consumo de cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.

	No ha fumado cannabis nunca	Fuma cannabis pero no diariamente	De 1 a 2 porros diarios	3 o más porros diarios
Problemas familiares	0,7	7,5	14,8	20,2
Problemas con amigos	0,4	6,1	7,4	15,8
Problemas de salud física	0,5	2,9	6,5	8,5
Problemas psicológicos	0,8	3,8	7,2	9,7
Accidentes de tráfico	0,1	2,6	1,1	6,8
Problemas laborales	0,2	1,7	3,4	4,0
Problemas económicos	0,3	6,0	7,1	10,6
Problemas con la policía o la ley	0,2	7,0	11,3	18,3
Relaciones sexuales que en otras circunstancias no hubiera mantenido	0,1	3,7	1,3	10,3
Relaciones sexuales sin protección	0,1	3,7	3,5	9,7
Necesidad de acudir a un centro de urgencias	0,2	2,3	4,1	7,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.95.

Número de porros consumidos diariamente en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
De 1 a 2 porros	68,6	65,6	77,5	67,1	61,8	78,9	68,2	67,4	70,7	69,4	65,9	83,1	69,4	66,2	81,6	76,0	74,6	79,7
De 3 a 4 porros	18,9	20,4	14,4	21,4	24,9	13,7	18,9	18,9	18,9	16,9	18,9	8,7	17,9	19,6	11,4	13,2	10,6	20,3
≥5 porros	12,5	14,0	8,1	11,4	13,3	7,5	12,9	13,7	10,5	13,8	15,2	8,2	12,7	14,1	7,0	10,8	14,8	0,0
Nº medio de porros	2,5	2,6	2,1	2,5	2,7	2,1	2,5	2,6	2,2	2,4	2,5	2,0	2,3	2,4	1,8	2,4	2,6	1,8

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.96.


Prevalencia del consumo de tabaco en los últimos 30 días en función de que se haya consumido cannabis en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.97.


Prevalencia del consumo de cannabis en los últimos 30 días en función de que se haya consumido tabaco en los últimos 30 días o no y en la población general (porcentaje). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.98.

Prevalencia de consumo de cannabis mezclado con tabaco en los últimos 30 días en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.99.

Prevalencia de consumo de cannabis y spice alguna vez en la vida en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.100.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	21,2	24,1	14,1	21,7	24,4	15,7	20,4	23,6	10,8
Prevalencia de consumo de cannabis (CAST<4)	78,8	75,9	85,9	78,3	75,6	84,3	79,6	76,4	89,2

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.101.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años	15-17 años
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	Total*	Total*
Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	21,9	25,6	14,8	21,5	23,3	16,7	19,4	21,2	13,9	24,7	12,5
Prevalencia de consumo de cannabis (CAST<4)	78,1	74,4	85,2	78,5	76,7	83,3	80,6	78,8	86,1	75,3	87,5

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.


T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Nota: se excluyen los datos por sexo en los grupos de 45-54 años y 15-17 años por su base muestral. Tampoco se incluye el segmento de 55-64 años por el mismo motivo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.102.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST \geq 4) en la población de 15 a 64 años, según sexo (porcentajes). España 2013, 2015.




	2013 (15-64 años)	2015 (15-64 años)
Hombres	3,5	2,9
Mujeres	0,8	0,7

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.103.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años (porcentaje y estimación). España, 2013-2015.



	2013	2015
Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4)	2,2	1,8
Estimación nº consumidores problemáticos (números absolutos)	687.233	558.549

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.104.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 15 a 64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2013-2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2013	4,4	6,5	2,1	3,4	5,6	1,3	1,9	3,2	0,5	1,1	1,9	0,3	0,4	0,9	0,0
2015	4,0	6,0	1,9	3,0	4,6	1,3	1,6	2,5	0,5	1,0	2,1	0,1	0,2	0,3	0,2

	MENORES						MAYORES								
	15-64 años			15-17 años			18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
2013	2,2	3,5	0,8	2,8	4,5	1,0	2,1	3,5	0,8	3,8	6,0	1,6	1,2	2,1	0,3
2015	1,8	2,9	0,7	1,4	1,3	1,4	1,8	3,0	0,7	3,4	5,2	1,6	1,0	1,7	0,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.105.

Riesgo percibido por la población de 15-64 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (proporción de personas que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Fumar un paquete de tabaco diario	76,3	83,5	91,6
Tomarse 5 o 6 cañas/copas en fin de semana	24,7	22,7	45,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	75,9	79,9	90,0
Fumar cannabis una vez por semana o más	32,3	37,6	79,8
Tomar hipnosedantes de 1 a 3 veces semana	63,9	70,0	78,8
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	83,2	88,9	91,3
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	82,0	82,5	94,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	78,7	81,9	94,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	93,6	94,4	97,3

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.106.

Percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad, según puntuación en escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Cannabis	94,9	91,1	64,3
Heroína	38,8	32,9	27,4
Cocaína	75,3	64,2	42,0
Alucinógenos	46,6	42,0	28,7
Éxtasis u otras drogas de síntesis	50,4	43,5	28,5
GHB o éxtasis líquido	36,5	33,5	24,2
Anfetaminas o speed	54,7	47,9	29,2
Setas alucinógenas	43,9	38,0	24,7
Ketamina	37,5	32,1	23,0
Hipnosedantes con receta	71,4	65,3	58,1
Hipnosedantes sin receta	47,8	43,2	31,9

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.107.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.

	Consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4)	Consumo de cannabis CAST<4	Total población general
Alcohol	91,5	94,1	77,6
Borracheras	60,5	54,8	16,8
Tabaco	90,1	81,9	40,2
Hipnosedantes (con o sin receta)	25,0	10,5	12,0
Cocaína general (polvo y/o base)	28,1	13,4	2,0
Éxtasis	12,1	3,5	0,6
Anfetaminas/speed	8,0	3,8	0,5
Alucinógenos	10,7	3,3	0,6

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.108.

Distribución según sexo, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, frecuencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días, prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días y prevalencia de consumo de otras drogas ilegales en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años de edad que ha contestado a CAST, según la puntuación obtenida, y entre la población general (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-64 años		
	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.	CAST≥4	CAST<4	P. GRAL.
Sexo									
Hombre	76,6	62,3	51,2	78,1	70,2	50,3	86,6	71,7	50,1
Mujer	23,4	37,7	48,8	21,9	29,8	49,7	13,4	28,3	49,9
Estado civil									
Soltero/a	93,3	96,9	94,9	79,2	79,0	63,2	52,8	40,1	19,2
Casado/a	6,0	2,9	4,9	19,5	19,9	34,8	31,4	42,5	66,4
Separado/a - Divorciado/a	0,7	0,2	0,2	1,3	1,1	1,9	15,9	15,6	11,1
Viuado/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,9	3,3
Nivel de estudios									
Primarios	20,4	11,5	13,9	17,5	10,6	8,5	19,1	9,2	16,8
Secundarios	73,7	81,9	78,4	67,3	65,7	64,7	67,0	68,2	63,2
Universitarios	5,8	6,7	7,7	15,2	23,7	26,9	13,9	22,6	20,0
Situación laboral									
Trabajando	29,3	24,9	21,2	55,1	60,0	61,4	46,9	65,0	56,7
Parado	29,8	20,0	15,6	33,3	28,9	22,6	37,8	24,3	16,5
Jubilado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,8	9,1
Incapacitado permanente	0,0	0,0	0,1	1,4	0,3	0,5	9,8	3,0	2,7
Estudiando	40,6	54,5	60,4	8,8	9,1	8,1	0,4	0,5	0,2
Labores del hogar (act. no económica)	0,3	0,0	2,3	0,8	1,3	7,0	2,6	2,7	13,9
Otra situación (sin act. económica alguna)	0,0	0,7	0,4	0,6	0,4	0,5	0,8	0,7	0,9
Cuántos días ha consumido cannabis, marihuana o hachís en los últimos 30 días									
Entre 1 y 3 días	8,9	29,2	4,5	9,6	26,4	3,1	6,7	25,3	1,0
Entre 4 y 9 días	10,8	16,6	2,8	6,9	12,1	1,5	11,3	18,2	0,8
Entre 10 y 19 días	14,5	11,4	2,2	14,9	11,5	1,7	15,2	9,1	0,5
Entre 20 y 29 días	13,3	3,4	1,0	10,5	4,3	0,8	12,6	5,2	0,3
30 días	46,0	11,9	3,7	50,0	20,2	3,8	49,0	20,5	1,3
No ha consumido cannabis	6,4	27,5	85,8	8,1	25,5	89,2	5,1	21,8	96,1
Prevalencia binge drinking en los últimos 30 días									
Ha hecho binge drinking	58,0	53,7	26,8	45,5	51,8	22,6	47,2	44,6	14,6
No ha hecho binge drinking	42,0	46,3	73,2	54,5	48,2	77,4	52,8	55,4	85,4
Consumo droga ilegal sin cannabis: cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos en los últimos 12 meses									
Ha consumido	31,7	14,2	4,1	27,2	20,2	3,9	37,9	17,4	1,8
No ha consumido	68,3	85,8	95,9	72,8	79,8	96,1	62,1	82,6	98,

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

P. GRAL. = población general.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.109.

Características del consumo de cannabis en los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST \geq 4) de la población de 15-64 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (porcentajes). España, 2015.


	Consumidores problemáticos de cannabis (CAST \geq 4)	Consumidores de cannabis CAST $<$ 4
Consumo cannabis últimos 30 días		
Principalmente marihuana	45,3	55,5
Principalmente hachís	18,1	16,6
De los dos tipos	36,6	27,9
Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días		
Sí	94,5	88,9
No	5,5	11,1
Media de porros consumidos al día	3,3	2,1

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.110.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo y edad media de inicio en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	3,4	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Últimos 12 meses	1,8	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Últimos 30 días	-	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
Edad media de inicio consumo	21,4	21,3	21,8	20,4	20,9	20,6	20,9	20,9	21,0	21,3	20,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.111.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,9	0,9	1,0	0,8
Últimos 12 meses	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
Últimos 30 días	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Edad media de inicio en el consumo	21,8	20,6	20,1	19,6	20,1	20,8	23,1	22,4	23,2	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.112.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo, base, polvo y/o base) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



	Cocaína polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base
Alguna vez en la vida	8,9	0,8	9,1
Últimos 12 meses	1,9	0,2	2,0
Últimos 30 días	0,9	0,1	0,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.113.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.114.


Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.115.

Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.116.


Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 1999-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.117.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según grupo de edad (porcentajes). España, 1999-2015.




	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
15-34 años	2,8	4,4	4,8	5,2	5,3	4,3	3,5	3,2	3,0
35-64 años	0,5	0,9	0,9	1,3	1,3	1,5	1,4	1,5	1,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.118.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 12 meses, disponibilidad percibida (conseguirlo en 24 horas es fácil/muy fácil) y percepción del riesgo ante el uso esporádico (una vez o menos al mes, porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Disponibilidad	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0
Riesgo	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6
Prevalencia de consumo	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,3	2,1	1,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.119.

Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T
Cocaína en polvo	13,3	4,6	8,9	2,9	0,9	1,9	1,4	0,3	0,9
Cocaína base	1,4	0,3	0,8	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Cocaína polvo y/o base	13,4	4,7	9,1	3,1	0,9	2,0	1,5	0,3	0,9

H = hombres; M = mujeres; T = total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.120.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína en polvo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	3,4	3,1	4,8	5,9	7,0	8,0	10,2	8,8	10,2	8,9
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	1,6	1,6	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	2,2	2,1	1,9
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	0,9	0,9	1,3	1,1	1,6	1,6	1,2	1,1	1,0	0,9
B/A*100	47,1	51,6	52,1	45,8	42,9	37,5	25,5	25,6	20,9	21,2
C/B*100	56,3	56,3	52,0	40,7	53,3	53,3	46,2	50,9	47,6	45,2
C/A*100	26,5	29,0	27,1	18,6	22,9	20,0	11,8	13,0	9,9	9,6

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.


C/B*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo en los últimos 12 meses y lo había consumido también en los últimos 30 días.

C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.121.

Prevalencia y continuidad en el consumo de cocaína base en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia alguna vez en la vida (%) (A)	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8
Prevalencia últimos 12 meses (%) (B)	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Prevalencia últimos 30 días (%) (C)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
B/A*100	0,3	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2
C/A*100	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1

B/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 12 meses.
 C/A*100 = El % de personas de 15 a 64 años que había probado cocaína en polvo alguna vez en la vida y lo había consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.122.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	2,0	2,7	3,3	2,5	1,3	0,4
Hombres	3,1	3,8	5,2	3,8	2,0	0,6
Mujeres	0,9	1,6	1,3	1,0	0,7	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.123.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio en el consumo de éxtasis en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	2,0	2,5	2,4	4,0	4,6	4,4	4,3	4,9	3,6	4,3	3,6
Últimos 12 meses	1,3	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Últimos 30 días	-	0,3	0,2	0,8	0,4	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2
Edad media de inicio consumo	21,1	20,0	20,7	20,2	20,3	20,1	20,8	20,5	20,8	21,1	20,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.124.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,6	1,7	1,0	0,4	0,2	0,1
Hombres	0,9	2,3	1,5	0,7	0,4	0,1
Mujeres	0,3	1,0	0,5	0,0	0,0	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.125.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	2,3	1,5	0,7	0,4	0,1
Mujeres	1,0	0,5	0,0	0,0	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.126.

Prevalencia de consumo de éxtasis en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	4,4	2,0	2,3	1,0	0,8	0,5
25-34 años	8,4	3,2	1,5	0,5	0,5	0,3
35-44 años	7,7	2,4	0,7	0,0	0,3	0,0
45-54 años	3,9	1,2	0,4	0,0	0,2	0,0
55-64 años	1,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.127.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de éxtasis una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Riesgo percibido	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.128.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de éxtasis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.




	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,9	0,8	1,8	1,4	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,6
Disponibilidad percibida	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.129.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de éxtasis (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido éxtasis alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.




No percibe un riesgo	24,4	4,8
Percibe un riesgo	75,6	95,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.130.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio en el consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	3,4	3,7	3,7	3,3	3,8	3,6
Últimos 12 meses	1,0	0,9	0,7	1,1	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,6	0,5
Últimos 30 días	-	0,2	0,3	0,6	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Edad media de inicio consumo	19,2	19,4	19,2	18,8	19,6	19,2	19,7	20,1	20,2	20,8	20,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.131.


Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.132.


Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.133.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	3,9	1,9	1,5	0,8	0,4	0,4
25-34 años	7,8	2,9	1,4	0,5	0,7	0,3
35-44 años	7,3	2,0	0,9	0,2	0,4	0,0
45-54 años	4,9	1,8	0,2	0,1	0,0	0,0
55-64 años	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.134.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida	Últimos 12 meses	Últimos 30 días
15-24 años	3,0	1,2	0,4
25-34 años	5,4	1,0	0,5
35-44 años	4,8	0,5	0,2
45-54 años	3,3	0,2	0,0
55-64 años	1,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.135.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de anfetaminas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido anfetaminas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.136.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Alguna vez en la vida	0,6	1,0	0,2	0,7	1,1	0,2	1,0	1,6	0,4	0,9	1,5	0,4	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
En los últimos 12 meses	0,1	0,2	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
En los últimos 30 días	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.137.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio en el consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	2,1	2,9	1,9	2,8	3,0	3,4	3,8	3,7	2,9	3,8	3,8
Últimos 12 meses	0,8	0,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,6
Últimos 30 días	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Edad media de inicio consumo	19,3	19,0	19,3	18,9	19,9	19,0	19,9	19,7	20,5	20,9	20,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.138.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-64 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Total	0,6	1,5	0,8	0,7	0,1	0,1
Hombres	0,8	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1
Mujeres	0,3	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.139.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	1,7	1,1	1,0	0,3	0,1
Mujeres	1,2	0,4	0,3	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.140.

Prevalencia de consumo de alucinógenos en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Alguna vez en la vida		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	H	M	H	M	H	M
15-24 años	3,9	2,4	1,7	1,2	0,5	0,4
25-34 años	8,3	2,9	1,1	0,4	0,6	0,1
35-44 años	8,3	2,1	1,0	0,3	0,4	0,0
45-54 años	5,0	1,2	0,3	0,0	0,1	0,0
55-64 años	1,9	0,5	0,1	0,0	0,1	0,0

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.141.


Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de alucinógenos (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido alucinógenos alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.142.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y riesgo percibido ante el consumo de alucinógenos una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses y percepción de disponibilidad de alucinógenos (conseguirlos en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.144.

Prevalencia de consumo de setas alucinógenas alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años			
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	
Ha consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida	2,0	3,0	1,0	2,2	2,6	1,8	3,5	5,4	1,7	3,0	4,6	1,3	1,1	1,8	0,5	0,2	0,4	0,1	
Ha consumido setas alucinógenas en los últimos 12 meses	0,4	0,5	0,2	1,2	1,2	1,1	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ha consumido setas alucinógenas en los últimos 30 días	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.145.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de setas alucinógenas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se haya consumido setas alucinógenas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.




No percibe un riesgo	29,2	3,6
Percibe un riesgo	70,8	96,4

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.146.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio en el consumo de heroína en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Alguna vez en la vida	0,8	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Últimos 12 meses	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Últimos 30 días	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Edad media de inicio consumo	20,3	20,1	19,0	20,7	22,0	20,2	21,7	22,9	20,7	21,5	22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.147.

Prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Hombres	0,1	0,5	1,1	2,0	0,9
Mujeres	0,0	0,1	0,3	0,5	0,3
Total	0,1	0,3	0,7	1,2	0,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.148.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y riesgo percibido ante el consumo de heroína una vez o menos al mes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Prevalencia de consumo	0,6	0,5	0,6	0,9	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,6
Riesgo percibido	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.149.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína alguna vez en la vida y percepción de disponibilidad de heroína (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.150.


Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo de inhalables volátiles en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.151.


Prevalencia de consumo de inhalables volátiles alguna vez en la vida, en la población de 15-64 años según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.152.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.153.

Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.154.

Prevalencia de consumo en los últimos 30 días de una sola o más sustancias psicoactivas* (legales e ilegales) en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.155.

Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



		Ninguna sustancia	Una sola sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-17 años	Hombres	40,8	39,8	11,4	7,0	1,0
	Mujeres	37,6	39,6	12,8	8,3	1,7
18-64 años	Hombres	9,6	44,4	31,8	10,4	3,8
	Mujeres	17,3	43,9	29,7	7,8	1,3
15-24 años	Hombres	16,5	39,7	22,1	16,6	5,2
	Mujeres	20,4	43,3	23,2	10,6	2,5
25-34 años	Hombres	8,6	40,3	31,7	13,2	6,2
	Mujeres	19,0	42,9	27,3	8,8	2,1
35-44 años	Hombres	9,7	44,1	32,0	10,1	4,2
	Mujeres	17,8	44,0	30,1	6,8	1,2
45-54 años	Hombres	8,7	45,0	36,2	7,4	2,6
	Mujeres	13,7	42,6	34,9	8,0	0,8
55-64 años	Hombres	10,8	51,5	31,3	5,7	0,6
	Mujeres	20,9	46,2	27,3	5,3	0,3


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.156.

Prevalencias de consumo de diferentes sustancias psicoactivas* en los últimos 30 días, según edad y sexo en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



		Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
15-17 años	Hombres	63,5	26,1	7,8	1,9	0,7
	Mujeres	61,7	22,4	10,0	5,9	0,0
18-64 años	Hombres	16,8	44,0	29,3	8,3	1,7
	Mujeres	30,4	41,3	23,1	4,6	0,6
15-24 años	Hombres	29,1	36,2	19,5	13,4	1,7
	Mujeres	36,5	36,8	19,2	6,2	1,3
25-34 años	Hombres	15,6	41,8	28,7	11,0	2,9
	Mujeres	33,2	38,7	21,9	5,3	0,9
35-44 años	Hombres	17,0	43,9	29,4	7,7	2,0
	Mujeres	31,0	41,3	23,4	3,9	0,4
45-54 años	Hombres	14,7	43,9	34,6	5,5	1,3
	Mujeres	25,2	42,6	26,8	4,9	0,5
55-64 años	Hombres	17,4	49,9	28,2	4,2	0,3
	Mujeres	34,2	42,8	19,6	3,3	0,1

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.157.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas según el número de sustancias* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro sustancias	Cinco o más sustancias
Alcohol	85,2	94,9	98,2	99,8	98,4
Tabaco	9,7	81,5	97,8	95,8	90,0
Cannabis	0,2	5,6	59,3	93,7	95,2
Éxtasis	0,0	0,1	0,4	4,3	49,6
Hipnosedantes con o sin receta	4,7	17,3	40,2	45,1	40,6
Cocaína en polvo	0,0	0,4	3,1	44,2	87,9
Cocaína base	0,1	0,2	0,2	1,5	5,8
Anfetaminas	0,0	0,0	0,2	8,2	42,7
Alucinógenos	0,1	0,0	0,4	6,6	40,2
Heroína	0,0	0,0	0,2	0,9	5,4
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.158.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Ningún consumo	4,4	3,2	5,7	14,2	10,5	18,0	24,7	18,1	31,4
Una sola sustancia	19,3	16,9	21,8	44,0	44,3	43,7	42,1	43,5	40,7
Dos sustancias	38,1	36,5	39,6	30,2	31,2	29,2	25,7	28,7	22,7
Tres sustancias	24,4	25,5	23,2	9,0	10,3	7,8	6,4	8,1	4,6
Cuatro sustancias	7,8	9,1	6,4	1,6	2,4	0,8	0,8	1,2	0,4
Cinco o más sustancias	6,1	8,7	3,4	0,9	1,3	0,5	0,3	0,4	0,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.159.

Prevalencia de consumo de ninguna, una o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en la población de 15-64 años, según edad (porcentajes). España, 2015.

ALGUNA VEZ EN LA VIDA								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	31,0	3,6	22,5	10,9	4,4	3,6	2,4	2,8
Una sola sustancia	37,4	18,8	34,5	28,0	20,6	18,5	15,3	17,0
Dos sustancias	16,9	38,7	22,0	26,8	31,5	36,5	42,4	50,7
Tres sustancias	11,7	24,8	16,5	25,2	25,5	23,4	25,4	22,7
Cuatro sustancias	1,8	7,9	2,5	4,9	9,6	9,5	8,6	4,6
Cinco o más sustancias	1,1	6,2	2,1	4,3	8,3	8,4	5,9	2,2

ÚLTIMOS 12 MESES								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	39,1	13,4	29,5	18,4	13,8	13,6	11,3	15,7
Una sola sustancia	39,7	44,2	40,1	41,5	41,6	44,1	43,7	49,0
Dos sustancias	12,1	30,8	18,4	22,6	29,5	31,1	35,5	29,4
Tres sustancias	7,7	9,1	9,7	13,7	11,0	8,5	7,7	5,5
Cuatro sustancias	1,0	1,6	1,4	2,0	2,6	2,0	1,2	0,4
Cinco o más sustancias	0,3	0,9	0,8	1,9	1,5	0,8	0,5	0,0

ÚLTIMOS 30 DÍAS								
	15-17 años	18-64 años	15-18 años	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Ningún consumo	62,6	23,5	49,6	32,7	24,3	23,8	20,3	25,5
Una sola sustancia	24,2	42,7	29,5	36,5	40,3	42,7	43,2	46,5
Dos sustancias	9,0	26,2	14,1	19,4	25,3	26,5	30,5	24,0
Tres sustancias	4,0	6,4	5,9	9,9	8,2	5,8	5,2	3,8
Cuatro sustancias	0,1	0,9	0,5	0,9	1,4	1,0	0,7	0,2
Cinco o más sustancias	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,2	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.160.

Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 12 meses). España, 2015.

	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles	Nuevas sustancias
Alcohol	100,0	44,1	11,3	2,1	11,4	2,4	0,2	2,5	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	1,0
Tabaco	85,3	100,0	14,4	3,0	19,8	4,0	0,2	4,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,1	1,7
Hipnosedantes*	72,4	48,1	100,0	19,3	10,2	3,0	0,2	3,2	0,9	0,8	1,0	0,3	0,1	0,9
Hipnosedantes**	72,4	52,9	100,0	100,0	14,0	8,3	0,1	8,4	1,6	1,6	2,0	0,5	0,1	2,0
Cannabis	93,4	82,2	13,0	3,4	100,0	15,7	0,7	16,0	5,3	4,6	4,8	0,9	0,4	7,4
Cocaína polvo y/o base	96,1	80,0	18,9	9,5	74,7	94,4	8,3	100,0	20,6	17,6	15,9	3,0	1,8	21,7
Éxtasis	94,2	72,9	17,5	6,2	83,2	67,7	3,8	70,3	100,0	44,7	40,9	3,8	6,0	41,1
Anfetaminas	96,7	77,9	18,5	6,8	81,5	66,3	2,2	67,1	48,9	100,0	42,7	2,2	2,8	46,5
Alucinógenos	92,0	72,9	20,0	8,0	79,0	53,8	3,6	56,4	43,3	41,9	100,0	3,6	4,7	84,2

* Hipnosedantes con o sin receta. ** Hipnosedantes sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.161.

Proporción (porcentajes en columnas) de consumidores de otras drogas entre las personas de 15-64 años que han consumido alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos (referencia temporal últimos 30 días). España, 2015.


	Alcohol	Tabaco	Hipnosedantes*	Hipnosedantes**	Cannabis	Cocaína en polvo	Cocaína base	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	Inhalables volátiles	Nuevas sustancias
Alcohol	100,0	44,7	6,9	0,9	10,1	1,3	0,1	1,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,5
Tabaco	72,2	100,0	9,9	1,3	16,2	1,8	0,1	1,9	0,5	0,4	0,4	0,1	0,0	0,8
Hipnosedantes*	53,0	46,9	100,0	12,0	7,0	1,4	0,2	1,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,1	0,4
Hipnosedantes**	61,5	53,8	100,0	100,0	14,6	6,9	0,0	6,9	1,2	1,2	2,2	1,1	0,0	1,8
Cannabis	84,9	83,2	7,8	1,9	100,0	8,8	0,7	9,2	2,5	2,2	2,0	0,7	0,2	4,1
Cocaína en polvo	94,3	80,3	13,5	7,6	74,7	100,0	2,3	100,0	15,4	13,7	8,2	3,5	0,8	14,1
Cocaína base	94,4	98,9	29,8	0,0	90,6	37,5	100,0	100,0	34,6	0,0	21,5	44,2	26,8	37,4
Cocaína polvo y/o base	94,5	81,0	14,8	7,3	75,1	96,3	6,0	100,0	16,4	13,3	9,2	5,2	2,1	15,4
Éxtasis	93,7	73,2	13,1	5,0	78,4	55,5	8,0	62,9	100,0	38,4	18,2	7,0	5,5	23,7
Anfetaminas	93,0	71,0	13,2	5,3	72,2	53,0	0,0	53,0	39,2	100,0	22,8	0,0	0,9	28,5
Alucinógenos	85,0	74,1	20,4	9,7	66,7	32,5	5,5	38,0	21,7	26,9	100,0	5,5	6,1	77,2
Heroína	97,3	100,0	68,9	19,3	89,2	54,9	43,1	84,0	32,3	0,0	22,7	100,0	26,1	10,4
Inhalables volátiles	100,0	72,6	58,7	0,0	72,6	34,5	70,0	90,6	63,0	21,4	63,0	70,0	100,0	9,4
Nuevas sustancias	80,8	80,5	9,3	4,3	76,1	28,8	5,4	33,3	13,3	15,8	42,6	1,3	0,5	100,0

* Hipnosedantes con o sin receta. ** Hipnosedantes sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.162.

Prevalencia de binge drinking y de intoxicaciones etílicas, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.




	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Se ha emborrachado en los últimos 30 días	3,7	7,1	18,5	44,8
Se ha emborrachado en los últimos 12 meses	13,0	19,5	39,0	71,7
Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días	14,2	22,5	37,3	65,7

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.163.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015.




	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
No ha hecho binge drinking	4,4	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Ha hecho binge drinking	20,8	4,1	1,1	1,0	0,8	0,2	0,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.164.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (porcentajes). España, 2015.




	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
No se ha emborrachado	5,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Se ha emborrachado	34,4	8,2	2,8	2,3	1,9	0,4	0,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.165.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días entre la población de 15-64 años, según su puntuación en la escala CAST (porcentajes). España, 2015.



	Cannabis	Cocaína	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos	Heroína	I. volátiles
Puntuación CAST <4	76,7	5,9	1,3	1,5	1,3	0,1	0,1
Puntuación CAST ≥4*	93,6	15,4	5,4	3,7	4,0	2,3	0,6


CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

* Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.166.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) en la población de 15-64 años que ha contestado la escala CAST, según el número de sustancias psicoactivas consumidas* en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Prevalencia consumidores problemáticos de cannabis entre los que han contestado al CAST (CAST \geq 4)	12,1	17,8	34,7
Prevalencia de consumo de cannabis CAST<4	87,9	82,2	65,3

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

CAST: Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.167.

Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	No policonsumo (ninguna o una sustancia)	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Estado civil				
Soltero/a	36,5	36,3	54,3	67,9
Casado/a	54,9	51,8	34,4	19,6
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	8,6	12,0	11,3	12,4
Nivel de estudios				
Primarios/sin estudios	15,2	14,6	13,0	13,7
Secundarios	63,7	67,7	72,2	69,8
Universitarios	21,1	17,7	14,8	16,5
Percepción sobre el propio estado de salud				
Buena/muy buena	87,7	84,4	79,9	76,2
Regular	10,9	13,3	17,3	20,8
Mala/muy mala	1,5	2,3	2,8	2,9

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.168.

Percepción de riesgo (porcentaje que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas) entre la población de 15 a 64 años, según el número de sustancias psicoactivas* consumidas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Ninguna sustancia	Una sustancia	Dos sustancias	Tres sustancias	Cuatro o más sustancias
Fumar un paquete de tabaco diario	97,0	94,1	88,1	85,2	77,8
Tomarse 5 o 6 cañas/copas el fin de semana	72,5	47,9	37,5	29,0	17,7
Tomarse 5 o 6 cañas/copas cada día	96,5	91,5	88,0	83,7	74,3
Fumar cannabis una vez o menos al mes	84,0	68,2	57,2	33,8	11,9
Fumar cannabis una vez por semana o más	92,3	85,1	77,6	54,9	31,1
Tomar hipnosedantes una vez o menos al mes	75,0	60,8	54,0	39,4	33,6
Tomar hipnosedantes de una a tres veces por semana	88,6	81,6	76,1	63,7	58,5
Tomar hipnosedantes a diario o casi a diario	95,8	93,0	90,2	82,5	81,6
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	98,1	96,2	94,4	89,5	73,0
Consumir cocaína una vez o menos al mes	97,9	96,5	94,7	89,6	65,6
Consumir heroína una vez o menos al mes	98,7	98,0	97,1	96,5	92,4
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	98,4	97,8	96,4	93,9	81,6
Consumir GHB una vez o menos al mes	98,5	98,0	96,9	95,0	86,2
Consumir anfetaminas una vez o menos al mes	98,2	97,4	95,7	93,3	77,2
Consumir setas alucinógenas una vez o menos al mes	98,4	97,5	95,8	93,0	76,3
Consumir ketamina una vez o menos al mes	98,7	98,2	96,9	95,0	88,0

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.169.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	3,9	4,8	2,9	5,5	8,4	2,6	4,6	6,8	2,3	2,2	3,6	1,0	0,6	0,9	0,3
Ketamina	0,7	0,8	0,5	1,2	1,9	0,6	1,2	1,9	0,5	0,3	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0
GHB	0,4	0,6	0,2	0,9	1,5	0,4	1,1	2,0	0,2	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	0,0
Spice	0,5	0,7	0,3	1,2	1,9	0,6	1,1	1,6	0,7	0,7	1,0	0,5	0,2	0,2	0,2
Mefedrona	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,6	1,1	0,0	0,7	1,2	0,3	0,8	1,3	0,3	0,2	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,3	0,6	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	3,4	5,0	1,8	1,9	0,8	2,8	3,4	5,1	1,7	4,8	6,8	2,7	2,7	4,0	1,3
Ketamina	0,7	1,1	0,3	0,1	0,2	0,0	0,7	1,1	0,3	1,0	1,4	0,5	0,6	0,9	0,2
GHB	0,6	1,0	0,2	0,1	0,3	0,0	0,6	1,1	0,2	0,7	1,1	0,3	0,6	1,0	0,1
Spice	0,8	1,1	0,5	0,0	0,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,9	1,4	0,5	0,7	1,0	0,5
Mefedrona	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0
Salvia	0,5	0,8	0,1	0,0	0,1	0,0	0,5	0,8	0,1	0,7	1,1	0,2	0,4	0,7	0,1
Esteroides anabolizantes	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.170.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	2,0	2,6	1,5	1,2	2,0	0,4	0,9	1,4	0,4	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,1
Ketamina	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Spice	0,2	0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Mefedrona	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Salvia	0,3	0,6	0,0	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Esteroides anabolizantes	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años			15-34 años			35-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Total nuevas sustancias	0,9	1,3	0,4	0,7	0,4	1,0	0,9	1,3	0,4	1,6	2,3	0,9	0,5	0,8	0,2
Ketamina	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0
GHB	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spice	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1
Mefedrona	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Salvia	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0
Esteroides anabolizantes	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.171.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2011-2015.

	Alguna vez en la vida			Últimos 12 meses			Últimos 30 días		
	2011	2013	2015	2011	2013	2015	2011	2013	2015
Nuevas sustancias	–	3,0	3,4	–	0,7	0,9	–	0,3	0,4
Ketamina	1,1	0,8	0,7	0,8	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0
GHB	–	0,6	0,6	–	0,1	0,1	–	0,0	0,0
Spice	1,1	0,5	0,8	0,8	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0
Piperazinas	0,4	0,0	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Mefedrona	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Nexus	0,5	0,2	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Research Chemicals	0,4	0,1	–	0,3	0,0	–	0,2	0,0	–
Legal Highs	0,7	0,0	–	0,6	0,0	–	0,5	0,0	–
Salvia	–	0,5	0,5	–	0,1	0,1	–	0,0	0,1
Esteroides anabolizantes	–	0,2	0,2	–	0,0	0,0	–	0,0	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.172.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida en la población de 15-64 años, según sexo (porcentajes). España, 2015.



	Spice	Ketamina	GHB	Salvia	Mefedrona	E. anabolizantes
Hombres	1,1	1,1	1,0	0,8	0,2	0,3
Mujeres	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.173.

Distribución de la población de 15-44 años que ha consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no, según sexo, estado civil y nivel de estudios (porcentajes). España, 2015.


	15-24 años		25-34 años		35-44 años	
	NSP alguna vez	NSP nunca	NSP alguna vez	NSP nunca	NSP alguna vez	NSP nunca
Sexo						
Hombre	63,3	50,8	76,5	48,7	76,0	50,4
Mujer	36,7	49,2	23,5	51,3	24,0	49,6
Estado civil						
Soltero/a	92,0	95,0	79,8	62,3	50,4	27,8
Casado/a	8,0	4,8	18,5	35,6	39,1	63,4
Separado/a - Divorciado/a - Viudo/a	0,0	0,2	1,7	2,0	10,4	8,8
Nivel de estudios						
Sin estudios/ estudios primarios	9,6	14,1	11,1	8,3	10,1	8,1
Estudios secundarios	79,6	78,3	64,1	64,8	67,8	66,4
Estudios universitarios	10,9	7,6	24,8	26,9	22,1	25,6

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.174.

Edad de inicio en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.175.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Mefedrona	Salviaa
Una sola sustancia	1,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,0
Dos sustancias	3,3	0,1	3,5	0,0	3,8	0,7
Tres sustancias	5,1	0,7	1,0	1,0	4,2	6,0
Cuatro sustancias	14,9	5,2	2,3	8,5	1,3	13,2
Cinco o más sustancias	75,6	94,0	92,1	90,2	90,7	80,2

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.176.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas* entre los consumidores de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Mefedrona	Salviaa
Una sola sustancia	7,1	0,0	6,6	0,0	12,8	3,3
Dos sustancias	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
Tres sustancias	18,7	1,7	20,8	29,5	0,0	42,8
Cuatro sustancias	22,3	4,5	18,8	31,0	34,3	14,5
Cinco o más sustancias	43,0	93,7	53,8	39,5	52,8	29,8

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.177.

Porcentaje de personas que nunca han oído hablar de nuevas sustancias psicoactivas en la población de 15-64 años, según edad y sexo. España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Nunca han oído hablar de NSP	66,6	64,8	68,5	67,1	62,5	71,8	69,0	65,6	72,6	73,2	71,0	75,2	79,0	78,0	80,2
	TOTAL 15-64 años						MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años					
	T	H	M				T	H	M				T	H	M
Nunca han oído hablar de NSP	71,1	68,4	73,9				71,1	73,5	68,9				71,1	68,2	74,0

T = total; H = hombres; M = mujeres.

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.178.

Riesgo percibido ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad y sexo. España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Consumir GHB																		
una vez o menos al mes	96,9	96,2	97,7	96,3	96,0	96,7	96,3	95,3	97,2	96,9	95,9	97,9	97,2	96,6	97,7	98,0	97,2	98,7
Consumir ketamina																		
una vez o menos al mes	97,1	96,3	97,9	96,4	96,3	96,6	96,3	95,3	97,3	96,9	96,0	97,9	97,5	96,9	98,0	98,3	97,4	99,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.179.

Percepción de riesgo ante el consumo una vez o menos al mes de GHB y de ketamina (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que esta conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según se hayan consumido alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.180.

Disponibilidad percibida de nuevas sustancias psicoactivas como GHB y ketamina (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.


	15-64 años			15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
GHB	24,2	27,8	20,4	25,7	28,5	22,7	29,9	33,2	26,4	26,3	30,8	21,2	22,3	26,2	18,7	15,5	18,4	12,3
Ketamina	23,0	26,2	19,6	24,1	26,0	22,1	28,4	31,3	25,4	24,9	29,5	19,7	21,1	24,3	18,1	15,3	18,0	12,2

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.181.

Vías de obtención de nuevas sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre la población de 15-64 años que ha consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.182.


Prevalencia de consumo alguna vez en la vida de otras sustancias psicoactivas entre las personas de 15-64 años que han consumido ketamina, GHB, spice o salvia alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.

	Nuevas sustancias	Ketamina	GHB	Spice	Salvia
Alcohol	99,2	98,4	98,2	98,4	97,4
Tabaco	94,7	95,0	94,8	94,6	96,8
Anfetaminas/speed	55,0	80,5	79,2	77,3	62,7
Alucinógenos	73,6	100,0	87,7	69,3	84,5
Hipnosedantes con o sin receta	32,4	40,9	38,9	44,5	40,8
Cannabis	94,1	98,3	94,4	97,9	96,8
Éxtasis	53,9	83,3	81,9	68,4	62,4
Cocaína polvo y/o base	74,0	93,1	92,9	91,8	75,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.183.

Prevalencia de consumo de cinco o más sustancias psicoactivas* alguna vez entre la población de 15 a 64 años según se hayan consumido en alguna ocasión nuevas sustancias, ketamina, GHB, spice o salvia (porcentajes). España, 2015.




* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles)

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.184.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales* en los últimos 12 meses en función de haber consumido o no nuevas sustancias psicoactivas** alguna vez en la vida (porcentajes). España, 2015.



	Sustancias legales (alcohol y/o tabaco)	Sustancias ilegales*	Ninguna sustancia legal e ilegal**
Ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	96,6	68,6	2,1
No ha consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida	83,5	8,2	14,6


* Sustancias psicoactivas legales e ilegales (alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles)

** Respuesta a la pregunta NS1 del cuestionario

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.185.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre las personas de 15-64 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias psicoactivas (porcentajes fila). España, 2015.




	Alcohol	Borracheras	Borracheras*	Binge drinking*	Tabaco	Hipnosedantes	Cannabis	Cocaína polvo y/o base	Éxtasis	Anfetaminas	Alucinógenos
Ha consumido NSP alguna vez en la vida	90,8	53,4	31,4	48,3	77,8	19,1	59,2	30,8	11,1	10,9	16,5
No ha consumido NSP alguna vez en la vida	77,0	15,5	5,6	16,8	38,9	11,7	7,7	1,0	0,2	0,2	0,0

* Últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.186.

Valoración de diversas acciones como “muy importantes” para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años, según haya consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida o no (porcentajes). España, 2015.



	Ha consumido NSP alguna vez en la vida	Nunca ha consumido NSP
Educación sobre las drogas en las escuelas	83,7	91,0
Tratamiento voluntario a los consumidores para dejar la droga	76,0	84,1
Legalización del hachís y la marihuana	66,0	36,3
Administración médica de metadona a los consumidores de heroína	60,7	69,7
Campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas	59,7	81,4
Control policial y de aduanas	58,0	81,2
Leyes estrictas contra las drogas	47,7	75,9
Administración médica de heroína a los consumidores que han fracasado en otros tratamientos	46,6	58,5
Tratamiento obligatorio a los consumidores para dejar la droga	39,9	60,1
Legalización de todas las drogas	27,6	20,7

NSP = nuevas sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.187.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	Diferencia 2015-2013	Diferencia 2015-1997
Consumir heroína una vez por semana o más	99,4	99,6	98,8	99,3	99,3	99,4	99,4	99,6	99,6	-	-	-
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3	0,1	-0,3
Consumir cocaína una vez por semana o más	98,5	99,2	97,9	98,5	98,7	98,9	99	99,1	99,0	-	-	-
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6	0,8	1,1
Probar cocaína una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	77,4	76,5	72,4	-	-	-
Consumir éxtasis una vez por semana o más	98,6	98,9	97,8	98,3	98,7	98,3	98,3	98,9	99,0	-	-	-
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6	-0,5	2,1
Probar éxtasis, una o dos veces en su vida	-	-	-	-	-	-	76,7	78,2	74,8	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez por semana o más	99,1	99,4	98,5	99,1	99,2	-	-	-	-	-	-	-
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	96,5	2,0	0,5
Consumir hipnosedantes una vez por semana o más	81,4	86,8	84,8	85,4	81,8	79,7	79,7	79,9	78,5	-	-	-
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0	0,4	-2,4
Consumir cannabis una vez por semana o más	84,0	87,6	83,1	79,2	80,8	83	81,6	85,5	82,4	79,8	-2,7	-4,2
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5	1,3	-6,4
Probar cocaína base 1 o 2 veces en su vida	-	-	-	-	-	-	95,7	91,8	89,5	-	-	-
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	90,0	-0,7	0,8
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	45,8	2,2	0,2
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6	2,8	11,9
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez por semana o más	-	-	-	-	-	-	-	99,4	99,5	-	-	-
Consumir GHB o éxtasis líquido 1 vez o menos al mes	-	-	-	-	-	-	-	97,8	97,2	96,9	-0,2	-

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.188.


Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos, bastantes, pocos o ningún problema). España, 2015.

	Muchos problemas	Bastantes problemas	Pocos problemas	Ningún problema	NS/NC
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana	19,5	25,7	36,8	16,7	1,2
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos una vez o menos al mes	34,2	20,2	27,0	12,4	6,1
Fumar hachís o marihuana una vez o menos al mes	37,8	22,9	24,8	11,7	2,8
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos de una a tres veces por semana	43,3	30,4	15,1	4,7	6,4
Fumar hachís o marihuana una vez por semana o más	51,2	26,3	13,7	5,9	2,8
Fumar un paquete de tabaco diario	55,7	35,0	6,3	2,1	0,9
Tomarse 5 ó 6 cañas/copas cada día	55,9	33,2	8,1	1,7	1,0
Tomar tranquilizantes / sedantes o somníferos a diario o casi a diario	64,4	21,3	5,6	2,6	6,1
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	74,3	16,3	4,1	1,1	4,1
Consumir cocaína una vez o menos al mes	77,1	14,9	4,2	1,0	2,8
Consumir setas mágicas una vez o menos al mes	78,0	12,6	3,0	0,9	5,5
Consumir ketamina una vez o menos al mes	78,5	11,9	2,1	0,6	6,9
Consumir anfetaminas o speed una vez o menos al mes	78,5	13,2	3,1	0,8	4,5
Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o menos al mes	78,9	12,9	2,3	0,6	5,4
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	79,2	13,5	2,7	0,7	3,9
Consumir heroína una vez o menos al mes	81,8	12,7	2,1	0,5	2,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.189.


Riesgo percibido ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población que piensa que cada conducta puede causar muchos o bastantes problemas). España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.190.

Evolución del riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas). España, 1997-2015.



- Consumir heroína una vez o menos al mes
- Consumir alucinógenos una vez o menos al mes
- Consumir éxtasis una vez o menos al mes
- Consumir cocaína una vez o menos al mes
- Consumir 5-6 cañas/copas cada día
- Fumar paquete tabaco diario
- Consumir cannabis una vez o menos al mes
- Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes
- Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Consumir heroína una vez o menos al mes	97,6	98,5	96,7	97,4	97,9	98,7	97,5	98,0	97,2	97,3
Consumir alucinógenos una vez o menos al mes	96,0	97,4	95,5	96,3	97,1	97,4	96,1	96,6	94,4	96,5
Consumir éxtasis una vez o menos al mes	92,5	94,6	92,6	92,6	94,4	95,8	94,4	95,4	95,1	94,6
Consumir cocaína una vez o menos al mes	93,5	95,4	93,3	93,1	95,0	95,8	94,6	94,5	93,8	94,6
Consumir 5-6 cañas/copas cada día	89,2	90,7	86,1	83,3	87,3	89,2	91,4	91,7	90,7	90,0
Fumar paquete tabaco diario	79,7	82,4	83,6	84,6	87,1	87,1	89,4	89,1	88,7	91,6
Consumir cannabis una vez o menos al mes	68,9	74,8	67,9	62,0	64,2	68,5	62,7	69,4	61,2	62,5
Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes	60,4	70,1	66,7	65,3	62,3	62,2	60,1	62,5	57,6	58,0
Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana	45,6	49,2	44,2	41,8	43,6	46,6	45,0	49,3	43,5	45,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.191.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (una vez al mes o menos), (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



* Paquete tabaco diario. ** 5-6 copas fin de semana.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.192.


Evolución de la percepción del riesgo (proporción de personas que piensa que fumar un paquete de tabaco diario puede causar muchos o bastantes problemas) y de la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1997-2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.193.


Percepción del riesgo asociado al consumo de hipnosedantes (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.194.

Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según sexo. España, 2015.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.195.


Percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de población de 15-64 años que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes problemas), según edad (porcentajes). España, 2015.

	Total	15-24 años	25-34 años	35-44 años	45-54 años	55-64 años
Paquete tabaco diario	91,6	91,7	91,3	91,3	91,0	92,7
5-6 copas fin de semana	45,8	44,1	42,5	44,1	45,6	52,9
5-6 copas cada día	90,0	90,5	89,5	89,6	89,8	91,1
Cannabis una vez o menos al mes	62,5	54,3	54,6	60,6	64,9	77,1
Cannabis una vez por semana o más	79,8	75,5	74,6	78,7	81,5	88,0
Hipnosedantes una vez o menos al mes	58,0	60,8	58,4	58,5	55,3	57,9
Hipnosedantes de 1 a 3 veces por semana	78,8	81,8	80,3	79,0	77,8	75,9
Hipnosedantes a diario o casi a diario	91,3	93,5	92,8	92,1	90,2	88,3
Éxtasis una vez o menos al mes	94,6	93,4	93,1	94,4	95,3	96,5
Cocaína una vez o menos al mes	94,6	93,3	92,9	94,2	95,4	96,9
Heroína una vez o menos al mes	97,3	96,6	96,8	97,3	97,6	98,2
Alucinógenos una vez o menos al mes	96,5	95,5	95,4	96,3	97,1	97,8
GHB una vez o menos al mes	96,9	96,3	96,3	96,9	97,2	98,0
Anfetaminas una vez o menos al mes	95,9	94,7	95,1	95,9	96,4	97,3
Setas alucinógenas una vez o menos al mes	95,9	94,8	94,6	95,9	96,4	97,8
Ketamina una vez o menos al mes	97,1	96,4	96,3	96,9	97,5	98,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.196.

Evolución de la percepción de disponibilidad de sustancias psicoactivas (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil), entre la población de 15-64 años de edad (porcentajes). España, 1995-2015.



	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Cannabis	50,3	52,1	51,8	59,5	59,2	66,2	59,8	69,6	67,0	64,6	64,3
Éxtasis	41,1	40,9	39,9	48,2	46,1	49,7	43,8	51,9	45,6	32,7	28,5
Cocaína	39,5	39,2	39,9	46,7	46,5	53,3	43,8	56,7	54,4	46,9	42,0
Heroína	37,0	36,2	37,2	41,2	39,2	43,4	39,5	44,7	44,9	31,6	27,4
Alucinógenos (LSD)	37,1	37,0	37,2	42,7	40,0	44,8	40,2	48,7	45,4	33,0	28,7
GHB o éxtasis líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	24,2
Anfetaminas o speed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	29,2
Setas alucinógenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	24,7
Ketamina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	23,0
Hipnosedantes con receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,1
Hipnosedantes sin receta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.197.


Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive (porcentajes). España, 1997-2015.

	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015	Diferencia 2013-2015
Nada importante	19,6	22,3	19,1	20,9	14,8	20,5	20,4	27,5	23,0	26,0	3,0
Algo importante	28,1	32,1	34,3	34,3	27,9	29,7	30,7	32,5	37,8	37,7	-0,2
Muy importante	46,4	37,3	39,3	36,3	52,0	49,8	48,9	40,0	39,2	36,3	-2,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.198.

Evolución de la visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales (porcentaje de la población de 15-64 años que se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el lugar donde vive). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Jeringuillas en el suelo	17,3	15,2	10,7	8,4	8,5	5,7	4,2	3,8	2,9	2,0	1,1
Personas inyectándose drogas	10,7	9,9	7,3	5,9	5,5	4,3	2,8	2,9	2,1	1,3	0,8
Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio (fumando chinos)	10,6	9,2	8,5	6,1	6,2	6,1	4,6	4,4	3,3	2,4	1,6
Personas drogadas caídas en el suelo	12,3	11,5	9,7	8,7	7,8	7,4	5,6	6,2	5,2	3,8	2,6
Vendedores que ofrecen drogas	11,4	10	8,6	8,8	8,2	10,1	10,2	13,5	10,7	9,4	7,3
Personas esnifando drogas por la nariz	-	-	-	-	-	-	11,6	10,4	8,6	7,9	6,1
Personas fumando porros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,9	45,1
Personas haciendo botellón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	34,9
Personas borrachas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.199.

Evolución de la valoración como “muy importantes” de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre la población de 15-64 años (porcentajes). España, 1995-2015.




	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Educación en las escuelas	94,3	93,1	91,8	89,4	89,5	88,8	90,6	90,4	91,8	90,4	90,8
Tratamiento voluntario a consumidores	86,3	87,1	84,8	81,6	82,7	82,4	83,2	85,1	84,9	83,2	83,8
Control policial y aduanero	85,8	83,7	82,1	80,5	78,8	79,8	83,3	84,7	84,2	81,2	80,4
Campañas publicitarias	84,5	81,5	79,8	77,6	75,6	77,7	79,1	77,7	81	78,7	80,7
Leyes estrictas contra las drogas	79,3	77	76,9	75,5	73,2	75,3	77,9	80,6	80,3	76,6	74,9
Administración médica de metadona	63,8	62,9	67,5	66,6	67,1	68,4	66,8	65,8	72,4	69,3	69,3
Tratamiento obligatorio a consumidores	56,2	57,2	57,9	62,8	59,7	58,2	56,3	57,2	65,7	59,9	59,4
Administración médica de heroína	43,3	47,5	53,9	58,2	59,3	59,9	52,8	48,9	60,2	59,1	58,1
Legalización de cannabis	27,3	30,2	33,3	38,5	37,1	35,2	23,4	29,6	32,7	33,1	37,4
Legalización de todas las drogas	19,8	21,5	24,6	27,1	23,5	21,4	16,6	15,6	20,9	19,6	21,0

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.1.200.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.




	Nada importante	Algo importante	Muy importante
Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4)	15,3	15,5	66,7
Han consumido cannabis en el último año (CAST <4)	15,2	21,3	59,1
No han consumido cannabis en el último año	40,6	17,6	30,8

CAST: Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.201.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.




	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres
15-24 años	36,1	39,3	32,8	18,7	18,7	18,8
25-34 años	38,9	43,1	34,6	20,5	20,5	20,5
35-44 años	39,8	42,5	36,8	21,7	22,8	20,5
45-54 años	37,0	38,5	35,6	21,6	20,1	22,9
55-64 años	33,9	35,5	32,1	21,4	20,7	22,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.202.

Porcentaje de personas de 15 a 64 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en los últimos 12 meses (porcentajes). España, 2015.



	Nada importante	Algo importante	Muy importante
Han consumido alguna droga ilegal en el último año	55,0	17,1	19,9
No han consumido ninguna droga ilegal en el último año	61,7	8,5	18,4

*Alguna droga ilegal: No incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.203.

Percepción del estado de salud de la población de 15-64 años, según sexo y edad (porcentajes). España, 2015.

	15-24 años			25-34 años			35-44 años			45-54 años			55-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Muy buena / buena	96,4	96,8	95,9	94,8	95,0	94,6	88,9	89,0	88,9	81,4	82,5	80,4	68,2	67,9	68,4
Regular	3,4	2,8	4,0	4,9	4,8	5,0	9,6	9,4	9,8	16,2	15,3	17,0	27,4	27,7	27,1
Mala / muy mala	0,3	0,4	0,1	0,3	0,2	0,4	1,5	1,6	1,3	2,4	2,2	2,6	4,4	4,3	4,5


	TOTAL 15-64 años			MENORES 15-17 años			MAYORES 18-64 años		
	T	H	M	T	H	M	T	H	M
Muy buena / buena	85,6	85,9	85,2	96,1	96,4	95,8	85,3	85,6	84,9
Regular	12,6	12,3	12,9	3,9	3,6	4,1	12,8	12,5	13,2
Mala / muy mala	1,8	1,8	1,9	0,0	0,0	0,1	1,9	1,9	1,9

T = total; H = hombres; M = mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADADES).

1.1.204.

Percepción de estado de salud bueno o muy bueno en la población de 15-64 años, según edad y sexo (porcentajes). España, 2015.



	HOMBRES	MUJERES
15-19 años	97,1	95,9
20-24 años	96,5	95,9
25-29 años	95,7	96,0
30-34 años	94,4	93,5
35-39 años	91,7	91,6
40-44 años	86,2	85,9
45-49 años	84,4	83,5
50-54 años	79,9	76,8
55-59 años	71,4	72,9
60-64 años	65,2	64,8

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EADAES).

1.1.205.

Percepción del estado de salud entre la población de 15-64 años, según se hayan consumido sustancias psicoactivas en los últimos 30 días o no (porcentajes fila). España, 2015.

		15-34 años		35-44 años		45-54 años		55-64 años	
		Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala	Buena/Muy buena	Regular/Mala/Muy mala
Ha hecho binge drinking	Sí	95,2	4,8	88,8	11,2	82,7	17,3	77,9	22,1
	No	95,5	4,5	88,9	11,1	81,3	18,7	67,2	32,8
Ha consumido tabaco	Sí	93,5	6,5	85,5	14,5	78,6	21,4	66,7	33,3
	No	96,6	3,4	91,3	8,7	83,9	16,1	69,1	30,9
Ha consumido hipnosedantes	Sí	75,7	24,3	55,4	44,6	54,7	45,3	45,7	54,3
	No	96,2	3,8	91,5	8,5	84,7	15,3	72,1	27,9
Ha consumido cannabis	Sí	92,3	7,7	80,2	19,8	65,8	34,2	-	-
	No	96,0	4,0	89,6	10,4	82,1	17,9	-	-
Consumo de cocaína	Sí	85,0	15,0	77,8	22,2	-	-	-	-
	No	95,6	4,4	89,1	10,9	-	-	-	-
Consumo de éxtasis	Sí	80,2	19,8	-	-	-	-	-	-
	No	95,6	4,4	-	-	-	-	-	-
Consumo de anfetaminas	Sí	79,2	20,8	-	-	-	-	-	-
	NO	95,5	4,5	-	-	-	-	-	-

Nota: se excluyen de la tabla los grupos con menor base muestral.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES).

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

En 2016, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas, ha llevado a cabo la duodécima edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

El **objetivo general** de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) del año 2016 es conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias (Enseñanza Secundaria Obligatoria —ESO—, Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional), a nivel estatal y autonómico, cuando sea posible, con la finalidad de obtener información útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas.

Los **objetivos específicos** de dicha encuesta son:

- a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- b) Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo y otras conductas.
- e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

El universo son los estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas Secundarias en España en régimen general. La muestra del año 2016 fue de 35.369 alumnos.

Al cierre de este informe los resultados de ESTUDES 2016 no están disponibles por lo que serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2014, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_ESTUDES.htm



Problemas relacionados con las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2015

2.1.1.


Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2015.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	-
1992	20.017	15.956	-
1993	18.977	16.703	-
1994	18.770	17.526	-
1995	17.878	20.369	-
1996	16.647	28.382	-
1997	12.993	30.173	-
1998	11.867	30.756	-
1999	10.473	26.031	-
2000	8.151	26.412	-
2001	7.461	24.844	-
2002	5.051	21.162	-
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756
2014*	2.356	8.555	10.911
2015	2.202	7.713	10.978


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848
2014*	9.683	8.182	17.864
2015	8.445	7.248	17.327


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914
2014*	12.968	3.510	16.478
2015	11.185	3.448	15.676


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175
2014*	871	321	1.192
2015	742	256	1.068


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2015.



	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120
2014	635	133	82
2015	636	157	77

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2015.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2015.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469


* Datos relacionados con la variable Tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos). España, 1996-2015.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos por primera vez). España, 1996-2015.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total de tratados). España, 1987-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1
2015	41,3	21,5

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5
2015	38,0	23,8

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (total de tratados). España, 1987-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,7	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,9
2011	33,9	20,7
2012	34,5	20,7
2013	35,0	20,6
2014	35,3	20,6
2015	36,0	20,7

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína general (tratados por primera vez). España, 1991-2015.




	Edad media admisiones a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8
2015	34,8	21,1

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125
2015	1.831	167	145

El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0
2015	83,7	7,6	6,6

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56
2015	7.005	1.078	30

El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2015.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7
2015	83,5	12,9	0,4

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2015.



2.1.20.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2015.




	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9,0	11,8	5,2	0,9
2007	58,0	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52,0	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2
2014*	56,7	48,3	8,1	4,5	2,8	0,4
2015	60,3	51,4	8,2	5,3	4,4	0,5

* El 76,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol solo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 23,4% restantes (n= 6.428) que han consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2015.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0
2015	33,4	35,4	33,7

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014 y 29,1% en 2015.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2015.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2
2015*	11,5	12,1	38,4

* En 2015, el número de inyectores con VIH menores de 25 años fue de 3 personas.

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014 y 29,1% en 2015.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2015.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	17.327	23,2
Cocaína polvo	16.659	22,3
Cocaína base	663	0,9
Opioides	12.146	16,2
Heroína	10.978	14,7
Metadona (mal uso)	452	0,6
Otros opioides	716	1,0
Cannabis	15.676	21,0
Hipnosedantes	1.068	1,4
Estimulantes	924	1,2
Anfetaminas	636	0,9
Éxtasis y derivados	157	0,2
Otros estimulantes	131	0,2
Alucinógenos	77	0,1
Inhalantes volátiles	18	0,0
Otras drogas ilegales	72	0,1
Alcohol	27.469	36,7
Total drogas ilegales	47.308	63,2
Total drogas ilegales y alcohol	74.777	–

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2015.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	16,2	7,3	0,5	16,5
Cocaína	23,2	22,7	1,8	19,1
Cannabis	21,0	30,0	93,9	21,9
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,2	1,5	0,5	1,1
Alcohol	36,7	36,1	2,7	40,2
Número de admisiones	74.777	37.234	2.198	7.274

* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2015.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	25,7	11,5	0,6	27,6
Cocaína	36,6	35,5	1,9	31,9
Cannabis	33,1	47,0	96,4	36,6
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	2,0	2,4	0,5	1,8
Otras sustancias	2,6	3,6	0,6	2,1
Número de admisiones	47.308	23.777	2.139	4.349

* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2015.



	TASAS	NÚMERO DE CASOS
	(España 101,47 casos/100.000 habitantes)	(Total 47.308)
Canarias	181,64	3.815
Andalucía	147,78	12.412
Extremadura	135,96	1.486
Melilla	130,87	112
Comunidad Valenciana	121,47	6.050
Baleares	104,39	1.153
Galicia	97,32	2.659
Cataluña	89,78	6.741
Madrid	88,83	5.718
Ceuta	86,63	73
Murcia	73,54	1.079
Castilla - La Mancha	70,66	1.455
Cantabria	68,36	400
La Rioja	68,13	216
País Vasco	64,04	1.402
Aragón	61,16	806
Castilla y León	52,18	1.290
Navarra	31,38	201
Asturias	22,83	240

Tasas brutas. Población de cada Comunidad Autónoma a 1 de enero de 2015 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	47.308	19.519	23.777	39.616	7.602
Tratamiento previo (%)					
Sí	45,1			46,0	40,0
No	54,9			54,0	60,0
Edad media (años)	34,38	37,79	31,21	34,29	34,86
Sexo (%)					
Hombre	83,9	85,9	82,6		
Mujer	16,1	14,1	17,4		
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8
Enseñanza primaria	57,9	59,0	57,3	59,0	52,1
Enseñanza secundaria	36,8	36,1	37,4	36,3	39,9
Estudios universitarios	4,4	3,8	4,4	3,8	7,3
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	28,0	26,1	29,8	29,0	22,9
Parado no habiendo trabajado	7,2	6,5	7,8	6,9	8,4
Parado habiendo trabajado	42,6	48,5	38,1	42,6	42,5
Otras	22,3	18,8	24,4	21,5	26,2
Nacidos fuera de España (%)	9,6	7,7	10,6	9,4	10,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,8	12,5	1,7	6,4	8,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	10,1	6,9	13,1	9,7	11,9
Hospitales u otros servicios de salud	6,8	5,7	8,1	6,2	10,1
Servicios Sociales	3,1	2,4	3,8	2,4	7,0
Prisión, centros de menores	7,2	10,0	5,0	7,7	4,3
Servicios legales o policiales	10,2	6,7	13,8	11,1	5,8
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares y amigos	12,3	7,6	16,9	12,4	11,8
Iniciativa propia	40,7	46,0	34,0	41,4	37,0
Servicios de educación	0,5	0,2	0,7	0,4	0,8
Otra	2,3	1,8	2,6	2,2	2,7
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	12,9	15,6	10,4	12,9	12,9
Únicamente con pareja	10,6	11,1	9,9	9,7	15,4
Únicamente con hijos/as	3,2	3,2	3,0	2,3	8,2
Con la pareja e hijos/as	16,2	16,0	16,5	16,2	16,2
Con padres o familia de origen	42,1	35,6	47,7	43,6	33,8
Con amigos/as	3,0	3,2	2,7	2,9	3,4
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	6,0	7,8	4,8	6,5	3,6
En instituciones no detenido (ej. albergue)	1,8	2,1	1,6	1,8	2,1
Otros	4,3	5,4	3,3	4,2	4,4

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de hijos (media)	0,8	0,9	0,7	0,7	1,1
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	87,2	82,5	91,1	86,6	89,8
Prisión, centros de menores	6,1	8,1	4,7	6,7	3,0
Otras instituciones	2,1	2,6	1,7	2,1	2,4
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,8	0,2	0,5	0,5
Alojamiento inestable/precario	2,1	2,9	1,4	2,1	2,5
Otros lugares	2,0	3,0	1,0	2,1	1,9
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	25,7	42,2	11,5	25,6	25,8
Heroína	23,2	39,5	9,3	23,5	21,8
Metadona	1,0	1,1	0,8	0,9	1,2
Buprenorfina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Fentanilo	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3
Otros opioides	1,4	1,5	1,2	1,2	2,4
Cocaína	36,6	37,1	35,5	37,4	32,6
CLH Cocaína	35,2	35,9	33,9	36,0	31,1
Cocaína base	1,4	1,3	1,6	1,4	1,4
Cocaína Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estimulantes	2,0	1,5	2,4	1,9	2,4
Anfetaminas	1,3	1,2	1,5	1,3	1,8
Metanfetaminas	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
MDMA y derivados	0,3	0,1	0,6	0,3	0,3
Catinonas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros estimulantes	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Hipnosedantes	2,3	1,3	3,1	1,5	6,1
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Sustancias volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cannabis	33,1	17,7	47,0	33,3	32,5
Otras sustancias	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4
Edad de inicio droga principal (años)	23,0	23,0	22,0	22,5	25,2
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)					
Todos los días	46,9	43,5	50,3	46,4	49,5
4-6 días a la semana	7,4	6,2	8,1	7,6	6,2
2-3 días a la semana	13,8	11,7	15,2	14,0	12,6
1 día a la semana	5,1	4,6	5,5	5,2	4,9
Menos de 1 día a la semana	7,0	7,4	6,6	7,1	6,6
No consumió	19,8	26,7	14,3	19,7	20,2

2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Vía de administración droga principal (%)					
Oral	6,1	4,7	7,2	5,1	11,0
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	56,8	54,5	59,0	57,0	55,4
Intranasal o esnifada	32,8	33,4	32,1	33,4	29,6
Inyectada o parenteral	3,6	6,6	1,0	3,7	3,1
Otras	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	14,5	25,5	4,7	14,8	12,7
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	5,9	10,2	1,7	6,0	5,5
Prevalencia mínima** de VIH positivo					
Positivo	4,1	7,1	1,6	3,9	4,7
Prevalencia mínima** de hepatitis C positivo					
Positivo	8,1	15,4	2,1	8,1	8,1
Prevalencia mínima** de hepatitis B (portador crónico)					
Portador crónico	0,7	1,3	0,4	0,7	0,8

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2015.

	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.041	76,6
Han consumido alcohol y otras drogas	6.428	23,4
Una droga más	4.729	17,2
Dos drogas más	1.424	5,2
Tres o más drogas	275	1,0

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según existencia o no de tratamiento previo y según sexo. España, 2015.

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	27.469	11.254	13.457	21.294	6.128
Tratamiento previo agrupado (%)					
Sí (misma droga y/o otra)	45,5	100,0	0,0	45,7	45,1
No por esta sustancia	54,5	0,0	100,0	54,3	54,9
Edad media (años)	46,1	47,0	45,4	46,0	46,8
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	0,9	0,6	1,2	1,0	0,7
Enseñanza Primaria	52,0	51,9	52,8	54,3	44,0
Ha finalizado la Educación Secundaria Obligatoria	20,5	21,4	20,4	20,4	20,9
Ha finalizado Bachillerato o Ciclo Formativo Grado Medio	17,0	17,2	16,5	16,1	20,2
Ha finalizado Estudios Superiores	9,6	8,9	9,1	8,2	14,2
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	35,6	32,4	38,5	36,7	31,8
Parado no habiendo trabajado	2,6	2,6	2,7	2,4	3,2
Parado habiendo trabajado	40,9	43,0	39,8	40,9	40,8
Otras	20,9	22,1	19,0	19,9	24,1
Español o extranjero (%)					
Español	88,8	91,3	87,0	89,5	86,3
Extranjero	11,2	8,7	13,0	10,5	13,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,7	6,1	1,4	3,5	4,4
Médico general, Atención Primaria de Salud	26,2	20,4	32,6	26,2	25,9
Hospitales u otros servicios de salud	13,5	12,5	15,3	12,7	16,4
Servicios Sociales	5,3	5,2	5,6	4,7	7,3
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	2,0	2,1	1,9	2,4	0,5
Servicios legales o policiales	2,1	2,1	2,2	2,4	1,1
Empresas o empleador	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Familiares y amigos	12,2	10,6	14,2	12,7	10,7
Iniciativa propia	32,6	38,8	24,0	33,1	31,0
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otra	2,0	1,9	2,3	2,0	2,3
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	20,3	22,3	18,8	20,7	18,9
Únicamente con pareja	14,8	14,2	15,4	13,7	18,4
Únicamente con hijos/as	5,6	5,8	5,2	3,5	13,0
Con la pareja e hijos/as	25,8	23,1	28,4	26,3	24,0
Con padres o familia de origen	23,2	23,4	23,2	25,1	16,7
Con amigos/as	2,5	2,5	2,3	2,5	2,6
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	2,6	2,6	2,3	2,9	1,6
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,3	2,7	1,8	2,4	1,8
Otros	2,9	3,3	2,6	2,9	3,1

2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,5	90,1	93,2	90,5	94,9
Prisión, centro de reforma o de internamiento menores	1,7	1,8	1,8	2,0	0,6
Otras instituciones	2,2	2,7	1,6	2,3	1,6
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,8	0,4	0,7	0,4
Alojamiento inestable/precarios	2,3	2,6	1,8	2,5	1,4
Otros lugares	1,7	2,0	1,3	1,9	1,1
Edad de inicio droga principal (años)	18,9	17,9	18,7	18,0	22,2
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)					
Todos los días	58,9	56,4	59,9	60,0	55,0
4-6 días a la semana	6,4	6,0	6,9	6,0	7,6
2-3 días a la semana	11,5	10,1	12,8	11,1	12,8
1 día a la semana	4,3	4,2	4,7	4,2	4,6
Menos de 1 día a la semana	5,2	5,6	4,9	5,0	5,7
No consumió	13,8	17,7	10,8	13,6	14,2
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)					
No	96,0	95,0	96,9	95,7	97,0
Sí	4,0	5,0	3,1	4,3	3,0
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)					
No	99,2	99,0	99,6	99,2	99,4
Sí	0,8	1,0	0,4	0,8	0,6
Prevalencia de VIH entre todos**					
Positivo	1,1	1,2	1,0	1,1	0,9
Negativo	32,3	39,8	28,1	31,8	34,1
Desconocido o pendiente de resultado	66,6	59,0	71,0	67,1	64,9
Prevalencia de hepatitis C entre todos**					
Positivo	3,0	4,0	2,3	3,1	2,8
Negativo	29,8	36,5	26,9	29,4	31,3
Desconocido o pendiente de resultado	67,1	59,5	70,8	67,5	65,9
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico)**					
Desconocido, no realizado test u otros resultados	99,5	99,2	99,6	99,4	99,5
Portador crónico	0,5	0,8	0,4	0,6	0,5

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2015.

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Tratamiento previo agrupado (%)								
Sí (misma droga y/o otra)	75,1	77,8	51,9	48,8	46,2	46,5	38,9	33,8
No por esta sustancia	24,9	22,2	48,1	51,2	53,8	53,5	61,1	66,2
Sexo (%)								
Hombre	83,8	84,9	80,5	70,3	85,7	85,8	83,7	79,8
Mujer	16,2	15,1	19,5	29,7	14,3	14,2	16,3	20,2
Edad (años)	41,5	41,3	43,1	42,9	35,9	35,9	37,2	33,2
Máximo nivel de estudios completados (%)								
Sin estudios	1,7	1,8	1,6	0,6	0,7	0,7	1,4	0,0
Primaria	64,3	65,1	63,7	51,6	54,3	53,5	72,9	46,7
Secundaria	30,6	30,0	32,6	39,4	39,8	40,5	22,3	44,0
Ha finalizado estudios superiores	3,4	3,2	2,1	8,4	5,2	5,3	3,4	9,2
Situación laboral (%)								
Trabajando	17,4	17,2	16,1	21,9	40,6	41,6	17,1	33,3
Parado no trabajando	7,5	7,7	8,0	4,7	4,0	3,9	7,0	5,3
Parado habiendo trabajado	53,6	54,5	53,2	41,3	43,3	42,6	59,4	42,7
Otras situaciones	21,4	20,6	22,7	32,2	12,1	11,9	16,5	18,7
Español o extranjero (%)								
Español	89,5	89,5	90,7	88,9	91,7	91,7	92,2	91,0
Extranjero	10,5	10,5	9,3	11,1	8,3	8,3	7,8	9,0
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)								
Otros servicios tratamiento drogodependencias	15,3	15,0	26,4	13,4	5,5	5,6	3,3	5,6
Médico general, Atención Primaria de Salud	5,3	4,7	5,2	14,7	11,4	11,6	7,0	14,2
Hospitales u otros servicios de salud	4,2	3,3	4,3	17,3	6,3	6,4	5,3	12,7
Servicios Sociales	1,6	1,6	1,1	1,6	2,2	2,2	2,7	3,1
Prisión, centro reforma o internamiento menores	11,5	11,9	10,1	5,8	6,6	6,4	9,7	3,9
Servicios legales o policiales	2,8	2,9	0,7	2,9	6,3	6,5	3,6	16,3
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4
Familiares y amigos	6,1	6,3	4,3	4,1	14,1	14,1	12,9	12,9
Iniciativa propia	51,1	52,2	46,6	37,6	45,7	45,4	52,9	28,3
Servicios de educación	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Otra	2,0	2,0	1,4	2,3	1,6	1,6	2,1	2,4
Número de hijos (media)	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	1,2	0,5

2.1.30. (continuación)

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Casas, pisos, apartamentos	77,8	77,1	79,6	87,4	89,4	89,8	78,2	88,5
Prisión, centro reforma o internamiento menores	9,3	9,6	9,2	5,2	6,2	5,9	14,7	4,0
Otras instituciones	2,9	2,9	1,4	2,4	1,3	1,2	2,7	2,7
Pensiones, hoteles, hostales	0,9	0,9	2,1	0,7	0,4	0,4	0,3	0,2
Alojamiento inestable/precario	4,8	4,9	4,3	3,2	1,2	1,2	1,7	2,2
Otros lugares	4,2	4,5	3,4	1,1	1,5	1,5	2,4	2,4
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Solo/a	18,4	18,2	21,5	19,2	13,0	13,1	11,8	15,4
Únicamente con pareja	12,2	11,9	13,4	15,4	12,8	12,9	11,0	9,0
Únicamente con hijos/as	2,9	2,7	3,7	4,9	3,6	3,7	2,0	2,7
Con la pareja e hijos/as	14,5	14,0	18,2	20,4	22,8	23,0	18,2	11,5
Con padres o familia de origen	30,2	30,5	26,1	26,8	34,8	34,8	33,9	46,8
Con amigos/as	4,3	4,4	3,9	4,3	2,2	2,3	1,7	4,4
Detenido (centro penitenciario o inserción social)	9,0	9,3	9,2	4,3	6,1	5,8	14,0	4,3
En instituciones no detenido (albergue)	2,3	2,4	1,6	1,6	1,1	1,1	2,3	2,0
Otros. Especificar	6,2	6,5	2,3	3,1	3,5	3,4	5,2	4,0
Edad de inicio droga principal (años)	22,1	21,5	29,6	28,3	20,7	20,7	21,1	21,5
Vía de administración droga principal (%)								
Oral	6,3	0,7	93,5	33,7	2,7	2,8	0,2	33,6
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	73,0	78,3	4,0	36,6	14,6	11,5	90,2	5,0
Intranasal o esnifada	6,6	6,6	1,1	9,8	81,0	84,0	8,2	59,3
Inyectada o parenteral	12,7	13,1	1,1	13,7	1,0	1,0	0,5	1,7
Otras	1,5	1,2	0,2	6,2	0,7	0,7	1,1	0,4
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)								
Todos los días	56,0	53,9	90,6	66,1	21,6	20,8	41,0	25,6
4-6 días a la semana	4,6	4,7	3,2	3,9	11,0	11,1	9,0	9,1
2-3 días a la semana	5,9	6,2	1,4	4,8	24,4	24,6	17,3	21,8
1 día a la semana	2,1	2,2	0,5	2,1	9,6	9,8	5,3	9,2
Menos de 1 día a la semana	3,6	3,8	0,9	1,5	12,5	12,7	8,6	12,7
No consumió	27,9	29,3	3,4	21,5	20,9	21,0	18,8	21,5
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Opioides	10,9	10,4	25,1	11,2	6,6	5,8	22,7	2,1
Heroína	1,0	0,0	23,7	6,4	6,0	5,4	20,0	1,7
Metadona	9,0	9,5	0,0	4,4	0,4	0,2	3,2	0,0
Otros opioides	1,0	0,9	1,8	0,4	0,2	0,4	0,9	0,6
Cocaína	44,1	45,2	20,5	38,8	0,5	0,2	5,6	30,9
CLH Cocaína	38,6	39,6	15,1	34,4	0,3	0,0	5,6	30,7
Cocaína base	5,7	5,8	5,5	4,4	0,2	0,2	0,0	0,4

2.1.30. (continuación)

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	CLH Cocaína	Cocaína base	Estimulantes*
Total	12.146	10.978	452	716	17.327	16.659	663	924
Estimulantes	1,8	1,8	1,8	2,0	5,5	5,6	2,6	8,3
Hipnosedantes	15,7	15,7	13,2	15,2	6,4	5,9	17,2	3,0
Alucinógenos	0,4	0,4	0,0	1,2	0,9	0,9	0,2	3,6
Sustancias volátiles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2
Cannabis	52,2	52,4	51,6	46,4	48,6	47,9	63,1	60,6
Alcohol	36,0	36,0	38,8	35,6	71,2	72,1	53,6	49,3
Otras sustancias psicoactivas	0,5	0,4	1,8	0,8	0,5	0,5	0,0	1,1
Inyección alguna vez en la vida (%)	45,6	46,2	44,5	35,8	5,5	5,1	13,8	6,5
Inyección últimos 12 meses (%)	19,2	19,7	7,8	18,6	2,3	2,3	2,5	3,1
Inyección últimos 30 días (%)	16,7	17,2	3,8	17,6	1,9	1,9	1,3	2,6
Prevalencia de VIH entre todos (%)								
Positivo	11,4	11,4	13,3	9,5	1,9	1,9	3,3	2,9
Negativo	48,4	49,5	38,5	38,4	39,1	39,1	39,5	30,7
Desconocido o pendiente de resultado	40,2	39,1	48,2	52,1	58,9	59,0	57,2	66,3
Prevalencia de VIH entre los que conocen resultado (%)								
Positivo	19,0	18,8	25,6	19,8	4,7	4,6	7,7	8,7
Prevalencia de hepatitis C entre todos (%)								
Positivo	25,0	25,6	22,8	17,6	2,9	2,8	6,3	3,0
Negativo	32,4	32,8	28,3	28,1	35,9	35,9	35,9	26,2
Desconocido o pendiente de resultado	42,6	41,6	48,9	54,3	61,2	61,3	57,8	70,8
Prevalencia de hepatitis C entre los que conocen resultados (%)								
Positivo	43,6	43,8	44,6	38,5	7,5	7,2	15,0	10,4
Situación hepatitis B (%)								
Nunca se ha realizado el test	6,8	6,7	6,6	7,5	13,4	13,3	14,5	20,5
Inmune: vacunado o hepatitis B pasada**	15,3	15,8	11,9	10,3	10,5	10,5	10,3	11,7
No inmune	11,3	11,5	7,3	11,2	11,9	11,9	10,9	7,6
Portador crónico (HBs Ag positivo)	1,9	1,9	1,5	1,7	0,4	0,4	0,9	0,3
Desconocido	64,7	64,0	72,6	69,3	64,0	64,0	63,5	60,0
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico) (%)								
Desconocido, no realizado test u otros resultados	98,1	98,1	98,5	98,3	99,6	99,6	99,1	99,7
Portador crónico	1,9	1,9	1,5	1,7	0,4	0,4	0,9	0,3

* Estimulantes: otros estimulantes diferentes de la cocaína.

** Inmune: vacunado (AC Anti HbS) o hepatitis B pasada (AC Anti HbC).

El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Tratamiento previo agrupado (%)								
Sí (misma droga y/o otra)	39,6	12,7	25,7	27,3	28,6	26,7	23,6	45,5
No por esta sustancia	60,4	87,3	74,3	72,7	71,4	73,3	76,4	54,5
Sexo (%)								
Hombre	78,3	83,2	56,3	57,7	80,5	88,9	84,2	77,7
Mujer	21,7	16,8	43,7	42,3	19,5	11,1	15,8	22,3
Edad (años)	33,7	28,8	41,8	41,2	31,7	27,4	26,7	46,1
Máximo nivel de estudios completados (%)								
Sin estudios	0,0	0,0	1,4	1,2	0,0	11,1	0,5	0,9
Primaria	48,4	44,1	56,1	55,5	45,2	77,8	57,9	52,0
Secundaria	43,1	48,0	33,3	34,2	49,3	11,1	38,1	37,5
Ha finalizado estudios superiores	8,6	7,9	9,3	9,1	5,5	0,0	3,5	9,6
Situación laboral (%)								
Trabajando	32,3	33,1	24,1	24,6	28,4	0,0	22,2	35,6
Parado no trabajando	5,1	9,1	9,0	8,4	9,5	16,7	10,3	2,6
Parado habiendo trabajado	46,5	33,8	43,7	44,5	33,8	44,4	33,3	40,9
Otras situaciones	16,1	24,0	23,3	22,6	28,4	38,9	34,2	20,9
Español o extranjero (%)								
Español	92,3	92,1	92,9	92,7	95,8	38,9	89,5	88,8
Extranjero	7,7	7,9	7,1	7,3	4,2	61,1	10,5	11,2
Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%)								
Otros servicios tratamiento drogodependencias	5,8	2,6	3,6	4,1	2,6	6,3	2,0	3,7
Médico general, Atención Primaria de Salud	15,4	7,2	24,5	21,2	15,6	12,5	10,9	26,2
Hospitales u otros servicios de salud	13,6	5,9	16,8	18,0	11,7	6,3	8,2	13,5
Servicios Sociales	3,2	0,7	2,2	2,3	1,3	0,0	5,3	5,3
Prisión, centro reforma o internamiento menores	3,9	6,5	4,7	5,2	9,1	18,8	5,0	2,0
Servicios legales o policiales	13,3	35,9	2,9	3,2	7,8	0,0	20,3	2,1
Empresas o empleador	0,5	0,7	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3
Familiares y amigos	13,3	13,1	8,9	9,3	9,1	18,8	15,3	12,2
Iniciativa propia	28,6	24,2	33,8	34,0	39,0	25,0	28,6	32,6
Servicios de educación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,2	0,1
Otra	2,4	3,3	2,3	2,5	3,9	6,3	3,1	2,0
Número de hijos (media)	0,5	0,3	1,2	1,2	0,5	0,3	0,4	1,3

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Casas, pisos, apartamentos	88,1	87,7	89,0	88,1	84,9	50,0	91,7	91,5
Prisión, centro reforma o internamiento menores	3,2	9,0	5,1	5,6	6,8	11,1	3,6	1,7
Otras instituciones	2,9	1,3	1,6	1,7	0,0	22,2	2,5	2,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,3	0,0	0,2	0,2	2,7	0,0	0,3	0,6
Alojamiento inestable/precario	2,5	0,6	3,2	3,3	1,4	5,6	1,0	2,3
Otros lugares	3,0	1,3	1,0	1,1	4,1	11,1	1,0	1,7
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Solo/a	17,3	9,0	15,7	16,0	13,5	5,6	8,2	20,3
Únicamente con pareja	9,5	8,4	13,1	13,1	9,5	5,6	6,9	14,8
Únicamente con hijos/as	2,9	0,6	8,1	7,6	5,4	0,0	2,7	5,6
Con la pareja e hijos/as	11,9	7,1	22,4	21,6	6,8	16,7	10,1	25,8
Con padres o familia de origen	44,2	55,5	28,9	29,4	43,2	27,8	59,6	23,2
Con amigos/as	4,6	4,5	2,2	1,8	5,4	0,0	2,7	2,5
Detenido (centro penitenciario o inserción social)	3,5	7,7	5,5	6,1	6,8	16,7	3,7	2,6
En instituciones no detenido (albergue)	1,8	2,6	1,2	1,3	1,4	16,7	2,2	2,3
Otros. Especificar	4,3	4,5	2,9	3,0	8,1	11,1	3,7	2,9
Edad de inicio droga principal (años)	20,7	21,3	28,7	28,3	22,1	16,6	15,6	18,9
Vía de administración droga principal (%)								
Oral	20,5	84,8	98,3	98,5	42,1	12,5	1,5	99,6
Pulmonar o fumada (en chinos, papel de plata)	2,9	1,3	1,0	0,9	5,3	18,8	97,7	0,2
Intranasal o esnifada	75,4	11,3	0,3	0,2	50,0	37,5	0,4	0,1
Inyectada o parenteral	0,8	1,3	0,3	0,2	1,3	0,0	0,1	0,0
Otras	0,3	1,3	0,2	0,2	1,3	31,3	0,3	0,1
Frecuencia de consumo de la droga principal (%)								
Todos los días	26,4	13,9	84,8	85,3	32,4	38,5	66,6	58,9
4-6 días a la semana	10,8	3,3	2,2	1,9	11,8	7,7	5,7	6,4
2-3 días a la semana	22,3	18,5	3,1	2,7	20,6	7,7	8,4	11,5
1 día a la semana	9,2	9,9	1,1	1,2	10,3	15,4	2,5	4,3
Menos de 1 día a la semana	12,5	19,2	1,4	1,2	7,4	23,1	3,6	5,2
No consumió	18,9	35,1	7,5	7,7	17,6	7,7	13,2	13,8
Otras sustancias consumidas los últimos 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)								
Opioides	2,4	2,2	8,8	9,4	0,0	14,3	2,4	5,3
Heroína	2,1	1,1	6,1	7,0	0,0	14,3	2,0	4,6
Metadona	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,1	0,4
Otros opioides	0,5	1,1	2,0	1,7	0,0	0,0	0,2	0,5
Cocaína	32,1	26,9	27,4	26,8	41,7	28,6	32,3	60,3
CLH Cocaína	31,8	26,9	26,6	26,2	41,7	28,6	31,8	59,4
Cocaína base	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,6	1,0

2.1.30. (continuación)

	Anfetaminas	MDMA y der.	Hipnosedantes	Benzodiacepinas	Alucinógenos	Sust. volátiles	Cannabis	Alcohol
Total	636	157	1.068	929	77	18	15.676	27.469
Estimulantes	8,0	8,6	5,4	5,6	25,0	42,9	9,7	4,4
Hipnosedantes	2,7	5,4	0,3	0,3	0,0	28,6	4,9	8,2
Alucinógenos	3,4	4,3	0,5	0,0	2,1	0,0	1,4	0,5
Sustancias volátiles	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
Cannabis	61,5	64,5	53,5	55,8	58,3	57,1	0,0	51,4
Alcohol	50,1	47,3	50,1	49,7	41,7	57,1	77,8	0,0
Otras sustancias psicoactivas	1,1	2,2	0,8	0,6	2,1	0,0	0,4	0,4
Inyección alguna vez en la vida (%)	6,5	4,1	6,3	7,1	6,8	7,1	2,1	4,0
Inyección últimos 12 meses (%)	2,7	1,4	1,0	0,9	1,7	0,0	0,4	0,8
Inyección últimos 30 días (%)	2,0	1,4	0,8	0,8	1,7	0,0	0,3	0,6
Prevalencia de VIH entre todos (%)								
Positivo	2,2	3,8	3,7	3,7	6,5	5,6	0,9	1,1
Negativo	33,0	23,6	35,1	36,7	29,9	33,3	24,0	32,3
Desconocido o pendiente de resultado	64,8	72,6	61,1	59,6	63,6	61,1	75,2	66,6
Prevalencia de VIH entre los que conocen resultado (%)								
Positivo	6,3	14,0	9,6	9,1	17,9	14,3	3,4	3,2
Prevalencia de hepatitis C entre todos (%)								
Positivo	2,8	3,2	5,3	5,5	1,3	5,6	1,3	3,0
Negativo	27,2	22,3	32,0	33,6	32,5	33,3	22,6	29,8
Desconocido o pendiente de resultado	70,0	74,5	62,6	60,9	66,2	61,1	76,2	67,1
Prevalencia de hepatitis C entre los que conocen resultados (%)								
Positivo	9,4	12,5	14,3	14,0	3,8	14,3	5,3	9,2
Situación hepatitis B (%)								
Nunca se ha realizado el test	18,1	33,8	16,6	15,8	11,7	16,7	22,7	13,7
Inmune: vacunado o hepatitis B pasada**	11,2	14,0	9,5	10,0	11,7	0,0	8,7	8,2
No inmune	8,2	7,0	13,9	14,4	10,4	22,2	7,5	11,1
Portador crónico (HBs Ag positivo)	0,3	0,0	0,7	0,5	1,3	11,1	0,2	0,5
Desconocido	62,3	45,2	59,5	59,2	64,9	50,0	60,9	66,3
Prevalencia VHB entre todos (portador crónico) (%)								
Desconocido, no realizado test u otros resultados	99,7	100,0	99,3	99,5	98,7	88,9	99,8	99,5
Portador crónico	0,3	0,0	0,7	0,5	1,3	11,1	0,2	0,5

* Estimulantes: otros estimulantes diferentes de la cocaína.

** Inmune: vacunado (AC Anti HbS) o hepatitis B pasada (AC Anti HbC).

El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.31.

Prevalencia y conocimiento del estado serológico sobre infección por VIH, hepatitis B (VHB) y hepatitis C (VHC) entre los inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas (nº absolutos y %). España, 2015.


	VIH		Hepatitis B		Hepatitis C	
	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
TOTAL						
Total inyectores (nº)	5.904	2.413	5.904	2.413	5.904	2.413
Prevalencia de infección (%)	31,5	33,7	10,5	12,2	66,5	68,9
Conocen estado serológico (%)	72,6	70,9	37,7	33,0	71,3	70,5
SEXO						
Hombres inyectores (nº)	5.083	2.057	5.083	2.057	5.083	2.057
Prevalencia de infección (%)	30,7	33,4	10,1	12,4	65,9	68,8
Conocen estado serológico (%)	72,4	71,4	37,9	33,3	71,4	71,3
Mujeres inyectoras (nº)	813	354	813	354	813	354
Prevalencia de infección (%)	35,8	35,4	13,1	11,2	70,5	70,1
Conocen estado serológico (%)	73,8	67,8	36,5	30,8	71,2	66,1
EDAD						
Inyectores < 34 años (nº)	880	547	880	547	880	547
Prevalencia de infección (%)	10,9	12,1	41,7	44,1	1,3	2,1
Conocen estado serológico (%)	58,4	56,1	58,5	56,9	33,0	30,7
Inyectores ≥ 35 años (nº)	5.024	1.866	5.024	1.866	5.024	1.866
Prevalencia de infección (%)	34,3	38,4	70,0	74,5	11,7	14,7
Conocen estado serológico (%)	75,1	75,2	73,6	74,5	38,6	33,7
CONSUMO DE OPIÁCEOS						
Inyectores consumidores de opiáceos (nº)	4.934	2.126	4.934	2.126	4.934	2.126
Prevalencia de infección (%)	31,6	33,8	68,4	66,2	10,7	12,9
Conocen estado serológico (%)	73,6	72,0	72,1	71,6	37,7	33,2
Inyectores no consumidores de opiáceos (nº)	970	287	970	287	970	287
Prevalencia de infección (%)	30,8	32,4	56,6	57,8	9,2	6,6
Conocen estado serológico (%)	67,6	62,4	67,7	62,7	38,1	31,4

Prevalencias calculadas sobre los casos que conocen el estado serológico.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.32.

Prevalencia de infección y conocimiento de estado serológico sobre VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada alguna vez en la vida o último año (%). España, 2005-2015.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% inyectores (alguna vez en la vida) que conocen estado serológico (VIH)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4	76,4	72,6
% inyectores (último año previo a admisión) que conocen estado serológico (VIH)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6	72,8	70,9
Prevalencia (%) de VIH en inyectores alguna vez en la vida	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9	31,5
Prevalencia (%) de VIH en inyectores último año previo a admisión	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0	33,7

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.33.

Evolución del número de inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (nº absolutos y %). España, 2005-2015.


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237	1.387	2.413
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646	1.010	1.710
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4	26,0	33,7
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026	5.224	5.904
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439	3.992	4.287
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6	30,9	31,5

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2015

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España*, 1996-2015.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9	43,7	43,4
Alcohol**	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7	38,7	39,7
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6	35,5	42,1
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8	18,5	18,0
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9	10,3	11,2
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0	8,6	8,0
Otros opioides	13,5	17,4	16,8	18,9	18,0	17,4	13,1	9,1	8,3	8,5	8,1	7,5	7,6	6,7	6,2	6,1	5,7	7,6	7,4
MDMA y derivados	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8	4,5	3,7
Otras sustancias	4,1	3,2	4,9	1,3	0,8	1,6	1,8	8,7	3,3	4,9	6,0	1,8	1,2	1,8	2,2	3,3	2,5	2,6	2,1
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6	2,5	1,6
Inhalables volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España*, 1996-2015.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol**	Cannabis	Hipnóticos y sedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	MDMA y derivados	Alucinógenos	Sustancias volátiles
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4
2014	6.441	43,7	38,7	35,5	18,5	10,3	8,6	7,6	4,5	2,5	0,3
2015	5.238	43,5	39,8	42,2	18,2	11,2	8,0	7,4	3,7	1,6	0,3

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2015.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número de episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715	6.441	5.238
Edad media (años)	27,8	28,1	29,1	29,4	30,3	29,8	29,8	31,0	30,7	31,6	32,0	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	33,2	34,1
Sexo (%) mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1	24,5	22,6
Detenidos (%)	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8	4,3	2,7
Resolución de la urgencia (%)																			
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8	69,8	72,2
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4	9,9	8,2
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8	15,9	16,0
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9	4,2	3,6

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España*, 2015.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.238	4.042	1.182	2.170	1.987	2.105	901	560	401	371	183	81	16
Edad media (años)	34,1	34,5	32,7	35,2	35,0	31,0	36,1	38,6	31,4	39,3	27,9	28,6	27,9
Sexo (%) mujeres	22,6	-	-	21,2	20,3	20,8	26,8	16,9	24,4	28,7	25,3	12,3	31,3
Detenidos (%)	2,7	3,2	1,2	2,4	2	2,5	3,2	6,3	2,3	4,0	2,2	2,5	12,5
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	72,2	71,9	73,4	71,6	73,2	70,9	69,4	70,8	74,0	70,2	67,6	71,9	81,8
Alta voluntaria	8,2	8,0	8,6	8,9	9,2	5,6	8,3	9,2	6,7	9,6	15,2	12,3	9,1
Ingreso hospitalario	16,0	16,6	13,7	15,7	13,8	19,8	17,4	17,6	15,2	17,1	12,4	12,3	9,1
Muerte en urgencias	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	3,6	3,3	4,3	3,8	3,8	3,6	4,9	2,3	4,1	3,1	4,8	3,5	0,0

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España*, 2015.


	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	MDMA y der.	Alucinógenos
Oral	2,0	4,3	99,3	1,5	68,2	85,0	92,1	76,1
Pulmonar o fumada	18,4	95,5	0,2	26,0	7,1	3,2	3,2	13,0
Intranasal o esnifada	71,6	0,2	0,2	5,3	24,7	2,4	4,8	2,2
Parenteral o inyectada	10,0	0,0	0,2	68,5	0,0	7,3	0,0	8,7
Otra vía	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2015.



	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	43,4	44,2	40,9
Alcohol**	39,7	40,9	35,8
Cannabis	42,1	43,0	38,9
Hipnosedantes	18,0	17,0	21,5
Heroína	11,2	12,0	8,4
Anfetaminas	8,0	7,8	8,7
Otros opioides	7,4	6,8	9,4
MDMA y derivados	3,7	3,5	4,1
Otras sustancias	2,1	1,7	3,7
Alucinógenos	1,6	1,8	0,9
Inhalables volátiles	0,3	0,3	0,4

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.


** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2015. Mortalidad relacionada con drogas

2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2015.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Estimación nacional ¹	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051	1.310	1.127	1.049	
Seis ciudades españolas ²	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395	421	339	306	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Estimación nacional ¹	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	767	936
Seis ciudades españolas ²	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171
CCAA que notifican ³	–	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	408	519	489	556	600

1. Datos elaborados por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto de Estadística.

2. Selección de seis ciudades correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

3. Comunidades Autónomas que declaran al Indicador mortalidad (50% de la población de España).

Hasta 1995, sólo se recogían las muertes por reacción aguda a opioides o cocaína.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

2.3.2.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2015.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600
Casos con información toxicológica	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518
Sexo (%)													
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7	44,3	43,6
Grupo de edad (años)													
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5
≥45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7
Estado civil(%)													
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1	3,1	0,9
Procedencia del cadáver (%)													
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6	5,1	4,7
Evidencias de consumo reciente (%)													
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1
Evidencia de suicidio (%)													
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6
Signos recientes venopunción (%)													
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)													
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0
Anticuerpos anti-VIH (%)													
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

** El número de fallecidos incluye 45 casos de Galicia de los que no se disponía de información desagregada por sustancias.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1983-2015.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Opioides	98,0	98,8	93,9	100,0	92,4	96,6	94,8	96,0	93,1	94,9	92,8	92,9	93,4	90,4	89,8	90,1	
Cocaína	2,0	12,5	11,0	11,5	19,3	18,4	29,6	24,8	21,6	26,0	30,9	28,8	24,7	32,7	41,4	51,2	
Hipnosedantes	13,7	22,5	41,5	46,0	33,8	40,2	43,8	47,4	37,2	37,9	37,4	48,4	54,8	47,7	58,6	47,4	
Anfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,8	3,2	4,3	4,9	4,0	8,6	2,8	
Cannabis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,2	11,3	
MDMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	0,0	
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	28,6	26,2	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opioides	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7
Cocaína	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8
Hipnosedantes	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0
Anfetaminas	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4
Cannabis	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4
MDMA	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3
Alcohol	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33,0	34,3	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

** El alcohol solo se registra cuando aparece con otras sustancias.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.4.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos identificado mediante análisis toxicológico. España*, 2004-2015.


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opioides	349	356	337	346	329	341	409	318	366	336	333	335
Cocaína	280	315	257	318	255	252	296	213	280	235	269	253
Hipnosedantes	227	246	217	223	191	180	302	265	302	273	342	352
Anfetaminas	12	12	15	17	9	15	8	19	18	27	41	23
Cannabis	78	95	72	69	66	97	123	100	107	94	86	121
MDMA	9	2	7	5	6	5	4	7	8	5	18	12
Alcohol	167	150	147	132	110	123	149	136	138	136	212	206
Nº de defunciones con información toxicológica	466	455	428	475	424	427	517	408**	478	437	520	518
Número total de fallecidos	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.5.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opiode —aunque haya otras sustancias—). España*, 2005-2015.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sólo metadona	0,6	2,8	4,2	2,4	2,6	2,7	2,2	1,1	2,1	1,5	0,6
Metadona	36,5	39,8	37,5	30,0	32,4	47,4	49,7	52,2	47,8	36,9	32,4
Metadona y no otro opiode	15,1	27,4	24,4	20,6	21,9	30,7	34,6	40,2	34,8	20,0	16,4

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.6.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (sólo cocaína, cocaína y no opioides, cocaína y alcohol). España*, 1985-2015.



	1985	1987	1989	1991	1992	1993	1994	1996	1997	1999	2000	2002
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	2,1	1,7	1,8	1	0,6	3,3	2,8	3,9	5,5	8,8	6,1	11,3
Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia)	0,7	0,9	1,3	0	0,4	1,2	0,6	2,3	2,4	4,1	2,9	2,6
Sólo cocaína y alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye solo cocaína)	16,4	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0
Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia)	7,5	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4
Sólo cocaína y alcohol	-	4,1	3,5	2,9	4	4,7	2,1	4,6	3,8	3,2	3,5	5,4


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

Nota: En el gráfico se muestran los datos correspondientes a aquellos años que permiten obtener una visión general de las tendencias. La serie completa de datos se encuentra disponible en el Informe OED 2011 (<http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/observa/home.htm>) o Spanish National Report 2012 (<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index214091EN.html>)

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Especifico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.7.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2015.




* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Especifico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.8.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta opioides (sólo opioides, opioides y no cocaína, opioides y cocaína). España*, 1984-2015.



	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	49,6	49,7	49,2	47,0	42,4	35,2	46,6	31,3	35,4	44,0	55,8	59,8	55,1	45,4	41,7	31,5
Sólo opioides (ninguna otra sustancia)	28,1	25,2	20,2	23,9	20,8	14,1	20,6	11,5	14,2	18,1	13,1	9,0	17,7	12,6	10,8	7,6
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides)	40,3	41,7	40,5	30,8	29,7	29,7	36,8	30,7	34,3	37,8	39,8	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8
Sólo opioides (ninguna otra sustancia)	9,2	8,7	7,1	5,9	6,4	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7
Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye solo opioides y cocaína)						48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

Nota: En el gráfico se muestran los datos correspondientes a aquellos años que permiten obtener una visión general de las tendencias. La serie completa de datos se encuentra disponible en el Informe OED 2011 (<http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/observa/home.htm>) o Spanish National Report 2012 (<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index214091EN.html>)

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.9.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta opioides en función de otras sustancias detectadas. España*, 2015.



* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.10.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide — independientemente de otras sustancias— y sólo metadona y benzodiazepinas). España*, 1996-2015.


	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	–	–	–
1997	0,9	–	–	–
1998	0,9	–	–	–
1999	0,4	–	–	–
2000	1,2	–	–	–
2001	2,7	–	–	–
2002	1,8	–	–	–
2003	0,6	–	–	–
2004	0,4	–	–	–
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6
2014	1,5	36,9	20,0	2,1
2015	0,6	32,4	16,4	1,9

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Casos con información en sustancias detectadas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.11.

Evolución del número de muertes por consumo de sustancias psicoactivas, según sexo. España, 1999-2015.




	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hombres	657	610	558	564	552	568	539	417	462	470	366	330	291	324	333	376	321
Mujeres	95	81	92	88	81	91	97	72	57	70	76	63	70	59	70	79	69
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390
Estimación	972	1012	923	1079	900	796	1004	820	703	773	739	706	736	707	727	767	936

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto de Estadística.

2.3.12.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2015.



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
< 35 años	505	429	391	349	310	285	262	200	192	193	141	108	101	104	93	76	80
≥ 35 años	247	262	259	303	323	374	374	289	327	347	301	285	260	279	310	379	310
Total	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

<http://www.msssi.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.msssi.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

<http://www.minhap.gob.es/>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/webInicio.tmpl>

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

<http://www.mineco.gob.es/>

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

http://www.who.int/substance_abuse/en/

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/incb/en/about.html>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

REDUCING ALCOHOL RELATED HARMS (RARHA)

<http://www.rarha.eu/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO
EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm>