

ESTADÍSTICAS 2019

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

**INDICADOR MORTALIDAD
POR REACCIÓN AGUDA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,
1983-2017**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).
Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Fernando MÉNDEZ. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS
Rosario BALLESTA
Izaskun BILBAO
Pedro Manuel SEJO
Mercedes SUÁREZ

Aragón

Carmen BARANGUAN
Francisco Javier FALO
Laura JOSÉ

Asturias

Rafael COFIÑO
José Antonio GONZÁLEZ
José Ramón HEVIA

Baleares

Francisca BIBILONI
Rut SUÁREZ
Juana María VANRELL

Canarias

Nicolás AMADOR
Marcos GASPAR
Concepción María GIL
Luz Marina MORENO

Cantabria

Mª Carmen DIEGO
Ángela HIGUERA
Paloma NAVAS
Antonia RUEDA

Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO
Juan José CAMACHO
Carmen DE PEDRO

Castilla y León

Susana REDONDO
Ana SÁNCHEZ
Esperanza VÁZQUEZ

Cataluña

Mª Teresa BRUGAL
Joan COLOM
Xavier MAJO
Regina MUÑOZ

Extremadura

Mercedes CORTÉS
Mª Pilar MORCILLO

Galicia

Sara CERDEIRA
Jaime FRAGA
María TAJES
Sergio VEIGA
Raquel ZUBIZARRETA

Madrid

Carmen Yolanda FUENTES
Mª Angeles GUTIÉRREZ
Ana RUIZ

Murcia

Mónica BALLESTA
Mª Dolores CHIRLAQUE
Juan Francisco CORREA
Purificación ROS
José Carlos VICENTE

Navarra

Raquel GONZÁLEZ
Miguel MARTÍNEZ
Mª Ángeles NUIÑ

País Vasco

Elena ALDASORO
Juan José AURREKOETXEA
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ
Enrique RAMALLE

Comunidad Valenciana

Inmaculada CLEMENTE
Ofelia JIMENO
Mª Jesús MATEU
Francisco VERDÚ

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA
Cleopatra R'KAINA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid
Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08
Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es
Internet: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 731-19-091-2

ÍNDICE

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2017

5

- 2.3.1. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2017 5
- 2.3.2. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2017 6

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

- 2.3.3. Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2017 7
- 2.3.4. Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2017 8
- 2.3.5. Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2004-2017 9
- 2.3.6. Número de fallecidos en los que se detecta la metadona (independientemente de otras sustancias), metadona y no otro opioide y metadona sola. España, 2005-2017. 9
- 2.3.7. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2017 10
- 2.3.8. Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2017 10
- 2.3.9. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España, 1984-2017 11
- 2.3.10. Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España, 2017 11
- 2.3.11. Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España, 1996-2017 12
- 2.3.12. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2017 13
- 2.3.13. Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2017 13


2.3.14. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España, 2015-2017	14
2.3.15. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España, 2015-2017	14
2.3.16. Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2017	15
2.3.17. Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas. España, 2005-2017	15
2.3.18. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2017	16
2.3.19. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2017	17

Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2017.

Mortalidad relacionada con drogas

2.3.1.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2017.



2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas.
España, 1983-2017.

	Estimación nacional	Reg. Específico Mortalidad (6 ciudades)		Estimación nacional	Reg. Específico Mortalidad (CCAA)	Reg. Específico Mortalidad (6 ciudades)	Registro General de Mortalidad
1983	266	82	1999	972	–	291	752
1984	440	139	2000	1.012	444	284	691
1985	453	143	2001	923	496	268	650
1986	516	163	2002	1.079	496	229	652
1987	741	234	2003	900	493	270	633
1988	1.067	337	2004	796	468	212	659
1989	1.440	455	2005	1.004	455	242	636
1990	1.440	455	2006	820	428	218	489
1991	1.833	579	2007	703	475	188	519
1992	1.760	558	2008	773	424	139	540
1993	1.399	444	2009	739	438	181	442
1994	1.067	388	2010	706	517	182	393
1995	1.051	395	2011	736	408	181	361
1996	1.310	421	2012	707	519	195	383
1997	1.127	339	2013	727	489	196	403
1998	1.049	306	2014	767	556	172	455
			2015	936	600	171	390
			2016	866	613	194	483
			2017	782	696	189	437

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2017.


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	556	600	613	696
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632
Sexo (%)															
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7	80,9	80,6	83,4	78,1
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3	19,1	19,4	16,6	21,9
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42	42,7	44,3	43,6	44,1	44,5
Grupo de edad (años)															
15-19 años	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,5	0,0
20-24 años	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4	1,5	2,7	1,8	1,0
25-29 años	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6	4,7	4,7	5,4	5,5
30-34 años	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1	10,4	9,3	8,3	8,3
35-39 años	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7	13,8	18,3	14	15,9
40-44 años	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6	17,7	16,5	19,4	16,7
≥45 años	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3	51,2	47,7	50,6	52,6
Estado civil (%)															
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3	59,3	64,8	64,2	63,3
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9	14,5	17,8	17,8	20,9
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9	23,1	16,5	15,6	13,9
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,0	3,1	0,9	2,5	1,9
Procedencia del cadáver (%)															
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7	74,4	72,6	68,5	71,9
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1	2,4	3,3	3,8	4,0
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1	10,1	8,2	8,2	6,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5	0,9	2,1	2,1	3,0
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6	5,5	5,9	8,4	7,7
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1	1,5	3,1	3,3	2,7
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0	5,1	4,7	5,6	4,6
Evidencias de consumo reciente (%)															
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8	81,8	84,9	82,0	88,1
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2	18,2	15,1	18,0	11,9
Evidencia de suicidio (%)															
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1	20,3	26,4	20,6	22,9
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9	79,7	73,6	79,4	77,1
Signos recientes venopunción (%)															
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2	12,5	13,5	13,0	13,3
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8	87,5	86,5	87,0	86,7
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)															
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0	35,4	27,0	31,5	38,2
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0	64,6	73,0	68,5	61,8
Anticuerpos anti-VIH (%)															
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5	27,2	26,2	21,4	22,1
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5	72,8	73,8	78,6	77,9

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Especifico de Mortalidad.

2.3.4.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1996-2017.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Opioides	90,4	89,8	90,1	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7
Cocaína	32,7	41,4	51,2	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0
Hipnosedantes	47,7	58,6	47,4	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7
Anfetaminas	4,0	8,6	2,8	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6
Cannabis	6,5	12,2	11,3	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8
MDMA	0,1	1,5	0,0	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7
Alcohol	27,7	28,6	26,2	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33	34,3
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opioides	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	64,0	64,7	63,9	58,1
Cocaína	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	51,7	48,8	53,7	53,2
Hipnosedantes	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	65,8	68,0	67,3	68,0
Anfetaminas	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	7,9	4,4	6,2	5,9
Cannabis	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	16,5	23,4	23,4	20,7
MDMA	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	3,5	2,3	2,8	1,7
Alcohol	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	40,8	39,8	42,9	44,0

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2003-2017.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opioides	376	349	356	338	340	324	346	409	318	366	337	333	335	320	367
Cocaína	305	280	315	250	313	251	247	297	213	280	236	269	253	269	336
Benzodiazepinas	234	225	241	203	212	186	180	292	258	291	265	327	336	319	403
Anfetaminas	15	12	12	15	17	9	13	8	19	18	27	41	23	31	37
Cannabis	82	78	95	70	68	65	88	123	100	107	94	86	121	117	131
Alcohol	191	167	150	143	130	108	120	149	136	138	136	212	206	215	278
Casos analizados	490	466	455	428	475	424	427	517	408	478	437	520	518	501	632


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

Fuente: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro específico de Mortalidad.

2.3.6.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide, aunque haya otras sustancias). España*, 2005-2017.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Metadona	36,5	39,8	37,5	30,0	32,4	47,4	49,7	52,2	47,8	36,9	32,4	36,3	30,2
Sólo metadona	0,6	2,8	4,2	2,4	2,6	2,7	2,2	1,1	2,1	1,5	0,6	1,0	0,9
Metadona y no otro opioide	15,1	27,4	24,4	20,6	21,9	30,7	34,6	40,2	34,8	20,0	16,4	19,2	18,4

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1985-2017.



	1985	1987	1989	1991	1992	1993	1994	1996	1997	1999	2000	2002	2003
Cocaina y no opioides**	2,1	1,7	1,8	1,0	0,6	3,3	2,8	3,9	5,5	8,8	6,1	11,3	16,4
Sólo cocaína***	0,7	0,9	1,3	0,0	0,4	1,2	0,6	2,3	2,4	4,1	2,9	2,6	7,5
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cocaina y no opioides**	20,4	18,5	25,1	18,9	16,4	18,0	17,2	19,0	19,7	17,7	18,0	20,0	25,5
Sólo cocaína***	5,9	4,7	7,8	6,4	5,4	5,8	3,4	6,7	7,6	4,6	4,4	3,2	3,5
Sólo cocaína y alcohol****	4,1	3,5	2,9	4,0	4,7	2,1	4,6	3,8	3,2	3,5	5,4	3,3	4,7

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

** Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye sólo cocaína)


*** Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia)

**** Sólo cocaína y alcohol

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.


2.3.8.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2017.



2.3.9.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España*, 1984-2017.



	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Opioides y no cocaína**	49,6	49,7	49,2	47,0	42,4	35,2	46,6	31,3	35,4	44,0	55,8	59,8	55,1	45,4	41,7	31,5	40,3
Sólo opioides***	28,1	25,2	20,2	23,9	20,8	14,1	20,6	11,5	14,2	18,1	13,1	9,0	17,7	12,6	10,8	7,6	9,2
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Opioides y no cocaína**	41,7	40,5	30,8	29,7	29,7	36,8	30,7	34,3	37,8	39,8	42,9	37,9	42,8	30,0	33,8	32,1	30,4
Sólo opioides***	8,7	7,1	5,9	6,4	4,0	4,7	7,8	7,3	8,2	6,4	4,2	2,7	4,6	3,1	1,7	2,0	3,0
Opioides y cocaína****	-	-	-	-	48,8	40,0	40,8	40,3	41,5	39,5	35,0	39,5	34,3	34,0	30,9	33,7	27,7

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

** Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides).


*** Sólo opioides (ninguna otra sustancia).

**** Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides y cocaína).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta opioides en función de otras sustancias detectadas. España*, 2017.



* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España*, 1996-2017.

	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	-	-	-
1997	0,9	-	-	-
1998	0,9	-	-	-
1999	0,4	-	-	-
2000	1,2	-	-	-
2001	2,7	-	-	-
2002	1,8	-	-	-
2003	0,6	-	-	-
2004	0,4	-	-	-
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6
2014	1,5	36,9	20,0	2,1
2015	0,6	32,4	16,4	1,9
2016	1,0	36,3	19,2	3,4
2017	0,9	30,2	18,4	1,6

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Casos con información en sustancias detectadas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2017.




Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.13.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2017.



* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.14.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España*, 2015-2017.

Sustancia detectada	2015	2016	2017
	Nº de casos	Nº de casos	Nº de casos
Sólo hipnosedantes	11	3	11
Hipnosedantes y cocaína (independientemente de otras sustancias)	133	152	198
Hipnosedantes y opiáceos (independientemente de otras sustancias)	249	230	278
Hipnosedantes y alcohol (independiente de otras sustancias)	120	137	189
Sólo hipnosedantes y alcohol	17	9	23
Sólo hipnosedantes y opioides	37	30	33
Sólo hipnosedantes y cocaína	7	11	17

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por hipnosedantes, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España*, 2015-2017.

Sustancia detectada	2015	2016	2017
	Nº de casos	Nº de casos	Nº de casos
Sólo cannabis y opioides	5	5	2
Sólo cannabis y cocaína	2	4	5
Sólo cannabis	2	1	0
Cannabis y opioides (independiente de otras sustancias)	88	87	86
Cannabis y cocaína (independiente de otras sustancias)	55	68	86
Cannabis y alcohol (independiente de otras sustancias)	50	42	50
Cannabis e hipnosedantes (independiente de otras sustancias)	86	82	93


* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por cannabis, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2017.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Con opioides*	182	170	136	104	140	143	148	152	141	105	94	105	102
Sin opioides*	55	48	52	35	41	39	33	43	51	60	65	53	70
Casos con información	237	218	188	139	181	182	181	195	192	165	159	158	172
Total	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189

* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.17.

Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas*. España, 2005-2017.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<15 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19 años	3	3	1	0	2	0	2	1	1	0	0	3	0
20-24 años	17	7	8	9	8	4	5	7	1	0	3	5	2
25-29 años	31	25	24	15	12	12	11	10	17	9	6	12	11
30-34 años	40	42	30	22	35	21	14	21	24	23	10	14	18
35-39 años	66	43	32	23	26	48	40	29	32	20	35	29	31
40-44 años	52	44	39	23	49	39	41	45	31	28	27	40	29
45-49 años	19	27	23	26	35	39	34	37	42	38	24	29	30
50-54 años	5	13	6	15	12	13	18	30	30	32	39	29	31
55-59 años	1	5	0	4	2	2	6	12	14	13	17	20	26
60-64 años	1	1	2	2	0	3	5	3	4	7	10	13	11
≥65 años	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Desconocida	2	0	23	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0
Total fallecidos	237	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2017.



Número de defunciones		Número de defunciones	
1983	266	2000	1.012
1984	440	2001	923
1985	453	2002	1.079
1986	516	2003	900
1987	741	2004	796
1988	1.067	2005	1.004
1989	1.440	2006	820
1990	1.440	2007	703
1991	1.833	2008	773
1992	1.760	2009	739
1993	1.399	2010	706
1994	1.067	2011	736
1995	1.051	2012	707
1996	1.310	2013	727
1997	1.127	2014	767
1998	1.049	2015	936
1999	972	2016	866
		2017	782

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

2.3.19.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2017.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2107
Estimación nacional	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	767	936	866	782
Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican)																		
	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	408	519	489	556	600	613	696
Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas)																		
	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	172	171	194	189
Registro General de Mortalidad (INE)																		
	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	455	390	483	437

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).