

ESTADÍSTICAS 2018

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
PARA EL PLAN NACIONAL
SOBRE DROGAS

GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

Elena ÁLVAREZ. Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ. Rosario SENDINO.

RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

Andalucía

Fernando ARENAS

Mercedes SUÁREZ

Rosario BALLESTA

Izaskun BILBAO

Aragón

Carmen BARANGUAN

Laura JOSÉ

Asturias

José Ramón HEVIA

José Antonio GONZÁLEZ

Baleares

Juana VANRELL

Francisca BIBILONI

Rut SUÁREZ

Canarias

Luz Marina MORENO

Nicolás AMADOR

Cantabria

Ángela HIGUERA

Antonia RUEDA

Carmen DIEGO

Castilla-La Mancha

Carmen DE PEDRO

Carlos ALONSO

Castilla y León

Ana SÁNCHEZ

Susana REDONDO

Alexander VELÁZQUEZ

Cataluña

Xavier MAJO

M. Teresa BRUGAL

Regina MUÑOZ

Extremadura

Antonia María VAS

Mª Pilar MORCILLO

Galicia

Sergio VEIGA

Jaime FRAGA

Sara CERDEIRA

María TAJES

Madrid

Ana RUIZ

Mª Angeles GUTIÉRREZ

Murcia

Juan Francisco CORREA

Mónica BALLESTA

M Dolores CHIRLAQUE

Navarra

Miguel MARTÍNEZ

Raquel GONZÁLEZ

País Vasco

Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

La Rioja

Cristina NUEZ

Comunidad Valenciana

Mª Jesús MATEU

Francisco VERDÚ

Julia CALABUIG

Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA

Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

INFORMACIÓN DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES (OEDA)

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid

Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08

Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es

Internet: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 680-18-111-2

Para poder prevenir y tratar de manera eficaz las adicciones debemos, en primer lugar, conocerlas. Para ello, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas cuenta con sistemas de información, de reconocido prestigio, que son imprescindibles para planificar nuestras acciones y el diseño de Estrategias y Planes de Acción conforme a las evidencias.

Desde el año 1985, trabajamos en actividades de recogida y análisis de datos, disponiendo de uno de los repositorios de información más consistentes entre los países de nuestro entorno. En 1998 se dio un paso más en la sistematización de la información con la creación de la Unidad de Sistemas de Información y Documentación, en la que se enmarca el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones que es, desde entonces, quien se encarga de realizar las encuestas necesarias, recopilar los datos, depurar y estructurar la información de carácter estadístico y epidemiológico y elaborar los informes anuales.

El informe que aquí se presenta, incorpora por una parte los resultados pormenorizados de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) de 2016 y, por otra parte los indicadores de: Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y relacionada con drogas y el indicador de Infecciones en consumidores de drogas.

Los Informes y Estadísticas anuales del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, suponen la mejor herramienta para lograr que las partes implicadas, y la sociedad en definitiva, tengan un conocimiento veraz de la situación y evolución de los fenómenos que nos rodean en este ámbito y se constituyen como uno de los instrumentos más valiosos con los que contamos para el correcto desarrollo de políticas en el ámbito de las adicciones en nuestro país.

Quiero terminar felicitando a todos los que han hecho posible este informe, resultado del trabajo conjunto de los profesionales de los diferentes departamentos de la Administración Central, Comunidades Autónomas y entidades del tercer sector y, en especial, al equipo del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, por el gran trabajo realizado.

María Azucena Martí Palacios
Delegada del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones

ESTADÍSTICAS 2018

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| Presentación | 3 |
| Introducción | 30 |
| 1. Consumo, percepciones y opiniones ante las drogas | 31 |
| 1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2017 | 32 |
| 1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016 .. | 33 |
| Metodología: tamaño muestra | |
| 1.2.1. Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$) España, 2016 | 33 |
| 1.2.2. Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016 | 34 |
| 1.2.3. Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016 | 35 |
| 1.2.4. Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016 | 36 |
| 1.2.5. Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 | 37 |
| 1.2.6. Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 | 37 |
| Prevalencia de consumo de drogas 1995-2016: evolución temporal. Edad y sexo | |
| 1.2.7. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 38 |
| 1.2.8. Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 40 |
| 1.2.9. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 42 |
| 1.2.10. Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 44 |
| 1.2.11. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 44 |

| | | |
|---------|---|----|
| 1.2.12. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 45 |
| 1.2.13. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 46 |
| 1.2.14. | Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 47 |
| 1.2.15. | Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 47 |
| 1.2.16. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 48 |
| 1.2.17. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 48 |
| 1.2.18. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 49 |
| 1.2.19. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 49 |
| 1.2.20. | Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 | 50 |
| 1.2.21. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 | 50 |
| 1.2.22. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 | 51 |
| 1.2.23. | Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016 | 52 |
| 1.2.24. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 52 |
| 1.2.25. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 53 |
| 1.2.26. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 53 |
| 1.2.27. | Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 54 |
| 1.2.28. | Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 | 54 |
| 1.2.29. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 | 55 |
| 1.2.30. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016 | 55 |
| 1.2.31. | Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 56 |
| 1.2.32. | Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016 | 56 |
| 1.2.33. | Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 | 57 |
| 1.2.34. | Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016 | 58 |

Incidencia del consumo de drogas

| | | |
|---------|---|----|
| 1.2.35. | Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 59 |
| 1.2.36. | Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 | 59 |

Prevalencia de consumo de drogas 2016: Comunidad/Ciudad Autónoma

| | | |
|---------|--|----|
| 1.2.37. | Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016 | 60 |
| 1.2.38. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 61 |
| 1.2.39. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 62 |
| 1.2.40. | Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 63 |
| 1.2.41. | Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 64 |
| 1.2.42. | Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 65 |
| 1.2.43. | Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 66 |
| 1.2.44. | Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 67 |
| 1.2.45. | Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 68 |
| 1.2.46. | Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016 | 69 |
| 1.2.47. | Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 | 70 |
| 1.2.48. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 71 |
| 1.2.49. | Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 72 |
| 1.2.50. | Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 73 |
| 1.2.51. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 74 |
| 1.2.52. | Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 75 |
| 1.2.53. | Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 | 76 |

| | | |
|---------|---|----|
| 1.2.54. | Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . | 77 |
| 1.2.55. | Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016 | 78 |
| 1.2.56. | Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 | 79 |
| 1.2.57. | Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016 . . | 80 |

Bebidas alcohólicas

| | | |
|---------|---|----|
| 1.2.58. | Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 81 |
| 1.2.59. | Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 81 |
| 1.2.60. | Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 82 |
| 1.2.61. | Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016 | 82 |
| 1.2.62. | Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016 | 83 |
| 1.2.63. | Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 83 |
| 1.2.64. | Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 84 |
| 1.2.65. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016 | 84 |
| 1.2.66. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 85 |
| 1.2.67. | Prevalencias de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 | 85 |
| 1.2.68. | Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 85 |
| 1.2.69. | Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016 | 86 |
| 1.2.70. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016 | 86 |

| | | |
|---------|---|----|
| 1.2.71. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 87 |
| 1.2.72. | Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 | 87 |
| 1.2.73. | Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 | 88 |
| 1.2.74. | Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 | 89 |
| 1.2.75. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 89 |
| 1.2.76. | Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 90 |
| 1.2.77. | Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 90 |
| 1.2.78. | Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 91 |
| 1.2.79. | Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 91 |
| 1.2.80. | Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 92 |
| 1.2.81. | Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 92 |
| 1.2.82. | Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016 | 93 |
| 1.2.83. | Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016 | 93 |
| 1.2.84. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016 | 94 |
| 1.2.85. | Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016 | 94 |
| 1.2.86. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016 | 95 |
| 1.2.87. | Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 96 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 1.2.88. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016 | 96 |
| 1.2.89. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 97 |
| 1.2.90. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016 | 97 |
| 1.2.91. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016 | 98 |
| 1.2.92. | Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016 | 99 |
| 1.2.93. | Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016 | 100 |
| 1.2.94. | Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 | 100 |
| 1.2.95. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 101 |
| 1.2.96. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016 | 101 |
| 1.2.97. | Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016 | 102 |
| 1.2.98. | Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 102 |
| 1.2.99. | Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 103 |
| 1.2.100. | Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 103 |
| 1.2.101. | Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 103 |
| 1.2.102. | Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 104 |
| 1.2.103. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016 | 104 |
| 1.2.104. | Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016 | 105 |
| 1.2.105. | Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 105 |

Bebidas energéticas

- 1.2.106. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 106
- 1.2.107. Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016 . . . 106

Tabaco

- 1.2.108. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 107
- 1.2.109. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 107
- 1.2.110. Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016 108
- 1.2.111. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016 108
- 1.2.112. Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 109
- 1.2.113. Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 109
- 1.2.114. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016 110
- 1.2.115. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 110
- 1.2.116. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016 111
- 1.2.117. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016 111
- 1.2.118. Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 112
- 1.2.119. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 112
- 1.2.120. Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 113
- 1.2.121. Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 113
- 1.2.122. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 114
- 1.2.123. Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 114

| | |
|--|-----|
| 1.2.124. Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016 | 114 |
| 1.2.125. Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016 | 115 |
| 1.2.126. Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016 | 115 |

Cigarrillos electrónicos

| | |
|---|-----|
| 1.2.127. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 116 |
| 1.2.128. Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016 | 116 |
| 1.2.129. Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016 | 117 |
| 1.2.130. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016 | 117 |
| 1.2.131. Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016 | 117 |

Consumo por tipo de drogas: hipnosedantes

| | |
|--|-----|
| 1.2.132. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 118 |
| 1.2.133. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 118 |
| 1.2.134. Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 119 |
| 1.2.135. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 119 |
| 1.2.136. Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 120 |
| 1.2.137. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 120 |
| 1.2.138. Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 121 |
| 1.2.139. Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 121 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.140. | Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016 | 122 |
| 1.2.141. | Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 122 |
| 1.2.142. | Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 123 |
| 1.2.143. | Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016 | 123 |
| 1.2.144. | Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 124 |
| 1.2.145. | Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 124 |
| 1.2.146. | Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 125 |
| 1.2.147. | Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 | 125 |
| 1.2.148. | Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 126 |
| 1.2.149. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 126 |
| 1.2.150. | Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 127 |
| 1.2.151. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016 | 127 |
| 1.2.152. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016 | 128 |
| 1.2.153. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), según edad y sexo (%). España, 2016 | 128 |
| 1.2.154. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016 | 129 |
| 1.2.155. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016 | 129 |
| 1.2.156. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), según edad y sexo (%). España, 2016 | 129 |
| 1.2.157. | Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016 | 130 |
| 1.2.158. | Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016 | 130 |
| 1.2.159. | Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco (%). España, 2002-2016 | 130 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.160. | Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 131 |
| 1.2.161. | Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 131 |
| 1.2.162. | Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016 | 132 |
| 1.2.163. | Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 132 |
| 1.2.164. | Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos en miles de estudiantes). España, 2016 | 133 |
| 1.2.165. | Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016 | 133 |
| 1.2.166. | Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016 | 134 |
| 1.2.167. | Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016 | 135 |
| 1.2.168. | Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016 | 135 |
| 1.2.169. | Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 | 136 |
| 1.2.170. | Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 | 136 |
| 1.2.171. | Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 | 137 |
| 1.2.172. | Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 | 137 |
| 1.2.173. | Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016 | 137 |
| 1.2.174. | Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016 | 138 |

Consumo por tipo de drogas: cocaína

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.175. | Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 139 |
| 1.2.176. | Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016 | 139 |

| | |
|--|-----|
| 1.2.177. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 | 140 |
| 1.2.178. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 140 |
| 1.2.179. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 141 |
| 1.2.180. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 141 |
| 1.2.181. Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 142 |
| 1.2.182. Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 142 |
| 1.2.183. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 143 |
| 1.2.184. Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 143 |
| 1.2.185. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 | 144 |
| 1.2.186. Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 | 144 |
| 1.2.187. Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 145 |
| 1.2.188. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 | 145 |
| 1.2.189. Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 | 146 |
| 1.2.190. Prevalencia de consumo de cocaína polvo y /o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016 | 146 |

Consumo por tipo de drogas: éxtasis

| | |
|--|-----|
| 1.2.191. Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 147 |
| 1.2.192. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 147 |
| 1.2.193. Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 148 |
| 1.2.194. Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 148 |
| 1.2.195. Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 149 |
| 1.2.196. Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016 | 149 |

Consumo por tipo de drogas: anfetaminas

| | |
|--|-----|
| 1.2.197. Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 150 |
| 1.2.198. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 150 |
| 1.2.199. Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 151 |
| 1.2.200. Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 151 |
| 1.2.201. Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 152 |
| 1.2.202. Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 152 |

Consumo por tipo de drogas: alucinógenos y setas mágicas

| | |
|---|-----|
| 1.2.203. Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 153 |
| 1.2.204. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 153 |
| 1.2.205. Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 154 |
| 1.2.206. Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 154 |
| 1.2.207. Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 155 |
| 1.2.208. Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 155 |
| 1.2.209. Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 156 |
| 1.2.210. Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 156 |
| 1.2.211. Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016 | 157 |

Consumo por tipo de drogas: heroína

| | |
|---|-----|
| 1.2.212. Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 157 |
| 1.2.213. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016 | 158 |
| 1.2.214. Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 158 |
| 1.2.215. Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 159 |
| 1.2.216. Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 159 |

| | |
|---|-----|
| 1.2.217. Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 160 |
| 1.2.218. Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 160 |
| 1.2.219. Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 161 |
| 1.2.220. Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 | 161 |

Consumo por tipo de drogas: inhalables volátiles

| | |
|--|-----|
| 1.2.221. Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016 .. | 162 |
| 1.2.222. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 162 |
| 1.2.223. Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 163 |
| 1.2.224. Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 163 |

Consumo por tipo de drogas: GHB

| | |
|--|-----|
| 1.2.225. Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 | 164 |
|--|-----|

Consumo por tipo de drogas: metanfetaminas

| | |
|---|-----|
| 1.2.226. Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016 | 164 |
| 1.2.227. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 165 |
| 1.2.228. Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 165 |
| 1.2.229. Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 166 |
| 1.2.230. Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016 | 166 |

Consumo por tipo de drogas: esteroides anabolizantes

| | |
|--|-----|
| 1.2.231. Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 .. | 167 |
| 1.2.232. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 167 |
| 1.2.233. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 168 |
| 1.2.234. Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 168 |

Consumo por tipo de drogas: sustancias estimulantes para mejorar rendimiento en el estudio

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.235. | Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 169 |
| 1.2.236. | Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 169 |
| 1.2.237. | Frecuencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016 | 170 |
| 1.2.238. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016 | 170 |
| 1.2.239. | Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016 | 171 |

Consumo por tipo de drogas: nuevas sustancias

| | | |
|----------|---|-----|
| 1.2.240. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 171 |
| 1.2.241. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 172 |
| 1.2.242. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 172 |
| 1.2.243. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016 | 173 |
| 1.2.244. | Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016 | 173 |
| 1.2.245. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 174 |
| 1.2.246. | Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016 | 174 |
| 1.2.247. | Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 175 |
| 1.2.248. | Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016 | 175 |
| 1.2.249. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 | 176 |
| 1.2.250. | Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 | 177 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.251. | Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016 | 178 |
| 1.2.252. | Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016 | 178 |
| 1.2.253. | Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016 | 179 |
| 1.2.254. | Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016 | 179 |
| 1.2.255. | Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 | 180 |
| 1.2.256. | Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 | 180 |
| 1.2.257. | Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016 | 181 |
| 1.2.258. | Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016 | 181 |
| 1.2.259. | Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016 | 182 |
| 1.2.260. | Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016 | 182 |
| 1.2.261. | Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016 . . | 183 |

Patrones de consumo de drogas: policonsumo

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.262. | Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 183 |
| 1.2.263. | Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 184 |
| 1.2.264. | Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 184 |
| 1.2.265. | Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016 | 184 |

| | |
|---|-----|
| 1.2.266. Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 | 185 |
| 1.2.267. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016 | 185 |
| 1.2.268. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 185 |
| 1.2.269. Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 | 186 |
| 1.2.270. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 | 186 |
| 1.2.271. Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila). España, 2016 | 187 |
| 1.2.272. Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016 | 187 |
| 1.2.273. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016 | 188 |
| 1.2.274. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016 | 188 |
| 1.2.275. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 . . | 189 |
| 1.2.276. Prevalencia de consumo conjunto de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016 . . | 190 |
| 1.2.277. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 . . | 191 |
| 1.2.278. Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 | 192 |

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de riesgo

| | |
|---|-----|
| 1.2.279. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016 | 193 |
| 1.2.280. Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016 | 194 |

| | |
|--|-----|
| 1.2.281. Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016 | 195 |
| 1.2.282. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016 | 195 |
| 1.2.283. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016 | 196 |
| 1.2.284. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016 | 196 |
| 1.2.285. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal (%). España, 2016 | 197 |
| 1.2.286. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 197 |
| 1.2.287. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016 | 198 |
| 1.2.288. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016 | 199 |
| 1.2.289. Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016 | 199 |

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: percepción de disponibilidad

| | |
|---|-----|
| 1.2.290. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2016 | 200 |
| 1.2.291. Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016 | 201 |
| 1.2.292. Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016 | 201 |
| 1.2.293. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016 | 202 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 1.2.294. | Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016 | 202 |
| 1.2.295. | Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016 | 203 |
| 1.2.296. | Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016 | 203 |
| 1.2.297. | Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016 | 204 |

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: información/formación sobre drogas

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.298. | Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 | 204 |
| 1.2.299. | Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016 | 205 |
| 1.2.300. | Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal y según edad (%). España, 2016 | 205 |
| 1.2.301. | Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016 | 206 |
| 1.2.302. | Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016 | 206 |
| 1.2.303. | Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016 | 207 |
| 1.2.304. | Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016 | 207 |

Percepciones y opiniones de la población ante las drogas: valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el problema de las drogas

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.305. | Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016 | 208 |
| 1.2.306. | Evolución de la valoración de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016 | 208 |
| 1.2.307. | Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 209 |
| 1.2.308. | Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 209 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: relación con sus iguales

| | | |
|----------|---|-----|
| 1.2.309. | Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016 | 210 |
| 1.2.310. | Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 210 |
| 1.2.311. | Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 211 |
| 1.2.312. | Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 211 |
| 1.2.313. | Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 212 |
| 1.2.314. | Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 212 |
| 1.2.315. | Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016 | 213 |
| 1.2.316. | Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016 | 213 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: permisividad de los padres y relaciones familiares

| | | |
|----------|--|-----|
| 1.2.317. | Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016 | 214 |
| 1.2.318. | Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016 | 214 |
| 1.2.319. | Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016 | 215 |
| 1.2.320. | Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016 | 215 |
| 1.2.321. | Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 | 216 |
| 1.2.322. | Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 | 216 |
| 1.2.323. | Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016 | 217 |
| 1.2.324. | Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 217 |

| | |
|--|-----|
| 1.2.325. Prevalencia de las intoxicaciones etílicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 218 |
| 1.2.326. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 218 |
| 1.2.327. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016 | 219 |
| 1.2.328. Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016 . . . | 219 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: internet, ocio

| | |
|--|-----|
| 1.2.329. Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 220 |
| 1.2.330. Frecuencia de uso de internet en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 220 |
| 1.2.331. Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 | 221 |
| 1.2.332. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 | 223 |
| 1.2.333. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 | 225 |
| 1.2.334. Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 | 227 |
| 1.2.335. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016 | 229 |
| 1.2.336. Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016 | 231 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: salidas nocturnas y hora de regreso

| | |
|---|-----|
| 1.2.337. Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016 | 233 |
| 1.2.338. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 233 |
| 1.2.339. Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 234 |
| 1.2.340. Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 | 235 |
| 1.2.341. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 236 |

| | |
|---|-----|
| 1.2.342. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 236 |
| 1.2.343. Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 237 |
| 1.2.344. Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 237 |
| 1.2.345. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 238 |
| 1.2.346. Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 238 |
| 1.2.347. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 239 |
| 1.2.348. Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 239 |
| 1.2.349. Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016 | 240 |
| 1.2.350. Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016 | 240 |
| 1.2.351. Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016 | 241 |
| 1.2.352. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 | 241 |
| 1.2.353. Prevalencia de binge drinking, inntoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST \geq 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 | 242 |
| 1.2.354. Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales) consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 | 242 |
| 1.2.355. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 | 243 |
| 1.2.356. Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016 | 244 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: dinero disponible

| | |
|--|-----|
| 1.2.357. Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016 | 245 |
| 1.2.358. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016 . . | 245 |
| 1.2.359. Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016 | 245 |

Consumo de sustancias psicoactivas - contexto: entorno escolar

| | |
|--|-----|
| 1.2.360. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 | 246 |
|--|-----|

Consumo de sustancias psicoactivas: consecuencias negativas del consumo

| | |
|---|-----|
| 1.2.361. Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016 | 247 |
| 1.2.362. Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016 | 247 |

2. Problemas relacionados con las drogas 249

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2016 250

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2016

| | |
|--|-----|
| 2.1.1. Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2016 | 250 |
| 2.1.2. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2016 . . | 251 |
| 2.1.3. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2016 | 252 |
| 2.1.4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2016 . . | 253 |
| 2.1.5. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2016 | 254 |
| 2.1.6. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2016 | 255 |
| 2.1.7. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2016 . . | 255 |
| 2.1.8. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2016 . . | 256 |
| 2.1.9. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2016 | 257 |
| 2.1.10. Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2016 | 258 |
| 2.1.11. Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2016 | 259 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.1.12. | Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2016 | 260 |
| 2.1.13. | Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2016 | 261 |
| 2.1.14. | Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2016 | 262 |
| 2.1.15. | Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 | 263 |
| 2.1.16. | Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 | 264 |
| 2.1.17. | Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 | 265 |
| 2.1.18. | Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016 | 266 |
| 2.1.19. | Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2016 | 267 |
| 2.1.20. | Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2016 . . | 268 |
| 2.1.21. | Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2016 | 269 |
| 2.1.22. | Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2016 | 270 |

Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2016

| | | |
|---------|--|-----|
| 2.1.23. | Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2016 | 271 |
| 2.1.24. | Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2016 | 272 |
| 2.1.25. | Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2016 | 273 |
| 2.1.26. | Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016 | 274 |
| 2.1.27. | Características sociodemográficas de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas ilegales, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016 . | 275 |
| 2.1.28. | Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2013-2016 | 277 |
| 2.1.29. | Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016 | 278 |
| 2.1.30. | Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2016 | 280 |

| | |
|--|------------|
| 2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2016 . . . | 283 |
| 2.2.1. Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España, 1996-2016 | 283 |
| 2.2.2. Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España, 1996-2016. | 284 |
| 2.2.3. Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España, 1996-2016 | 285 |
| 2.2.4. Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España, 2016 | 285 |
| 2.2.5. Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España, 2016 | 286 |
| 2.2.6. Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2016 | 286 |
| 2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2016 | 287 |
| 2.3.1. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016 | 287 |
| 2.3.2. Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016 | 288 |

Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas y Registro General de Mortalidad

| | |
|---|-----|
| 2.3.3. Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 2003-2016 | 289 |
| 2.3.4. Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España, 1983-2016 | 290 |
| 2.3.5. Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España, 2004-2016 | 291 |
| 2.3.6. Número de fallecidos en los que se detecta la metadona (independientemente de otras sustancias), metadona y no otro opioide y metadona sola. España, 2005-2016. | 291 |
| 2.3.7. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España, 1985-2016 | 292 |
| 2.3.8. Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2016 | 292 |
| 2.3.9. Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España, 1984-2016 | 293 |
| 2.3.10. Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España, 2016 | 293 |
| 2.3.11. Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (metadona, sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España, 1996-2016 | 294 |
| 2.3.12. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2016 | 295 |
| 2.3.13. Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2016 | 295 |

| | |
|--|-----|
| 2.3.14. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España, 2015-2016 | 296 |
| 2.3.15. Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España, 2015-2016 | 296 |
| 2.3.16. Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2016 | 297 |
| 2.3.17. Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas. España, 2005-2016 | 297 |
| 2.3.18. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2016 | 298 |
| 2.3.19. Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2016 | 299 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Información complementaria | 300 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Páginas web de interés | 301 |
|----------------------------------|-----|

INTRODUCCIÓN

La función primordial del **Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)** es ofrecer una visión global de la evolución y características del consumo de sustancias psicoactivas (incluyendo alcohol, tabaco, hipnosedantes, drogas ilegales y nuevas sustancias), nuevas adicciones y los problemas asociados en España. Para ello se emplea información procedente de diversas fuentes que, una vez analizada y contextualizada, debería ayudar a responsables políticos, asociaciones, profesionales y consumidores a la hora de tomar decisiones sobre estas cuestiones en sus respectivos ámbitos.

Este documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Estadísticas 2018*, se publica junto con otro documento, *Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Informe 2018*, al que complementa con una selección de tablas y gráficos.

El presente documento se estructura en dos capítulos que se detallan a continuación:

En el **capítulo 1**, se presenta información relativa al consumo, percepciones y opiniones de la población ante las drogas desde 1994 hasta 2016. La fuente de información es la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), en sus sucesivas ediciones. ESTUDES se realiza de forma bienal, y se promueve y financia directamente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas contando con la estrecha colaboración de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el presente documento no se incluye información de EDADES, ya que los últimos datos disponibles, al cierre de este informe, se corresponden al año 2015 y ya han sido publicados en el *Informe y Estadísticas 2017 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España*.


En el **capítulo 2**, se incluye información relativa a los problemas relacionados con las drogas desde 1987 hasta 2016. La información procede de tres indicadores clave: Indicador “Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas”, Indicador “Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas” e Indicador “Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas”, así como información relativa al consumo problemático de drogas e información relacionada con las infecciones en consumidores de drogas.

Los indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad se gestionan desde 1987 en el marco del Plan Nacional sobre Drogas como una colaboración interinstitucional en el que tienen un papel muy activo las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como las instituciones de las que procede la información (centros de tratamiento de drogodependencias, hospitales, institutos de medicina legal, laboratorios toxicológicos, etc.). En algunos casos, los Ayuntamientos prestan también soporte a la recogida y depuración de la información. Los indicadores sobre infecciones y consumo problemático proceden de varias fuentes, pero fundamentalmente de la DGPNSD y de otras divisiones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En la página web del Plan Nacional sobre Drogas pueden consultarse los informes que se han ido publicando periódicamente desde 1998.

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/home.htm>

Consumo,
percepciones
y opiniones
ante las drogas



1.1. Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 1995-2017

En 2017, siguiendo con la serie de periodicidad bienal iniciada en 1995, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha llevado a cabo la duodécima edición de la Encuesta sobre alcohol y drogas en España (EDADES). Esta encuesta se realiza en todo el territorio nacional, en la población general residente en hogares (15-64 años), y se realiza en el domicilio. En 2017 la muestra fue de 21.249.

El objetivo general de la misma es conseguir información que permita diseñar, desarrollar y evaluar estrategias y políticas dirigidas a prevenir el consumo y a abordar las consecuencias negativas del uso de drogas, del mal uso de las tecnologías y de otras conductas relacionadas.

Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas son conocer:

- La prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
- Las características sociodemográficas de los consumidores.
- Los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
- La disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas conductas de consumo.
- La visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- La opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas para reducirlos.
- La evolución temporal (desde 1995) de los aspectos antes expuestos.

Los resultados de EDADES 2017 serán publicados en el próximo informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

La metodología y los resultados, hasta el año 2017, pueden consultarse en la página web del Plan Nacional sobre Drogas: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/encuestas_EDADES.htm

1.2. Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), 1994-2016

1.2.1.

Error muestral de la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma (para un nivel de confianza del 95,5% y una distribución poblacional de $p = q = 0,5$) España, 2016.

| | Número de colegios | | | Número de alumnos | | | Error muestral (\pm)*** |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | DGPNSD* | Ampliación** | Tamaño final | DGPNSD* | Ampliación** | Tamaño final | |
| Andalucía | 68 | 0 | 68 | 2.970 | 0 | 2.970 | 1,8% |
| Aragón | 24 | 45 | 69 | 976 | 1.805 | 2.781 | 1,8% |
| Asturias | 21 | 32 | 53 | 641 | 1.257 | 1.898 | 2,2% |
| Baleares | 23 | 0 | 23 | 913 | 0 | 913 | 3,3% |
| Canarias | 32 | 48 | 80 | 1.286 | 1.928 | 3.214 | 1,7% |
| Cantabria | 17 | 32 | 49 | 573 | 1.286 | 1.859 | 2,2% |
| Castilla-La Mancha | 33 | 20 | 53 | 1.319 | 814 | 2.133 | 2,1% |
| Castilla y León | 32 | 0 | 32 | 1.220 | 0 | 1.220 | 2,8% |
| Cataluña | 59 | 0 | 59 | 2.617 | 0 | 2.617 | 1,9% |
| C. Valenciana | 48 | 38 | 86 | 1.945 | 1.557 | 3.502 | 1,7% |
| Extremadura | 23 | 0 | 23 | 817 | 0 | 817 | 3,5% |
| Galicia | 33 | 20 | 53 | 1.321 | 768 | 2.089 | 2,2% |
| Madrid | 55 | 41 | 96 | 2.457 | 1.864 | 4.321 | 1,5% |
| Murcia | 29 | 0 | 29 | 1.259 | 0 | 1.259 | 2,8% |
| Navarra | 18 | 0 | 18 | 773 | 0 | 773 | 3,5% |
| País Vasco | 33 | 0 | 33 | 1.286 | 0 | 1.286 | 2,8% |
| La Rioja | 13 | 12 | 25 | 512 | 564 | 1.076 | 2,9% |
| Ceuta | 6 | 1 | 7 | 192 | 127 | 319 | 5,3% |
| Melilla | 6 | 1 | 7 | 322 | 0 | 322 | 5,3% |
| Total España | 573 | 290 | 863 | 23.399 | 11.970 | 35.369 | 0,5% |

* Muestra financiada por la DGPNSD

** Muestra financiada por las CCAA

*** Error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.2.

Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CCAA | | | | | | | | | | | | |
| Andalucía | 471.794 | 462.498 | 439.486 | 402.840 | 361.512 | 363.862 | 326.571 | 304.858 | 350.592 | 345.073 | 296.955 | 307.453 |
| Aragón | 69.699 | 64.548 | 58.208 | 49.597 | 45.599 | 44.849 | 40.860 | 38.581 | 44.414 | 45.224 | 39.471 | 40.463 |
| Asturias | 73.467 | 67.094 | 59.379 | 48.271 | 42.232 | 39.752 | 33.888 | 28.534 | 32.598 | 32.381 | 26.746 | 27.234 |
| Baleares | 39.271 | 37.441 | 36.613 | 34.923 | 34.408 | 34.804 | 31.333 | 30.164 | 33.985 | 35.788 | 31.203 | 32.753 |
| Canarias | 113.256 | 110.955 | 111.340 | 96.577 | 87.248 | 85.592 | 74.244 | 68.929 | 78.902 | 81.402 | 67.994 | 73.074 |
| Cantabria | 36.909 | 34.734 | 311.64 | 26.253 | 23.666 | 22.473 | 19.609 | 17.583 | 20.366 | 19.980 | 16.536 | 17.541 |
| Castilla y León | 160.256 | 151.635 | 137.270 | 117.058 | 105.092 | 102.177 | 89.776 | 78.471 | 88.990 | 87.789 | 73.070 | 74.887 |
| Castilla-La Mancha | 90.837 | 89.425 | 85.693 | 79.729 | 77.727 | 78.397 | 73.297 | 69.538 | 79.848 | 81.315 | 69.444 | 71.507 |
| Cataluña | 384.125 | 354.024 | 310.815 | 262.519 | 248.490 | 248.973 | 236.139 | 234.395 | 264.590 | 275.946 | 250.522 | 249.005 |
| C. Valenciana | 251.506 | 234.037 | 215.858 | 190.873 | 178.801 | 177.602 | 160.648 | 154.174 | 176.955 | 180.461 | 153.623 | 161.202 |
| Extremadura | 57.224 | 59.242 | 58.622 | 54.160 | 51.426 | 50.791 | 46.757 | 41.203 | 45.254 | 44.111 | 38.292 | 38.332 |
| Galicia | 182.834 | 176.703 | 163.396 | 134.929 | 113.916 | 112.125 | 94.564 | 82.464 | 95.485 | 87.948 | 73.481 | 75.578 |
| Madrid | 347.417 | 322.791 | 292.702 | 251.754 | 229.324 | 231.045 | 207.926 | 191.834 | 224.210 | 227.068 | 199.999 | 211.462 |
| Murcia | 73.929 | 71.706 | 66.423 | 60.005 | 55.246 | 56.305 | 51.755 | 49.721 | 57.769 | 59.440 | 51.322 | 54.473 |
| Navarra | 32.758 | 30.589 | 26.977 | 22.174 | 21.103 | 20.626 | 19.640 | 19.061 | 22.096 | 22.524 | 21.251 | 21.858 |
| Pais Vasco | 151.581 | 136.827 | 112.596 | 90.058 | 82.048 | 78.790 | 67.592 | 63.000 | 72.145 | 72.410 | 64.174 | 68.202 |
| La Rioja | 17.809 | 16.224 | 14.249 | 11.940 | 10.928 | 10.723 | 9.755 | 9.080 | 10.567 | 10.976 | 9.628 | 10.262 |
| Ceuta | 3.379 | 3.565 | 3.724 | 3.611 | 3.303 | 3.433 | 2.797 | 2.680 | 3.224 | 3.209 | 2.715 | 3.230 |
| Melilla | 2.961 | 3.136 | 3.455 | 3.197 | 3.244 | 2.970 | 2.791 | 2.890 | 6.099 | 3.776 | 3.105 | 3.421 |
| Titularidad del centro educativo | | | | | | | | | | | | |
| Pública | 1.911.828 | 1.769.080 | 1.626.084 | 1.362.588 | 1.225.988 | 1.241.521 | 1.093.906 | 1.004.590 | 1.154.668 | 1.189.700 | 1.014.070 | 1.056.289 |
| Privada | 649.184 | 658.094 | 601.886 | 577.880 | 549.325 | 5.237.68 | 496.036 | 482.570 | 553.421 | 527.121 | 475.461 | 485.648 |
| Tipo de estudios | | | | | | | | | | | | |
| ESO | 237.115 | 515.206 | 886.542 | 953.021 | 935.678 | 937.280 | 891.860 | 845.306 | 828.331 | 826.153 | 826.260 | 850.831 |
| Bachillerato | 1.510.024 | 1.261.877 | 927.249 | 724.972 | 614.796 | 600.389 | 576.960 | 520.541 | 608.428 | 594.090 | 550.619 | 560.404 |
| F. Profesional | 813.873 | 650.091 | 414.179 | 262.475 | 224.839 | 227.620 | 121.122 | 121.313 | 271.330 | 296.578 | 112.652 | 130.702 |
| Total | 2.561.012 | 2.427.174 | 2.227.970 | 1.940.468 | 1.775.313 | 1.765.289 | 1.589.942 | 1.487.160 | 1.708.089 | 1.716.821 | 1.489.531 | 1.541.937 |

FUENTES: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.3.

Distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra de ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia, según titularidad jurídica del centro educativo y según tipo de estudios (números absolutos). España, 1996-2016.

| | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CCAA | | | | | | | | | | | |
| Andalucía | 2.075 | 1.976 | 2.372 | 2.552 | 2.464 | 2.750 | 6.143 | 3.724 | 2.378 | 4.636 | 2.970 |
| Aragón | 941 | 775 | 671 | 2.185 | 1.757 | 1.764 | 785 | 1.377 | 2.464 | 2.710 | 2.781 |
| Asturias | 875 | 765 | 661 | 744 | 584 | 1.737 | 627 | 1.155 | 2.024 | 1.890 | 1.898 |
| Baleares | 661 | 679 | 602 | 1.762 | 1.795 | 622 | 599 | 1.203 | 806 | 859 | 913 |
| Canarias | 859 | 966 | 739 | 960 | 835 | 2.079 | 1.398 | 1.815 | 1.155 | 3.592 | 3.214 |
| Cantabria | 575 | 722 | 1.244 | 1.169 | 1.478 | 1.376 | 352 | 906 | 1.923 | 1.885 | 1.859 |
| Castilla y León | 1.120 | 1.093 | 919 | 1.140 | 983 | 1.107 | 1.697 | 1.865 | 1.151 | 2.284 | 1.220 |
| Castilla-La Mancha | 982 | 943 | 1.749 | 2.501 | 860 | 984 | 1.359 | 1.818 | 1.721 | 1.941 | 2.133 |
| Cataluña | 1.881 | 1.681 | 1.552 | 1.885 | 2.831 | 2.177 | 4.628 | 3.415 | 2.353 | 2.510 | 2.617 |
| C. Valenciana | 1.466 | 1.395 | 2.287 | 1.685 | 1.362 | 1.657 | 3.119 | 2.727 | 1.696 | 3.260 | 3.502 |
| Extremadura | 659 | 718 | 443 | 796 | 1.693 | 777 | 807 | 1.370 | 860 | 905 | 817 |
| Galicia | 1.436 | 1.333 | 1.170 | 2.108 | 1.245 | 2.244 | 1.799 | 1.945 | 2.022 | 2.102 | 2.089 |
| Madrid | 1.979 | 1.853 | 2.929 | 3.308 | 3.033 | 3.055 | 3.904 | 3.056 | 3.250 | 4.404 | 4.321 |
| Murcia | 818 | 813 | 727 | 1.394 | 1.468 | 1.601 | 998 | 1.551 | 1.054 | 1.085 | 1.259 |
| Navarra | 659 | 553 | 627 | 530 | 600 | 570 | 361 | 960 | 605 | 662 | 773 |
| País Vasco | 1.104 | 1.021 | 852 | 806 | 990 | 884 | 1.316 | 1.726 | 1.096 | 1.164 | 1.286 |
| La Rioja | 651 | 570 | 462 | 457 | 975 | 525 | 190 | 647 | 477 | 507 | 1.076 |
| Ceuta | 128 | 30 | 323 | 130 | 140 | 289 | 46 | 325 | 232 | 224 | 319 |
| Melilla | 97 | 199 | 121 | 464 | 428 | 256 | 57 | 382 | 236 | 866 | 322 |
| Titularidad del centro educativo | | | | | | | | | | | |
| Pública | 13.716 | 12.766 | 10.421 | 14.445 | 14.889 | 13.050 | 20.720 | 22.081 | 18.848 | 25.976 | 24.383 |
| Privada | 5.250 | 5.319 | 10.029 | 12.131 | 10.632 | 13.404 | 9.463 | 9.886 | 8.655 | 11.510 | 10.986 |
| Tipo de estudios | | | | | | | | | | | |
| ESO | 5.129 | 9.560 | 13.664 | 14.400 | 14.415 | 15.983 | 15.671 | 17.816 | 14.953 | 21.278 | 20.219 |
| Bachillerato | 10.495 | 7.312 | 5.869 | 10.733 | 9.468 | 8.468 | 10.348 | 11.683 | 10.384 | 14.624 | 13.496 |
| Formación Profesional | 3.342 | 1.213 | 917 | 1.443 | 1.638 | 2.003 | 4.164 | 2.468 | 2.166 | 1.584 | 1.654 |
| Total | 18.966 | 18.085 | 20.450 | 26.576 | 25.521 | 26.454 | 30.183 | 31.967 | 27.503 | 37.486 | 35.369 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.4.

Distribución de las aulas y centros educativos incluidos en la muestra ESTUDES, según Comunidad/Ciudad Autónoma de residencia (números absolutos). España, 1994-2016.


| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CENTROS | | | | | | | | | | | | |
| Andalucía | 45 | 45 | 45 | 54 | 60 | 64 | 70 | 77 | 62 | 63 | 110 | 68 |
| Aragón* | 19 | 18 | 18 | 17 | 35 | 32 | 33 | 49 | 63 | 68 | 69 | 69 |
| Asturias* | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 29 | 48 | 63 | 59 | 55 | 53 |
| Baleares | 12 | 12 | 13 | 15 | 32 | 32 | 15 | 41 | 77 | 22 | 20 | 23 |
| Canarias* | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 33 | 57 | 30 | 32 | 92 | 80 |
| Cantabria* | 13 | 12 | 13 | 28 | 29 | 28 | 28 | 39 | 58 | 58 | 50 | 49 |
| Castilla y León | 18 | 19 | 27 | 25 | 30 | 27 | 32 | 35 | 29 | 33 | 61 | 32 |
| Castilla-La Mancha* | 25 | 24 | 17 | 44 | 58 | 22 | 25 | 31 | 29 | 43 | 52 | 53 |
| Cataluña | 44 | 38 | 39 | 37 | 43 | 70 | 53 | 56 | 53 | 55 | 58 | 59 |
| C. Valenciana* | 33 | 33 | 33 | 56 | 37 | 35 | 40 | 46 | 66 | 48 | 78 | 86 |
| Extremadura | 16 | 14 | 16 | 10 | 19 | 31 | 19 | 25 | 22 | 27 | 27 | 23 |
| Galicia* | 23 | 26 | 29 | 25 | 36 | 30 | 39 | 62 | 65 | 60 | 57 | 53 |
| Madrid* | 40 | 37 | 40 | 66 | 75 | 71 | 71 | 85 | 81 | 81 | 98 | 96 |
| Murcia | 16 | 16 | 16 | 17 | 38 | 25 | 25 | 48 | 25 | 27 | 25 | 29 |
| Navarra | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| País Vasco | 26 | 24 | 27 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | 32 | 33 |
| La Rioja* | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 25 | 37 | 12 | 11 | 25 |
| Ceuta* | – | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Melilla | – | – | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 48 | 6 | 23 | 7 |
| Total | 395 | 389 | 404 | 488 | 591 | 573 | 577 | 784 | 857 | 747 | 941 | 863 |
| AULAS | | | | | | | | | | | | |
| Andalucía | 92 | 92 | 90 | 108 | 119 | 128 | 139 | 154 | 125 | 126 | 218 | 136 |
| Aragón* | 38 | 36 | 38 | 31 | 101 | 95 | 92 | 98 | 128 | 136 | 138 | 137 |
| Asturias* | 42 | 36 | 36 | 30 | 35 | 32 | 84 | 96 | 125 | 125 | 106 | 106 |
| Baleares | 29 | 28 | 27 | 24 | 84 | 93 | 30 | 82 | 153 | 43 | 40 | 46 |
| Canarias* | 44 | 46 | 44 | 41 | 46 | 44 | 98 | 114 | 60 | 66 | 182 | 160 |
| Cantabria* | 28 | 28 | 28 | 48 | 58 | 84 | 81 | 78 | 116 | 117 | 98 | 98 |
| Castilla y León | 38 | 40 | 40 | 47 | 58 | 54 | 64 | 70 | 60 | 71 | 121 | 64 |
| Castilla-La Mancha* | 54 | 55 | 55 | 69 | 116 | 44 | 50 | 62 | 63 | 96 | 104 | 106 |
| Cataluña | 88 | 78 | 78 | 74 | 87 | 140 | 103 | 112 | 111 | 115 | 116 | 118 |
| C. Valenciana* | 68 | 65 | 69 | 90 | 72 | 70 | 80 | 92 | 136 | 92 | 154 | 172 |
| Extremadura | 34 | 32 | 53 | 19 | 37 | 92 | 38 | 50 | 45 | 57 | 50 | 46 |
| Galicia* | 56 | 55 | 33 | 43 | 102 | 60 | 116 | 124 | 129 | 120 | 114 | 104 |
| Madrid* | 85 | 80 | 58 | 119 | 144 | 142 | 142 | 170 | 160 | 166 | 196 | 190 |
| Murcia | 34 | 36 | 79 | 29 | 72 | 74 | 75 | 96 | 51 | 55 | 50 | 58 |
| Navarra | 30 | 28 | 26 | 22 | 26 | 28 | 26 | 32 | 32 | 30 | 32 | 36 |
| País Vasco | 52 | 52 | 33 | 40 | 44 | 51 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | 66 |
| La Rioja* | 25 | 29 | 29 | 20 | 22 | 50 | 24 | 50 | 74 | 24 | 22 | 50 |
| Ceuta* | – | 10 | 2 | 15 | 6 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 19 |
| Melilla | – | – | 8 | 6 | 22 | 24 | 10 | 14 | 94 | 12 | 45 | 14 |
| Total | 837 | 826 | 826 | 875 | 1.251 | 1.315 | 1.322 | 1.568 | 1.730 | 1.523 | 1.858 | 1.726 |

* Han ampliado muestra en el año 2016.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.5.


Evolución del tamaño de la muestra (colegios, aulas y alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.6.

Evolución del tamaño de la muestra (alumnos) de la encuesta ESTUDES entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.7.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 38,5 | 36,3 | 40,7 | 21,3 | 19,4 | 23,3 | 36,7 | 35,3 | 38,3 | 40,6 | 38,4 | 42,8 | 50,6 | 47,9 | 53,3 | 62,7 | 59,4 | 66,5 | 36,7 | 34,6 | 38,9 |
| Cigarrillos electrónicos | 20,1 | 22,6 | 17,5 | 12,8 | 14,5 | 11,1 | 21,2 | 23,7 | 18,4 | 21,4 | 23,9 | 19,0 | 23,8 | 26,5 | 21,1 | 26,8 | 31,9 | 21,0 | 19,6 | 21,8 | 17,2 |
| Cigarrillos electrónicos con nicotina | 8,9 | 9,4 | 8,5 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 9,0 | 9,4 | 8,5 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 11,7 | 12,1 | 11,2 | 12,6 | 15,6 | 9,3 | 8,7 | 8,9 | 8,4 |
| Cigarrillos electrónicos sin nicotina | 14,6 | 17,0 | 12,2 | 10,1 | 11,6 | 8,6 | 15,8 | 18,1 | 13,3 | 15,7 | 18,4 | 13,2 | 16,7 | 19,7 | 13,8 | 17,6 | 20,6 | 14,1 | 14,4 | 16,7 | 12,1 |
| Cigarrillos electrónicos de los 2 tipos | 4,7 | 5,2 | 4,2 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 5,7 | 7,3 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 4,2 |
| Alcohol | 76,9 | 75,7 | 78,2 | 57,1 | 55,9 | 58,2 | 75,4 | 73,1 | 77,9 | 83,1 | 82,0 | 84,3 | 89,9 | 89,7 | 90,0 | 91,9 | 91,3 | 92,6 | 75,8 | 74,5 | 77,2 |
| Borracheras | 48,9 | 46,4 | 51,4 | 23,1 | 19,9 | 26,4 | 42,4 | 39,2 | 45,7 | 55,9 | 53,6 | 58,2 | 69,7 | 68,5 | 70,9 | 74,7 | 73,0 | 76,6 | 47,0 | 44,3 | 49,7 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 17,9 | 14,4 | 21,5 | 14,1 | 12,6 | 15,7 | 17,2 | 13,6 | 21,0 | 17,9 | 14,3 | 21,4 | 20,7 | 15,8 | 25,5 | 25,9 | 19,8 | 32,8 | 17,3 | 14,0 | 20,7 |
| Hipnosedantes sin receta | 8,0 | 6,3 | 9,8 | 5,7 | 4,7 | 6,8 | 7,8 | 6,1 | 9,6 | 8,3 | 6,5 | 10,2 | 9,4 | 7,3 | 11,5 | 11,6 | 8,9 | 14,6 | 7,8 | 6,1 | 9,4 |
| Cannabis | 31,1 | 33,2 | 28,9 | 13,9 | 15,2 | 12,6 | 26,7 | 28,9 | 24,4 | 33,7 | 36,6 | 30,8 | 45,2 | 48,0 | 42,5 | 55,6 | 56,3 | 54,7 | 29,3 | 31,5 | 27,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 3,2 | 4,1 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 2,4 | 3,6 | 5,3 | 2,0 | 7,9 | 10,4 | 5,0 | 2,8 | 3,6 | 2,0 |
| Cocaína en polvo | 2,6 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 2,4 | 2,9 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 3,1 | 4,6 | 1,7 | 7,0 | 9,2 | 4,4 | 2,3 | 3,0 | 1,5 |
| Cocaína base | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 2,6 | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,2 |
| Éxtasis | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 3,4 | 4,4 | 2,5 | 5,1 | 5,6 | 4,5 | 2,1 | 2,5 | 1,7 |
| Anfetaminas/speed | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 1,3 | 4,0 | 5,3 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 1,1 |
| Alucinógenos | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 4,1 | 5,3 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 1,0 |
| Heroína | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,5 |
| Inhalables volátiles | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
| GHB | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 |
| Metanfetamina | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,1 | 3,2 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| Setas mágicas | 1,4 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 3,1 | 5,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 0,8 |
| E. anabolizantes | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |

1.2.7. (continuación)

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | |
| Sustancias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| estimulantes | 27,2 | 29,5 | 24,9 | 21,6 | 24,1 | 19,0 | 27,6 | 29,6 | 25,6 | 27,3 | 29,2 | 25,4 | 30,6 | 33,5 | 27,8 | 36,0 | 37,8 | 34,0 | 26,6 | 28,8 | 24,3 | |
| Metilfenidato | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | |
| Piracetam | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | |
| Modafinilo | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |
| Donepezilo | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
| Durbitan | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |
| Eivanse, Adderall | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |
| Complejos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vitamínicos | 2,5 | 1,9 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 1,2 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 4,8 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | |
| Ginkgo, guaraná, ácidos grasos... | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | |
| Anfetaminas o speed para estudiar | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | |
| Cocaína | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 2,7 | 4,2 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | |
| Bebidas energéticas para estudiar | 21,3 | 23,9 | 18,6 | 17,1 | 19,5 | 14,7 | 21,7 | 24,0 | 19,2 | 21,3 | 23,8 | 18,9 | 23,5 | 27,2 | 20,0 | 28,9 | 30,8 | 26,6 | 20,7 | 23,4 | 18,1 | |
| Nuevas sustancias | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | |
| Ketamina | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |
| Spice | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | |
| Mefedrona | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | |
| Salvia | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | |
| Alguna droga ilegal* | 32,6 | 35,0 | 30,3 | 15,3 | 16,6 | 14,1 | 28,5 | 30,8 | 26,1 | 35,2 | 38,4 | 32,1 | 46,4 | 49,5 | 43,4 | 57,0 | 58,1 | 55,7 | 30,9 | 33,2 | 28,5 | |
| Alguna droga ilegal sin cannabis** | 5,6 | 6,7 | 4,5 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 5,5 | 6,2 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 4,3 | 7,0 | 9,3 | 4,9 | 12,1 | 14,9 | 8,9 | 5,1 | 6,0 | 4,1 | |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

** Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.8.

Prevalencia de consumo de drogas y situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 34,7 | 32,6 | 36,9 | 19,8 | 17,5 | 22,2 | 33,8 | 32,1 | 35,6 | 36,7 | 34,7 | 38,7 | 44,5 | 42,2 | 46,7 | 55,6 | 52,3 | 59,4 | 33,2 | 31,0 | 35,4 |
| Alcohol | 75,6 | 74,3 | 76,9 | 55,3 | 53,8 | 56,8 | 73,9 | 71,4 | 76,6 | 82,1 | 81,0 | 83,2 | 88,7 | 88,4 | 88,9 | 90,6 | 90,6 | 90,7 | 74,5 | 73,0 | 75,9 |
| Borracheras | 42,4 | 40,1 | 44,8 | 18,8 | 15,3 | 22,3 | 36,1 | 33,0 | 39,3 | 49,3 | 47,4 | 51,2 | 61,5 | 60,6 | 62,3 | 65,4 | 64,7 | 66,1 | 40,7 | 38,2 | 43,3 |
| Botellón | 52,0 | 50,3 | 53,8 | 28,0 | 24,8 | 31,3 | 47,7 | 45,2 | 50,4 | 61,1 | 59,4 | 62,8 | 68,9 | 68,3 | 69,4 | 68,1 | 71,3 | 64,5 | 50,9 | 48,7 | 53,1 |
| Bebidas alcohólicas y cannabis | 15,2 | 16,5 | 13,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 12,4 | 12,9 | 11,9 | 17,1 | 19,0 | 15,3 | 24,1 | 27,0 | 21,4 | 27,9 | 30,1 | 25,3 | 14,3 | 15,5 | 13,2 |
| Bebidas alcohólicas y cocaína en polvo y/o base | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 5,7 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 11,6 | 8,8 | 14,4 | 9,0 | 7,9 | 10,2 | 10,7 | 8,0 | 13,6 | 12,1 | 8,9 | 15,1 | 13,6 | 9,8 | 17,3 | 16,2 | 11,5 | 21,5 | 11,3 | 8,6 | 14,0 |
| Hipnosedantes sin receta | 5,4 | 4,1 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 4,3 | 4,9 | 3,5 | 6,3 | 5,9 | 4,4 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | 7,9 | 8,2 | 6,0 | 10,8 | 5,2 | 3,9 | 6,4 |
| Cannabis | 26,3 | 28,1 | 24,4 | 11,1 | 11,8 | 10,5 | 23,1 | 24,5 | 21,6 | 29,2 | 31,8 | 26,7 | 38,1 | 40,7 | 35,6 | 45,0 | 47,9 | 41,8 | 24,9 | 26,6 | 23,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 2,5 | 3,3 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 1,4 | 6,1 | 8,7 | 3,2 | 2,2 | 2,9 | 1,5 |
| Cocaína en polvo | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 5,5 | 7,5 | 3,2 | 1,9 | 2,5 | 1,3 |
| Cocaína base | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 2,4 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| Éxtasis | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 3,4 | 1,4 | 3,1 | 4,3 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,1 |
| Anfetaminas/speed | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | 0,7 | 2,8 | 4,3 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |
| Alucinógenos | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 2,1 | 0,6 | 2,1 | 3,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| Heroína | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| Inhalables volátiles | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,3 |
| GHB | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Metanfetamina | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 2,4 | 3,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
| Setas mágicas | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 1,9 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,5 |
| Esteroides anabolizantes | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |

1.2.8. (continuación)

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Nuevas sustancias | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |
| Ketamina | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Spice | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
| Mefedrona | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| Salvia | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Conducir + alcohol | 2,5 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 2,9 | 0,5 | 2,6 | 3,9 | 1,3 | 4,2 | 6,4 | 1,9 | 5,4 | 8,3 | 2,1 | 2,3 | 3,5 | 1,0 |
| Conducir + hachís | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 2,4 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,9 | 4,7 | 1,1 | 3,9 | 5,3 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | 0,7 |
| Conducir + cocaína | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Pasajero + alcohol | 17,2 | 16,4 | 17,9 | 8,6 | 7,7 | 9,6 | 13,4 | 12,8 | 14,1 | 19,0 | 17,8 | 20,2 | 24,5 | 24,4 | 24,6 | 30,8 | 30,6 | 31,0 | 16,2 | 15,3 | 17,0 |
| Pasajero + hachís | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,2 | 9,7 | 8,7 | 14,7 | 15,3 | 14,1 | 22,1 | 23,7 | 20,3 | 8,1 | 8,3 | 8,0 |
| Pasajero + cocaína | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 1,8 | 4,4 | 5,6 | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
| Accidente | 1,7 | 2,6 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 2,6 | 3,9 | 1,3 | 2,8 | 4,5 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 0,8 |
| Accidente + alcohol | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Accidente + hachís | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Pelea | 14,1 | 18,5 | 9,7 | 10,8 | 13,9 | 7,7 | 14,4 | 18,6 | 10,0 | 14,5 | 19,3 | 10,0 | 15,4 | 20,6 | 10,3 | 19,9 | 26,1 | 12,9 | 13,7 | 17,9 | 9,4 |
| Pelea + alcohol | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 4,2 | 4,9 | 3,4 | 5,9 | 7,0 | 4,8 | 7,3 | 9,5 | 5,2 | 11,1 | 14,8 | 6,9 | 4,8 | 5,7 | 3,8 |
| Pelea + hachís | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 3,1 | 1,6 | 2,8 | 3,7 | 2,0 | 3,3 | 4,9 | 1,9 | 5,2 | 7,2 | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 1,5 |
| Tratamiento hachís* | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |
| Alguna droga ilegal** | 27,1 | 29,1 | 25,1 | 11,8 | 12,4 | 11,1 | 24,1 | 25,8 | 22,4 | 30,0 | 32,8 | 27,3 | 38,9 | 41,8 | 36,2 | 46,1 | 49,2 | 42,6 | 25,7 | 27,6 | 23,9 |
| Alguna droga ilegal sin cannabis*** | 3,7 | 4,8 | 2,6 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 3,6 | 4,2 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 2,7 | 4,9 | 7,0 | 2,8 | 8,0 | 11,1 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 2,5 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Porcentaje de estudiantes de 14-18 años que en los últimos 12 meses han iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de hachís o marihuana.

** Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

*** Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.9.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 27,3 | 25,6 | 29,0 | 14,6 | 12,9 | 16,4 | 26,1 | 24,3 | 28,1 | 28,3 | 26,9 | 29,8 | 35,8 | 34,3 | 37,3 | 48,0 | 45,9 | 50,4 | 25,8 | 24,1 | 27,5 |
| Alcohol | 67,0 | 65,9 | 68,1 | 46,1 | 44,4 | 47,8 | 64,6 | 62,8 | 66,6 | 73,1 | 72,4 | 73,8 | 81,2 | 80,8 | 81,6 | 84,5 | 85,4 | 83,5 | 65,7 | 64,4 | 67,0 |
| Borracheras | 21,8 | 21,2 | 22,3 | 7,9 | 6,5 | 9,2 | 15,8 | 14,4 | 17,4 | 25,6 | 25,1 | 26,1 | 33,9 | 35,3 | 32,6 | 40,4 | 40,5 | 40,3 | 20,4 | 19,7 | 21,1 |
| Binge drinking | 31,7 | 32,3 | 31,0 | 13,9 | 13,2 | 14,6 | 26,4 | 25,5 | 27,3 | 35,9 | 37,0 | 34,7 | 45,0 | 47,5 | 42,6 | 56,6 | 58,9 | 54,0 | 29,8 | 30,2 | 29,5 |
| Bebidas energéticas | 42,7 | 52,6 | 32,6 | 40,7 | 50,5 | 30,8 | 44,9 | 54,2 | 35,0 | 42,1 | 52,5 | 31,9 | 42,0 | 52,5 | 31,7 | 47,8 | 56,0 | 38,3 | 42,3 | 52,3 | 32,2 |
| Bebidas energéticas + alcohol | 15,0 | 16,7 | 13,2 | 8,0 | 9,3 | 6,8 | 14,3 | 16,0 | 12,6 | 16,4 | 18,3 | 14,5 | 19,6 | 21,7 | 17,5 | 23,4 | 25,1 | 21,5 | 14,4 | 16,1 | 12,7 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 5,9 | 4,4 | 7,3 | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 6,1 | 4,3 | 7,8 | 6,6 | 4,5 | 8,6 | 8,7 | 5,8 | 12,0 | 5,7 | 4,3 | 7,0 |
| Hipnosedantes sin receta | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 3,2 | 2,1 | 4,1 | 4,4 | 3,1 | 5,8 | 2,5 | 1,9 | 3,1 |
| Cannabis | 18,3 | 20,8 | 15,9 | 8,1 | 9,1 | 7,1 | 16,7 | 18,4 | 15,0 | 20,2 | 23,0 | 17,4 | 25,6 | 29,5 | 22,0 | 32,0 | 36,5 | 26,9 | 17,3 | 19,5 | 15,1 |
| Principalmente marihuana | 7,9 | 8,7 | 7,1 | 3,1 | 3,6 | 2,7 | 6,7 | 7,4 | 6,0 | 8,7 | 9,4 | 8,0 | 11,8 | 13,1 | 10,6 | 14,8 | 16,2 | 13,2 | 7,4 | 8,2 | 6,7 |
| Principalmente hachis | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,8 | 4,4 | 3,1 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| De los 2 tipos | 5,7 | 6,9 | 4,4 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 5,2 | 6,0 | 4,4 | 6,4 | 8,0 | 4,8 | 8,5 | 10,8 | 6,3 | 10,0 | 12,2 | 7,6 | 5,4 | 6,5 | 4,2 |
| En forma de porros o canutos | 16,5 | 18,7 | 14,3 | 6,3 | 6,8 | 5,8 | 14,7 | 16,2 | 13,1 | 18,3 | 20,9 | 15,6 | 23,9 | 27,5 | 20,4 | 30,5 | 35,0 | 25,3 | 15,5 | 17,4 | 13,5 |
| Pipas de agua, bongs | 2,9 | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 2,9 | 3,7 | 1,9 | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 5,1 | 2,8 | 3,8 | 5,4 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 2,1 |
| Usando cigarrillos electrónicos | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Por vía oral | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
| Cannabis + tabaco | 13,3 | 14,9 | 11,7 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 11,5 | 12,8 | 10,2 | 15,0 | 16,9 | 13,2 | 20,2 | 23,0 | 17,6 | 25,6 | 28,7 | 22,0 | 12,4 | 13,8 | 11,1 |

1.2.9. (continuación)

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|------|-----------------|-----|-----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | |
| Cocaína | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| polvo y/o base | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 0,3 | 2,4 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | |
| Cocaína en polvo | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 2,2 | 3,1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | |
| Cocaína base | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | |
| Éxtasis | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | |
| Anfetaminas/speed | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | |
| Alucinógenos | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |
| Heroína | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |
| Inhalables volátiles | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
| GHB | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| Metanfetamina | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | |
| Setas mágicas | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | |
| Esteroides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| anabolizantes | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| Nuevas sustancias | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | |
| Ketamina | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| Spice | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
| Mefedrona | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
| Salvia | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | |
| Alguna droga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ilegal* | 18,9 | 21,5 | 16,3 | 8,5 | 9,4 | 7,5 | 17,4 | 19,2 | 15,4 | 20,7 | 23,7 | 17,8 | 26,2 | 30,2 | 22,3 | 32,9 | 37,8 | 27,4 | 17,9 | 20,2 | 15,5 | |
| Alguna droga ilegal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sin cannabis** | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 1,9 | 3,3 | 0,7 | 3,2 | 4,7 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con o sin receta, ni inhalables volátiles, porque todos ellos se pueden comprar en tiendas y son legales, es ilegal la manera de usarlos = cannabis + cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

** Alguna droga ilegal sin cannabis: incluye cocaína polvo + cocaína base + heroína + anfetaminas + éxtasis + alucinógenos + GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.10.

Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|-----|-----|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 9,7 | 9,3 | 10,1 | 13,5 | 13,7 | 13,3 | 22,1 | 20,4 | 24,0 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
| Alcohol | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
| Borracheras | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Binge drinking | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 3,1 | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 3,4 | 5,4 | 2,6 | 2,2 | 2,9 |
| Hipnosedantes sin receta | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Cannabis | 2,0 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 2,3 | 2,9 | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 1,8 | 3,9 | 4,5 | 3,1 | 1,8 | 2,6 | 1,1 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.11.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.12.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



| | 2016 |
|--------------------------|------|
| Alcohol | 75,6 |
| Tabaco | 34,7 |
| Cannabis | 26,3 |
| Hipnosedantes* | 11,6 |
| Hipnosedantes** | 5,4 |
| Nuevas sustancias | 3,1 |
| Cocaína polvo y/o base | 2,5 |
| Cocaína en polvo | 2,1 |
| Éxtasis | 1,6 |
| Cocaína base | 1,2 |
| Anfetaminas/speed | 1,2 |
| Metanfetamina | 1,0 |
| Alucinógenos | 1,0 |
| Setas mágicas | 0,9 |
| Spice | 0,7 |
| Inhalables volátiles | 0,6 |
| Heroína | 0,6 |
| GHB | 0,4 |
| Salvia | 0,4 |
| Mefedrona | 0,4 |
| Ketamina | 0,3 |
| Esteroides anabolizantes | 0,3 |


* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.13.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



2016

| | |
|--------------------------|------|
| Alcohol | 67,0 |
| Tabaco | 27,3 |
| Cannabis | 18,3 |
| Hipnosedantes* | 5,9 |
| Hipnosedantes** | 2,6 |
| Nuevas sustancias | 1,7 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,0 |
| Cocaína en polvo | 0,8 |
| Éxtasis | 0,6 |
| Cocaína base | 0,5 |
| Anfetaminas/speed | 0,5 |
| Metanfetamina | 0,4 |
| Alucinógenos | 0,4 |
| Setas mágicas | 0,3 |
| Heroína | 0,3 |
| Inhalables volátiles | 0,3 |
| Spice | 0,3 |
| GHB | 0,2 |
| Esteroides anabolizantes | 0,2 |
| Salvia | 0,2 |
| Ketamina | 0,2 |
| Mefedrona | 0,2 |


* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.14.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.15.

Prevalencia de consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

| Droga | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días | A diario en los últimos 30 días |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Tabaco | 38,5 | 34,7 | 27,3 | 8,8 |
| Alcohol | 76,9 | 75,6 | 67,0 | 1,6 |
| Hipnosedantes* | 17,9 | 11,6 | 5,9 | 2,7 |
| Hipnosedantes** | 8,0 | 5,4 | 2,6 | 1,1 |
| Cannabis | 31,1 | 26,3 | 18,3 | 2,0 |
| Éxtasis | 2,3 | 1,6 | 0,6 | - |
| Alucinógenos | 1,6 | 1,0 | 0,4 | - |
| Anfetaminas | 1,7 | 1,2 | 0,5 | - |
| Cocaína polvo y/o base | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 0,3 |
| Cocaína polvo | 2,6 | 2,1 | 0,8 | 0,2 |
| Cocaína base | 1,7 | 1,2 | 0,5 | 0,2 |
| Heroína | 0,8 | 0,6 | 0,3 | - |
| Inhalables volátiles | 1,0 | 0,6 | 0,3 | - |
| GHB | 0,6 | 0,4 | 0,2 | - |
| Metanfetamina | 1,4 | 1,0 | 0,4 | - |
| Setas mágicas | 1,4 | 0,9 | 0,3 | - |
| Esteroides anabolizantes | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - |

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.16.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tabaco | 60,6 | 64,4 | 63,4 | 61,8 | 59,8 | 60,4 | 46,1 | 44,6 | 39,8 | 43,8 | 38,4 | 38,5 |
| Alcohol | 84,1 | 84,2 | 86,0 | 78,0 | 76,6 | 82,0 | 79,6 | 81,2 | 75,1 | 83,9 | 78,9 | 76,9 |
| Hipnosedantes* | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,5 | 10,0 | 12,1 | 17,3 | 18,0 | 18,5 | 16,1 | 17,9 |
| Hipnosedantes** | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 9,4 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 8,0 |
| Cannabis | 20,9 | 26,4 | 29,5 | 33,2 | 37,5 | 42,7 | 36,2 | 35,2 | 33,0 | 33,6 | 29,1 | 31,1 |
| Éxtasis | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 6,2 | 6,4 | 5,0 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,3 |
| Alucinógenos | 5,1 | 6,8 | 5,5 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 1,6 |
| Anfetaminas | 4,2 | 5,3 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | 1,7 |
| Cocaína polvo y/o base | 2,5 | 3,4 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 5,7 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| Heroína | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Inhalables volátiles | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,6 |
| Metanfetaminas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,4 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,4 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,5 |

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.17.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tabaco | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 38,1 | 32,4 | 35,3 | 31,4 | 34,7 |
| Alcohol | 82,7 | 82,4 | 83,8 | 77,3 | 75,6 | 81,0 | 74,9 | 72,9 | 73,6 | 81,9 | 76,8 | 75,6 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 10,1 | 9,8 | 11,6 | 10,8 | 11,6 |
| Hipnosedantes** | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,4 |
| Cannabis | 18,2 | 23,4 | 25,7 | 28,8 | 32,8 | 36,6 | 29,8 | 30,5 | 26,4 | 26,6 | 25,4 | 26,3 |
| Éxtasis | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 5,2 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 1,6 |
| Alucinógenos | 4,4 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| Anfetaminas | 3,5 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Heroína | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Inhalables volátiles | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| Metanfetamina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,9 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.18.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tabaco | 31,1 | 32,5 | 31,9 | 32,1 | 29,4 | 28,7 | 27,8 | 32,4 | 26,2 | 29,7 | 25,9 | 27,3 |
| Alcohol | 75,1 | 66,7 | 68,1 | 60,2 | 56,0 | 65,6 | 58,0 | 58,5 | 63,0 | 74,0 | 68,2 | 67,0 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 5,1 | 5,2 | 6,6 | 6,2 | 5,9 |
| Hipnosedantes** | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| Cannabis | 12,4 | 15,7 | 17,2 | 20,8 | 22,5 | 25,1 | 20,1 | 20,1 | 17,2 | 16,1 | 18,6 | 18,3 |
| Éxtasis | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
| Alucinógenos | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| Anfetaminas | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,0 |
| Heroína | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Inhalables volátiles | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| Metanfetamina | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 |

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.19.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tabaco | 21,6 | 23,7 | 23,1 | 23,0 | 21,0 | 21,5 | 14,8 | 14,8 | 12,3 | 12,5 | 8,9 | 8,8 |
| Alcohol | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,9 | 6,0 | 2,7 | 1,7 | 1,6 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 2,7 |
| Hipnosedantes** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,1 |
| Cannabis | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 3,7 | 3,8 | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 1,8 | 2,0 |

* Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes/sedantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.20.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tabaco | 21,3 | 36,7 | 40,6 | 50,6 | 62,7 |
| Alcohol | 57,1 | 75,4 | 83,1 | 89,9 | 91,9 |
| Hipnosedantes* | 14,1 | 17,2 | 17,9 | 20,7 | 25,9 |
| Hipnosedantes** | 5,7 | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 11,6 |
| Cannabis | 13,9 | 26,7 | 33,7 | 45,2 | 55,6 |
| Éxtasis | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 5,1 |
| Alucinógenos | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 4,1 |
| Anfetaminas/speed | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 4,0 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 7,9 |
| Cocaína polvo | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 7,0 |
| Cocaína base | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 3,3 |
| Heroína | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| Inhalables volátiles | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,7 |
| GHB | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,4 |
| Metanfetamina | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 3,2 |
| Setas mágicas | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | 3,1 |
| Esteroides anabolizantes | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.21.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tabaco | 19,8 | 33,8 | 36,7 | 44,5 | 55,6 |
| Alcohol | 55,3 | 73,9 | 82,1 | 88,7 | 90,6 |
| Hipnosedantes* | 9,0 | 10,7 | 12,1 | 13,6 | 16,2 |
| Hipnosedantes** | 3,5 | 4,9 | 5,9 | 6,5 | 8,2 |
| Cannabis | 11,1 | 23,1 | 29,2 | 38,1 | 45,0 |
| Éxtasis | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,1 |
| Alucinógenos | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 2,1 |
| Anfetaminas/speed | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,8 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 6,1 |
| Cocaína polvo | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 2,7 | 5,5 |
| Cocaína base | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 2,4 |
| Heroína | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Inhalables volátiles | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,4 |
| GHB | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Metanfetamina | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 2,4 |
| Setas mágicas | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,9 |
| Esteroides anabolizantes | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.22.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tabaco | 14,6 | 26,1 | 28,3 | 35,8 | 48,0 |
| Alcohol | 46,1 | 64,6 | 73,1 | 81,2 | 84,5 |
| Hipnosedantes* | 4,7 | 5,4 | 6,1 | 6,6 | 8,7 |
| Hipnosedantes** | 1,6 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,4 |
| Cannabis | 8,1 | 16,7 | 20,2 | 25,6 | 32,0 |
| Éxtasis | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |
| Alucinógenos | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Anfetaminas/speed | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 |
| Cocaína polvo y/o base | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 2,4 |
| Cocaína polvo | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,2 |
| Cocaína base | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| Heroína | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| Inhalables volátiles | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| GHB | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Metanfetamina | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
| Setas mágicas | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
| Esteroides anabolizantes | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.23.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la edad (%). España, 2016.

| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tabaco | 2,2 | 6,7 | 9,7 | 13,5 | 22,1 |
| Alcohol | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,3 |
| Hipnosedantes* | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 4,3 |
| Hipnosedantes** | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
| Cannabis | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 3,4 | 3,9 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.24.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Tabaco | 56,6 | 65,1 | 58,9 | 69,4 | 57,4 | 68,5 | 57,1 | 66,7 | 54,6 | 64,7 | 56,6 | 64,1 | 42,0 | 49,8 | 42,2 | 47,0 | 35,6 | 43,8 | 41,6 | 46,1 | 36,5 | 40,3 | 36,3 | 40,7 |
| Alcohol | 84,3 | 84,0 | 84,3 | 84,1 | 85,5 | 86,4 | 78,2 | 77,9 | 75,9 | 77,2 | 81,5 | 82,5 | 78,4 | 80,7 | 80,8 | 81,7 | 74,9 | 75,2 | 82,9 | 84,9 | 77,8 | 80,1 | 75,7 | 78,2 |
| Hipnosedantes* | 5,8 | 8,1 | 6,6 | 9,1 | 6,4 | 9,3 | 7,3 | 10,2 | 6,8 | 9,9 | 8,1 | 12,3 | 12,0 | 18,8 | 14,2 | 20,4 | 14,9 | 21,5 | 14,1 | 23,0 | 11,9 | 20,1 | 14,4 | 21,5 |
| Hipnosedantes** | 4,8 | 7,4 | 4,5 | 7,6 | 4,4 | 8,2 | 5,2 | 8,6 | 5,0 | 7,9 | 5,8 | 8,1 | 5,8 | 9,2 | 7,7 | 11,0 | 8,4 | 12,3 | 6,9 | 11,0 | 5,8 | 9,6 | 6,3 | 9,8 |
| Cannabis | 23,8 | 18,0 | 28,8 | 24,2 | 31,6 | 27,6 | 36,2 | 30,1 | 40,6 | 34,6 | 45,3 | 40,2 | 38,0 | 34,6 | 37,8 | 32,8 | 34,9 | 31,1 | 36,3 | 30,7 | 31,5 | 26,8 | 33,2 | 28,9 |
| Éxtasis | 4,7 | 2,5 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 7,6 | 4,8 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 3,9 | 4,2 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 1,6 | 0,8 | 2,7 | 1,9 |
| Alucinógenos | 6,7 | 3,6 | 8,0 | 5,6 | 6,1 | 5,0 | 7,2 | 4,4 | 5,6 | 3,4 | 6,2 | 3,3 | 5,7 | 2,7 | 5,6 | 2,6 | 4,6 | 2,4 | 4,1 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 2,1 | 1,1 |
| Anfetaminas | 5,3 | 3,1 | 6,6 | 4,1 | 5,5 | 3,2 | 5,7 | 3,3 | 6,2 | 4,9 | 6,0 | 3,6 | 4,2 | 2,7 | 4,5 | 2,7 | 3,4 | 1,8 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 1,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 3,1 | 1,9 | 4,0 | 2,8 | 6,5 | 4,4 | 8,4 | 4,5 | 9,0 | 6,4 | 11,3 | 6,8 | 6,8 | 4,7 | 6,3 | 3,8 | 4,8 | 3,0 | 4,8 | 2,5 | 4,2 | 2,9 | 4,1 | 2,2 |
| Heroína | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
| Inhalables volátiles | 4,1 | 2,1 | 4,2 | 2,5 | 5,1 | 3,4 | 5,7 | 3,0 | 4,8 | 2,7 | 5,2 | 2,9 | 4,1 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Metanfetamina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 1,7 | 1,0 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 0,8 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.25.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Tabaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 | 37,5 | 36,0 | 40,1 | 28,1 | 36,4 | 33,1 | 37,5 | 29,6 | 33,2 | 32,6 | 36,9 |
| Alcohol | 82,8 | 82,7 | 82,3 | 82,5 | 83,0 | 84,5 | 77,3 | 77,3 | 74,9 | 76,3 | 80,6 | 81,5 | 73,4 | 76,3 | 71,5 | 74,2 | 73,3 | 73,8 | 80,9 | 82,9 | 75,3 | 78,2 | 74,3 | 76,9 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 11,1 | 8,1 | 12,1 | 7,7 | 12,5 | 8,4 | 14,9 | 7,7 | 13,8 | 8,8 | 14,4 |
| Hipnosedantes** | 3,2 | 5,6 | 3,2 | 5,8 | 3,3 | 5,9 | 3,5 | 6,6 | 3,2 | 5,7 | 4,0 | 5,5 | 3,7 | 5,8 | 4,6 | 6,8 | 4,4 | 6,7 | 4,4 | 7,3 | 3,8 | 6,8 | 4,1 | 6,7 |
| Cannabis | 21,2 | 15,2 | 25,9 | 21,1 | 28,2 | 23,5 | 32,2 | 25,2 | 36,2 | 29,8 | 39,4 | 33,7 | 31,6 | 28,2 | 33,5 | 27,5 | 28,2 | 24,7 | 29,7 | 23,3 | 28,0 | 23,0 | 28,1 | 24,4 |
| Éxtasis | 4,2 | 2,2 | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 6,4 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 3,3 | 1,6 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 1,1 |
| Alucinógenos | 5,7 | 3,1 | 6,9 | 4,5 | 4,8 | 3,2 | 5,5 | 2,9 | 4,4 | 2,0 | 4,4 | 1,8 | 4,1 | 1,6 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 2,9 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |
| Anfetaminas | 4,4 | 2,5 | 5,5 | 3,4 | 4,5 | 2,5 | 4,6 | 2,4 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 3,2 | 1,8 | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 0,7 |
| Cocaína polvo y/o base | 2,3 | 1,2 | 3,3 | 2,2 | 5,4 | 3,6 | 6,4 | 3,1 | 7,5 | 5,1 | 9,4 | 5,1 | 5,2 | 3,1 | 4,9 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 3,4 | 1,6 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 1,6 |
| Heroína | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Inhalables volátiles | 2,5 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,4 | 2,6 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Metanfetamina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,5 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.26.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Tabaco | 26,0 | 36,3 | 26,2 | 38,1 | 25,5 | 37,6 | 27,3 | 37,1 | 25,0 | 33,4 | 25,1 | 32,4 | 24,8 | 30,6 | 30,9 | 33,8 | 23,0 | 29,3 | 28,1 | 31,3 | 24,5 | 27,2 | 25,6 | 29,0 |
| Alcohol | 75,3 | 74,9 | 66,8 | 66,7 | 67,5 | 68,5 | 60,4 | 59,9 | 56,7 | 55,4 | 65,5 | 65,7 | 58,1 | 58,0 | 57,7 | 59,4 | 62,7 | 63,2 | 72,9 | 75,2 | 66,9 | 69,5 | 65,9 | 68,1 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6,1 | 4,0 | 6,6 | 4,7 | 8,5 | 4,2 | 8,1 | 4,4 | 7,3 |
| Hipnosedantes** | 1,9 | 3,3 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 4,3 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 3,3 |
| Cannabis | 15,1 | 9,8 | 18,4 | 13,2 | 20,3 | 14,5 | 24,5 | 16,9 | 28,5 | 19,6 | 28,3 | 22,0 | 22,3 | 18,0 | 23,0 | 17,2 | 19,3 | 15,2 | 18,9 | 13,3 | 21,4 | 15,8 | 20,8 | 15,9 |
| Éxtasis | 2,9 | 1,4 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| Alucinógenos | 3,6 | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Anfetaminas | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 1,2 | 3,2 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 3,7 | 2,8 | 5,1 | 2,6 | 3,1 | 1,6 | 2,7 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 0,5 |
| Heroína | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| Inhalables volátiles | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| Metanfetamina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| Esteroides anabolizantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.27.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Tabaco | 17,8 | 25,4 | 19,0 | 28,1 | 17,9 | 27,5 | 19,3 | 27,0 | 17,2 | 24,2 | 18,9 | 24,1 | 12,5 | 16,9 | 13,3 | 16,4 | 11,0 | 13,6 | 12,0 | 13,1 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 9,0 |
| Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 2,0 | 7,8 | 4,3 | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 1,9 | 1,3 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,3 | 3,0 |
| Hipnosedantes** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
| Cannabis | 1,5 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 2,7 | 0,9 | 5,5 | 1,9 | 5,5 | 2,1 | 7,0 | 2,9 | 4,2 | 2,2 | 4,4 | 1,9 | 4,3 | 1,8 | 3,8 | 1,5 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 1,3 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.28.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

*** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.29.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.



* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.30.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. (%). España, 2016.




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta. *** Cocaína polvo y/o base.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.31.

Prevalencia de consumo de drogas a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



| | Alcohol | Tabaco | Hipnosedantes* | Hipnosedantes** | Cannabis |
|---------|---------|--------|----------------|-----------------|----------|
| Hombres | 1,9 | 8,6 | 2,3 | 1,0 | 2,7 |
| Mujeres | 1,3 | 9,0 | 3,0 | 1,2 | 1,3 |
| Total | 1,6 | 8,8 | 2,7 | 1,1 | 2,0 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.32.

Edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 2016.

| | Hombres | Mujeres |
|---------------------------|---------|---------|
| Alcohol | 13,9 | 14,0 |
| Alcohol (consumo semanal) | 15,1 | 15,1 |
| Borracheras | 14,7 | 14,7 |
| Tabaco | 14,1 | 14,2 |
| Tabaco (consumo diario) | 14,7 | 14,6 |
| Hipnosedantes** | 13,5 | 14,2 |
| Cannabis | 14,8 | 14,9 |
| Cocaína polvo y/o base | 15,1 | 15,0 |
| Heroína | 13,7 | 14,6 |
| Éxtasis | 15,3 | 15,1 |
| Alucinógenos | 15,0 | 15,4 |
| Anfetaminas | 15,1 | 15,0 |
| Sustancias volátiles | 13,9 | 13,7 |
| Hipnosedantes* | 13,2 | 14,1 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.


** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.33.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Éxtasis | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 15,4 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 15,3 | 15,8 | 15,2 | 15,2 |
| Cocaína polvo | – | – | – | – | – | – | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 15,1 | 15,2 |
| Alucinógenos | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,0 | 15,2 |
| Alcohol (consumo semanal) | – | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 15,6 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 15,1 |
| Cocaína polvo y/o base | 15,6 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 15,3 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | 15,0 | 15,1 |
| Anfetaminas | 15,5 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 15,1 |
| Metanfetamina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,1 |
| Setas mágicas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,0 |
| Cannabis | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| Borracheras | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,7 |
| Tabaco (consumo diario) | – | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,2 | 15,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
| Cocaína base | – | – | – | – | – | – | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 15,2 | 14,8 | 14,6 |
| Esteroides anabolizantes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 |
| GHB | – | – | – | – | – | – | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 15,1 | 14,8 | 14,2 |
| Tabaco | 13,9 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,1 |
| Heroína | 14,3 | 14,7 | 14,4 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 14,0 |
| Hipnosedantes** | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,2 | 14,3 | 14,2 | 14,6 | 14,2 | 14,0 |
| Alcohol | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 13,8 | 14,0 |
| Inhalables volátiles | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,8 | 13,2 | 13,4 | 13,9 | 13,8 |
| Hipnosedantes* | – | – | – | – | – | – | 13,8 | 14,0 | 13,9 | 14,3 | 13,9 | 13,7 |




* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.34.

Evolución de la edad media de inicio (años) en el consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2000-2016.



| | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alcohol | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 13,8 | 14,0 |
| Alcohol (consumo semanal) | 14,9 | 15 | 15,1 | 14,9 | 15,6 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 15,1 |
| Borracheras | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 |
| Tabaco | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,1 |
| Tabaco (consumo diario) | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,2 | 15,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
| Hipnosedantes** | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,2 | 14,0 |
| Cannabis | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| Cocaína polvo y/o base | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | 15,0 | 15,1 |
| Heroína | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 14,0 |
| Éxtasis | 15,7 | 15,4 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 15,3 | 15,8 | 15,2 | 15,2 |
| Alucinógenos | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,0 | 15,2 |
| Anfetaminas | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 15,1 |
| Sustancias volátiles | 13,9 | 14,3 | 14 | 13,6 | 13,8 | 13,2 | 13,4 | 13,9 | 13,8 |
| Hipnosedantes* | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 13,9 | 13,7 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.35.

Incidencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 16,3 | 15,0 | 17,7 | 12,6 | 10,8 | 14,6 | 18,6 | 17,8 | 19,5 | 17,4 | 16,0 | 18,8 | 17,5 | 16,6 | 18,4 | 19,9 | 18,8 | 21,3 | 16,1 | 14,8 | 17,5 |
| Alcohol | 47,7 | 47,0 | 48,4 | 39,4 | 38,0 | 40,9 | 52,8 | 49,9 | 56,1 | 54,5 | 54,1 | 55,0 | 51,5 | 55,9 | 46,0 | 54,3 | 55,6 | 52,2 | 47,5 | 46,7 | 48,4 |
| Cannabis | 13,9 | 14,7 | 13,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 14,8 | 15,9 | 13,7 | 16,8 | 18,2 | 15,5 | 17,8 | 19,1 | 16,7 | 19,5 | 20,6 | 18,4 | 13,6 | 14,4 | 12,8 |
| Cocaína en polvo | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 2,7 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 0,8 |
| Cocaína base | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Cocaína | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| polvo y/o base | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 3,3 | 4,8 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.36.

Incidence del consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos* en miles de estudiantes). España, 2016.

| | TOTAL | | | POR EDAD Y SEXO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-----------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|-----|-----|------------|-------|-------|
| | | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tabaco | 184,6 | 87,7 | 96,9 | 44,4 | 19,2 | 25,2 | 46,3 | 23,1 | 23,2 | 51,0 | 23,8 | 27,2 | 33,3 | 16,3 | 16,9 | 9,7 | 5,3 | 4,4 | 174,9 | 82,4 | 92,5 |
| Alcohol | 323,9 | 167,4 | 156,4 | 108,9 | 53,4 | 55,5 | 88,0 | 44,2 | 43,8 | 82,7 | 43,2 | 39,5 | 34,2 | 20,5 | 13,7 | 10,1 | 6,1 | 4,0 | 313,8 | 161,3 | 152,5 |
| Cannabis | 170,0 | 88,9 | 81,1 | 26,3 | 13,1 | 13,2 | 40,5 | 22,0 | 18,5 | 54,5 | 28,4 | 26,0 | 37,5 | 19,1 | 18,4 | 11,2 | 6,3 | 4,9 | 158,8 | 82,6 | 76,1 |
| Cocaína en polvo | 17,7 | 11,0 | 6,6 | 2,3 | 1,7 | 0,5 | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 4,3 | 3,0 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 15,0 | 9,1 | 5,8 |
| Cocaína base | 10,2 | 6,1 | 4,1 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 9,2 | 5,3 | 3,9 |
| Cocaína | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| polvo y/o base | 21,5 | 13,7 | 7,8 | 3,3 | 2,3 | 1,0 | 4,6 | 2,4 | 2,2 | 5,5 | 3,1 | 2,3 | 4,8 | 3,3 | 1,5 | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 18,2 | 11,2 | 7,0 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Notas: Debido al redondeo, la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

En 2016 no se dispone de la desagregación poblacional según sexo y edad, por eso la tabla se ha calculado utilizando el factor de expansión.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.37.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| Andalucía | 2.970 | 52,4 | 47,6 | 25,2 | 20,3 | 28,8 | 18,8 | 6,8 |
| Aragón | 2.781 | 53,2 | 46,8 | 25,1 | 22,4 | 26,7 | 19,5 | 6,3 |
| Asturias | 1.898 | 51,5 | 48,5 | 26,6 | 19,9 | 27,9 | 18,7 | 6,9 |
| Baleares | 913 | 49,3 | 50,7 | 21,5 | 21,9 | 30,3 | 21,0 | 5,4 |
| Canarias | 3.214 | 49,0 | 51,0 | 21,8 | 21,4 | 27,3 | 21,2 | 8,3 |
| Cantabria | 1.859 | 48,5 | 51,5 | 27,1 | 21,5 | 27,1 | 19,5 | 4,7 |
| Castilla y León | 1.220 | 48,7 | 51,3 | 22,1 | 21,1 | 26,9 | 21,9 | 8,0 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 50,2 | 49,8 | 23,1 | 21,5 | 23,6 | 23,9 | 7,9 |
| Cataluña | 2.617 | 50,5 | 49,5 | 32,5 | 19,2 | 22,9 | 20,1 | 5,2 |
| C. Valenciana | 3.502 | 50,7 | 49,3 | 21,8 | 20,9 | 28,6 | 20,9 | 7,8 |
| Extremadura | 817 | 48,8 | 51,2 | 28,1 | 17,7 | 25,3 | 22,5 | 6,4 |
| Galicia | 2.089 | 49,8 | 50,2 | 22,9 | 20,2 | 27,0 | 22,0 | 8,0 |
| Madrid | 4.321 | 50,4 | 49,6 | 25,1 | 19,4 | 23,5 | 23,1 | 8,9 |
| Murcia | 1.259 | 45,8 | 54,2 | 29,1 | 22,6 | 28,3 | 17,3 | 2,7 |
| Navarra | 773 | 49,9 | 50,1 | 26,0 | 20,3 | 29,0 | 19,4 | 5,3 |
| País Vasco | 1.286 | 51,7 | 48,3 | 16,4 | 29,3 | 29,8 | 20,1 | 4,4 |
| La Rioja | 1.076 | 49,6 | 50,4 | 28,7 | 17,9 | 27,8 | 19,7 | 5,8 |
| Ceuta | 319 | 42,4 | 57,6 | 26,0 | 27,3 | 20,1 | 20,1 | 6,4 |
| Melilla | 322 | 55,7 | 44,3 | 21,3 | 29,1 | 37,0 | 10,8 | 1,8 |
| Total | 35.369 | 50,6 | 49,4 | 25,3 | 20,7 | 26,5 | 20,6 | 6,8 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.38.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Alguna vez en la vida | | | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 78,5 | 77,0 | 80,0 | 77,4 | 75,9 | 78,9 | 68,7 | 67,0 | 70,4 |
| Aragón | 2.781 | 82,6 | 81,2 | 84,0 | 81,6 | 80,1 | 83,0 | 73,8 | 72,1 | 75,4 |
| Asturias | 1.898 | 77,7 | 75,8 | 79,6 | 76,3 | 74,4 | 78,3 | 70,6 | 68,6 | 72,7 |
| Baleares | 913 | 79,2 | 76,5 | 81,8 | 78,0 | 75,3 | 80,7 | 68,9 | 65,9 | 71,9 |
| Canarias | 3.214 | 71,8 | 70,2 | 73,3 | 69,9 | 68,3 | 71,5 | 60,9 | 59,2 | 62,5 |
| Cantabria | 1.859 | 77,1 | 75,2 | 79,0 | 75,8 | 73,9 | 77,8 | 68,8 | 66,7 | 70,9 |
| Castilla y León | 1.220 | 80,4 | 78,1 | 82,6 | 79,6 | 77,3 | 81,8 | 71,1 | 68,5 | 73,6 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 81,3 | 79,7 | 83,0 | 80,3 | 78,6 | 82,0 | 72,5 | 70,6 | 74,4 |
| Cataluña | 2.617 | 71,6 | 69,9 | 73,4 | 69,9 | 68,1 | 71,6 | 61,9 | 60,1 | 63,8 |
| C. Valenciana | 3.502 | 81,2 | 79,9 | 82,4 | 79,8 | 78,5 | 81,1 | 72,6 | 71,1 | 74,0 |
| Extremadura | 817 | 80,6 | 77,9 | 83,3 | 79,3 | 76,5 | 82,0 | 69,0 | 65,8 | 72,2 |
| Galicia | 2.089 | 70,6 | 68,6 | 72,6 | 69,3 | 67,3 | 71,2 | 60,3 | 58,2 | 62,4 |
| Madrid | 4.321 | 74,9 | 73,6 | 76,2 | 73,2 | 71,9 | 74,5 | 63,1 | 61,6 | 64,5 |
| Murcia | 1.259 | 76,2 | 73,8 | 78,6 | 75,4 | 73,0 | 77,8 | 67,5 | 64,9 | 70,1 |
| Navarra | 773 | 85,9 | 83,4 | 88,3 | 85,3 | 82,8 | 87,8 | 71,3 | 68,1 | 74,5 |
| País Vasco | 1.286 | 83,5 | 81,4 | 85,5 | 82,0 | 79,9 | 84,1 | 73,1 | 70,7 | 75,5 |
| La Rioja | 1.076 | 78,6 | 76,1 | 81,0 | 77,5 | 75,0 | 80,0 | 70,3 | 67,6 | 73,1 |
| Ceuta | 319 | 38,3 | 33,0 | 43,7 | 37,1 | 31,8 | 42,4 | 31,2 | 26,1 | 36,3 |
| Melilla | 322 | 45,5 | 40,1 | 50,9 | 43,9 | 38,5 | 49,3 | 39,1 | 33,8 | 44,5 |
| Total | 35.369 | 76,9 | 76,5 | 77,4 | 75,6 | 75,1 | 76,0 | 67,0 | 66,5 | 67,5 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.39.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Alguna vez en la vida | | | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 49,9 | 48,1 | 51,7 | 42,8 | 41,1 | 44,6 | 22,2 | 20,7 | 23,7 |
| Aragón | 2.781 | 57,8 | 56,0 | 59,7 | 51,0 | 49,1 | 52,9 | 25,5 | 23,9 | 27,1 |
| Asturias | 1.898 | 46,4 | 44,1 | 48,6 | 41,0 | 38,8 | 43,2 | 22,0 | 20,2 | 23,9 |
| Baleares | 913 | 50,2 | 47,0 | 53,5 | 43,6 | 40,4 | 46,8 | 23,7 | 21,0 | 26,5 |
| Canarias | 3.214 | 39,1 | 37,4 | 40,8 | 31,7 | 30,1 | 33,3 | 13,7 | 12,5 | 14,9 |
| Cantabria | 1.859 | 49,4 | 47,1 | 51,7 | 43,0 | 40,8 | 45,3 | 24,8 | 22,9 | 26,8 |
| Castilla y León | 1.220 | 56,1 | 53,3 | 58,8 | 51,2 | 48,4 | 54,0 | 26,1 | 23,7 | 28,6 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 54,7 | 52,6 | 56,8 | 47,3 | 45,2 | 49,5 | 25,3 | 23,5 | 27,1 |
| Cataluña | 2.617 | 44,1 | 42,2 | 46,0 | 39,4 | 37,5 | 41,3 | 21,1 | 19,6 | 22,7 |
| C. Valenciana | 3.502 | 53,0 | 51,3 | 54,6 | 45,9 | 44,2 | 47,5 | 24,6 | 23,2 | 26,1 |
| Extremadura | 817 | 52,7 | 49,3 | 56,2 | 44,5 | 41,1 | 47,9 | 21,3 | 18,5 | 24,1 |
| Galicia | 2.089 | 42,2 | 40,1 | 44,3 | 36,1 | 34,1 | 38,2 | 16,6 | 15,0 | 18,2 |
| Madrid | 4.321 | 47,2 | 45,7 | 48,7 | 39,8 | 38,4 | 41,3 | 19,3 | 18,1 | 20,4 |
| Murcia | 1.259 | 43,6 | 40,9 | 46,4 | 38,0 | 35,3 | 40,6 | 21,0 | 18,8 | 23,3 |
| Navarra | 773 | 62,5 | 59,1 | 66,0 | 57,6 | 54,1 | 61,1 | 27,8 | 24,6 | 30,9 |
| País Vasco | 1.286 | 56,0 | 53,3 | 58,7 | 49,2 | 46,5 | 51,9 | 25,1 | 22,7 | 27,4 |
| La Rioja | 1.076 | 53,7 | 50,7 | 56,7 | 48,3 | 45,3 | 51,3 | 24,8 | 22,2 | 27,4 |
| Ceuta | 319 | 19,8 | 15,4 | 24,2 | 14,2 | 10,4 | 18,0 | 7,6 | 4,7 | 10,5 |
| Melilla | 322 | 20,5 | 16,1 | 24,9 | 15,5 | 11,6 | 19,5 | 8,6 | 5,5 | 11,7 |
| Total | 35.369 | 48,9 | 48,4 | 49,4 | 42,4 | 41,9 | 42,9 | 21,8 | 21,3 | 22,2 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.40.

Prevalencia de binge drinking entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 33,0 | 31,3 | 34,7 |
| Aragón | 2.781 | 37,3 | 35,5 | 39,1 |
| Asturias | 1.898 | 35,2 | 33,1 | 37,4 |
| Baleares | 913 | 30,4 | 27,4 | 33,4 |
| Canarias | 3.214 | 24,7 | 23,2 | 26,2 |
| Cantabria | 1.859 | 33,2 | 31,0 | 35,3 |
| Castilla y León | 1.220 | 36,1 | 33,4 | 38,8 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 37,5 | 35,4 | 39,5 |
| Cataluña | 2.617 | 27,4 | 25,7 | 29,1 |
| C. Valenciana | 3.502 | 36,9 | 35,3 | 38,4 |
| Extremadura | 817 | 36,0 | 32,8 | 39,3 |
| Galicia | 2.089 | 24,7 | 22,8 | 26,5 |
| Madrid | 4.321 | 28,2 | 26,9 | 29,6 |
| Murcia | 1.259 | 33,8 | 31,2 | 36,4 |
| Navarra | 773 | 36,2 | 32,8 | 39,6 |
| País Vasco | 1.286 | 34,8 | 32,1 | 37,4 |
| La Rioja | 1.076 | 36,9 | 34,0 | 39,8 |
| Ceuta | 319 | 10,6 | 7,2 | 14,0 |
| Melilla | 322 | 13,8 | 10,0 | 17,6 |
| Total | 35.369 | 31,7 | 31,2 | 32,1 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.41.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| Muestra | Alguna vez en la vida | | | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | | A diario en los últimos 30 días | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|
| | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | |
| Andalucía | 2.970 | 37,6 | 35,9 | 39,3 | 34,2 | 32,5 | 35,9 | 27,5 | 25,9 | 29,2 | 8,6 | 7,6 | 9,6 |
| Aragón | 2.781 | 42,6 | 40,7 | 44,4 | 37,9 | 36,1 | 39,7 | 29,8 | 28,1 | 31,5 | 11,4 | 10,2 | 12,6 |
| Asturias | 1.898 | 36,0 | 33,8 | 38,2 | 32,9 | 30,7 | 35,0 | 25,9 | 23,9 | 27,9 | 8,3 | 7,0 | 9,5 |
| Baleares | 913 | 40,4 | 37,2 | 43,6 | 36,0 | 32,9 | 39,2 | 28,5 | 25,6 | 31,4 | 9,2 | 7,3 | 11,0 |
| Canarias | 3.214 | 33,5 | 31,9 | 35,1 | 28,4 | 26,9 | 30,0 | 22,2 | 20,7 | 23,6 | 6,1 | 5,3 | 6,9 |
| Cantabria | 1.859 | 35,8 | 33,6 | 38,0 | 33,0 | 30,8 | 35,1 | 26,1 | 24,1 | 28,1 | 8,9 | 7,6 | 10,2 |
| Castilla y León | 1.220 | 41,9 | 39,2 | 44,7 | 37,4 | 34,7 | 40,1 | 31,1 | 28,5 | 33,7 | 11,7 | 9,9 | 13,6 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 38,1 | 36,0 | 40,1 | 34,1 | 32,1 | 36,1 | 26,4 | 24,5 | 28,3 | 8,0 | 6,9 | 9,2 |
| Cataluña | 2.617 | 39,8 | 38,0 | 41,7 | 35,6 | 33,8 | 37,5 | 26,9 | 25,2 | 28,6 | 9,2 | 8,1 | 10,3 |
| C. Valenciana | 3.502 | 41,1 | 39,5 | 42,8 | 37,2 | 35,6 | 38,8 | 29,1 | 27,6 | 30,6 | 9,3 | 8,4 | 10,3 |
| Extremadura | 817 | 37,1 | 33,8 | 40,5 | 33,2 | 30,0 | 36,5 | 28,2 | 25,1 | 31,3 | 10,4 | 8,3 | 12,5 |
| Galicia | 2.089 | 33,5 | 31,5 | 35,5 | 31,1 | 29,1 | 33,1 | 22,7 | 20,9 | 24,5 | 6,0 | 5,0 | 7,1 |
| Madrid | 4.321 | 37,7 | 36,2 | 39,1 | 34,0 | 32,6 | 35,5 | 27,2 | 25,9 | 28,5 | 8,1 | 7,3 | 9,0 |
| Murcia | 1.259 | 34,8 | 32,2 | 37,4 | 31,7 | 29,1 | 34,2 | 25,3 | 22,9 | 27,8 | 6,8 | 5,4 | 8,2 |
| Navarra | 773 | 41,0 | 37,5 | 44,5 | 37,0 | 33,6 | 40,4 | 29,7 | 26,5 | 32,9 | 9,7 | 7,6 | 11,8 |
| País Vasco | 1.286 | 44,0 | 41,3 | 46,7 | 40,8 | 38,1 | 43,5 | 30,8 | 28,2 | 33,3 | 11,4 | 9,7 | 13,2 |
| La Rioja | 1.076 | 40,4 | 37,5 | 43,3 | 36,9 | 34,0 | 39,7 | 29,1 | 26,4 | 31,9 | 9,7 | 7,9 | 11,4 |
| Ceuta | 319 | 26,1 | 21,3 | 30,9 | 24,2 | 19,5 | 28,9 | 20,0 | 15,6 | 24,4 | 5,1 | 2,7 | 7,5 |
| Melilla | 322 | 22,3 | 17,7 | 26,8 | 21,3 | 16,8 | 25,7 | 18,9 | 14,6 | 23,2 | 4,9 | 2,5 | 7,2 |
| Total | 35.369 | 38,5 | 38,0 | 39,0 | 34,7 | 34,2 | 35,2 | 27,3 | 26,8 | 27,8 | 8,8 | 8,5 | 9,1 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.42.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Alguna vez en la vida | | | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 26,1 | 24,5 | 27,6 | 21,9 | 20,4 | 23,4 | 15,1 | 13,8 | 16,4 |
| Aragón | 2.781 | 30,7 | 29,0 | 32,5 | 26,2 | 24,6 | 27,8 | 17,9 | 16,5 | 19,3 |
| Asturias | 1.898 | 27,7 | 25,7 | 29,7 | 22,5 | 20,6 | 24,4 | 16,6 | 14,9 | 18,2 |
| Baleares | 913 | 34,2 | 31,1 | 37,3 | 28,3 | 25,4 | 31,2 | 20,1 | 17,5 | 22,7 |
| Canarias | 3.214 | 27,7 | 26,1 | 29,2 | 23,8 | 22,3 | 25,3 | 16,7 | 15,4 | 18,0 |
| Cantabria | 1.859 | 30,2 | 28,1 | 32,3 | 25,5 | 23,5 | 27,5 | 18,6 | 16,9 | 20,4 |
| Castilla y León | 1.220 | 32,2 | 29,6 | 34,8 | 28,1 | 25,6 | 30,6 | 18,5 | 16,3 | 20,7 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 28,6 | 26,6 | 30,5 | 24,2 | 22,3 | 26,0 | 16,4 | 14,9 | 18,0 |
| Cataluña | 2.617 | 34,9 | 33,1 | 36,8 | 28,3 | 26,6 | 30,0 | 20,3 | 18,8 | 21,9 |
| C. Valenciana | 3.502 | 37,2 | 35,6 | 38,8 | 31,7 | 30,1 | 33,2 | 22,8 | 21,5 | 24,2 |
| Extremadura | 817 | 26,8 | 23,7 | 29,8 | 21,3 | 18,5 | 24,1 | 15,4 | 12,9 | 17,8 |
| Galicia | 2.089 | 25,5 | 23,6 | 27,4 | 22,2 | 20,4 | 24,0 | 15,5 | 14,0 | 17,1 |
| Madrid | 4.321 | 31,5 | 30,1 | 32,8 | 26,7 | 25,4 | 28,0 | 17,9 | 16,8 | 19,1 |
| Murcia | 1.259 | 26,0 | 23,6 | 28,5 | 22,3 | 20,0 | 24,6 | 16,4 | 14,4 | 18,5 |
| Navarra | 773 | 38,6 | 35,1 | 42,0 | 33,5 | 30,2 | 36,8 | 22,1 | 19,2 | 25,1 |
| País Vasco | 1.286 | 41,1 | 38,4 | 43,8 | 36,9 | 34,3 | 39,6 | 25,6 | 23,2 | 27,9 |
| La Rioja | 1.076 | 31,6 | 28,8 | 34,4 | 27,0 | 24,4 | 29,7 | 17,7 | 15,4 | 20,0 |
| Ceuta | 319 | 21,9 | 17,4 | 26,4 | 19,0 | 14,7 | 23,3 | 13,2 | 9,5 | 16,9 |
| Melilla | 322 | 21,1 | 16,7 | 25,6 | 16,1 | 12,1 | 20,1 | 12,0 | 8,5 | 15,6 |
| Total | 35.369 | 31,1 | 30,6 | 31,6 | 26,3 | 25,8 | 26,7 | 18,3 | 17,9 | 18,7 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.43.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Alguna vez en la vida | | | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 18,3 | 16,9 | 19,7 | 11,7 | 10,5 | 12,8 | 5,4 | 4,6 | 6,2 |
| Aragón | 2.781 | 14,7 | 13,4 | 16,0 | 9,9 | 8,8 | 11,1 | 4,8 | 4,0 | 5,6 |
| Asturias | 1.898 | 18,5 | 16,8 | 20,3 | 12,6 | 11,1 | 14,1 | 6,0 | 4,9 | 7,0 |
| Baleares | 913 | 18,6 | 16,1 | 21,1 | 11,8 | 9,7 | 13,9 | 6,0 | 4,5 | 7,6 |
| Canarias | 3.214 | 17,6 | 16,3 | 18,9 | 11,6 | 10,5 | 12,7 | 4,9 | 4,2 | 5,7 |
| Cantabria | 1.859 | 16,1 | 14,4 | 17,8 | 11,5 | 10,0 | 12,9 | 5,9 | 4,8 | 6,9 |
| Castilla y León | 1.220 | 15,2 | 13,2 | 17,2 | 9,3 | 7,7 | 11,0 | 4,8 | 3,6 | 6,0 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 12,9 | 11,5 | 14,4 | 8,0 | 6,8 | 9,1 | 3,7 | 2,9 | 4,5 |
| Cataluña | 2.617 | 20,4 | 18,9 | 22,0 | 12,8 | 11,5 | 14,1 | 7,0 | 6,1 | 8,0 |
| C. Valenciana | 3.502 | 20,5 | 19,2 | 21,8 | 13,7 | 12,5 | 14,8 | 7,1 | 6,3 | 8,0 |
| Extremadura | 817 | 16,4 | 13,8 | 18,9 | 10,6 | 8,5 | 12,7 | 4,8 | 3,4 | 6,3 |
| Galicia | 2.089 | 17,5 | 15,8 | 19,1 | 10,8 | 9,5 | 12,2 | 5,4 | 4,5 | 6,4 |
| Madrid | 4.321 | 16,7 | 15,6 | 17,8 | 10,9 | 9,9 | 11,8 | 5,9 | 5,2 | 6,6 |
| Murcia | 1.259 | 19,6 | 17,4 | 21,8 | 14,1 | 12,2 | 16,1 | 6,9 | 5,5 | 8,3 |
| Navarra | 773 | 19,5 | 16,7 | 22,3 | 13,2 | 10,8 | 15,6 | 6,4 | 4,7 | 8,1 |
| País Vasco | 1.286 | 15,4 | 13,5 | 17,4 | 11,0 | 9,2 | 12,7 | 6,2 | 4,9 | 7,5 |
| La Rioja | 1.076 | 14,8 | 12,7 | 16,9 | 9,6 | 7,9 | 11,4 | 5,2 | 3,9 | 6,5 |
| Ceuta | 319 | 12,0 | 8,4 | 15,6 | 7,9 | 5,0 | 10,9 | 4,7 | 2,4 | 7,1 |
| Melilla | 322 | 15,4 | 11,5 | 19,4 | 8,0 | 5,0 | 11,0 | 4,0 | 1,8 | 6,1 |
| Total | 35.369 | 17,9 | 17,5 | 18,3 | 11,6 | 11,3 | 11,9 | 5,9 | 5,6 | 6,1 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.44.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Últimos 12 meses | | | Últimos 30 días | | |
|--------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior | Prevalencia (%) | IC95% inferior | IC95% superior |
| Andalucía | 2.970 | 54,7 | 52,9 | 56,4 | 28,4 | 26,7 | 30,0 |
| Aragón | 2.781 | 62,4 | 60,6 | 64,2 | 27,5 | 25,9 | 29,2 |
| Asturias | 1.898 | 47,2 | 44,9 | 49,4 | 17,9 | 16,2 | 19,7 |
| Baleares | 913 | 49,5 | 46,3 | 52,8 | 24,0 | 21,2 | 26,7 |
| Canarias | 3.214 | 32,5 | 30,8 | 34,1 | 12,3 | 11,2 | 13,5 |
| Cantabria | 1.859 | 57,6 | 55,4 | 59,9 | 36,9 | 34,7 | 39,1 |
| Castilla y León | 1.220 | 59,2 | 56,5 | 62,0 | 26,6 | 24,2 | 29,1 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 62,8 | 60,7 | 64,8 | 33,9 | 31,9 | 35,9 |
| Cataluña | 2.617 | 46,3 | 44,4 | 48,3 | 20,2 | 18,7 | 21,7 |
| C. Valenciana | 3.502 | 52,5 | 50,8 | 54,1 | 24,2 | 22,8 | 25,6 |
| Extremadura | 817 | 70,6 | 67,5 | 73,7 | 35,6 | 32,3 | 38,9 |
| Galicia | 2.089 | 45,7 | 43,6 | 47,9 | 23,2 | 21,4 | 25,1 |
| Madrid | 4.321 | 48,4 | 46,9 | 49,9 | 18,3 | 17,1 | 19,4 |
| Murcia | 1.259 | 55,7 | 53,0 | 58,5 | 26,2 | 23,7 | 28,6 |
| Navarra | 773 | 60,0 | 56,6 | 63,5 | 24,2 | 21,2 | 27,3 |
| País Vasco | 1.286 | 61,7 | 59,0 | 64,4 | 27,8 | 25,3 | 30,2 |
| La Rioja | 1.076 | 55,2 | 52,3 | 58,2 | 26,9 | 24,3 | 29,6 |
| Ceuta | 319 | 23,3 | 18,7 | 28,0 | 13,7 | 9,9 | 17,4 |
| Melilla | 322 | 25,6 | 20,9 | 30,4 | 15,3 | 11,4 | 19,3 |
| Total | 35.369 | 52,0 | 51,5 | 52,6 | 24,1 | 23,7 | 24,6 |

IC95% = Intervalo de confianza del 95%

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.45.

Edad media de inicio en el consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.

| | Muestra | Edad media inicio en el consumo de | | | |
|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | Tabaco | Tabaco diario | Alcohol | Cannabis |
| Andalucía | 2.970 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | 14,9 |
| Aragón | 2.781 | 13,6 | 14,1 | 13,5 | 14,6 |
| Asturias | 1.898 | 14,1 | 14,6 | 13,9 | 14,9 |
| Baleares | 913 | 14,1 | 14,8 | 14,0 | 14,7 |
| Canarias | 3.214 | 14,1 | 14,6 | 14,1 | 14,6 |
| Cantabria | 1.859 | 14,1 | 14,3 | 14,0 | 14,8 |
| Castilla y León | 1.220 | 14,0 | 14,5 | 13,8 | 15,0 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 14,1 | 14,7 | 14,0 | 15,1 |
| Cataluña | 2.617 | 14,0 | 14,6 | 13,9 | 14,6 |
| C. Valenciana | 3.502 | 14,2 | 14,7 | 13,9 | 14,8 |
| Extremadura | 817 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 15,1 |
| Galicia | 2.089 | 14,6 | 15,0 | 14,4 | 15,1 |
| Madrid | 4.321 | 14,2 | 14,9 | 14,1 | 15,0 |
| Murcia | 1.259 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | 14,7 |
| Navarra | 773 | 13,9 | 14,5 | 13,6 | 14,5 |
| País Vasco | 1.286 | 14,2 | 14,7 | 13,7 | 14,7 |
| La Rioja | 1.076 | 14,2 | 14,6 | 13,8 | 14,8 |
| Ceuta | 319 | 14,4 | 15,2 | 14,0 | 15,0 |
| Melilla | 322 | 13,8 | 14,4 | 14,1 | 15,0 |
| Total | 35.369 | 14,1 | 14,6 | 14,0 | 14,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.46.

Distribución de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma según cómo estén informados respecto al tema de las drogas (%). España, 2016.

| | Muestra | Información con respecto al tema de las drogas | |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| | | Perfectamente informado | Mal informado |
| Andalucía | 2.970 | 30,5 | 7,8 |
| Aragón | 2.781 | 31,1 | 6,2 |
| Asturias | 1.898 | 36,7 | 8,1 |
| Baleares | 913 | 33,8 | 8,1 |
| Canarias | 3.214 | 36,8 | 5,9 |
| Cantabria | 1.859 | 38,5 | 8,1 |
| Castilla y León | 1.220 | 35,1 | 4,4 |
| Castilla-La Mancha | 2.133 | 30,6 | 7,9 |
| Cataluña | 2.617 | 28,9 | 8,6 |
| C. Valenciana | 3.502 | 33,0 | 7,4 |
| Extremadura | 817 | 29,7 | 8,6 |
| Galicia | 2.089 | 34,2 | 6,9 |
| Madrid | 4.321 | 31,2 | 6,5 |
| Murcia | 1.259 | 33,6 | 7,2 |
| Navarra | 773 | 25,9 | 6,0 |
| País Vasco | 1.286 | 22,0 | 9,0 |
| La Rioja | 1.076 | 36,6 | 6,8 |
| Ceuta | 319 | 31,7 | 17,9 |
| Melilla | 322 | 32,9 | 19,6 |
| Total | 35.369 | 31,3 | 7,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.47.

Valoración (algo o muy importante) de diversas acciones para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.


| | Campañas publicitarias | Educación en las escuelas | Tratamiento voluntario a consumidores | Tratamiento obligatorio a consumidores | Administración médica de metadona | Administración médica de heroína | Control policial y aduanero | Leyes estrictas contra las drogas | Legalización de cannabis | Legalización de todas las drogas |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Andalucía | 92,6 | 97,3 | 95,2 | 92,0 | 88,0 | 81,2 | 95,4 | 90,9 | 51,2 | 36,9 |
| Aragón | 88,9 | 95,4 | 95,3 | 91,3 | 87,4 | 79,9 | 92,5 | 88,0 | 53,8 | 34,9 |
| Asturias | 89,3 | 95,8 | 95,1 | 91,5 | 88,1 | 78,9 | 92,5 | 87,4 | 53,6 | 35,6 |
| Baleares | 92,0 | 96,5 | 96,1 | 92,9 | 91,0 | 88,4 | 94,2 | 91,3 | 59,3 | 42,5 |
| Canarias | 90,7 | 96,3 | 95,7 | 92,2 | 90,5 | 84,6 | 94,4 | 90,3 | 57,0 | 40,7 |
| Cantabria | 91,3 | 96,4 | 95,1 | 92,9 | 89,3 | 83,0 | 93,0 | 90,2 | 54,8 | 40,5 |
| Castilla y León | 92,7 | 97,4 | 96,3 | 91,7 | 90,3 | 82,8 | 92,7 | 88,9 | 54,1 | 34,8 |
| Castilla-La Mancha | 91,3 | 97,0 | 95,4 | 92,1 | 89,8 | 82,4 | 93,0 | 88,3 | 54,3 | 38,1 |
| Cataluña | 90,9 | 95,0 | 93,9 | 90,2 | 89,5 | 85,5 | 91,4 | 86,7 | 59,1 | 42,6 |
| C. Valenciana | 89,0 | 95,4 | 94,6 | 90,3 | 88,6 | 82,4 | 92,6 | 88,2 | 56,1 | 37,2 |
| Extremadura | 94,6 | 97,4 | 96,6 | 93,0 | 91,1 | 82,4 | 95,0 | 91,1 | 51,7 | 34,9 |
| Galicia | 91,2 | 96,7 | 95,7 | 91,6 | 89,8 | 81,3 | 93,2 | 89,2 | 52,2 | 33,0 |
| Madrid | 91,9 | 97,3 | 95,8 | 92,4 | 90,8 | 82,6 | 93,8 | 89,4 | 55,3 | 36,7 |
| Murcia | 92,9 | 95,7 | 96,2 | 93,5 | 91,6 | 85,8 | 92,6 | 90,1 | 53,5 | 40,4 |
| Navarra | 90,8 | 95,4 | 96,1 | 89,6 | 85,5 | 77,1 | 88,1 | 82,9 | 64,3 | 39,6 |
| País Vasco | 88,6 | 95,0 | 94,2 | 90,8 | 84,8 | 74,3 | 89,8 | 85,1 | 60,6 | 39,8 |
| La Rioja | 90,6 | 96,3 | 94,1 | 90,0 | 91,0 | 83,1 | 93,5 | 87,6 | 55,3 | 36,1 |
| Ceuta | 93,0 | 95,0 | 97,5 | 93,5 | 92,0 | 84,0 | 94,5 | 92,9 | 59,0 | 49,9 |
| Melilla | 84,1 | 95,5 | 91,7 | 86,7 | 87,5 | 80,7 | 91,7 | 87,9 | 55,8 | 49,7 |
| Total | 91,3 | 96,4 | 95,2 | 91,6 | 89,3 | 82,5 | 93,2 | 88,9 | 55,1 | 38,0 |

* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.48.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





68,7 73,8 70,6 68,9 60,9 68,8 71,1 72,5 61,9 72,6 69,0 60,3 63,1 67,5 71,3 73,1 70,3 31,2 39,1

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 66,5; Límite superior: 67,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.49.

Prevalencia de consumo de tabaco a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 8,6 | 11,4 | 8,3 | 9,2 | 6,1 | 8,9 | 11,7 | 8,0 | 9,2 | 9,3 | 10,4 | 6,0 | 8,1 | 6,8 | 9,7 | 11,4 | 9,7 | 5,1 | 4,9 |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|

Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 8,5; Límite superior: 9,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.50.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15,1 | 17,9 | 16,6 | 20,1 | 16,7 | 18,6 | 18,5 | 16,4 | 20,3 | 22,8 | 15,4 | 15,5 | 17,9 | 16,4 | 22,1 | 25,6 | 17,7 | 13,2 | 12,0 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 17,9; Límite superior: 18,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.51.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





22,2 25,5 22,0 23,7 13,7 24,8 26,1 25,3 21,1 24,6 21,3 16,6 19,3 21,0 27,8 25,1 24,8 7,6 8,6

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 21,3; Límite superior: 22,2

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.52.

Prevalencias de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 33,0 | 37,3 | 35,2 | 30,4 | 24,7 | 33,2 | 36,1 | 37,5 | 27,4 | 36,9 | 36,0 | 24,7 | 28,2 | 33,8 | 36,2 | 34,8 | 36,9 | 10,6 | 13,8 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 31,2; Límite superior: 32,1

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.53.

Prevalencias de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.





54,7 62,4 47,2 49,5 32,5 57,6 59,2 62,8 46,3 52,5 70,6 45,7 48,4 55,7 60,0 61,7 55,2 23,3 25,6

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 51,5; Límite superior: 52,6

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.54.

Prevalencias de hipnosedantes (con o sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




11,7 9,9 12,6 11,8 11,6 11,5 9,3 8,0 12,8 13,7 10,6 10,8 10,9 14,1 13,2 11,0 9,6 7,9 8,0

Error de estimación: 0,3; Límite inferior: 11,3; Límite superior: 11,9

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.55.

Dinero disponible a la semana para gastos personales por término medio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (euros). España, 2016.





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16,9 | 17,8 | 20,0 | 21,2 | 21,1 | 19,4 | 17,0 | 16,0 | 19,9 | 18,9 | 15,0 | 20,1 | 17,4 | 16,9 | 16,1 | 15,6 | 18,7 | 25,3 | 25,9 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Error de estimación: 0,2; Límite inferior: 17,8; Límite superior: 18,3

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.56.

Valoración de la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas ilegales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%)* por Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



51,2 53,8 53,6 59,3 57,0 54,8 54,1 54,3 59,1 56,1 51,7 52,2 55,3 53,5 64,3 60,6 55,3 59,0 55,8



* % válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos Ns/Nc.

Error de estimación: 0,5; Límite inferior: 54,6; Límite superior: 55,7

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.57.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por Comunidad/Ciudad Autónoma (%). España, 2016.




24,8 17,6 12,4 19,1 16,3 16,0 18,6 15,3 22,6 19,8 15,9 13,6 21,0 15,8 14,6 18,5 17,3 23,7 18,9

Error de estimación: 0,4; Límite inferior: 19,6; Límite superior: 20,5

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.58.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de borracheras (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo semanal, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 84,1 | 84,2 | 86,0 | 78,0 | 76,6 | 82,0 | 79,6 | 81,2 | 75,1 | 83,9 | 78,9 | 76,9 |
| Últimos 12 meses | 82,7 | 82,4 | 83,8 | 77,3 | 75,6 | 81,0 | 74,9 | 72,9 | 73,6 | 81,9 | 76,8 | 75,6 |
| Últimos 30 días | 75,1 | 66,7 | 68,1 | 60,2 | 56,0 | 65,6 | 58,0 | 58,5 | 63,0 | 74,0 | 68,2 | 67,0 |
| Borracheras últimos 30 días | 16,1 | 15,3 | 16,5 | 21,7 | 20,2 | 28,0 | 25,6 | 29,1 | 35,6 | 30,8 | 22,2 | 21,8 |
| Binge drinking últimos 30 días | - | - | - | - | - | - | - | 41,4 | 36,7 | 41,8 | 32,2 | 31,7 |
| Edad media de inicio consumo | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,9 | 13,8 | 14,0 |
| Edad media de consumo semanal | - | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 15,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.59.

Prevalencia de consumo diario de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | 14-17 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Hombres | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 1,8 |
| Mujeres | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 1,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.60.

Evolución de la prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, riesgo percibido ante el consumo habitual y disponibilidad percibida de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Consumo últimos 12 meses | 82,7 | 82,4 | 83,8 | 77,3 | 75,6 | 81,0 | 74,9 | 72,9 | 73,6 | 81,9 | 76,8 | 75,6 |
| Consumo últimos 30 días | 75,1 | 66,7 | 68,1 | 60,2 | 56,0 | 65,6 | 58,0 | 58,5 | 63,0 | 74,0 | 68,2 | 67,0 |
| Disponibilidad percibida | 93,8 | 89,0 | 90,5 | 91,2 | 92,0 | 93,8 | 91,2 | 90,8 | 93,3 | 92,9 | 91,4 | 93,0 |
| Riesgo percibido 5 o 6 cañas /copas fin de semana | 43,8 | 45,2 | 44,8 | 44,9 | 44,8 | 41,2 | 51,3 | 47,2 | 47,0 | 47,5 | 55,3 | 56,1 |
| Riesgo percibido 1 o 2 cañas /copas diariamente | 50,2 | 48,5 | 45,9 | 44,0 | 43,6 | 41,4 | 57,4 | 57,9 | 59,8 | 59,7 | 57,8 | 52,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.61.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, en días laborables y en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida (%). España, 2016.




| | Vino | Cerveza | Licores fuertes | Combinados/cubatas | Vermut/jerez/fino | Licores de frutas |
|---------------|------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Laborables | 7,2 | 17,8 | 6,8 | 12,6 | 2,9 | 8,0 |
| Fin de semana | 21,4 | 39,3 | 28,3 | 55,2 | 6,8 | 28,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.62.

Prevalencia de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según tipo de bebida y edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | 14-17 años |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Vino | 15,5 | 22,2 | 23,8 | 29,2 | 37,0 | 22,3 |
| Cerveza | 19,6 | 34,8 | 45,3 | 57,1 | 63,5 | 38,8 |
| Licores fuertes | 16,0 | 28,1 | 34,1 | 36,5 | 41,9 | 28,3 |
| Combinados/cubatas | 32,2 | 51,4 | 63,1 | 71,8 | 77,4 | 54,1 |
| Vermut/jerez/fino | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 13,4 | 7,3 |
| Licores de frutas | 21,7 | 31,7 | 32,9 | 32,6 | 33,8 | 29,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.63.

Prevalencia de consumo de atracón de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Hombres | 13,2 | 25,5 | 37,0 | 47,5 | 30,2 | 58,9 |
| Mujeres | 14,6 | 27,3 | 34,7 | 42,6 | 29,5 | 54,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.64.


Prevalencia de consumo de atracción de alcohol (binge drinking) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.65.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y proporción de los que se han emborrachado entre los que han consumido alcohol en los últimos 30 días (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.66.

Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según edad y sexo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.67.

Prevalencias de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

| | HOMBRES | | | | | | MUJERES | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|-------|------|
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 14-17 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14-17 | 18 |
| Borrracheras alguna vez | 19,9 | 39,2 | 53,6 | 68,5 | 44,3 | 73,0 | 26,4 | 45,7 | 58,2 | 70,9 | 49,7 | 76,6 |
| Borrracheras últimos 12 meses | 15,3 | 33,0 | 47,4 | 60,6 | 38,2 | 64,7 | 22,3 | 39,3 | 51,2 | 62,3 | 43,3 | 66,1 |
| Borrracheras últimos 30 días | 6,5 | 14,4 | 25,1 | 35,3 | 19,7 | 40,5 | 9,2 | 17,4 | 26,1 | 32,6 | 21,1 | 40,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.68.

Consumo de riesgo de alcohol de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han informado sobre el tipo de bebidas consumidas en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 17-18 años | 18 años |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| HOMBRES | | | | | | | |
| Bebedor de riesgo (más de 49 cc al día) | 4,6 | 1,7 | 4,9 | 3,9 | 5,0 | 4,1 | 8,1 |
| No bebedor de riesgo (menos de 50 cc al día) | 95,4 | 98,3 | 95,1 | 96,1 | 95,0 | 95,9 | 91,9 |
| MUJERES | | | | | | | |
| Bebedor de riesgo (más de 29 cc al día) | 6,3 | 3,4 | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 5,8 | 11,2 |
| No bebedor de riesgo (menos de 30 cc al día) | 93,7 | 96,6 | 94,3 | 93,7 | 93,5 | 94,2 | 88,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.69.

Prevalencias de consumo de riesgo de bebidas alcohólicas* según equivalencias de alcohol por tipo de bebida en centímetros cúbicos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking o botellón en los últimos 30 días (%). España, 2016.


| | Borracheras | | Binge drinking | | Botellón | |
|-------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| | en los últimos 30 días | | en los últimos 30 días | | en los últimos 30 días | |
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| HOMBRES | | | | | | |
| 50 cc al día o más (bebedor riesgo) | 7,9 | 2,2 | 7,0 | 0,5 | 8,1 | 2,0 |
| Menos de 50 cc al día (no riesgo) | 92,1 | 97,8 | 93,0 | 99,5 | 91,9 | 98,0 |
| MUJERES | | | | | | |
| 30 cc al día o más (bebedor riesgo) | 11,8 | 2,5 | 10,4 | 0,9 | 10,7 | 3,1 |
| Menos de 30 cc al día (no riesgo) | 88,2 | 97,5 | 89,6 | 99,1 | 89,3 | 96,9 |

* La base son los alumnos que han consumido en los últimos 30 días y han contestado las bebidas consumidas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.70.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, tanto en días laborables como en fin de semana, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado en los últimos 30 días, según edad (%). España, 2016.




| | Vino | Cerveza | Licores fuertes | Combinados/cubatas | Vermut/jerez/fino | Licores de frutas |
|---------|------|---------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 14 años | 46,1 | 63,1 | 71,1 | 94,8 | 22,7 | 65,2 |
| 15 años | 43,1 | 73,4 | 72,5 | 96,6 | 22,6 | 61,3 |
| 16 años | 39,6 | 75,4 | 65,9 | 97,1 | 16,6 | 53,9 |
| 17 años | 42,9 | 81,2 | 57,2 | 96,6 | 16,0 | 42,6 |
| 18 años | 48,9 | 82,5 | 59,5 | 98,0 | 19,7 | 43,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.71.


Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días según el tipo de bebida consumida, tanto en fin de semana como en días laborables, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.72.


Modos en los que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.73.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.




| | Total | Hombres | Mujeres |
|-----------------------------|-------|---------|---------|
| Supermercados | 37,3 | 36,0 | 38,7 |
| Bares o pubs | 34,8 | 33,4 | 36,2 |
| Tiendas de barrio* | 34,7 | 35,4 | 34,0 |
| Discotecas | 27,7 | 26,1 | 29,3 |
| Casa de otras personas | 18,7 | 17,9 | 19,5 |
| Hipermercados | 17,5 | 18,9 | 16,1 |
| Casa donde vives | 13,1 | 14,1 | 12,2 |
| Venta ambulante | 3,4 | 4,3 | 2,5 |
| Internet o venta telefónica | 0,7 | 1,0 | 0,4 |

* Tiendas de barrio, "chinos", quioscos, bodegas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.74.

Lugares donde han tomado bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.




* Espacios públicos abiertos: calles, plazas, parques, playas...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.75.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.76.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Total | Hombres | Mujeres |
|----------|-------|---------|---------|
| Alcohol | 2,5 | 3,9 | 1,1 |
| Cannabis | 1,8 | 2,9 | 0,8 |
| Cocaína | 0,3 | 0,6 | 0,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.77.

Prevalencia de conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Alcohol | 2,5 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 2,3 | 5,4 |
| Cannabis | 1,8 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 3,9 |
| Cocaína | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.78.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Total | Hombres | Mujeres |
|----------|-------|---------|---------|
| Alcohol | 17,2 | 16,4 | 17,9 |
| Cannabis | 9,1 | 9,4 | 8,8 |
| Cocaína | 1,8 | 2,1 | 1,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.79.

Prevalencia de viajar como pasajero en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Alcohol | 17,2 | 8,6 | 13,4 | 19,0 | 24,5 | 16,2 | 30,8 |
| Cannabis | 9,1 | 3,0 | 6,4 | 9,2 | 14,7 | 8,1 | 22,1 |
| Cocaína | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 4,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.80.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Total | Hombres | Mujeres |
|-------------------------|-------|---------|---------|
| Sin especificar consumo | 1,7 | 2,6 | 0,8 |
| Alcohol | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Cannabis | 0,3 | 0,5 | 0,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.81.

Prevalencia de accidente de tráfico siendo el encuestado el conductor de un vehículo de motor bajo los efectos de distintas sustancias psicoactivas o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Sin especificar consumo | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 1,7 | 2,8 |
| Alcohol | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Cannabis | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.82.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según sexo (%). España, 2016.




| | Total | Hombres | Mujeres |
|-------------------------|-------|---------|---------|
| Sin especificar consumo | 14,1 | 18,5 | 9,7 |
| Alcohol | 5,2 | 6,4 | 4,0 |
| Cannabis | 2,5 | 3,4 | 1,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.83.

Prevalencia de haber participado en alguna pelea o agresión física entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años habiendo consumido o no alguna sustancia psicoactiva, según edad (%). España, 2016.



| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|-------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Sin especificar consumo | 14,1 | 10,8 | 14,4 | 14,5 | 15,4 | 13,7 | 19,9 |
| Alcohol | 5,2 | 2,0 | 4,2 | 5,9 | 7,3 | 4,8 | 11,1 |
| Cannabis | 2,5 | 0,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 5,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.84.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas, prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) (últimos 30 días), prevalencia de binge drinking (últimos 30 días), edad media de inicio del consumo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por sexo y edad (%). España, 2016.

| | Hombres | Mujeres | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años | Total |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-------|
| Alguna vez en la vida | 75,7 | 78,2 | 57,1 | 75,4 | 83,1 | 89,9 | 75,8 | 91,9 | 76,9 |
| Últimos 12 meses | 74,3 | 76,9 | 55,3 | 73,9 | 82,1 | 88,7 | 74,5 | 90,6 | 75,6 |
| Últimos 30 días | 65,9 | 68,1 | 46,1 | 64,6 | 73,1 | 81,2 | 65,7 | 84,5 | 67,0 |
| Borracheras últimos 30 días | 21,2 | 22,3 | 7,9 | 15,8 | 25,6 | 33,9 | 20,4 | 40,4 | 21,8 |
| Binge drinking últimos 30 días | 32,3 | 31,0 | 13,9 | 26,4 | 35,9 | 45,0 | 29,8 | 56,6 | 31,7 |
| Edad media de inicio consumo | 13,9 | 14,0 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | 14,4 | 13,9 | 14,7 | 14,0 |
| Edad media de consumo alcohol semanal | 15,1 | 15,1 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 15,7 | 14,9 | 16,3 | 15,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.85.

Características generales del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (medias y porcentajes), según sexo. España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio del consumo (años) | 13,1 | 13,8 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 13,4 | 13,8 | 13,4 | 13,8 | 13,6 | 13,9 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 |
| Edad media de inicio del consumo de alcohol semanal (años) | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,1 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 14,9 | 15,1 | 15,1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida | 84,3 | 84,0 | 84,3 | 84,1 | 85,5 | 86,4 | 78,2 | 77,9 | 75,9 | 77,2 | 81,5 | 82,5 | 78,4 | 80,7 | 80,8 | 81,7 | 74,9 | 75,2 | 82,9 | 84,9 | 77,8 | 80,1 | 75,7 | 78,2 |
| Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 12 meses | 82,8 | 82,7 | 82,3 | 82,5 | 83,0 | 84,5 | 77,3 | 77,3 | 74,9 | 76,3 | 80,6 | 81,5 | 73,4 | 76,3 | 71,5 | 74,2 | 73,3 | 73,8 | 80,9 | 82,9 | 75,3 | 78,2 | 74,3 | 76,9 |
| Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días | 75,3 | 74,9 | 66,8 | 66,7 | 67,5 | 68,5 | 60,4 | 59,9 | 56,7 | 55,4 | 65,5 | 65,7 | 58,1 | 58,0 | 57,7 | 59,4 | 62,7 | 63,2 | 72,9 | 75,2 | 66,9 | 69,5 | 65,9 | 68,1 |
| Prevalencia de consumo de alcohol en fin de semana en los últimos 30 días | - | - | 66,0 | 66,4 | 67,0 | 68,1 | 60,1 | 59,8 | 56,3 | 55,2 | 65,1 | 65,5 | 57,7 | 57,7 | 61,2 | 61,3 | 71,3 | 71,5 | 70,1 | 72,8 | 63,0 | 66,5 | 63,4 | 66,2 |
| Prevalencia de consumo de alcohol en días laborables los últimos 30 días | - | - | 26,8 | 14,9 | 26,0 | 16,1 | 30,0 | 16,8 | 20,8 | 10,6 | 26,5 | 14,1 | 24,2 | 13,9 | 28,4 | 17,8 | 33,1 | 21,4 | 35,3 | 25,6 | 28,8 | 22,4 | 30,2 | 23,9 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.86.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según edad y sexo. España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prevalencia de consumo alguna vez en la vida | | | | | | | | | | | | |
| Total | 84,1 | 84,2 | 86,0 | 78,0 | 76,6 | 82,0 | 79,6 | 81,2 | 75,1 | 83,9 | 78,9 | 76,9 |
| Sexo | | | | | | | | | | | | |
| Hombre | 84,3 | 84,3 | 85,5 | 78,2 | 75,9 | 81,5 | 78,4 | 80,8 | 74,9 | 82,9 | 77,8 | 75,7 |
| Mujer | 84,0 | 84,1 | 86,4 | 77,9 | 77,2 | 82,5 | 80,7 | 81,7 | 75,2 | 84,9 | 80,1 | 78,2 |
| Edad | | | | | | | | | | | | |
| 14 años | 69,6 | 67,6 | 71,5 | 52,4 | 52,7 | 59,2 | 57,1 | 62,6 | 49,7 | 65,9 | 60,1 | 57,1 |
| 5 años | 81,8 | 81,7 | 82,5 | 73,4 | 70,4 | 76,6 | 76,1 | 78,7 | 71,5 | 77,7 | 73,7 | 75,4 |
| 16 años | 88,0 | 88,7 | 89,7 | 83,1 | 81,7 | 86,9 | 86,0 | 86,2 | 81,6 | 86,2 | 84,1 | 83,1 |
| 17 años | 91,9 | 91,3 | 92,8 | 89,6 | 89,0 | 91,9 | 91,2 | 90,5 | 87,8 | 90,8 | 90,6 | 89,9 |
| 18 años | 92,5 | 93,4 | 96,2 | 93,8 | 92,2 | 93,8 | 92,3 | 92,3 | 88,6 | 92,6 | 92,4 | 91,9 |
| Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | |
| Total | 82,7 | 82,4 | 83,8 | 77,3 | 75,6 | 81,0 | 74,9 | 72,9 | 73,6 | 81,9 | 76,8 | 75,6 |
| Sexo | | | | | | | | | | | | |
| Hombre | 82,8 | 82,3 | 83,0 | 77,3 | 74,9 | 80,6 | 73,4 | 71,5 | 73,3 | 80,9 | 75,3 | 74,3 |
| Mujer | 82,7 | 82,5 | 84,5 | 77,3 | 76,3 | 81,5 | 76,3 | 74,2 | 73,8 | 82,9 | 78,2 | 76,9 |
| Edad | | | | | | | | | | | | |
| 14 años | 67,7 | 64,3 | 67,9 | 51,5 | 52,0 | 57,9 | 50,9 | 53,1 | 48,0 | 63,1 | 57,4 | 55,3 |
| 15 años | 80,4 | 79,7 | 80,5 | 72,7 | 69,7 | 75,6 | 70,9 | 69,6 | 70,0 | 75,3 | 71,2 | 73,9 |
| 16 años | 86,7 | 87,4 | 88,0 | 82,4 | 80,9 | 85,9 | 82,1 | 77,6 | 80,3 | 84,2 | 82,2 | 82,1 |
| 17 años | 90,7 | 89,9 | 90,9 | 88,7 | 87,6 | 91,1 | 87,4 | 84,1 | 86,1 | 89,2 | 88,7 | 88,7 |
| 18 años | 91,1 | 92,4 | 94,1 | 93,3 | 91,2 | 93,0 | 88,2 | 84,2 | 86,4 | 91,3 | 90,7 | 90,6 |
| Prevalencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | |
| Total | 75,1 | 66,7 | 68,1 | 60,2 | 56,0 | 65,6 | 58,0 | 58,5 | 63,0 | 74,0 | 68,2 | 67,0 |
| Sexo | | | | | | | | | | | | |
| Hombre | 75,3 | 66,8 | 67,5 | 60,4 | 56,7 | 65,5 | 58,1 | 57,7 | 62,7 | 72,9 | 66,9 | 65,9 |
| Mujer | 74,9 | 66,7 | 68,5 | 59,9 | 55,4 | 65,7 | 58,0 | 59,4 | 63,2 | 75,2 | 69,5 | 68,1 |
| Edad | | | | | | | | | | | | |
| 14 años | 56,7 | 40,1 | 43,2 | 32,1 | 27,7 | 38,0 | 31,7 | 36,2 | 38,1 | 53,2 | 48,4 | 46,1 |
| 15 años | 71,8 | 60,1 | 62,2 | 51,8 | 47,7 | 57,7 | 50,7 | 52,9 | 58,9 | 66,0 | 61,3 | 64,6 |
| 16 años | 80,0 | 74,1 | 73,4 | 65,7 | 61,6 | 71,9 | 65,3 | 63,8 | 70,0 | 75,6 | 74,0 | 73,1 |
| 17 años | 85,1 | 79,4 | 81,1 | 73,7 | 71,5 | 78,2 | 74,2 | 71,9 | 74,8 | 82,4 | 80,8 | 81,2 |
| 18 años | 86,2 | 84,1 | 85,0 | 82,7 | 76,8 | 81,5 | 76,5 | 75,1 | 77,1 | 86,4 | 84,8 | 84,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.87.

Prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 14-17 años | | | 18 años | | |
|-------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Alguna vez en la vida | 57,0 | 55,9 | 58,2 | 75,4 | 73,1 | 78 | 83 | 82,0 | 84 | 90 | 89,7 | 90,0 | 75,8 | 74,5 | 77,2 | 91,9 | 91,3 | 92,6 |
| Últimos 12 meses | 55,0 | 53,8 | 56,8 | 73,9 | 71,4 | 76,6 | 82,1 | 81,0 | 83,2 | 88,7 | 88,4 | 88,9 | 74,5 | 73,0 | 75,9 | 90,6 | 90,6 | 90,7 |
| Últimos 30 días | 46,0 | 44,4 | 47,8 | 64,6 | 62,8 | 66,6 | 73,1 | 72,4 | 73,8 | 81,2 | 80,8 | 82 | 66 | 64,4 | 67,0 | 84,5 | 85,4 | 83,5 |
| Diario en los últimos 30 días | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,8 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Nunca | 43,0 | 44,1 | 41,8 | 24,6 | 26,9 | 22,1 | 16,9 | 18,0 | 15,7 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 8,1 | 8,7 | 7,4 | 24,2 | 25,5 | 22,8 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.88.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

| | Total | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Vermut/jerez/fino | 7,7 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 7,3 | 13,4 |
| Vino/champán | 23,3 | 15,5 | 22,2 | 23,8 | 29,2 | 22,3 | 37,0 |
| Licores fuertes | 29,2 | 16,0 | 28,1 | 34,1 | 36,5 | 28,3 | 41,9 |
| Licores de frutas | 29,7 | 21,7 | 31,7 | 32,9 | 32,6 | 29,4 | 33,8 |
| Cerveza/sidra | 40,5 | 19,6 | 34,8 | 45,3 | 57,1 | 38,8 | 63,5 |
| Combinados/cubatas | 55,7 | 32,2 | 51,4 | 63,1 | 71,8 | 54,1 | 77,4 |
| Cualquier bebida alcohólica | 67,0 | 46,1 | 64,6 | 73,1 | 81,2 | 65,7 | 84,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.89.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas algún fin de semana (1, 2 o 3), todos los fines de semana, algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) y todos los días laborables en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Algún fin de semana (1, 2 o 3) | Todos los fines de semana | Algún día laborable (1, 2 o 3 por semana) | Todos los días laborables |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Total | 51,3 | 12,8 | 22,8 | 2,1 |
| Sexo | | | | |
| Hombres | 48,8 | 13,8 | 25,0 | 2,8 |
| Mujeres | 53,8 | 11,8 | 20,5 | 1,4 |
| Edad | | | | |
| 14 años | 37,2 | 3,9 | 12,7 | 1,2 |
| 15 años | 51,4 | 9,5 | 20,1 | 2,1 |
| 16 años | 57,1 | 13,8 | 23,0 | 2,1 |
| 17 años | 59,9 | 19,9 | 31,6 | 2,5 |
| 14-17 años | 51,1 | 11,6 | 21,5 | 2,0 |
| 18 años | 53,6 | 29,7 | 39,8 | 4,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.90.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y tipo de bebida (%). España, 2016.

| Total | | 14 años | | 15 años | | 16 años | | 17 años | | 14-17 años | | 18 años | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana | Días laborables | Fin de semana |
| Vino/champán | | | | | | | | | | | | | |
| 7,2 | 21,4 | 5,1 | 13,9 | 7,6 | 19,9 | 6,4 | 22,2 | 8,5 | 27,2 | 6,8 | 20,5 | 13,1 | 34,4 |
| Cerveza/sidra | | | | | | | | | | | | | |
| 17,8 | 39,3 | 7,1 | 18,3 | 14,0 | 33,4 | 18,2 | 44,1 | 28,0 | 56,0 | 16,5 | 37,6 | 36,3 | 62,1 |
| Vermut/jerez/fino | | | | | | | | | | | | | |
| 2,9 | 6,8 | 2,0 | 4,1 | 3,4 | 6,9 | 2,6 | 7,3 | 3,3 | 8,2 | 2,8 | 6,5 | 4,9 | 11,4 |
| Combinados/cubatas | | | | | | | | | | | | | |
| 12,6 | 55,2 | 8,1 | 31,4 | 12,8 | 51,0 | 13,2 | 62,5 | 14,9 | 71,3 | 12,1 | 53,6 | 20,1 | 77,2 |
| Licores de frutas | | | | | | | | | | | | | |
| 8,0 | 28,4 | 7,0 | 20,3 | 9,1 | 30,6 | 8,1 | 31,6 | 7,5 | 31,2 | 7,9 | 28,1 | 10,2 | 31,9 |
| Licores fuertes | | | | | | | | | | | | | |
| 6,8 | 28,3 | 4,8 | 15,1 | 7,4 | 27,2 | 6,9 | 33,2 | 7,7 | 35,8 | 6,6 | 27,4 | 9,4 | 40,9 |
| Cualquier bebida alcohólica | | | | | | | | | | | | | |
| 27,1 | 64,8 | 15,8 | 42,2 | 24,7 | 61,7 | 27,5 | 71,4 | 36,1 | 80,1 | 25,6 | 63,4 | 46,4 | 83,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.91.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en días laborables y en fin de semana en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad, sexo y tipo de bebida consumida (%). España, 2016.

| Total | | 14 años | | | | 15 años | | | | 16 años | | | | 17 años | | | | 14-17 años | | | | 18 años | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|-----------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| Días laborables | | Días laborables | | Fin de semana | | Días laborables | | Fin de semana | | Días laborables | | Fin de semana | | Días laborables | | Fin de semana | | Días laborables | | Fin de semana | | Días laborables | | Fin de semana | | | | | |
| H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | | | | |
| Vino/champán | | 8,4 | 6,0 | 21,8 | 21,0 | 5,8 | 4,4 | 14,4 | 13,4 | 8,7 | 6,5 | 21,4 | 18,4 | 7,5 | 5,4 | 22,5 | 21,9 | 9,9 | 7,2 | 27,3 | 27,1 | 7,8 | 5,8 | 21,0 | 20,0 | 16,1 | 9,9 | 33,4 | 35,4 |
| Cerveza/sidra | | 20,9 | 14,8 | 42,4 | 36,1 | 7,9 | 6,3 | 20,2 | 16,4 | 16,7 | 11,3 | 36,1 | 30,6 | 21,4 | 15,0 | 47,4 | 40,9 | 33,1 | 23,0 | 60,7 | 51,4 | 19,2 | 13,7 | 40,5 | 34,6 | 41,2 | 30,6 | 66,5 | 57,2 |
| Vermut/jerez/fino | | 3,7 | 2,2 | 8,0 | 5,6 | 2,4 | 1,5 | 4,5 | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 8,1 | 5,6 | 3,4 | 1,8 | 8,6 | 6,0 | 4,7 | 2,0 | 10,1 | 6,4 | 3,5 | 2,0 | 7,6 | 5,4 | 5,4 | 4,3 | 13,1 | 9,6 |
| Combinados/cubatas | | 14,8 | 10,4 | 53,0 | 57,4 | 8,5 | 7,6 | 28,0 | 34,9 | 14,9 | 10,7 | 48,2 | 53,9 | 15,5 | 11,0 | 60,8 | 64,2 | 18,6 | 11,4 | 69,8 | 72,7 | 14,1 | 10,1 | 51,0 | 56,0 | 24,4 | 15,4 | 77,4 | 76,8 |
| Licores de frutas | | 9,2 | 6,9 | 27,3 | 29,4 | 7,7 | 6,4 | 18,3 | 22,3 | 10,4 | 7,8 | 29,2 | 32,0 | 8,9 | 7,4 | 30,9 | 32,2 | 9,3 | 5,8 | 30,4 | 32,0 | 9,0 | 6,8 | 26,9 | 29,4 | 11,9 | 8,3 | 34,0 | 29,5 |
| Licores fuertes | | 8,6 | 5,0 | 29,5 | 27,1 | 5,6 | 3,9 | 14,7 | 15,6 | 8,9 | 5,9 | 26,5 | 27,8 | 8,4 | 5,4 | 35,1 | 31,3 | 10,5 | 5,0 | 38,8 | 32,8 | 8,2 | 5,0 | 28,3 | 26,6 | 14,0 | 4,2 | 45,8 | 35,5 |
| Cualquier bebida alcohólica | | 30,2 | 23,9 | 63,4 | 66,2 | 16,4 | 15,1 | 39,7 | 44,7 | 27,7 | 21,5 | 59,2 | 64,3 | 30,8 | 24,2 | 70,5 | 72,3 | 41,0 | 31,2 | 79,7 | 80,5 | 28,4 | 22,8 | 61,7 | 65,0 | 51,9 | 40,0 | 84,4 | 82,6 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.92.


Evolución de la prevalencia de consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en días laborables y fines de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2016.

| | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONSUMO EN DÍAS LABORABLES | | | | | | | | | | | |
| Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días | | | | | | | | | | | |
| Vino | 8,1 | 8,9 | 8,2 | 4,9 | 6,6 | 5,3 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 9,1 | 5,5 |
| Cerveza | 15,3 | 14,0 | 16,2 | 10,5 | 14,1 | 12,8 | 15,0 | 13,7 | 17,5 | 16,3 | 15,1 |
| Vermut | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 4,1 | 3,6 | 5,6 | 5,8 | 2,1 |
| Combinados | 5,4 | 6,4 | 6,8 | 5,0 | 6,8 | 7,4 | 10,6 | 10,2 | 10,8 | 10,3 | 10,6 |
| Licores fuertes | 3,2 | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 5,5 |
| Licores frutas | 6,6 | 7,5 | 6,2 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 6,6 | 5,3 | 6,5 | 7,6 | 6,6 |
| Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 días | | | | | | | | | | | |
| Vino | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Cerveza | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 1,0 |
| Vermut | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Combinados | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Licores fuertes | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Licores frutas | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| CONSUMO EN FIN DE SEMANA | | | | | | | | | | | |
| Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 días | | | | | | | | | | | |
| Vino | 32,8 | 32,8 | 23,7 | 21,0 | 27,7 | 18,8 | 17,0 | 17,3 | 21,1 | 33,5 | 18,0 |
| Cerveza | 46,9 | 40,7 | 30,8 | 27,1 | 34,1 | 27,9 | 28,6 | 30,0 | 37,5 | 38,4 | 29,7 |
| Vermut | 12,0 | 13,6 | 9,6 | 8,0 | 11,0 | 8,3 | 8,4 | 9,4 | 11,8 | 13,2 | 5,1 |
| Combinados | 48,8 | 53,7 | 49,2 | 48,2 | 58,4 | 51,6 | 54,0 | 50,3 | 58,0 | 54,0 | 46,5 |
| Licores fuertes | 24,5 | 26,7 | 22,4 | 22,3 | 27,8 | 23,0 | 25,0 | 23,7 | 25,8 | 28,0 | 23,5 |
| Licores frutas | 36,2 | 37,1 | 25,6 | 22,6 | 26,0 | 20,6 | 20,8 | 18,3 | 23,6 | 27,7 | 24,4 |
| Todos los días de viernes a domingo durante los últimos 30 días | | | | | | | | | | | |
| Vino | 9,6 | 10,6 | 8,6 | 5,9 | 7,5 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| Cerveza | 19,9 | 17,6 | 14,4 | 10,7 | 13,8 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 8,9 | 8,2 | 7,6 |
| Vermut | 2,9 | 4,2 | 3,3 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 0,7 |
| Combinados | 19,6 | 23,5 | 22,2 | 18,9 | 22,5 | 16,8 | 17,9 | 13,8 | 10,9 | 7,2 | 7,5 |
| Licores fuertes | 8,2 | 10,8 | 10,1 | 7,7 | 9,4 | 5,5 | 5,9 | 4,1 | 3,6 | 2,9 | 2,7 |
| Licores frutas | 10,2 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 6,8 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.93.

Evolución de la prevalencia de binge drinking o consumo en atracón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2008-2016.



■ Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido alcohol en el mismo período
 ■ Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años

| | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido alcohol en el mismo período | 64,4 | 66,5 | 56,8 | 47,3 | 47,6 |
| Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de 14-18 años | 41,4 | 36,7 | 41,8 | 32,2 | 31,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.94.

Evolución de la prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.

| | Alguna vez en la vida | | | | | Últimos 12 meses | | | | | Últimos 30 días | | | | |
|---------|-----------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Total | 56,2 | 58,8 | 60,7 | 50,1 | 48,9 | 47,1 | 52,9 | 52,0 | 42,6 | 42,4 | 29,1 | 35,6 | 30,8 | 22,2 | 21,8 |
| Sexo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hombres | 54,8 | 58,0 | 59,9 | 48,7 | 46,4 | 46,5 | 52,2 | 51,7 | 41,5 | 40,1 | 29,4 | 36,4 | 31,3 | 22,3 | 21,2 |
| Mujeres | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 51,4 | 51,4 | 47,7 | 53,5 | 52,3 | 43,7 | 44,8 | 28,7 | 34,8 | 30,3 | 22,1 | 22,3 |
| Edad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 años | 30,4 | 27,8 | 31,5 | 23,2 | 23,1 | 24,5 | 24,6 | 26,1 | 19,0 | 18,8 | 13,4 | 16,0 | 12,7 | 7,6 | 7,9 |
| 15 años | 48,5 | 52,2 | 47,4 | 39,8 | 42,4 | 41,0 | 47,3 | 40,2 | 33,6 | 36,1 | 24,2 | 32,0 | 21,3 | 14,9 | 15,8 |
| 16 años | 62,2 | 66,2 | 62,3 | 56,5 | 55,9 | 53,0 | 59,8 | 53,4 | 48,8 | 49,3 | 31,7 | 38,8 | 30,9 | 26,4 | 25,6 |
| 17 años | 72,6 | 76,8 | 73,1 | 69,1 | 69,7 | 59,7 | 69,1 | 62,6 | 59,0 | 61,5 | 39,0 | 46,6 | 38,8 | 33,1 | 33,9 |
| 18 años | 76,9 | 77,8 | 80,4 | 74,1 | 74,7 | 65,8 | 69,8 | 70,5 | 63,4 | 65,4 | 45,2 | 52,8 | 46,5 | 37,5 | 40,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.95.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Más de una vez al mes* | Menos frecuentemente |
|---------|------------------------|----------------------|
| Total | 8,7 | 91,3 |
| Sexo | | |
| Hombres | 9,6 | 90,4 |
| Mujeres | 7,9 | 92,1 |
| Edad | | |
| 14 años | 1,3 | 98,7 |
| 15 años | 5,1 | 94,9 |
| 16 años | 9,7 | 90,3 |
| 17 años | 16,4 | 83,6 |
| 18 años | 20,6 | 79,4 |

* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.96.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se han emborrachado alguna vez en los últimos 12 meses, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Más de una vez al mes* | Menos frecuentemente |
|---------|------------------------|----------------------|
| Total | 20,6 | 79,4 |
| Sexo | | |
| Hombres | 23,9 | 76,1 |
| Mujeres | 17,6 | 82,4 |
| Edad | | |
| 14 años | 6,7 | 93,3 |
| 15 años | 14,1 | 85,9 |
| 16 años | 19,7 | 80,3 |
| 17 años | 26,6 | 73,4 |
| 18 años | 31,5 | 68,5 |

* Se ha emborrachado 10 días o más al año.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.97.

Lugares donde han comprado o conseguido y donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días (%). España, 2016.

| | Comprado/conseguido | | | Consumido | | |
|---|---------------------|------------|---------|-----------|------------|---------|
| | Total | 14-17 años | 18 años | Total | 14-17 años | 18 años |
| Supermercados | 37,3 | 35,2 | 63,1 | - | - | - |
| Bares o pubs | 34,8 | 32,7 | 60,4 | 34,4 | 32,1 | 63,7 |
| Discotecas | 27,7 | 25,4 | 56,1 | 29,0 | 26,6 | 58,8 |
| Tiendas de barrio, chinos, quioscos, bodegas | 34,7 | 34,5 | 37,1 | - | - | - |
| Hipermercados | 17,5 | 16,0 | 35,9 | - | - | - |
| Casa de otras personas | 18,7 | 18,4 | 22,5 | 26,5 | 25,6 | 39,0 |
| Casa donde vives | 13,1 | 12,3 | 22,8 | 14,5 | 13,4 | 28,5 |
| Internet | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
| Venta ambulante | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - | - |
| En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos | - | - | - | 33,6 | 33,1 | 40,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.98.

Lugares donde han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 14-17 años | | | 18 años | | |
|-----------------------------|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Supermercados | 37,3 | 36,0 | 38,7 | 14,2 | 12,2 | 16,2 | 30,4 | 27,0 | 34,0 | 42,0 | 40,8 | 43,3 | 53,5 | 54,1 | 52,9 | 35,2 | 33,6 | 36,8 | 63,1 | 62,7 | 63,6 |
| Bares o pubs | 34,8 | 33,4 | 36,2 | 9,7 | 8,2 | 11,2 | 23,1 | 21,4 | 25,0 | 40,2 | 37,7 | 42,6 | 56,5 | 55,8 | 57,1 | 32,7 | 30,9 | 34,5 | 60,4 | 62,0 | 58,5 |
| Tiendas de barrio* | 34,7 | 35,4 | 34,0 | 19,4 | 18,5 | 20,3 | 33,8 | 32,7 | 34,9 | 39,6 | 40,2 | 39,1 | 45,0 | 47,4 | 42,7 | 34,5 | 34,7 | 34,3 | 37,1 | 43,7 | 29,6 |
| Discotecas | 27,7 | 26,1 | 29,3 | 6,6 | 5,9 | 7,3 | 17,3 | 15,2 | 19,5 | 31,7 | 29,3 | 34,1 | 44,8 | 43,1 | 46,5 | 25,4 | 23,5 | 27,3 | 56,1 | 55,9 | 56,4 |
| Casa de otras personas | 18,7 | 17,9 | 19,5 | 12,1 | 10,2 | 14,0 | 17,9 | 15,9 | 20,0 | 20,3 | 20,2 | 20,4 | 23,2 | 22,8 | 23,6 | 18,4 | 17,3 | 19,4 | 22,5 | 24,2 | 20,7 |
| Hipermercados | 17,5 | 18,9 | 16,1 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 19,8 | 21,2 | 18,5 | 25,9 | 28,8 | 23,2 | 16,0 | 16,9 | 15,1 | 35,9 | 41,0 | 30,1 |
| Casa donde vives | 13,1 | 14,1 | 12,2 | 7,2 | 6,6 | 7,8 | 10,7 | 11,5 | 9,9 | 13,3 | 15,0 | 11,7 | 18,1 | 19,4 | 16,7 | 12,3 | 13,1 | 11,5 | 22,8 | 24,9 | 20,3 |
| Venta ambulante | 3,4 | 4,3 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,7 | 4,9 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | 4,3 | 2,6 | 3,4 | 5,0 | 1,6 |
| Internet o venta telefónica | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Tiendas de barrio, chinos, quioscos...

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.99.

Modos en que han comprado o conseguido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 14-17 años | | | 18 años | | |
|---|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Tú directamente | 38,2 | 40,0 | 36,4 | 14,0 | 13,5 | 14,6 | 28,6 | 29,8 | 27,4 | 40,5 | 42,5 | 38,7 | 55,5 | 59,9 | 51,4 | 34,9 | 36,4 | 33,3 | 78,8 | 80,5 | 76,8 |
| A través de otras personas de 18 años o mayores | 32,9 | 28,2 | 37,5 | 17,4 | 14,8 | 20,1 | 32,0 | 27,0 | 37,2 | 41,0 | 35,1 | 46,7 | 45,7 | 39,7 | 51,5 | 34,2 | 29,2 | 39,1 | 16,5 | 17,1 | 15,9 |
| A través de otras personas menores de 18 años | 10,7 | 9,6 | 11,7 | 9,2 | 7,9 | 10,5 | 12,3 | 10,3 | 14,4 | 13,1 | 12,4 | 13,9 | 10,2 | 9,7 | 10,7 | 11,3 | 10,1 | 12,4 | 3,2 | 3,6 | 2,9 |
| De otra forma | 4,9 | 5,5 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 4,0 | 6,0 | 6,8 | 5,2 | 5,4 | 6,5 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 3,8 | 5,1 | 5,8 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | 2,9 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.100.

Lugares donde han consumido bebidas alcohólicas los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 14-17 años | | | 18 años | | |
|------------------------|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Bares o pubs | 34,4 | 32,8 | 36,0 | 8,4 | 7,1 | 9,7 | 22,3 | 20,1 | 24,6 | 40,4 | 38,4 | 42,5 | 57,2 | 56,3 | 58,0 | 32,1 | 30,2 | 33,9 | 63,7 | 64,1 | 63,2 |
| Discotecas | 29,0 | 27,4 | 30,6 | 7,3 | 6,2 | 8,3 | 19,2 | 17,7 | 20,8 | 34,0 | 31,8 | 36,2 | 45,8 | 44,2 | 47,3 | 26,6 | 24,8 | 28,4 | 58,8 | 58,6 | 59,1 |
| Restaurantes | 11,4 | 12,3 | 10,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 6,6 | 7,3 | 5,7 | 10,8 | 11,5 | 10,1 | 20,3 | 21,8 | 18,9 | 9,9 | 10,5 | 9,3 | 31,0 | 33,8 | 27,7 |
| Casa donde vives | 14,5 | 16,5 | 12,5 | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 11,7 | 13,7 | 9,6 | 14,6 | 17,3 | 12,0 | 20,3 | 23,3 | 17,5 | 13,4 | 15,1 | 11,7 | 28,5 | 32,8 | 23,6 |
| Casa de otras personas | 26,5 | 26,7 | 26,3 | 13,7 | 12,4 | 15,1 | 23,3 | 22,4 | 24,3 | 30,0 | 30,5 | 29,4 | 35,4 | 36,7 | 34,1 | 25,6 | 25,4 | 25,7 | 39,0 | 43,2 | 34,2 |
| En calles, plazas* | 33,6 | 33,3 | 34,0 | 18,8 | 16,8 | 20,9 | 32,1 | 29,5 | 34,9 | 38,8 | 39,1 | 38,6 | 42,7 | 44,7 | 40,9 | 33,1 | 32,4 | 33,8 | 40,7 | 44,3 | 36,5 |
| Otros sitios | 10,1 | 11,2 | 8,9 | 6,7 | 7,2 | 6,3 | 10,3 | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 12,5 | 9,3 | 11,8 | 14,1 | 9,6 | 9,9 | 10,9 | 8,9 | 12,4 | 15,1 | 9,4 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* En calles, plazas, parques, playas o espacios públicos abiertos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.101.


Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses y últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Botellón en los últimos 12 meses | | Botellón en los últimos 30 días | |
|-------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|
| Total | | 52,0 | | 24,1 |
| Sexo | Hombre | 50,3 | | 23,3 |
| | Mujer | 53,8 | | 25,0 |
| Edad | 14 años | 28,0 | | 9,7 |
| | 15 años | 47,7 | | 20,5 |
| | 16 años | 61,1 | | 27,9 |
| | 17 años | 68,9 | | 35,7 |
| | 14-17 años | 50,9 | | 23,0 |
| | 18 años | 68,1 | | 39,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.102.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Hombres | 24,8 | 45,2 | 59,4 | 68,3 | 48,7 | 71,3 |
| Mujeres | 31,3 | 50,4 | 62,8 | 69,4 | 53,1 | 64,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.103.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses, de binge drinking y borracheras en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

| | Total | | 14 años | | 15 años | | 16 años | | 17 años | | 17-18 años | | 18 años | |
|--|---------------------|------|---------|-----|---------|-----|---------|------|---------|------|------------|-----|---------|------|
| | ¿HA HECHO BOTELLÓN? | | | | | | | | | | | | | |
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Se ha emborrachado en los últimos 12 meses | 72,6 | 10,5 | 57,1 | 4,4 | 66,7 | 9,0 | 73,1 | 12,7 | 79,8 | 21,7 | 71,4 | 9,7 | 84,5 | 25,5 |
| Se ha emborrachado en los últimos 30 días | 39,6 | 3,3 | 26,4 | 1,0 | 31,4 | 2,4 | 39,9 | 3,8 | 46,0 | 8,1 | 38,0 | 3,0 | 55,5 | 9,2 |
| Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días | 53,8 | 7,7 | 40,3 | 3,6 | 48,6 | 6,3 | 52,8 | 9,4 | 58,8 | 14,5 | 51,9 | 7,0 | 73,5 | 21,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.104.

Prevalencia de consumo de tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan realizado o no botellón en los últimos 12 meses y según edad (%). España, 2016.

| | Total | | 14 años | | 15 años | | 16 años | | 17 años | | 17-18 años | | 18 años | |
|----------------------------|-------|------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|------------|------|---------|------|
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| ¿HA HECHO BOTELLÓN? | | | | | | | | | | | | | | |
| Ha consumido... | | | | | | | | | | | | | | |
| Tabaco | 53,9 | 13,4 | 46,1 | 9,1 | 55,2 | 13,8 | 50,9 | 14,0 | 55,7 | 19,3 | 52,5 | 12,7 | 68,6 | 27,9 |
| Hipnosedantes | 13,9 | 8,9 | 12,4 | 7,6 | 12,7 | 8,5 | 13,9 | 9,0 | 14,4 | 11,7 | 13,6 | 8,7 | 17,5 | 13,2 |
| Cannabis | 42,6 | 8,3 | 27,7 | 4,4 | 39,4 | 7,9 | 41,4 | 9,5 | 48,8 | 14,4 | 41,2 | 7,8 | 57,0 | 19,2 |
| Cocaína | 4,0 | 0,7 | 3,2 | 0,5 | 4,0 | 0,7 | 3,1 | 1,0 | 3,9 | 0,7 | 3,5 | 0,7 | 8,4 | 1,2 |
| Éxtasis | 2,6 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 2,5 | 0,4 | 2,2 | 0,6 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,4 | 4,2 | 1,0 |
| Anfetaminas | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 0,6 | 1,7 | 0,3 | 3,8 | 0,7 |
| Alucinógenos | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 2,8 | 0,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.105.


Percepción del consumo de alcohol del padre y de la madre que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

| | Total alumnos |
|---|---------------|
| PADRE | |
| No ha bebido ningún día | 23,5 |
| Ha bebido algún día aislado | 35,5 |
| Ha bebido solo los fines de semana | 23,3 |
| Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente | 16,4 |
| Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días | 1,4 |
| MADRE | |
| No ha bebido ningún día | 38,6 |
| Ha bebido algún día aislado | 37,5 |
| Ha bebido solo los fines de semana | 16,5 |
| Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente | 7,0 |
| Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días | 0,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.106.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | 14 años | | 15 años | | 16 años | | 17 años | | 18 años | |
|---|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Bebidas energéticas | 50,5 | 30,8 | 54,2 | 35,0 | 52,5 | 31,9 | 52,5 | 31,7 | 56,0 | 38,3 |
| Bebidas energéticas mezcladas con alcohol | 9,3 | 6,8 | 16,0 | 12,6 | 18,3 | 14,5 | 21,7 | 17,5 | 25,1 | 21,5 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.107.

Prevalencia de consumo de bebidas energéticas y de bebidas energéticas mezcladas con alcohol en los últimos 30 días, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido diferentes sustancias psicoactivas en los últimos 30 días (%). España, 2016.


| | Ha consumido alcohol | Se ha emborrachado | Ha hecho binge drinking | Ha consumido tabaco | Ha consumido hipnosedantes* | Ha consumido cannabis | Ha consumido cocaína | Ha consumido éxtasis | Ha consumido anfetaminas | Ha consumido alucinógenos |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ha consumido bebidas energéticas | 50,7 | 58,1 | 57,8 | 60,9 | 57,4 | 65,8 | 77,2 | 81,8 | 78,9 | 79,8 |
| Ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol | 22,5 | 37,9 | 34,6 | 32,3 | 26,0 | 38,6 | 58,2 | 62,6 | 59,2 | 58,3 |

* Con o sin receta.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.108.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 60,6 | 64,4 | 63,4 | 61,8 | 59,8 | 60,4 | 46,1 | 44,6 | 39,8 | 43,8 | 38,4 | 38,5 |
| Últimos 12 meses | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 38,1 | 32,4 | 35,3 | 31,4 | 34,7 |
| Últimos 30 días | 31,1 | 32,5 | 31,9 | 32,1 | 29,4 | 28,7 | 27,8 | 32,4 | 26,2 | 29,7 | 25,9 | 27,3 |
| Diariamente en últimos 30 días | 21,6 | 23,7 | 23,1 | 23,0 | 21,0 | 21,5 | 14,8 | 14,8 | 12,3 | 12,5 | 8,9 | 8,8 |
| Edad media de inicio consumo | 13,9 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,1 |
| Edad media de inicio consumo diario | - | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,2 | 15,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.109.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 17,8 | 19,0 | 17,9 | 19,3 | 17,7 | 18,9 | 12,5 | 13,3 | 11,0 | 12,0 | 8,7 | 8,6 |
| Mujeres | 25,4 | 28,1 | 27,5 | 27,0 | 24,2 | 24,1 | 16,9 | 16,4 | 13,6 | 13,1 | 9,1 | 9,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.110.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que afirman que en sus casas alguna de las personas con las que conviven o comparten casa fuman diariamente. España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| % alumnos que conviven con personas que fuman diariamente en sus hogares | 68,2 | 62,4 | 63,8 | 63,0 | 58,0 | 55,9 | 47,7 | 52,9 | 50,0 | 50,0 | 49,7 | 47,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.111.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de un paquete diario de tabaco (porcentaje de estudiantes que piensa que puede causar bastantes o muchos problemas) y prevalencia del consumo diario de tabaco. España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riesgo atribuido a consumir habitualmente | 76,9 | 75,2 | 78 | 77,3 | 78,9 | 80,3 | 87,3 | 88,8 | 90,4 | 91,4 | 89,7 | 91,8 |
| Prevalencia de consumo diario | 21,6 | 23,7 | 23,1 | 23 | 21 | 21,5 | 14,8 | 14,8 | 12,3 | 12,5 | 8,9 | 8,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.112.

Evolución de la prevalencia de consumo diario de tabaco y el riesgo percibido (porcentaje que piensa que cada conducta puede causar bastantes/muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prevalencia hombres | 17,8 | 19,0 | 17,9 | 19,3 | 17,7 | 18,9 | 12,5 | 13,3 | 11,0 | 12,0 | 8,7 | 8,6 |
| Prevalencia mujeres | 25,4 | 28,1 | 27,5 | 27,0 | 24,2 | 24,1 | 16,9 | 16,4 | 13,6 | 13,1 | 9,1 | 9,0 |
| Riesgo hombres | 74,7 | 72,8 | 75,7 | 75,1 | 76,7 | 78,2 | 84,9 | 86,5 | 88,9 | 89,6 | 88,1 | 91,0 |
| Riesgo mujeres | 79,1 | 77,4 | 79,9 | 79,5 | 80,8 | 82,3 | 89,3 | 91,0 | 91,7 | 93,1 | 91,1 | 92,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.113.

Prevalencia de consumo de tabaco diario en los últimos 30 días en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 2,0 | 6,8 | 9,3 | 13,7 | 20,4 |
| Mujeres | 2,4 | 6,6 | 10,1 | 13,3 | 24,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.114.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, por edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.115.


Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.116.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| 14 años | 19,1 | 23,0 | 17,5 | 20,6 | 18,6 | 19,8 |
| 15 años | 30,6 | 34,5 | 27,7 | 28,6 | 25,5 | 33,8 |
| 16 años | 37,6 | 40,7 | 36,9 | 34,7 | 35,3 | 36,7 |
| 17 años | 41,3 | 47,1 | 41,8 | 40,9 | 39,7 | 44,5 |
| 18 años | 47,4 | 52,1 | 43,8 | 48,6 | 45,3 | 55,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.117.

Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 14 años | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 17,2 | 13,4 | 14,0 | 13,8 | 18,2 | 12,3 | 15,6 | 15,0 | 14,6 |
| 15 años | 28,4 | 27,7 | 27,7 | 28,1 | 23,6 | 24,3 | 24,1 | 28,8 | 21,4 | 23,3 | 20,5 | 26,1 |
| 16 años | 33,9 | 35,9 | 33,0 | 32,2 | 32,0 | 29,0 | 30,6 | 34,1 | 29,7 | 29,1 | 29,4 | 28,3 |
| 17 años | 37,0 | 36,4 | 37,8 | 38,8 | 37,6 | 40,4 | 35,5 | 40,7 | 35,6 | 34,6 | 32,7 | 35,8 |
| 18 años | 44,4 | 50,3 | 49,7 | 51,6 | 46,4 | 48,2 | 42,1 | 48,3 | 40,1 | 43,2 | 39,1 | 48,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.118.

Media de cigarrillos al día consumidos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 9,1 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 5,8 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 5,8 | 6,1 |
| Mujeres | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 6,0 | 5,4 | 5,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.119.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Encuestados (nº) | 21.094 | 18.966 | 18.085 | 20.450 | 26.576 | 25.521 | 26.454 | 30.183 | 31.967 | 27.503 | 37.486 | 35.369 |
| Edad media de inicio de consumo (años)* | 13,9 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,6 | 13,9 | 14,1 |
| Edad media de inicio de consumo diario (años)* | – | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,2 | 15,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 60,6 | 64,4 | 63,4 | 61,8 | 59,8 | 60,4 | 46,1 | 44,6 | 39,8 | 43,8 | 38,4 | 38,5 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 31,1 | 32,5 | 31,9 | 32,1 | 29,4 | 28,7 | 27,8 | 32,4 | 26,2 | 29,7 | 25,9 | 27,3 |
| Prevalencia (%) de consumo diario | 21,6 | 23,7 | 23,1 | 23 | 21 | 21,5 | 14,8 | 14,8 | 12,3 | 12,5 | 8,9 | 8,8 |
| Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº) | | | | | | | | | | | | |
| De 1 a 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55,9 | 63,5 | 60,2 |
| De 6 a 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,7 | 28,5 | 30,5 |
| Más de 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 | 8,0 | 9,3 |
| Media de cigarrillos/día | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,2 | 5,6 | 5,8 |

* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.120.

Características del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años)* | 13,7 | 14,1 | 13,1 | 13,5 | 13,0 | 13,4 | 12,9 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,2 |
| Edad media de inicio de consumo diario (años)* | - | - | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,3 | 14,6 | 14,5 | 14,6 | 14,5 | 14,7 | 14,6 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 56,0 | 65,1 | 58,9 | 69,4 | 57,4 | 68,5 | 57,1 | 66,7 | 54,6 | 64,7 | 56,6 | 54,1 | 42,0 | 49,8 | 42,2 | 47,0 | 35,6 | 43,8 | 41,6 | 46,1 | 36,5 | 40,3 | 36,3 | 40,7 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 26,0 | 36,3 | 26,2 | 38,1 | 25,5 | 37,6 | 27,3 | 37,1 | 25,0 | 33,4 | 25,1 | 32,4 | 24,8 | 30,6 | 30,9 | 33,8 | 23,0 | 29,3 | 28,1 | 31,3 | 24,5 | 27,2 | 25,6 | 29,0 |
| Prevalencia (%) de consumo diario | 17,8 | 25,4 | 19,0 | 28,1 | 17,9 | 27,5 | 19,3 | 27,0 | 17,7 | 24,2 | 18,9 | 24,1 | 12,5 | 16,9 | 13,3 | 16,4 | 11,0 | 13,6 | 12,0 | 13,1 | 8,7 | 9,1 | 8,6 | 9,0 |
| Cigarrillos diarios consumidos diariamente (nº) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De 1 a 5 | 37,7 | 47,3 | 41,8 | 50,3 | 43,8 | 49,5 | 44,4 | 49,0 | 44,7 | 46,5 | 41,6 | 44,5 | 61,9 | 63,0 | 56,1 | 58,3 | 65,0 | 68,5 | 54,7 | 57,0 | 60,6 | 66,1 | 56,6 | 63,5 |
| De 6 a 10 | 33,8 | 36,8 | 33,9 | 34,8 | 35,2 | 34,9 | 34,8 | 35,2 | 33,5 | 36,0 | 35,7 | 35,5 | 22,7 | 27,2 | 28,0 | 30,1 | 23,3 | 23,9 | 32,4 | 32,9 | 30,7 | 26,5 | 32,9 | 28,3 |
| Más de 10 | 28,5 | 15,9 | 24,3 | 14,8 | 20,9 | 15,6 | 20,8 | 15,8 | 21,8 | 17,5 | 22,7 | 20,0 | 15,3 | 9,8 | 15,9 | 11,6 | 11,7 | 7,6 | 12,9 | 10,1 | 8,7 | 7,4 | 10,5 | 8,1 |
| Media de cigarrillos al día | 9,1 | 7,2 | 8,3 | 6,9 | 7,9 | 7,0 | 7,6 | 6,8 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 7,5 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,7 | 4,8 | 6,4 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 6,1 | 5,5 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* En fumadores actuales y exfumadores.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.121.

Prevalencia del consumo de cigarrillos de cajetilla, de liar o de los 2 tipos en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Cigarrillos de cajetilla | Cigarrillos de liar | De los 2 tipos |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| Total | 45,6 | 10,2 | 44,2 |
| Hombre | 37,7 | 12,6 | 49,7 |
| Mujer | 52,5 | 8,1 | 39,3 |
| 14 años | 54,1 | 7,2 | 38,7 |
| 15 años | 49,0 | 9,7 | 41,3 |
| 16 años | 44,9 | 9,8 | 45,2 |
| 17 años | 42,2 | 11,0 | 46,9 |
| 14-17 años | 46,1 | 9,8 | 44,0 |
| 18 años | 42,2 | 12,8 | 45,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.122.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
|---------------------------------|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Consumo tabaco (porcentajes) | 16,3 | 15,0 | 17,7 | 12,6 | 10,8 | 14,6 | 18,6 | 17,8 | 19,5 | 17,4 | 16,0 | 18,8 | 17,5 | 16,6 | 18,4 | 19,9 | 18,8 | 21,3 | 16,1 | 14,8 | 17,5 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.123.

Incidencia del consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos* en miles de estudiantes). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
|--|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|-----|-----|------------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Consumo tabaco (n ^{os} absolutos)* | 184,6 | 87,7 | 96,9 | 44,4 | 19,2 | 25,2 | 46,3 | 23,1 | 23,2 | 51,0 | 23,8 | 27,2 | 33,3 | 16,3 | 16,9 | 9,7 | 5,3 | 4,4 | 174,9 | 82,4 | 92,5 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.124.

Porcentaje de estudiantes que han visto fumar a profesores, a estudiantes o a otras personas dentro del recinto del centro educativo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según titularidad del centro y tipo de estudios (%). España, 2016.

| | Profesores | Estudiantes | Otras personas del centro |
|--|------------|-------------|---------------------------|
| Total | 42,7 | 65,8 | 35,7 |
| Centros públicos | 46,9 | 70,2 | 38,9 |
| Centros privados | 33,5 | 56,1 | 29,0 |
| ESO | 42,3 | 65,7 | 35,3 |
| Bachillerato | 42,0 | 64,8 | 33,7 |
| Formación Profesional Básica | 56,5 | 81,5 | 59,6 |
| Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional | 45,2 | 66,2 | 42,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.125.

Porcentaje de estudiantes cuyos padres u otros familiares con los que convive fuman a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según fumen o no (%). España, 2016.

| | Total de estudiantes | Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida | Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses | Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días | Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días |
|--------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| Madre fuma a diario | 24,9 | 31,6 | 32,2 | 33,0 | 43,9 |
| Madre fuma pero no a diario | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 6,2 |
| Madre fuma (a diario o no) | 32,1 | 38,6 | 39,3 | 40,4 | 50,1 |
| Madre no fuma | 67,9 | 61,4 | 60,7 | 59,6 | 49,9 |
| Padre fuma a diario | 26,8 | 32,7 | 33,1 | 34,7 | 43,2 |
| Padre fuma pero no a diario | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 5,8 |
| Padre fuma (a diario o no) | 34,5 | 40,3 | 40,8 | 42,5 | 49,1 |
| Padre no fuma | 65,5 | 59,7 | 59,2 | 57,5 | 50,9 |
| Familiar fuma a diario | 28,2 | 38,3 | 38,7 | 40,5 | 51,3 |
| Familiar fuma pero no a diario | 14,3 | 13,2 | 13,1 | 13,6 | 11,0 |
| Familiar fuma (a diario o no) | 42,6 | 51,5 | 51,7 | 54,1 | 62,3 |
| Familiar no fuma | 57,4 | 48,5 | 48,3 | 45,9 | 37,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.126.


Porcentaje de estudiantes que se han planteado alguna vez dejar de fumar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia con la que fumen (%). España, 2016.

| | Total de estudiantes | Estudiantes que han fumado alguna vez en la vida | Estudiantes que han fumado en los últimos 12 meses | Estudiantes que han fumado en los últimos 30 días | Estudiantes que han fumado a diario en los últimos 30 días |
|--|----------------------|--|--|---|--|
| Se han planteado dejar de fumar y lo han intentado | 9,6 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 37,1 |
| Se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado | 7,2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 43,7 |
| No se han planteado dejar de fumar | 7,1 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 19,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.127.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 12,8 | 21,2 | 21,4 | 23,8 | 26,8 |
| Hombres | 14,5 | 23,7 | 23,9 | 26,5 | 31,9 |
| Mujeres | 11,1 | 18,4 | 19,0 | 21,1 | 21,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.128.

Prevalencia de consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido tabaco o no (%). España, 2016.

| | Consumo de tabaco alguna vez en la vida | | Consumo de tabaco en los últimos 12 meses | | Consumo de tabaco en los últimos 30 días | | Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días | |
|---------------------------------------|---|------|---|------|--|------|---|------|
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Ha consumido CE alguna vez en la vida | 40,9 | 7,0 | 42,2 | 8,2 | 46,3 | 10,2 | 58,0 | 15,6 |
| Nunca ha consumido CE | 59,1 | 93,0 | 57,8 | 91,8 | 53,7 | 89,8 | 42,0 | 84,4 |
| Ha consumido CE con nicotina | 21,1 | 1,4 | 22,5 | 1,8 | 26,0 | 2,6 | 40,9 | 5,7 |
| No ha consumido CE con nicotina | 78,9 | 98,6 | 77,5 | 98,2 | 74,0 | 97,4 | 59,1 | 94,3 |
| Ha consumido CE sin nicotina | 29,2 | 5,7 | 29,9 | 6,6 | 32,1 | 8,2 | 34,1 | 12,1 |
| No ha consumido CE sin nicotina | 70,8 | 94,3 | 70,1 | 93,4 | 67,9 | 91,8 | 65,9 | 87,9 |
| Ha consumido CE de los dos tipos | 11,0 | 0,8 | 11,8 | 1,0 | 13,2 | 1,5 | 18,3 | 3,2 |
| No ha consumido CE de los dos tipos | 89,0 | 99,2 | 88,2 | 99,0 | 86,8 | 98,5 | 81,7 | 96,8 |

CE = Cigarrillos electrónicos

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.129.

Prevalencia del consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cannabis o no (%). España, 2016.

| | Consumo de cannabis alguna vez en la vida | | Consumo de cannabis en los últimos 12 meses | | Consumo de cannabis en los últimos 30 días | |
|---------------------------------------|---|------|---|------|--|------|
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Ha consumido CE alguna vez en la vida | 42,1 | 10,0 | 44,4 | 11,1 | 48,0 | 13,7 |
| Nunca ha consumido CE | 57,9 | 90,0 | 55,6 | 88,9 | 52,0 | 86,3 |

CE = Cigarrillos electrónicos.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.130.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de cigarrillos electrónicos y de cannabis (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

| Problemas de salud o de otro tipo que puede significar... | | Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida | |
|---|----------------------------|---|------|
| | | Sí | No |
| Fumar un paquete de tabaco diario | Muchos/bastantes problemas | 88,2 | 92,8 |
| | Pocos/ningún problema | 11,8 | 7,2 |
| Fumar hachis/marihuana (cannabis) alguna vez | Muchos/bastantes problemas | 44,3 | 56,7 |
| | Pocos/ningún problema | 55,7 | 43,3 |
| Fumar hachis/marihuana (cannabis) habitualmente | Muchos/bastantes problemas | 83,6 | 92,4 |
| | Pocos/ningún problema | 16,4 | 7,6 |
| Fumar cigarrillos electrónicos | Muchos/bastantes problemas | 26,1 | 36,6 |
| | Pocos/ningún problema | 73,9 | 63,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.131.


Disponibilidad percibida del tabaco y del cannabis entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según hayan consumido cigarrillos electrónicos alguna vez o no (%). España, 2016.

| | | Consumo de cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida | |
|---------------------------------------|---|---|------|
| | | Sí | No |
| Disponibilidad percibida del tabaco | Fácilmente disponible (fácil + muy fácil) | 95,3 | 90,3 |
| | Difícilmente disponible (difícil + imposible) | 4,7 | 9,7 |
| Disponibilidad percibida del cannabis | Fácilmente disponible (fácil + muy fácil) | 83,3 | 60,5 |
| | Difícilmente disponible (difícil + imposible) | 16,7 | 39,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.132.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta médica y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,5 | 10,0 | 12,1 | 17,3 | 18,0 | 18,5 | 16,1 | 17,9 |
| Últimos 12 meses | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 10,1 | 9,8 | 11,6 | 10,8 | 11,6 |
| Últimos 30 días | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 5,1 | 5,2 | 6,6 | 6,2 | 5,9 |
| Edad media inicio consumo | - | - | - | - | - | - | 13,8 | 14,0 | 13,8 | 14,3 | 13,9 | 13,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.133.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 7,9 | 8,0 | 8,9 | 9,8 | 11,5 |
| Mujeres | 10,2 | 13,6 | 15,1 | 17,3 | 21,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.134.

Evolución de la prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 9,4 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 8,0 |
| Últimos 12 meses | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,4 |
| Últimos 30 días | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| Edad media inicio consumo | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,6 | 14,2 | 14,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.135.

Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,0 | 6,0 |
| Mujeres | 4,3 | 6,3 | 7,3 | 7,9 | 10,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.136.

Continuidad en el consumo de hipnosedantes sin receta en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida (A) | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 9,4 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 8,0 |
| Últimos 12 meses (B) | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,4 |
| Últimos 30 días (C) | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| B/A*100 | 72,1 | 73,8 | 73,4 | 72,5 | 69,2 | 67,1 | 63,2 | 60,6 | 53,8 | 65,0 | 68,6 | 69,2 |
| C/B*100 | 59,1 | 48,9 | 48,9 | 50,0 | 53,3 | 51,1 | 50,0 | 50,9 | 53,6 | 59,3 | 56,1 | 49,8 |
| C/A*100 | 42,6 | 36,1 | 35,9 | 36,2 | 36,9 | 34,3 | 31,6 | 30,9 | 28,8 | 38,6 | 38,5 | 34,2 |

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.
 C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.
 C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado los hipnosedantes alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.137.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Encuestados (n°) | 21.094 | 18.966 | 18.085 | 20.450 | 26.576 | 25.521 | 26.454 | 30.183 | 31.967 | 27.503 | 37.486 | 35.369 |
| Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años) | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 14,6 | 14,2 | 14,0 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida | - | - | - | - | - | - | 15,6 | 17,3 | 18,0 | 18,5 | 16,1 | 17,9 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida | 6,1 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 9,4 | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 8,0 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,3 | 5,4 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 97,7 | 97,9 | 97,6 | 97,0 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,1 | 97,0 | 96,6 | 97,0 | 97,4 |
| 1 a 2 días | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | - |
| 3 a 5 días | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | - |
| 6 a 9 días | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - |
| 10 a 19 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | - |

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.138.

Características del consumo de hipnosedantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.061 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio en el consumo de hipnosedantes sin receta (años) | 13,6 | 14,4 | 13,9 | 14,8 | 14,4 | 15,0 | 14,3 | 14,7 | 14,4 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 13,8 | 14,4 | 13,9 | 14,5 | 13,7 | 14,4 | 14,3 | 14,8 | 13,8 | 14,5 | 13,5 | 14,2 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida | 5,8 | 8,1 | 6,6 | 9,1 | 6,4 | 9,3 | 7,3 | 10,2 | 6,8 | 9,9 | 8,1 | 12,3 | 9,3 | 13,6 | 14,2 | 20,4 | 14,9 | 21,5 | 14,1 | 23,0 | 11,9 | 20,1 | 14,4 | 21,5 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida | 4,8 | 7,4 | 4,5 | 7,6 | 4,4 | 8,2 | 5,2 | 8,6 | 5,0 | 7,9 | 5,8 | 8,1 | 5,8 | 9,2 | 7,7 | 11,0 | 8,4 | 12,3 | 6,9 | 11,0 | 5,8 | 9,6 | 6,3 | 9,8 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 12 meses | 3,2 | 5,6 | 3,2 | 5,8 | 3,3 | 5,9 | 3,5 | 6,6 | 3,2 | 5,7 | 4,0 | 5,5 | 3,7 | 5,8 | 4,6 | 6,8 | 4,4 | 6,7 | 4,4 | 7,3 | 3,8 | 6,8 | 4,1 | 6,7 |
| Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días | 1,9 | 3,3 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | 3,0 | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 4,3 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 3,3 |
| Frecuencia de consumo de hipnosedantes sin receta en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 98,1 | 96,7 | 98,5 | 97,1 | 98,5 | 97,0 | 98,3 | 96,6 | 98,3 | 96,9 | 98,2 | 97,0 | 98,0 | 97,1 | 97,6 | 96,6 | 97,7 | 96,3 | 97,4 | 95,7 | 98,0 | 96,1 | 98,0 | 96,7 |
| 1 a 2 días | 1,3 | 2,1 | 1,1 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | - | - |
| 3 a 5 días | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | - | - |
| 6 a 9 días | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 10 a 19 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |

H = Hombres; M = Mujeres.

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.139.

Prevalencias de consumo de hipnosedantes con o sin receta y sin receta entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 14-17 años | | | 18 años | | |
|--------------------------------|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Hipnosedantes con o sin receta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alguna vez | 17,9 | 14,4 | 21,5 | 14,1 | 12,6 | 15,7 | 17,2 | 13,6 | 21,0 | 17,9 | 14,3 | 21,4 | 20,7 | 15,8 | 25,5 | 17,3 | 14,0 | 20,7 | 25,9 | 19,8 | 32,8 |
| Último año | 11,6 | 8,8 | 14,4 | 9,0 | 7,9 | 10,2 | 10,7 | 8,0 | 13,6 | 12,1 | 8,9 | 15,1 | 13,6 | 9,8 | 17,3 | 11,3 | 8,6 | 14,0 | 16,2 | 11,5 | 21,5 |
| Último mes | 5,9 | 4,4 | 7,3 | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 6,1 | 4,3 | 7,8 | 6,6 | 4,5 | 8,6 | 5,7 | 4,3 | 7,0 | 8,7 | 5,8 | 12,0 |
| Hipnosedantes sin receta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alguna vez | 8,0 | 6,3 | 9,8 | 5,7 | 4,7 | 6,8 | 7,8 | 6,1 | 9,6 | 8,3 | 6,5 | 10,2 | 9,4 | 7,3 | 11,5 | 7,8 | 6,1 | 9,4 | 11,6 | 8,9 | 14,6 |
| Último año | 5,4 | 4,1 | 6,7 | 3,5 | 2,8 | 4,3 | 4,9 | 3,5 | 6,3 | 5,9 | 4,4 | 7,3 | 6,5 | 5,0 | 7,9 | 5,2 | 3,9 | 6,4 | 8,2 | 6,0 | 10,8 |
| Último mes | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 3,6 | 3,2 | 2,1 | 4,1 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 4,4 | 3,1 | 5,8 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.140.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%) y edad media de inicio del consumo. España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 20,9 | 26,4 | 29,5 | 33,2 | 37,5 | 42,7 | 36,2 | 35,2 | 33,0 | 33,6 | 29,1 | 31,1 |
| Últimos 12 meses | 18,2 | 23,4 | 25,7 | 28,8 | 32,8 | 36,6 | 29,8 | 30,5 | 26,4 | 26,6 | 25,4 | 26,3 |
| Últimos 30 días | 12,4 | 15,7 | 17,2 | 20,8 | 22,5 | 25,1 | 20,1 | 20,1 | 17,2 | 16,1 | 18,6 | 18,3 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,1 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,8 | 14,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.141.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Alguna vez en la vida | Hombre | 15,2 | 28,9 | 36,6 | 48,0 | 31,5 | 56,3 |
| | Mujer | 12,6 | 24,4 | 30,8 | 42,5 | 27,2 | 54,7 |
| Últimos 12 meses | Hombre | 11,8 | 24,5 | 31,8 | 40,7 | 26,6 | 47,9 |
| | Mujer | 10,5 | 21,6 | 26,7 | 35,6 | 23,2 | 41,8 |
| Últimos 30 días | Hombre | 9,1 | 18,4 | 23,0 | 29,5 | 19,5 | 36,5 |
| | Mujer | 7,1 | 15,0 | 17,4 | 22,0 | 15,1 | 26,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.142.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Alguna vez en la vida | 13,9 | 26,7 | 33,7 | 45,2 | 29,3 | 55,6 |
| Últimos 12 meses | 11,1 | 23,1 | 29,2 | 38,1 | 24,9 | 45,0 |
| Últimos 30 días | 8,1 | 16,7 | 20,2 | 25,6 | 17,3 | 32,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.143.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días y de la percepción del riesgo (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riesgo atribuido a consumir habitualmente | 91,9 | 87,7 | 85,9 | 82,8 | 81,7 | 83,7 | 89,0 | 88,3 | 88,7 | 88,1 | 88,8 | 90,7 |
| Prevalencia de consumo en últimos 30 días | 12,4 | 15,7 | 17,2 | 20,8 | 22,5 | 25,1 | 20,1 | 20,1 | 17,2 | 16,1 | 18,6 | 18,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.144.

Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante su consumo habitual y de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riesgo percibido ante uso habitual | 91,9 | 87,7 | 85,9 | 82,8 | 81,7 | 83,7 | 89,0 | 88,3 | 88,7 | 88,1 | 88,8 | 90,7 |
| Disponibilidad percibida | 30,8 | 53,9 | 60,4 | 59,7 | 67,9 | 71,8 | 66,8 | 63,6 | 71,1 | 69,4 | 66,3 | 65,9 |
| Prevalencia de consumo último año | 18,2 | 23,4 | 25,7 | 28,8 | 32,8 | 36,6 | 29,8 | 30,5 | 26,4 | 26,6 | 25,4 | 26,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.145.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Hombres | 11,8 | 24,5 | 31,8 | 40,7 | 26,6 | 47,9 |
| Mujeres | 10,5 | 21,6 | 26,7 | 35,6 | 23,2 | 41,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.146.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Hombres | 9,1 | 18,4 | 23,0 | 29,5 | 19,5 | 36,5 |
| Mujeres | 7,1 | 15,0 | 17,4 | 22,0 | 15,1 | 26,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.147.

Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.


| | Ningún día | 1 día | 2 días | 3 días | 4-5 días | 6-9 días | 10-19 días | 20 días o más |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| Total | 86,2 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombres | 84,2 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,7 |
| Mujeres | 88,2 | 3,5 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 94,9 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| 15 años | 88,4 | 3,1 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 |
| 16 años | 84,6 | 4,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 2,3 |
| 17 años | 79,2 | 4,8 | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 |
| 18 años | 73,4 | 6,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 3,9 |

* Casos con información en el número de días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.148.

Continuidad en el consumo de cannabis en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Prevalencia alguna vez en la vida (A) | 20,9 | 26,4 | 29,5 | 33,2 | 37,5 | 42,7 | 36,2 | 35,2 | 33 | 33,6 | 29,1 | 31,1 |
| Prevalencia últimos 12 meses (B) | 18,2 | 23,4 | 25,7 | 28,8 | 32,8 | 36,6 | 29,8 | 30,5 | 26,4 | 26,6 | 25,4 | 26,3 |
| Prevalencia últimos 30 días (C) | 12,4 | 15,7 | 17,2 | 20,8 | 22,5 | 25,1 | 20,1 | 20,1 | 17,2 | 16,1 | 18,6 | 18,3 |
| B/A*100 | 87,1 | 88,6 | 87,1 | 86,7 | 87,5 | 85,7 | 82,3 | 86,6 | 80,0 | 79,1 | 87,4 | 84,4 |
| C/A*100 | 59,3 | 59,5 | 58,3 | 62,7 | 60,0 | 58,8 | 55,5 | 57,1 | 52,1 | 48,0 | 63,9 | 58,9 |
| C/B*100 | 68,1 | 67,1 | 66,9 | 72,2 | 68,6 | 68,6 | 67,4 | 65,9 | 65,2 | 60,7 | 73,1 | 69,8 |

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.

C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.

C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cannabis alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.149.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|---|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| Tipo de consumo de cannabis | | | | | | | | |
| Principalmente marihuana (hierba) | 51,1 | 49,3 | 53,4 | 55,4 | 49,4 | 50,2 | 51,3 | 51,8 |
| Principalmente hachís (resina, chocolate) | 12,2 | 11,5 | 13,2 | 10,2 | 12,4 | 12,8 | 11,8 | 13,2 |
| De los 2 tipos | 36,7 | 39,2 | 33,4 | 34,4 | 38,2 | 37,0 | 36,9 | 35,1 |
| Mezcla de cannabis con tabaco | | | | | | | | |
| Sí | 82,4 | 81,1 | 84,1 | 65,5 | 79,8 | 83,7 | 86,8 | 86,9 |
| No | 17,6 | 18,9 | 15,9 | 34,5 | 20,2 | 16,3 | 13,2 | 13,1 |
| Media de porros consumidos el día que se consume cannabis | | | | | | | | |
| | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.150.

Características generales del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.688 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 15,1 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 14,9 | 15,1 | 14,8 | 15,0 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 14,8 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 14,8 | 14,9 | 14,8 | 14,9 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 23,8 | 18,0 | 28,8 | 24,2 | 31,6 | 27,6 | 36,2 | 30,1 | 46,6 | 34,6 | 45,3 | 40,2 | 38,0 | 34,6 | 37,8 | 32,8 | 34,9 | 31,1 | 36,3 | 30,7 | 31,5 | 26,8 | 33,2 | 28,9 |
| Prevalencia (%) últimos 12 meses | 21,2 | 15,2 | 25,9 | 21,1 | 28,2 | 23,5 | 32,2 | 25,2 | 36,2 | 29,8 | 39,4 | 33,7 | 31,6 | 28,2 | 33,5 | 27,5 | 26,8 | 23,3 | 29,7 | 23,3 | 28,0 | 23,0 | 28,1 | 24,4 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 15,1 | 9,8 | 18,4 | 13,2 | 20,3 | 14,5 | 24,5 | 16,9 | 25,8 | 19,6 | 28,3 | 22,0 | 22,3 | 18,0 | 23,0 | 17,2 | 18,6 | 14,6 | 18,9 | 13,3 | 21,4 | 15,8 | 20,8 | 15,9 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 84,9 | 90,2 | 81,6 | 86,8 | 79,7 | 85,5 | 75,5 | 83,1 | 74,2 | 80,4 | 71,7 | 78,0 | 77,7 | 82,0 | 74,7 | 82,5 | 80,3 | 84,7 | 81,1 | 86,7 | 83,1 | 87,9 | 84,2 | 88,2 |
| 1 a 2 días | 6,9 | 5,1 | 7,3 | 7,2 | 8,4 | 7,4 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
| 3 a 5 días | 3,0 | 2,1 | 4,1 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 4,7 | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,0 | 3,9 | 2,8 | 3,6 | 2,7 |
| 6 a 9 días | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | 1,9 | 3,1 | 1,9 | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,6 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | 1,3 |
| 10 a 19 días | 1,5 | 0,6 | 2,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 3,6 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | 1,9 | 1,1 |
| 20 a 29 días | 1,5 | 0,6 | 2,2 | 0,9 | 2,8 | 1,0 | 4,7 | 1,4 | 5,5 | 2,1 | 7,4 | 2,8 | 4,2 | 2,2 | 4,5 | 1,9 | 4,3 | 1,8 | 3,8 | 1,5 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 1,3 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.151.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

| | Total población | No ha fumado cannabis nunca | Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses | Ha fumado cannabis en los últimos 30 días | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|--|
| Alcohol | 75,6 | 66,2 | 97,7 | 97,2 | 99,3 |
| Tabaco | 34,7 | 15,8 | 82,5 | 84,4 | 95,6 |
| Cannabis | 26,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Éxtasis | 1,6 | 0,2 | 5,5 | 7,2 | 18,6 |
| Hipnosedantes* | 11,6 | 9,0 | 18,3 | 19,2 | 28,0 |
| Hipnosedantes** | 5,4 | 3,7 | 9,9 | 10,6 | 18,2 |
| Cocaína en polvo | 2,1 | 0,2 | 7,5 | 9,8 | 27,2 |
| Cocaína base | 1,2 | 0,2 | 4,3 | 5,8 | 15,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 2,5 | 0,3 | 8,4 | 11,1 | 28,9 |
| Anfetaminas | 1,2 | 0,1 | 4,0 | 5,3 | 17,0 |
| Metanfetamina | 1,0 | 0,1 | 3,5 | 4,6 | 12,8 |
| Alucinógenos | 1,0 | 0,1 | 3,4 | 4,5 | 13,6 |
| Setas mágicas | 0,9 | 0,1 | 3,3 | 4,5 | 12,1 |
| Heroína | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 2,6 | 7,2 |
| Inhalables volátiles | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 2,1 | 6,4 |
| Esteroides anabolizantes | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 4,4 |
| Nuevas sustancias | 3,1 | 0,4 | 10,7 | 13,0 | 26,0 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta. ** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.152.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han fumado o no cannabis (%). España, 2016.

| | Total población | No ha fumado cannabis nunca | Ha fumado cannabis en los últimos 12 meses | Ha fumado cannabis en los últimos 30 días | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|--|---|---|
| Alcohol | 67,0 | 56,0 | 93,1 | 94,2 | 96,2 |
| Tabaco | 27,3 | 10,4 | 70,3 | 77,5 | 92,5 |
| Cannabis | 18,3 | 0,0 | 70,2 | 100,0 | 95,1 |
| Éxtasis | 0,6 | 0,1 | 2,0 | 2,8 | 9,6 |
| Hipnosedantes* | 5,9 | 4,3 | 9,9 | 10,6 | 16,8 |
| Hipnosedantes** | 2,6 | 1,6 | 5,2 | 6,0 | 10,4 |
| Cocaína en polvo | 0,8 | 0,1 | 2,9 | 4,1 | 12,7 |
| Cocaína base | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 2,7 | 8,2 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,0 | 0,1 | 3,5 | 4,8 | 14,4 |
| Anfetaminas | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 2,4 | 8,3 |
| Metanfetamina | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 2,0 | 5,9 |
| Alucinógenos | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 6,0 |
| Setas mágicas | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,7 | 4,8 |
| Heroína | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,6 | 5,1 |
| Inhalables volátiles | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 3,8 |
| Esteroides anabolizantes | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 2,9 |
| Nuevas sustancias | 1,7 | 0,2 | 5,9 | 8,2 | 14,9 |

* Incluye tranquilizantes y/o somníferos con o sin receta.

** Incluye tranquilizantes y/o somníferos sin receta.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.153.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4), según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|---|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| Tipo de consumo de cannabis | | | | | | | | |
| Principalmente marihuana (hierba) | 30,7 | 26,6 | 38,9 | 36,7 | 34,9 | 30,1 | 27,0 | 32,5 |
| Principalmente hachís (resina, chocolate) | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 5,5 | 8,0 | 10,9 | 11,7 | 16,6 |
| De los 2 tipos | 52,9 | 56,5 | 45,5 | 55,8 | 53,4 | 53,5 | 54,5 | 46,4 |
| Mezcla de cannabis con tabaco | | | | | | | | |
| Sí | 90,6 | 90,2 | 91,4 | 86,5 | 91,5 | 90,2 | 90,1 | 93,5 |
| No | 9,4 | 9,8 | 8,6 | 13,5 | 8,5 | 9,8 | 9,9 | 6,5 |
| Media de porros consumidos el día que se consume cannabis | | | | | | | | |
| | 5,4 | 5,6 | 5,0 | 6,0 | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 4,9 |

H = Hombres; M = Mujeres.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.154.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

| | Total población | Ha fumado cannabis en últimos 30 días | Ha fumado cannabis en últimos 12 meses | Consumidores de cannabis (CAST <4) | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Tipo de consumo de cannabis | | | | | |
| Principalmente marihuana (hierba) | 7,9 | 51,1 | 33,6 | 36,7 | 30,7 |
| Principalmente hachís (resina, chocolate) | 1,9 | 12,2 | 8,0 | 8,2 | 11,2 |
| De los 2 tipos | 5,7 | 36,7 | 24,1 | 21,0 | 52,9 |
| Mezcla de cannabis con tabaco | | | | | |
| Sí | 13,3 | 82,4 | 55,1 | 54,9 | 90,6 |
| No | 86,7 | 17,6 | 44,9 | 45,1 | 9,4 |
| Media de porros consumidos el día que se consume cannabis | | | | | |
| | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,9 | 5,4 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.155.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 30 días, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| En forma de porro o canuto | 97,7 | 97,4 | 98,0 | 93,6 | 96,7 | 98,2 | 98,4 | 99,3 |
| Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas | 17,0 | 19,0 | 14,2 | 20,0 | 18,8 | 17,4 | 16,2 | 12,5 |
| Por vía oral: pasteles, galletas... | 5,7 | 6,3 | 4,9 | 7,5 | 4,7 | 4,8 | 6,7 | 5,4 |
| Usando cigarrillos electrónicos | 1,8 | 2,3 | 1,1 | 4,4 | 2,4 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.156.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que tienen un consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| En forma de porro o canuto | 93,8 | 93,4 | 94,6 | 92,4 | 96,2 | 92,7 | 92,9 | 95,7 |
| Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas | 25,4 | 26,8 | 22,6 | 27,3 | 26,6 | 25,2 | 27,0 | 20,0 |
| Por vía oral: pasteles, galletas... | 9,5 | 10,1 | 8,5 | 12,2 | 12,0 | 6,6 | 10,7 | 8,6 |
| Usando cigarrillos electrónicos | 4,1 | 4,7 | 2,9 | 10,9 | 5,8 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |

H = Hombres; M = Mujeres. CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.157.

Características del consumo de cannabis de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis o no (%). España, 2016.

| | Total población | Ha fumado cannabis en últimos 30 días | Ha fumado cannabis en últimos 12 meses | Consumidores de cannabis (CAST <4) | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) |
|--|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| En forma de porro o canuto | 16,5 | 97,7 | 66,4 | 66,4 | 93,8 |
| Usando pipas de agua, bongos, cachimbos, shishas | 2,9 | 17,0 | 11,5 | 10,0 | 25,4 |
| Por vía oral: pasteles, galletas... | 1,0 | 5,7 | 3,9 | 2,9 | 9,5 |
| Usando cigarrillos electrónicos | 0,3 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 4,1 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.158.

Consumo de tabaco a diario entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según su consumo de cannabis alguna vez en la vida, últimos 12 meses y 30 días (%). España, 2016.


| Total población | No ha fumado cannabis nunca | Ha fumado cannabis en últimos 12 meses | Ha fumado cannabis en últimos 30 días | Consumidores de cannabis (CAST <4) | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) | |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|------|
| Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días | 8,8 | 1,0 | 29,7 | 35,4 | 26,4 | 67,4 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.159.

Evolución de la distribución en el orden de las edades de inicio en el consumo de cannabis y tabaco* (%). España, 2002-2016.




| | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| Se inician antes en el consumo de cannabis | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 7,4 | 9,4 |
| Se inician en el mismo año en las 2 sustancias | 20,0 | 24,1 | 25,7 | 35,0 | 39,6 |
| Se inician antes en el consumo de tabaco | 75,4 | 72,1 | 70,4 | 57,6 | 51,0 |

* Se debe clasificar a cada una de las personas que han iniciado el consumo de tabaco y cannabis, en función de que: Hayan iniciado primero el cannabis (edad más temprana); Hayan iniciado primero el tabaco (edad más temprana); Hayan iniciado con la misma edad las dos sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.160.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? Respuesta entre los que no la han probado nunca de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



| | Sí | No |
|--|------|------|
| Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? | 12,5 | 87,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.161.

Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana, lo probarían los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | |
|------------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
| No | 60,1 | 57,8 | 62,5 | 76,2 | 63,5 | 57,3 | 47,2 | 39,8 |
| Sí | 8,6 | 8,7 | 8,4 | 9,7 | 9,5 | 8,8 | 7,3 | 4,4 |
| Ya lo he probado | 31,3 | 33,5 | 29,1 | 14,0 | 27,0 | 33,9 | 45,5 | 55,8 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.162.

Consumo de tabaco alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la posible legalidad del consumo de hachís o marihuana (%). España, 2016.



| | Ha consumido tabaco alguna vez en la vida | Nunca ha consumido tabaco |
|--|---|---------------------------|
| Si fuese legal el consumo de hachís o marihuana ¿lo probarías? | | |
| No | 15,7 | 84,3 |
| Sí | 40,2 | 59,8 |
| Ya lo he probado | 81,8 | 18,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.163.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | |
|--------------------------------|-------|------|------|---------|-----|-----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Consumo cannabis (porcentajes) | 13,9 | 14,7 | 13,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 14,8 | 15,9 | 13,7 | 16,8 | 18,2 | 15,5 | 17,8 | 19,1 | 16,7 | 19,5 | 20,6 | 18,4 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.164.

Incidencia del consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (números absolutos* en miles de estudiantes). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | |
|------------------|-------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|-----|-----|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Consumo cannabis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (nº absolutos)* | 170,0 | 88,9 | 81,1 | 26,3 | 13,1 | 13,2 | 40,5 | 22,0 | 18,5 | 54,5 | 28,4 | 26,0 | 37,5 | 19,1 | 18,4 | 11,2 | 6,3 | 4,9 |


T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

* Tamaño de la población usado en la selección de la muestra ESTUDES 2016. El universo incluye el total de estudiantes de 14 a 18 años en España. Fuente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Debido al redondeo la suma de hombres y mujeres no coincide exactamente con el total.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.165.

Evolución de la prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) entre los que han consumido cannabis en los últimos 12 meses y entre la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.





| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| % entre los estudiantes de 14-18 años que han consumido cannabis en los últimos 12 meses | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,1 | 13,8 | 13,3 |
| % entre todos los estudiantes de 14-18 años | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 2,8 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.166.

Evolución de la categorización de resultados de la escala CAST entre los que han contestado el cuestionario en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años. España, 2006-2016.



| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| Puntuación CAST 0-1 | 66,0 | 67,1 | 64,8 | 65,2 | 69,5 | 69,5 |
| Puntuación CAST 2-3 | 20,7 | 18,6 | 19,9 | 18,7 | 16,7 | 17,2 |
| Puntuación CAST ≥4 (consumo problemático) | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,1 | 13,8 | 13,3 |

Puntuación CAST 0-1: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 0-1/los que han contestado el cuestionario CAST).

Puntuación CAST 2-3: % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación 2-3/los que han contestado el cuestionario CAST).


Puntuación CAST ≥ 4 (consumo problemático): % válido sobre consumidores (gente que tiene una puntuación ≥ 4/los que han contestado el cuestionario CAST).

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.167.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 3,1 | 3,7 |
| Mujeres | 2,2 | 2,5 | 4,1 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.168.

Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación escala CAST ≥ 4) en la población de 14-18 años (% y estimación). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Prevalencia del consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) | 3,3 | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 2,8 |
| Estimación nº consumidores problemáticos (números absolutos) | 73.534 | 81.080 | 100.340 | 83.208 | 53.701 | 61.810 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.169.

Prevalencia de botellón en los últimos 12 meses, binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días y policonsumo en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.



| | Consumidores problemáticos de cannabis CAST ≥4 | Total población 14-18 años |
|--------------------------------|--|----------------------------|
| Botellón últimos 12 meses | 92,0 | 52,0 |
| Binge drinking últimos 30 días | 76,6 | 31,7 |
| Borracheras últimos 30 días | 69,8 | 21,8 |
| 3 drogas | 51,0 | 17,5 |
| 4 drogas o más | 46,9 | 6,0 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.170.

Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

| | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST ≥4 | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST <4 |
|--------------------------------|--|--|
| Alcohol | 99,6 | 98,3 |
| Tabaco | 97,3 | 87,3 |
| Cigarrillos electrónicos | 63,9 | 42,3 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 38,4 | 25,2 |
| Cocaína (polvo y/o base) | 30,8 | 6,5 |
| Éxtasis | 24,9 | 5,7 |
| Anfetaminas/speed | 22,3 | 3,4 |
| Alucinógenos | 19,0 | 3,3 |
| Nuevas sustancias | 31,8 | 11,7 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.171.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

| | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST ≥ 4 | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST < 4 |
|--------------------------------|--|---|
| Alcohol | 99,3 | 98,1 |
| Borracheras | 90,6 | 82,0 |
| Botellón | 92,0 | 85,5 |
| Tabaco | 95,6 | 83,3 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 28,0 | 17,2 |
| Cocaína (polvo y/o base) | 28,9 | 5,4 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.172.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días en la población de estudiantes de 14-18 años que ha contestado a la escala CAST, según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

| | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST ≥ 4 | Prevalencia de consumo (%) alguna vez en la vida entre los que tienen una puntuación CAST < 4 |
|--------------------------------|--|---|
| Alcohol | 96,2 | 93,6 |
| Borracheras | 69,8 | 50,1 |
| Binge drinking | 76,6 | 63,8 |
| Tabaco | 92,5 | 70,8 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 16,8 | 9,0 |
| Cocaína (polvo y/o base) | 14,4 | 1,6 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.173.

Características de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días, según sexo (%). España, 2016.


| | Total | Hombres | Mujeres |
|--|-------|---------|---------|
| Nº casos consumo problemático cannabis últimos 30 días | 956 | 627 | 329 |
| Consumo cannabis últimos 30 días | | | |
| Principalmente marihuana | 32,4 | 28,2 | 40,7 |
| Principalmente hachís | 11,8 | 11,9 | 11,6 |
| De los 2 tipos | 55,8 | 59,9 | 47,7 |
| Nº casos consumo problemático cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días | 869 | 574 | 295 |
| Consumo cannabis mezclado con tabaco últimos 30 días | | | |
| Sí | 90,6 | 90,2 | 91,4 |
| No | 9,4 | 9,8 | 8,6 |
| Media de porros consumidos al día | 5,4 | 5,6 | 5,0 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.174.

Características de los consumidores de cannabis y de los consumidores problemáticos de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) de la población de estudiantes de 14-18 años que ha consumido cannabis en los últimos 30 días (%). España, 2016.



| | Consumidores de cannabis últimos 30 días | Consumidores de cannabis CAST <4 | Consumidores problemáticos de cannabis (CAST ≥ 4) |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Cannabis + tabaco | 82,4 | 82,3 | 95,5 |
| De los 2 tipos | 36,7 | 31,9 | 55,8 |
| Marihuana | 51,1 | 55,7 | 32,4 |
| Hachís | 12,2 | 12,4 | 11,8 |
| Porro | 88,3 | 62,9 | 92,8 |
| Pipas de agua | 15,3 | 9,5 | 25,1 |
| Vía oral | 5,1 | 2,8 | 9,4 |
| Cigarrillos electrónicos | 1,6 | 0,6 | 4,0 |


CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Casos con información (eliminando los no contesta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.175.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 2,5 | 3,4 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 5,7 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| Últimos 12 meses | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Últimos 30 días | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,0 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,6 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 15,5 | 15,0 | 15,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.176.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo. España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Total | 2,5 | 3,4 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 5,7 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| hombres | 3,1 | 4,0 | 6,5 | 8,4 | 9,0 | 11,3 | 6,8 | 6,3 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,1 |
| mujeres | 1,9 | 2,8 | 4,4 | 4,5 | 6,4 | 6,8 | 4,7 | 3,8 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.177.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.




| | | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | Hombre | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 5,3 | 10,4 |
| | Mujer | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 5,0 |
| Últimos 12 meses | Hombre | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 4,4 | 8,7 |
| | Mujer | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 3,2 |
| Últimos 30 días | Hombre | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 3,2 |
| | Mujer | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.178.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 5,3 | 10,4 |
| Mujeres | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 5,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.179.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 4,4 | 8,7 |
| Mujeres | 0,8 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 3,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.180.

Prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 7,9 |
| Últimos 12 meses | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 6,1 |
| Últimos 30 días | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 2,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.181.

Continuidad en el consumo de cocaína polvo y/o base en la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida (A) | 2,5 | 3,4 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,0 | 5,7 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,2 |
| Últimos 12 meses (B) | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Últimos 30 días (C) | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,0 |
| B/A*100 | 72,0 | 79,0 | 83,0 | 74,0 | 81,0 | 80,0 | 72,0 | 71,0 | 67,0 | 68,5 | 80,5 | 82,7 |
| C/B*100 | 61,0 | 59,0 | 56,0 | 52,0 | 52,0 | 53,0 | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 68,5 | 49,1 |
| C/A*100 | 44,0 | 47,0 | 46,0 | 38,0 | 42,0 | 42,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 41,1 | 54,8 | 39,0 |

B/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida y la habían consumido también en los últimos 12 meses.
 C/B = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína en los últimos 12 meses y la habían consumido también en los últimos 30 días.
 C/A = El % de los estudiantes de 14 a 18 años que habían probado cocaína alguna vez en la vida, y la habían consumido también en los últimos 30 días.
 FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.182.


Incidencia del consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
|------------------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------------|-----|-----|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Últimos 12 meses | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 3,3 | 4,8 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,0 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.
 FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.183.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y/o base en los últimos 12 meses, del riesgo percibido ante el consumo habitual de cocaína polvo y de la disponibilidad de cocaína polvo percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riesgo percibido ante consumo habitual | 98,5 | 97,6 | 97,4 | 96,9 | 97,4 | 97,8 | 96,8 | 96,0 | 96,2 | 97,0 | 96,9 | 96,4 |
| Disponibilidad percibida | 26,7 | 30,4 | 37,9 | 38,0 | 43,5 | 46,7 | 37,4 | 32,7 | 37,2 | 37,7 | 32,7 | 32,8 |
| Prevalencia de consumo último año | 1,8 | 2,7 | 4,5 | 4,8 | 6,2 | 7,2 | 4,1 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.184.

Prevalencia de consumo de cocaína según forma de presentación (polvo o base) en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




| | Cocaína polvo | Cocaína base | Cocaína polvo y/o base |
|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| Alguna vez en la vida | 2,6 | 1,7 | 3,2 |
| Últimos 12 meses | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| Últimos 30 días | 0,8 | 0,5 | 1,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.185.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína polvo y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 5,1 | 4,3 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
| Últimos 12 meses | 3,6 | 3,1 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
| Últimos 30 días | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 15,1 | 15,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.186.

Evolución de la prevalencia de consumo de cocaína base y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 1,7 |
| Últimos 12 meses | 1,9 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |
| Últimos 30 días | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 0,5 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 15,2 | 14,8 | 14,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.187.

Características del consumo de cocaína polvo y/o base entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.688 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 15,7 | 15,5 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,7 | 16,0 | 15,6 | 15,8 | 15,6 | 15,9 | 15,7 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 14,7 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,0 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 3,1 | 1,9 | 4,0 | 2,8 | 6,5 | 4,4 | 8,4 | 4,5 | 9,0 | 6,4 | 11,3 | 6,8 | 6,8 | 4,7 | 6,3 | 3,8 | 4,8 | 3,0 | 4,8 | 2,5 | 4,2 | 2,9 | 4,1 | 2,2 |
| Prevalencia (%), últimos 12 meses | 2,3 | 1,2 | 3,3 | 2,2 | 5,4 | 3,6 | 6,4 | 3,1 | 7,5 | 5,1 | 9,4 | 5,1 | 5,2 | 3,1 | 4,9 | 2,4 | 3,3 | 1,8 | 3,4 | 1,6 | 3,3 | 2,2 | 3,3 | 1,6 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 1,2 | 3,2 | 1,8 | 3,4 | 1,5 | 3,7 | 2,8 | 5,1 | 2,6 | 3,1 | 1,6 | 2,7 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | 0,5 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 98,6 | 99,3 | 97,9 | 98,8 | 96,8 | 98,2 | 96,6 | 98,5 | 96,3 | 97,2 | 94,9 | 97,4 | 96,9 | 98,4 | 97,2 | 98,3 | 98,2 | 99,3 | 97,8 | 99,2 | 98,4 | 99,3 | 98,5 | 99,5 |
| 1 a 2 días | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 1,1 | 2,3 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| 3 a 5 días | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 6 a 9 días | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 10 a 19 días | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.188.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

| | Ningún día | 1 día | 2 días | 3 días | 4-5 días | 6-9 días | 10-19 días | 20 días o más |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| Total | 99,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombres | 98,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Mujeres | 99,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 99,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 15 años | 99,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 16 años | 99,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 17 años | 99,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 18 años | 97,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.189.

Prevalencia de consumo de cocaína base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

| | Ningún día | 1 día | 2 días | 3 días | 4-5 días | 6-9 días | 10-19 días | 20 días o más |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| Total | 99,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombres | 99,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Mujeres | 99,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 99,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 15 años | 99,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 16 años | 99,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 17 años | 99,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 18 años | 98,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.190.


Prevalencia de consumo de cocaína polvo y /o base en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según frecuencia de consumo, edad y sexo (%). España, 2016.

| | Ningún día | 1 día | 2 días | 3 días | 4-5 días | 6-9 días | 10-19 días | 20 días o más |
|---------|------------|-------|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|
| Total | 99,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Sexo | | | | | | | | |
| Hombres | 98,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Mujeres | 99,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Edad | | | | | | | | |
| 14 años | 99,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 15 años | 99,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 16 años | 99,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 17 años | 99,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 18 años | 97,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.191.

Evolución de la prevalencia de consumo de éxtasis y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 3,6 | 5,5 | 3,6 | 6,2 | 6,4 | 5,0 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 1,2 | 2,3 |
| Últimos 12 meses | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 5,2 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 1,6 |
| Últimos 30 días | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 2,8 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,6 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 15,4 | 15,6 | 15,5 | 15,2 | 15,3 | 15,8 | 15,2 | 15,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.192.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 5,1 |
| Últimos 12 meses | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,1 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.193.

Prevalencia de consumo de éxtasis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 3,4 | 4,3 |
| Mujeres | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.194.

Prevalencia de consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|--------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Hombre | 2,7 | 2,0 | 0,9 |
| Mujer | 1,9 | 1,1 | 0,3 |
| Total | 2,3 | 1,6 | 0,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.195.

Prevalencia de consumo de éxtasis alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 4,7 | 6,1 | 4,0 | 7,6 | 7,0 | 6,0 | 4,2 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 1,6 | 2,7 |
| Mujeres | 2,5 | 4,8 | 3,2 | 4,8 | 5,8 | 3,9 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 0,8 | 1,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.196.


Características generales del consumo de éxtasis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%), según sexo. España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.688 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 15,7 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,9 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,7 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,9 | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 15,3 | 15,1 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 4,7 | 2,5 | 6,1 | 4,8 | 4,0 | 3,2 | 7,6 | 4,8 | 7,0 | 5,8 | 6,0 | 3,9 | 4,2 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 3,2 | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 1,6 | 0,8 | 2,7 | 1,9 |
| Prevalencia (%), últimos 12 meses | 4,2 | 2,2 | 4,8 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 6,4 | 3,9 | 4,7 | 3,8 | 3,3 | 1,9 | 3,2 | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 1,1 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 2,9 | 1,4 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 97,1 | 98,6 | 97,2 | 98,1 | 98,1 | 98,7 | 96,2 | 98,3 | 97,9 | 98,4 | 98,1 | 99,0 | 97,8 | 99,3 | 98,4 | 99,4 | 98,6 | 99,4 | 98,2 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,1 | 99,7 |
| 1 a 2 días | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 3 a 5 días | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
| 6 a 9 días | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 a 19 días | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.197.

Evolución de la prevalencia de consumo de anfetaminas y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 4,2 | 5,3 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 2,6 | 2,4 | 1,4 | 1,7 |
| Últimos 12 meses | 3,5 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 |
| Últimos 30 días | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,5 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,2 | 15,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.198.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,7 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 4,0 |
| Últimos 12 meses | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,8 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.199.

Prevalencia de consumo de anfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 2,7 | 4,3 |
| Mujeres | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.200.

Prevalencia de consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|---------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Hombres | 2,2 | 1,6 | 0,8 |
| Mujeres | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
| Total | 1,7 | 1,2 | 0,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.201.

Prevalencia de consumo de anfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 5,3 | 6,6 | 5,5 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 4,2 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |
| Mujeres | 3,1 | 4,1 | 3,2 | 3,3 | 4,9 | 3,6 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.202.

Características generales del consumo de anfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 15,5 | 15,4 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 15,3 | 15,6 | 15,5 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,2 | 15,1 | 15,4 | 15,1 | 15,0 | 15,0 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 5,3 | 3,1 | 6,6 | 4,1 | 5,5 | 3,2 | 5,7 | 3,3 | 6,2 | 4,9 | 6,0 | 3,6 | 4,2 | 2,7 | 4,6 | 2,8 | 3,4 | 1,8 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 2,2 | 1,2 |
| Prevalencia (%), últimos 12 meses | 4,4 | 2,5 | 5,5 | 3,4 | 4,5 | 2,5 | 4,6 | 2,4 | 4,8 | 3,4 | 4,3 | 2,3 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,6 | 0,7 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 2,9 | 1,6 | 3,2 | 2,0 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 44,8 | 49,8 | 51,8 | 52,0 | 51,1 | 53,1 | 55,1 | 59,1 | 57,9 | 66,8 | 97,3 | 99,0 | 98,0 | 99,0 | 97,4 | 99,2 | 98,6 | 99,5 | 98,6 | 99,4 | 99,3 | 99,8 | 99,2 | 99,7 |
| 1 a 2 días | 32,7 | 33,6 | 31,5 | 29,0 | 29,5 | 29,9 | 31,6 | 27,4 | 30,1 | 23,6 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - |
| 3 a 5 días | 10,6 | 8,9 | 8,8 | 12,5 | 8,4 | 8,9 | 7,0 | 9,7 | 5,9 | 6,1 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 6 a 9 días | 7,0 | 3,7 | 5,5 | 4,5 | 5,3 | 3,9 | 0,9 | 1,9 | 3,7 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 a 19 días | 3,1 | 2,3 | 0,7 | 0,7 | 2,8 | 1,8 | 4,3 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 a 29 días | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.203.

Evolución de la prevalencia de consumo de alucinógenos y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 5,1 | 6,8 | 5,5 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 1,6 |
| Últimos 12 meses | 4,4 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| Últimos 30 días | 2,6 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,4 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,8 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,0 | 15,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.204.

Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 2,3 | 4,1 |
| Últimos 12 meses | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 2,1 |
| Últimos 30 días | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.205.


Prevalencia de consumo de alucinógenos en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.206.


Prevalencia de consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.207.

Prevalencia de consumo de alucinógenos alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 6,7 | 8,0 | 6,1 | 7,2 | 5,6 | 6,2 | 5,7 | 5,6 | 4,6 | 4,1 | 2,3 | 2,1 |
| Mujeres | 3,6 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,2 | 1,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.208.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alucinógenos | 5,1 | 6,8 | 5,5 | 5,8 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 1,6 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.209.

Evolución del consumo de alucinógenos y setas mágicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alucinógenos | 4,4 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| Setas mágicas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.210.

Características generales del consumo de alucinógenos entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 15,4 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,6 | 15,3 | 15,6 | 15,4 | 15,8 | 15,7 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,2 | 14,1 | 13,8 | 15,0 | 15,4 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 6,7 | 3,6 | 8,0 | 5,6 | 6,1 | 5,0 | 7,2 | 4,4 | 5,6 | 3,4 | 6,2 | 3,3 | 5,7 | 2,7 | 5,6 | 2,6 | 4,6 | 2,4 | 4,1 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 2,1 | 1,1 |
| Prevalencia (%) últimos 12 meses | 5,7 | 3,1 | 6,9 | 4,5 | 4,8 | 3,2 | 5,5 | 2,9 | 4,4 | 2,0 | 4,4 | 1,8 | 4,1 | 1,6 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 2,9 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 3,6 | 1,7 | 3,8 | 1,9 | 2,6 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | 1,8 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 96,4 | 98,3 | 96,2 | 98,1 | 97,4 | 98,5 | 97,4 | 98,7 | 98,2 | 99,3 | 97,7 | 99,3 | 97,9 | 99,2 | 97,4 | 98,9 | 98,5 | 99,4 | 98,4 | 99,6 | 99,1 | 99,6 | 99,4 | 99,8 |
| 1 a 2 días | 2,4 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | - | - | - | - |
| 3 a 5 días | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 6 a 9 días | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 a 19 días | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.211.

Evolución de la prevalencia de consumo de setas mágicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años (%). España, 2010-2016.




| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 2,1 | 2,2 | 1,3 | 1,4 |
| Últimos 12 meses | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,9 |
| Últimos 30 días | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.212.

Evolución de la prevalencia de consumo de heroína y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Últimos 12 meses | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Últimos 30 días | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Edad media de inicio consumo | 14,3 | 14,7 | 14,4 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 14,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.213.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,2 |
| Últimos 12 meses | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.214.

Prevalencia de consumo de heroína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,7 |
| Mujeres | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.215.

Prevalencia de consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Hombres | Mujeres | Total |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Alguna vez en la vida | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
| Últimos 12 meses | 0,8 | 0,3 | 0,6 |
| Últimos 30 días | 0,6 | 0,1 | 0,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.216.

Evolución de la percepción del riesgo ante el consumo habitual de heroína (proporción de estudiantes que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) y de la percepción de disponibilidad de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.



| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Riesgo percibido consumo habitual | 98,9 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,6 | 98,8 | 97,0 | 96,2 | 96,3 | 96,9 | 97,5 | 96,4 |
| Disponibilidad | 48,0 | 25,6 | 29,1 | 28,1 | 32,0 | 30,7 | 26,1 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 21,4 | 21,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.217.

Características generales del consumo de heroína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 14,4 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 14,0 | 15,1 | 15,5 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,2 | 15,0 | 14,5 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | 13,8 | 14,1 | 13,8 | 13,7 | 14,6 |
| Prevalencia(%) alguna vez en la vida | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,5 |
| Prevalencia (%) últimos 12 meses | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,9 | 99,4 | 99,8 | 99,5 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,3 | 99,9 | 99,0 | 99,8 | 98,4 | 99,5 | 99,3 | 99,7 | 99,2 | 99,7 | 99,5 | 99,8 | 99,4 | 99,9 |
| 1 a 2 días | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 3 a 5 días | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 6 a 9 días | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 a 19 días | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.218.

Evolución del consumo de heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Heroína | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
| Alucinógenos | 4,4 | 5,6 | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,2 | 1,0 |
| Éxtasis | 3,2 | 4,1 | 2,5 | 5,2 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 1,6 |
| Anfetaminas | 3,5 | 4,4 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 |
| Inhalables volátiles | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.219.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Heroína | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Inhalables volátiles | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.220.

Evolución del consumo de heroína e inhalables volátiles en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Heroína | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Inhalables volátiles | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.221.

Evolución de la prevalencia de consumo de inhalables volátiles y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 1,0 |
| Últimos 12 meses | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,6 |
| Últimos 30 días | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Edad media de inicio consumo | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,9 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,8 | 13,2 | 13,4 | 13,9 | 13,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.222.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,7 |
| Últimos 12 meses | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,4 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.223.

Prevalencia de consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



| | Hombres | Mujeres | Total |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Alguna vez en la vida | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
| Últimos 12 meses | 0,8 | 0,4 | 0,6 |
| Últimos 30 días | 0,5 | 0,2 | 0,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.224.

Características generales del consumo de inhalables volátiles entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.


| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Edad media de inicio de consumo (años) | 13,8 | 12,4 | 13,9 | 13,3 | 13,7 | 13,0 | 14,0 | 13,7 | 14,3 | 14,2 | 13,9 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,6 | 14,2 | 13,1 | 13,2 | 13,8 | 12,6 | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 13,7 |
| Prevalencia (%) alguna vez en la vida | 4,1 | 2,1 | 4,2 | 2,5 | 5,1 | 3,4 | 5,7 | 3,0 | 4,8 | 2,7 | 5,2 | 2,9 | 4,2 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| Prevalencia (%) últimos 12 meses | 2,5 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 3,3 | 2,0 | 3,3 | 1,8 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,4 | 2,7 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Prevalencia (%) últimos 30 días | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 |
| Frecuencia de consumo en los últimos 30 días | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 98,5 | 99,2 | 98,5 | 99,0 | 97,8 | 98,5 | 98,2 | 98,9 | 98,5 | 99,2 | 98,4 | 99,3 | 98,2 | 99,4 | 97,7 | 99,1 | 98,8 | 99,5 | 99,0 | 99,4 | 99,4 | 99,7 | 99,5 | 99,8 |
| 1 a 2 días | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |
| 3 a 5 días | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |
| 6 a 9 días | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 10 a 19 días | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 20 a 29 días | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.225.

Evolución de la prevalencia de consumo de GHB y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,6 |
| Últimos 12 meses | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| Últimos 30 días | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| Edad media de inicio del consumo | 15,0 | 15,0 | 14,6 | 15,1 | 14,8 | 14,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.226.

Evolución de la prevalencia de consumo de metanfetaminas y edad media de inicio en el consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.




| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,4 |
| Últimos 12 meses | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
| Últimos 30 días | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Edad media de inicio del consumo | - | - | - | 15,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.227.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 3,2 |
| Últimos 12 meses | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 2,4 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.228.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 3,5 |
| Mujeres | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.229.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Hombres | Mujeres | Total |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Alguna vez en la vida | 1,7 | 1,0 | 1,4 |
| Últimos 12 meses | 1,3 | 0,7 | 1,0 |
| Últimos 30 días | 0,6 | 0,2 | 0,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.230.

Prevalencia de consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2010-2016.




| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|
| Hombres | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,7 |
| Mujeres | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.231.

Evolución de la prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes y edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




| | 2012 | 2014 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|
| Alguna vez en la vida | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Últimos 12 meses | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Últimos 30 días | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Edad media inicio consumo | - | - | 14,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.232.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alguna vez en la vida | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| Últimos 12 meses | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| Últimos 30 días | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.233.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.




| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hombres | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,3 |
| Mujeres | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.234.

Prevalencia de consumo de esteroides anabolizantes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



| | Hombres | Mujeres | Total |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Alguna vez en la vida | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
| Últimos 12 meses | 0,5 | 0,1 | 0,3 |
| Últimos 30 días | 0,4 | 0,1 | 0,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.235.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.


| | Total | | | 14 años | | | 15 años | | | 16 años | | | 17 años | | | 18 años | | | 14-17 años | | |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------|------|------------|-------|-------|
| | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M |
| Número de casos | 9.476 | 5.178 | 4.298 | 1.903 | 1.077 | 826 | 1.996 | 1.101 | 896 | 2.519 | 1.333 | 1.186 | 2.206 | 1.191 | 1.015 | 852 | 477 | 376 | 8.624 | 4.702 | 3.922 |
| Sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio | 27,2 | 29,5 | 24,9 | 21,6 | 24,1 | 19,0 | 27,6 | 29,6 | 25,6 | 27,3 | 29,2 | 25,4 | 30,6 | 33,5 | 27,8 | 36,0 | 37,8 | 34,0 | 26,6 | 28,8 | 24,3 |

T = Total; H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.236.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




| | % |
|---|------|
| Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...) | 21,3 |
| Otras | 3,2 |
| Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...) | 2,5 |
| Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina... | 2,4 |
| Cocaína | 1,1 |
| Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín) | 0,8 |
| Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice) | 0,7 |
| Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam | 0,5 |
| Durvitan | 0,4 |
| Elvanse, Adderall | 0,3 |
| Modafinilo (Modiodal, Provigil) | 0,3 |
| Donepezilo (Aricept, Donebrain) | 0,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.237.

Prevalencia de consumo de sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido estas sustancias (%). España, 2016.



| | % |
|---|------|
| Bebidas energéticas (Red Bull, Burn, Monster...) | 82,6 |
| Otras | 12,3 |
| Complejos vitamínicos (Berocca, Memovit, Pharmaton, Supradyn...) | 9,5 |
| Productos que contienen: Ginkgo Biloba, Guaraná, Ácidos grasos Omega 3, Jalea real, Acetil L-carnitina (ALC), fosfatidilserina... | 9,2 |
| Cocaína | 4,2 |
| Metilfenidato (Concerta, Rubifen, Medikinet, Equasym, Medicebran, Ritalín) | 3,1 |
| Anfetaminas o speed (anfetas, metanfetamina, ice) | 2,7 |
| Piracetam (Nootropil, Ciclofalina, Anacervix), Aniracetam | 1,9 |
| Durvitan | 1,4 |
| Elvanse, Adderall | 1,3 |
| Modafinilo (Modiodal, Provigil) | 1,3 |
| Donepezilo (Aricept, Donebrain) | 1,2 |

Porcentaje calculado sobre los estudiantes que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.238.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras), binge drinking, tabaco, cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio alguna vez en la vida (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Borracheras últimos 12 meses | | Binge drinking últimos 30 días | | Tabaco últimos 12 meses | | Cannabis últimos 12 meses | | Cannabis (consumo problemático)* | |
|---|---------------|------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Nº casos | 9.476 | 5.220 | 3.858 | 4.345 | 5.047 | 4.868 | 4.597 | 3.942 | 5.452 | 577 | 2.778 |
| Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio | 27,2 | 57,5 | 42,5 | 46,3 | 53,7 | 51,4 | 48,6 | 42,0 | 58,0 | 17,2 | 82,8 |


* Consumo problemático (CAST ≥4). CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Se lee: entre los que han consumido sustancias Estimulantes para estudiar un X% se han emborrachado.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.239.


Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido sustancias estimulantes con el fin de mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes que han consumido dichas sustancias (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.240.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.241.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.




| | Spice | Ketamina | Salvia | Mefedrona |
|---------|-------|----------|--------|-----------|
| Hombres | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Mujeres | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.242.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



| | Spice | Ketamina | Salvia | Mefedrona |
|------------|-------|----------|--------|-----------|
| 14 años | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 15 años | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 16 años | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 17 años | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| 14-17 años | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 18 años | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.243.


Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.244.

Desconocimiento de los problemas de salud que conlleva el consumo de nuevas sustancias entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alguna vez en la vida alguna de las siguientes nuevas sustancias (%). España, 2016.




Se excluyen de la base los casos que no contestan y no han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.245.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.246.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la hora de regreso a casa en la última salida (%). España, 2016.




Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.247.

Prevalencia de sustancias psicoactivas (nuevas sustancias frente a legales e ilegales) consumidas alguna vez en la vida, según la hora de regreso a casa en la última salida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

Sustancias legales: alcohol, tabaco, hipnosedantes con y o sin receta e inhalables volátiles.

Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo y/o base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.248.


Evolución de las prevalencias de consumo de nuevas sustancias entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2010-2016.

| | Prevalencia de consumo alguna vez en la vida | | | | Prevalencia de consumo en los últimos 12 meses | | | | Prevalencia de consumo en los últimos 30 días | | | |
|--------------------------|--|------|------|------|--|------|------|------|---|------|------|------|
| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2010 | 2012 | 2016 | 2014 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Ketamina | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Spice | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Piperazinas | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Mefedrona | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Nexus | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,3 | - | - |
| Metanfetamina | 0,8 | 0,9 | 0,8 | - | 0,6 | 0,7 | 0,5 | - | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| Setas mágicas | 2,1 | 2,2 | 1,3 | - | 1,6 | 1,4 | 0,8 | - | 0,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| Research Chemicals | 0,4 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Legal Highs | 0,7 | 0,4 | - | - | 0,6 | 0,3 | - | - | 0,5 | 0,2 | - | - |
| Salvia | - | 0,8 | 0,7 | 0,6 | - | 0,5 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Esteroides anabolizantes | - | 0,7 | 0,6 | - | - | 0,5 | 0,4 | - | - | 0,3 | 0,3 | - |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.249.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.




| | Sí consumidor de nuevas sustancias | No consumidor de nuevas sustancias |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Alcohol | 88,8 | 66,3 |
| Borracheras últimos 30 días | 55,1 | 21,1 |
| Binge drinking | 67,5 | 30,8 |
| Tabaco | 72,8 | 26,0 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 24,6 | 5,5 |
| Cannabis | 70,5 | 17,1 |
| Cocaína polvo y/o base | 25,2 | 0,6 |
| Éxtasis | 18,9 | 0,3 |
| Anfetaminas | 17,9 | 0,2 |
| Alucinógenos | 14,6 | 0,1 |
| Heroína | 14,2 | 0,1 |
| Inhalables volátiles | 9,6 | 0,2 |
| GHB | 10,0 | 0,1 |

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.250.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias psicoactivas alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.




| | Sí consumidor de nuevas sustancias | No consumidor de nuevas sustancias |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Alcohol | 93,3 | 75,0 |
| Borracheras últimos 12 meses | 75,9 | 41,7 |
| Botellón | 78,1 | 51,4 |
| Tabaco | 76,7 | 33,5 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 37,7 | 11,1 |
| Cannabis | 79,4 | 25,0 |
| Cocaína polvo y/o base | 40,6 | 1,7 |
| Éxtasis | 32,4 | 1,0 |
| Anfetaminas | 30,0 | 0,6 |
| Alucinógenos | 27,6 | 0,5 |
| Heroína | 18,5 | 0,2 |
| Inhalables volátiles | 15,8 | 0,3 |
| GHB | 15,3 | 0,1 |

Nuevas sustancias psicoactivas: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.251.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias (%). España, 2016.



| | Sustancias legales (alcohol y/o tabaco) | Sustancias ilegales | Ninguna sustancia legal e ilegal |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| Sí consumidor de nuevas sustancias | 90,8 | 72,7 | 6,0 |
| No consumidor de nuevas sustancias | 68,0 | 17,5 | 29,6 |


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.252.

Prevalencia de consumo de drogas (legales e ilegales) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida frente a los que no han consumido nuevas sustancias. España, 2016.



| | Sustancias legales (alcohol y/o tabaco) | Sustancias ilegales |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Sí consumidor de nuevas sustancias | 94,3 | 80,5 |
| No consumidor de nuevas sustancias | 76,0 | 25,7 |


Drogas legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.253.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (puntuación CAST ≥ 4) o no entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido nuevas sustancias alguna vez en la vida o no (%). España, 2016.



CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.254.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), por sexo y edad (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Consumir ketamina alguna vez | 77,2 | 72,0 | 82,7 | 69,8 | 74,6 | 77,6 | 81,7 | 76,3 | 86,7 |
| Consumir spice alguna vez | 77,7 | 71,8 | 83,8 | 69,9 | 75,0 | 78,8 | 81,5 | 76,8 | 87,9 |
| Consumir mefedrona alguna vez | 75,9 | 70,5 | 82,2 | 68,3 | 73,6 | 76,8 | 80,7 | 75,0 | 87,2 |
| Consumir salvia alguna vez | 71,5 | 67,2 | 76,5 | 65,0 | 70,2 | 72,4 | 74,8 | 70,8 | 80,9 |

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

H = Hombres; M = Mujeres.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.255.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez* de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

| | SÍ consumen esa sustancia | NO consumen esa sustancia |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Consumir ketamina alguna vez | 46,3 | 77,7 |
| Consumir spice alguna vez | 46,0 | 78,7 |
| Consumir mefedrona alguna vez | 55,3 | 76,3 |
| Consumir salvia alguna vez | 54,8 | 76,2 |

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.256.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
| Consumir ketamina alguna vez | 50,5 | 53,2 | 47,2 | 35,0 |
| Consumir spice alguna vez | 47,0 | 50,1 | 47,6 | 35,7 |
| Consumir mefedrona alguna vez | 43,2 | 41,1 | 43,1 | 30,7 |
| Consumir metanfetamina alguna vez | 46,7 | 54,0 | 54,1 | - |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 48,2 | 54,4 | 51,2 | - |
| Consumir salvia alguna vez | - | 39,6 | 39,6 | 28,2 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | - | 52,3 | 50,2 | - |
| Consumir piperazinas habitualmente | 43,6 | 41,4 | - | - |
| Consumir nexus habitualmente | 42,7 | 41,2 | - | - |
| Consumir research chemicals habitualmente | 41,4 | 39,6 | - | - |
| Consumir legal highs habitualmente | 41,3 | 40,7 | - | - |

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.257.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo alguna vez de nuevas sustancias (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas) (%). España, 2010-2016.

| | 2012 | 2014 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Consumir ketamina alguna vez | 68,2 | 82,2 | 77,2 |
| Consumir spice alguna vez | 72,4 | 82,7 | 77,7 |
| Consumir mefedrona alguna vez | 74,8 | 83,0 | 75,9 |
| Consumir metanfetamina alguna vez | 75,4 | 87,4 | - |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 65,3 | 77,6 | - |
| Consumir salvia alguna vez | 71,2 | 78,8 | 71,5 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | 65,3 | 81,1 | - |

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente. Habitualmente: una vez por semana o más frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

Entre los que han contestado la pregunta, eliminando los casos de NS/NC, blancos y que nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.258.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que desconocen los problemas de salud que puede significar consumir alguna de las siguientes nuevas sustancias psicoactivas, según consuman o no consuman la sustancia (%). España, 2016.

| No saben los problemas de salud que pueden causar | | | |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|
| | Todos | Sí consumen esa sustancia | NO consumen esa sustancia |
| Consumir salvia alguna vez | 49,7 | 23,9 | 50,1 |
| Consumir mefedrona alguna vez | 48,4 | 41,8 | 48,4 |
| Consumir ketamina alguna vez | 44,4 | 32,5 | 44,5 |
| Consumir spice alguna vez | 43,8 | 30,4 | 44,1 |

Alguna vez: una vez al mes o menos frecuentemente.

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se considera consumidores aquellos que han consumido alguna vez cada una de las sustancias.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.259.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga). España, 2010-2016.

| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Ketamina | 40,2 | 41,9 | 38,8 | 51,5 |
| Spice | 39,8 | 42,6 | 41,4 | 53,7 |
| Piperazinas | 31,5 | 34,4 | - | - |
| Mefedrona | 30,9 | 33,9 | 35,4 | 46,0 |
| Nexus | 30,5 | 34,8 | - | - |
| Metanfetamina | 39,8 | 43,8 | 42,9 | - |
| Setas mágicas | 50,3 | 52,0 | 49,0 | - |
| Research chemicals | 30,6 | 34,4 | - | - |
| Legal highs | 32,8 | 35,4 | - | - |
| Salvia | - | 37,5 | 37,7 | 48,5 |
| Esteroides anabolizantes | - | 54,0 | 51,6 | - |

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.260.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga) según hayan consumido alguna vez en la vida o no la sustancia (%). España, 2010-2016.


| | Todos | | | | Sí consumen esa sustancia | | | | NO consumen esa sustancia | | | |
|--------------------|-------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2010 | 2012 | 2016 | 2014 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
| Ketamina | 40,2 | 41,8 | 38,8 | 51,5 | 83,6 | 74,4 | 76,8 | 75,0 | 39,4 | 41,0 | 38,2 | 51,0 |
| Spice | 39,8 | 42,5 | 41,4 | 53,7 | 79,1 | 73,4 | 78,9 | 86,5 | 39 | 41,4 | 40,6 | 52,6 |
| Piperazinas | 31,5 | 34,2 | - | - | 75,6 | 66,2 | - | - | 31,2 | 33,8 | - | - |
| Mefedrona | 30,9 | 34,2 | 35,4 | 46,0 | 78,2 | 66,2 | 69,7 | 73,7 | 30,5 | 33,8 | 35,0 | 45,6 |
| Nexus | 30,5 | 34,6 | - | - | 73,4 | 66,2 | - | - | 30,1 | 34,1 | - | - |
| Metanfetamina | 39,8 | 43,6 | 42,9 | - | 80,5 | 74,7 | 78,7 | - | 39,2 | 43,0 | 42,2 | - |
| Setas mágicas | 50,3 | 52,0 | 49,0 | - | 84,7 | 84,2 | 84,3 | - | 48,9 | 50,4 | 48,0 | - |
| Research chemicals | 30,6 | 34,2 | - | - | 67 | 75,6 | - | - | 30,3 | 33,8 | - | - |
| Legal highs | 32,8 | 35,1 | - | - | 79,3 | 73,9 | - | - | 32,2 | 34,7 | - | - |
| Salvia | - | 37,3 | 37,7 | 48,5 | - | 75,4 | 78,4 | 86,4 | - | 36,4 | 36,9 | 47,6 |
| E. anabolizantes | - | 53,9 | 51,6 | - | - | 72,7 | 81,4 | - | - | 53,7 | 51,3 | - |

Se excluyen de la base los casos que no contestan, no saben o nunca han oído hablar de la sustancia y se eliminan los casos sin información.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.261.

Formas de conseguir nuevas sustancias en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido nuevas sustancias en los últimos 12 meses (%). España, 2014-2016.




| | 2014 | 2016 |
|---|------|------|
| Me la ofreció un amigo | 55,0 | 53,7 |
| A través de un vendedor (camello) | 45,0 | 34,5 |
| Me la ofrecieron en una fiesta, en un pub, en un bar | 23,1 | 27,3 |
| Las compré en una tienda especializada (smart shop o head shop) | 8,0 | 6,4 |
| Otros sitios | 15,9 | 5,8 |
| A través de internet | 6,2 | 5,3 |

Nuevas sustancias: ketamina, spice, mefedrona o salvia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.262.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.263.

Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.264.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

| | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Ninguna sustancia | 18,9 | 21,7 | 30,0 |
| Una sola sustancia | 32,9 | 36,7 | 39,2 |
| Dos sustancias | 19,4 | 18,1 | 16,3 |
| Tres sustancias | 19,5 | 17,5 | 12,3 |
| Cuatro o más sustancias | 9,3 | 6,0 | 2,2 |

* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.265.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 2016.

| | Alguna vez en la vida | | Últimos 12 meses | | Últimos 30 días | |
|------------------------|-----------------------|------|------------------|------|-----------------|------|
| | H | M | H | M | H | M |
| Ninguna sustancia | 20,3 | 17,6 | 23,3 | 20,1 | 31,5 | 28,5 |
| Una sola sustancia | 33,6 | 32,3 | 37,1 | 36,2 | 39,0 | 39,4 |
| Dos sustancias | 17,7 | 21,0 | 16,1 | 20,1 | 14,3 | 18,3 |
| Tres sustancias | 19,6 | 19,4 | 17,6 | 17,4 | 13,0 | 11,7 |
| Cuatro sustancias | 5,4 | 7,3 | 3,5 | 4,8 | 1,4 | 1,7 |
| Cinco o más sustancias | 3,4 | 2,5 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |

* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.266.

Evolución de la prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

| | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| Ninguna sustancia | 16,8 | 21,0 | 21,7 |
| Una sola sustancia | 38,9 | 39,1 | 36,7 |
| Dos sustancias | 20,1 | 17,7 | 18,1 |
| Tres sustancias | 17,5 | 16,7 | 17,5 |
| Cuatro sustancias | 3,9 | 3,7 | 4,2 |
| Cinco o más sustancias | 2,8 | 1,8 | 1,9 |

* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.267.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la edad (%). España, 2016.

| | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| Ninguna sustancia | 40,7 | 23,0 | 15,8 | 9,7 | 22,8 | 6,7 |
| Una sola sustancia | 35,9 | 37,9 | 39,2 | 35,7 | 37,2 | 29,0 |
| Dos sustancias | 13,5 | 18,3 | 19,2 | 21,0 | 17,8 | 21,7 |
| Tres sustancias | 7,5 | 15,7 | 19,7 | 25,2 | 16,7 | 28,3 |
| Cuatro sustancias | 1,7 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 3,7 | 10,2 |
| Cinco o más sustancias | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 2,7 | 1,7 | 4,1 |

* Sustancias legales e ilegales: tabaco, alcohol, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.268.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.

| | Alguna vez en la vida | Últimos 12 meses | Últimos 30 días |
|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| Ninguna sustancia | 68,3 | 73,8 | 82,2 |
| Una sola sustancia | 27,4 | 23,2 | 16,8 |
| Dos sustancias | 2,2 | 1,4 | 0,4 |
| Tres sustancias | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
| Cuatro sustancias | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Cinco o más sustancias | 0,8 | 0,6 | 0,2 |

* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.269.

Prevalencia del número de sustancias psicoactivas consumidas (ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.

| | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------------------|------|------|------|
| Ninguna sustancia | 73,2 | 74,1 | 73,8 |
| Una sola sustancia | 22,7 | 22,9 | 23,2 |
| Dos sustancias | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Tres sustancias | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Cuatro sustancias | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| Cinco o más sustancias | 1,1 | 0,6 | 0,6 |

* Sustancias ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.270.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)*. España, 2016.

| | Alcohol | Tabaco | Cannabis | Hipnosedantes** | Hipnosedantes*** | Cocaína en polvo | Cocaína base | Cocaína polvo y/o base | Anfetaminas/speed | Alucinógenos | Éxtasis | Heroína | Inhalables volátiles | GHB |
|------------------------|---------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|----------------------|-------|
| Alcohol | 100,0 | 44,7 | 34,1 | 6,3 | 13,1 | 2,8 | 1,6 | 3,2 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| Tabaco | 97,0 | 100,0 | 62,8 | 8,6 | 16,9 | 5,2 | 3,1 | 5,9 | 2,8 | 2,4 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| Cannabis | 97,7 | 82,5 | 100,0 | 9,9 | 18,3 | 7,5 | 4,3 | 8,4 | 4,0 | 3,4 | 5,5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 |
| Hipnosedantes** | 88,1 | 55,6 | 48,1 | 100,0 | 100,0 | 9,7 | 6,6 | 10,9 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 3,7 | 4,1 | 3,1 |
| Hipnosedantes*** | 85,4 | 50,2 | 41,3 | 47,1 | 100,0 | 6,8 | 4,3 | 7,6 | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 2,3 | 2,4 | 1,8 |
| Cocaína en polvo | 98,7 | 84,4 | 91,7 | 24,9 | 37,7 | 100,0 | 44,5 | 100,0 | 37,9 | 28,2 | 42,0 | 19,8 | 14,4 | 12,4 |
| Cocaína base | 96,1 | 84,4 | 89,7 | 29,1 | 40,6 | 76,8 | 100,0 | 100,0 | 39,2 | 32,9 | 45,0 | 30,3 | 21,8 | 21,7 |
| Cocaína polvo y/o base | 97,4 | 83,0 | 89,3 | 24,3 | 36,3 | 88,5 | 52,1 | 100,0 | 34,8 | 26,0 | 38,6 | 19,4 | 13,8 | 12,0 |
| Anfetaminas/speed | 96,3 | 83,5 | 91,2 | 26,7 | 38,7 | 68,5 | 41,6 | 71,7 | 100,0 | 48,1 | 62,8 | 31,5 | 25,5 | 23,8 |
| Alucinógenos | 96,2 | 84,0 | 92,6 | 35,8 | 46,3 | 61,1 | 41,8 | 64,1 | 57,5 | 100,0 | 61,3 | 36,2 | 30,7 | 28,3 |
| Éxtasis | 97,5 | 84,5 | 90,7 | 25,4 | 37,1 | 55,5 | 34,8 | 58,0 | 46,0 | 37,8 | 100,0 | 23,7 | 19,3 | 16,8 |
| Heroína | 93,8 | 73,7 | 88,8 | 36,1 | 49,6 | 78,0 | 66,6 | 83,9 | 67,0 | 63,8 | 68,7 | 100,0 | 48,4 | 43,8 |
| Inhalables volátiles | 92,5 | 70,2 | 73,4 | 35,8 | 45,7 | 50,2 | 44,4 | 54,1 | 49,2 | 49,4 | 50,9 | 43,0 | 100,0 | 36,3 |
| GHB | 92,1 | 77,4 | 88,2 | 44,3 | 55,2 | 74,7 | 72,6 | 79,0 | 74,2 | 75,1 | 73,7 | 65,8 | 60,2 | 100,0 |

* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

** Hipnosedantes (sin receta).

*** Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.271.

Proporción de consumidores de otras drogas (en los últimos 30 días) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han consumido alcohol, tabaco, cannabis, éxtasis, hipnosedantes sin receta, hipnosedantes, cocaína en polvo, cocaína base, cocaína polvo y/o base, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables volátiles o GHB en los últimos 12 meses (porcentajes de fila)*. España, 2016.

| | Alcohol | Tabaco | Cannabis | Hipnosedantes** | Hipnosedantes*** | Cocaína en polvo | Cocaína base | Cocaína polvo y/o base | Anfetaminas/speed | Alucinógenos | Éxtasis | Heroína | Inhalables volátiles | GHB |
|------------------------|---------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|----------------------|-------|
| Alcohol | 100,0 | 38,3 | 25,9 | 3,2 | 6,8 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| Tabaco | 93,7 | 100,0 | 52,1 | 4,7 | 9,6 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Cannabis | 94,2 | 77,5 | 100,0 | 6,0 | 10,6 | 4,1 | 2,7 | 4,8 | 2,4 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| Hipnosedantes** | 81,8 | 48,3 | 41,1 | 100,0 | 100,0 | 6,9 | 5,8 | 8,1 | 5,5 | 4,9 | 6,0 | 4,8 | 4,2 | 4,0 |
| Hipnosedantes*** | 77,7 | 44,4 | 32,9 | 45,9 | 100,0 | 4,4 | 3,5 | 5,2 | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 2,5 | 2,1 |
| Cocaína en polvo | 96,1 | 77,4 | 88,3 | 22,5 | 31,6 | 100,0 | 49,8 | 100,0 | 38,3 | 22,7 | 38,1 | 26,3 | 19,1 | 16,0 |
| Cocaína base | 96,4 | 81,6 | 88,4 | 28,9 | 38,8 | 77,2 | 100,0 | 100,0 | 39,9 | 30,9 | 44,6 | 39,4 | 26,7 | 22,7 |
| Cocaína polvo y/o base | 95,5 | 77,6 | 86,8 | 22,1 | 31,7 | 88,1 | 58,7 | 100,0 | 34,5 | 21,2 | 35,4 | 25,4 | 17,1 | 14,6 |
| Anfetaminas/speed | 91,5 | 75,4 | 84,2 | 27,1 | 36,5 | 65,3 | 45,1 | 70,6 | 100,0 | 48,1 | 62,8 | 44,4 | 36,6 | 35,2 |
| Alucinógenos | 91,4 | 77,2 | 85,3 | 33,9 | 46,0 | 57,4 | 51,6 | 63,3 | 66,1 | 100,0 | 68,6 | 56,8 | 44,3 | 48,3 |
| Éxtasis | 92,9 | 76,2 | 86,2 | 26,6 | 37,8 | 57,1 | 44,5 | 62,1 | 56,0 | 43,6 | 100,0 | 39,9 | 29,0 | 30,4 |
| Heroína | 93,4 | 72,5 | 87,3 | 37,2 | 46,5 | 73,2 | 66,9 | 81,1 | 69,6 | 63,4 | 69,7 | 100,0 | 55,5 | 52,0 |
| Inhalables volátiles | 83,9 | 64,6 | 65,7 | 32,7 | 43,4 | 50,8 | 46,6 | 53,7 | 57,2 | 50,1 | 50,5 | 51,9 | 100,0 | 45,1 |
| GHB | 86,8 | 72,5 | 77,3 | 44,1 | 53,3 | 65,6 | 62,4 | 72,7 | 78,5 | 76,3 | 75,4 | 72,3 | 65,5 | 100,0 |

* Porcentaje de consumidores de la sustancia (fila) que también consumen la sustancia (columna).

** Hipnosedantes (sin receta). *** Hipnosedantes (con o sin receta).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.272.

Prevalencia de consumo de una, dos o más sustancias psicoactivas según sustancia consumida en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentajes de fila). España, 2016.


| | Una sustancia | Dos sustancias | Tres sustancias | Cuatro o más sustancias |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Alcohol | 45,3 | 23,6 | 23,2 | 8,0 |
| Tabaco | 2,0 | 31,3 | 49,5 | 17,1 |
| Cannabis | 1,2 | 14,4 | 61,6 | 22,9 |
| Hipnosedantes sin receta | 10,3 | 30,4 | 16,4 | 42,9 |
| Hipnosedantes con o sin receta | 13,3 | 32,9 | 17,6 | 36,2 |
| Cocaína en polvo | 0,6 | 2,9 | 3,3 | 93,3 |
| Cocaína base | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 90,8 |
| Cocaína polvo y/o base | 1,3 | 4,5 | 4,6 | 89,6 |
| Éxtasis | 0,7 | 3,2 | 4,8 | 91,3 |
| Anfetaminas/speed | 0,5 | 1,1 | 4,6 | 93,7 |
| Alucinógenos | 0,4 | 2,7 | 2,4 | 94,5 |
| Heroína | 0,0 | 5,6 | 2,6 | 91,8 |
| Inhalables volátiles | 5,1 | 11,1 | 4,4 | 79,4 |
| GHB | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 94,8 |

Nota: policonsumo de drogas legales e ilegales = alcohol, tabaco, hipnosedantes con/sin receta, inhalables volátiles, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.273.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan hecho binge drinking o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




| | Cannabis | Cocaína polvo y/o base | Éxtasis | Anfetaminas o speed | Alucinógenos | Heroína | I. volátiles | GHB |
|--|----------|------------------------|---------|---------------------|--------------|---------|--------------|-----|
| Ha hecho binge drinking últimos 30 días | 39,1 | 2,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| No ha hecho binge drinking últimos 30 días | 8,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |

Se lee: entre los que han hecho binge drinking un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.274.

Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según se hayan emborrachado o no en el mismo periodo (%). España, 2016.




| | Cannabis | Cocaína polvo y/o base | Éxtasis | Anfetaminas o speed | Alucinógenos | Heroína | I. volátiles | GHB |
|---------------------------------------|----------|------------------------|---------|---------------------|--------------|---------|--------------|-----|
| Se ha emborrachado últimos 30 días | 45,3 | 2,8 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
| No se ha emborrachado últimos 30 días | 10,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Se lee: entre los que se han emborrachado un X% ha consumido cannabis.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.275.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




| | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Total | 24,9 | 22,9 | 19,6 | 17,3 | 15,2 |
| Sexo | | | | | |
| Hombres | 28,0 | 24,8 | 22,7 | 19,5 | 16,5 |
| Mujeres | 21,8 | 21,0 | 16,5 | 15,2 | 13,9 |
| Edad | | | | | |
| 14 años | 11,4 | 9,1 | 6,8 | 6,3 | 5,0 |
| 15 años | 21,0 | 17,3 | 12,9 | 12,5 | 12,4 |
| 16 años | 27,3 | 26,2 | 19,6 | 20,7 | 17,1 |
| 17 años | 33,2 | 33,4 | 25,8 | 25,5 | 24,1 |
| 14-17 años | - | - | - | - | 14,3 |
| 18 años | 38,1 | 35,9 | 29,7 | 25,8 | 27,9 |

* Consumo de alcohol y cannabis sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.276.

Prevalencia de consumo conjunto* de alcohol y cocaína en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2008-2016.




| | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------|------|------|------|------|------|
| Total | 4,1 | 3,0 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| Sexo | | | | | |
| Hombres | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 1,6 |
| Mujeres | 3,1 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
| Edad | | | | | |
| 14 años | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 |
| 15 años | 3,4 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| 16 años | 4,0 | 2,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| 17 años | 4,9 | 4,4 | 1,9 | 1,4 | 1,5 |
| 14-17 años | – | – | – | – | 1,0 |
| 18 años | 8,1 | 6,1 | 3,5 | 2,1 | 4,2 |

* Consumo de alcohol y cocaína sin que hayan pasado más de 2 horas entre el consumo de una y otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.277.

Prevalencia de consumo conjunto* de tabaco y cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




| | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Total | 20,9 | 19,7 | 21,5 |
| Sexo | | | |
| Hombres | 22,2 | 20,7 | 22,1 |
| Mujeres | 19,5 | 18,7 | 20,9 |
| Edad | | | |
| 14 años | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| 15 años | 15,4 | 14,9 | 19,1 |
| 16 años | 20,6 | 23,1 | 23,8 |
| 17 años | 26,5 | 27,4 | 30,7 |
| 14-17 años | - | - | 20,2 |
| 18 años | 30,7 | 29,9 | 39,1 |

* Se obtiene de cruzar a las personas que han consumido ambas sustancias en el mismo periodo.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.278.

Prevalencia de consumo conjunto de tabaco diario y cannabis en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.




| | 2012 | 2014 | 2016 |
|------------|------|------|------|
| Total | 6,8 | 5,9 | 6,1 |
| Sexo | | | |
| Hombres | 7,1 | 6,3 | 6,5 |
| Mujeres | 6,4 | 5,4 | 5,7 |
| Edad | | | |
| 14 años | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| 15 años | 4,0 | 3,7 | 5,0 |
| 16 años | 6,2 | 7,2 | 6,9 |
| 17 años | 9,1 | 8,6 | 9,2 |
| 14-17 años | - | - | 5,6 |
| 18 años | 12,0 | 11,6 | 13,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.279.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 1994-2016.




■ Heroína
 ■ Cocaína en polvo
 ■ Éxtasis
 ■ Hipnosedantes
 ■ Cannabis
 ■ Tabaco (un paquete diario)
■ Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana
■ Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente

| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Heroína | 98,9 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 98,6 | 98,8 | 97,0 | 96,2 | 96,3 | 96,9 | 97,5 | 96,4 |
| Cocaína en polvo | 98,5 | 97,6 | 97,4 | 96,9 | 97,4 | 97,8 | 96,8 | 96,0 | 96,2 | 96,6 | 96,9 | 96,4 |
| Éxtasis | 97,2 | 97,1 | 97,0 | 95,5 | 96,7 | 97,2 | 97,0 | 96,1 | 95,9 | 96,5 | 96,9 | 96,2 |
| Hipnosedantes | 90,6 | 88,6 | 88,5 | 87,4 | 88,7 | 89,7 | 87,5 | 86,6 | 85,5 | 89,5 | 88,6 | 87,7 |
| Cannabis | 91,9 | 87,7 | 85,9 | 82,8 | 81,7 | 83,7 | 89,0 | 88,3 | 88,7 | 88,1 | 88,8 | 90,7 |
| Tabaco (un paquete diario) | 76,9 | 75,2 | 78,0 | 77,3 | 78,9 | 80,3 | 87,3 | 88,8 | 90,4 | 91,4 | 89,7 | 91,8 |
| Tomar 5 o 6 cañas/copas en fin de semana | 43,8 | 45,2 | 44,8 | 44,9 | 44,8 | 41,2 | 51,3 | 47,2 | 47,0 | 47,5 | 55,3 | 56,1 |
| Tomar 1 o 2 cañas/copas diariamente | 50,2 | 48,5 | 45,9 | 44,0 | 43,6 | 41,4 | 57,4 | 57,9 | 59,8 | 59,7 | 57,8 | 52,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.280.

Evolución del riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de distintas drogas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas). España, 2008-2016.



| | 2008 | 2012 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Consumir alcohol (5 o 6 cañas/copas en fin de semana) | 56,1 | 47,5 | 47,2 |
| Consumir alcohol (1 o 2 cañas/copas cada día) | 52,9 | 59,7 | 57,9 |
| Consumir hipnosedantes habitualmente | 87,7 | 89,5 | 86,6 |
| Consumir cannabis habitualmente | 90,7 | 88,1 | 88,3 |
| Consumir un paquete tabaco/día | 91,8 | 91,4 | 88,8 |
| Consumir éxtasis habitualmente | 96,2 | 96,5 | 96,1 |
| Consumir cocaína en polvo habitualmente | 96,4 | 96,6 | 96 |
| Consumir heroína habitualmente | 96,4 | 96,9 | 96,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.281.

Evolución del riesgo percibido del consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) entre los Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo (%). España, 1994-2016.

| | 1994 | | 1996 | | 1998 | | 2000 | | 2002 | | 2004 | | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | | 2014 | | 2016 | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| Número de encuestados | 10.415 | 10.374 | 8.867 | 9.668 | 8.224 | 9.341 | 10.147 | 9.777 | 12.964 | 13.946 | 12.864 | 13.076 | 12.598 | 13.856 | 14.951 | 15.232 | 15.595 | 16.372 | 13.769 | 13.734 | 18.405 | 19.081 | 17.649 | 17.720 |
| Fumar un paquete de tabaco diario | 74,7 | 79,1 | 72,8 | 77,4 | 75,7 | 79,9 | 75,1 | 79,5 | 76,7 | 80,8 | 78,2 | 82,3 | 84,9 | 89,3 | 86,5 | 91,0 | 88,9 | 91,7 | 89,6 | 93,1 | 88,1 | 91,1 | 91,0 | 92,7 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana | 39,8 | 47,7 | 40,6 | 49,4 | 40,3 | 48,7 | 41,5 | 48,3 | 41,1 | 48,1 | 36,8 | 45,7 | 48,7 | 53,6 | 45,1 | 49,2 | 44,2 | 49,5 | 44,7 | 50,3 | 52,6 | 57,7 | 55,7 | 56,5 |
| Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas a diario | 46,3 | 54,6 | 43,7 | 52,9 | 41,7 | 49,4 | 39,4 | 48,4 | 38,7 | 47,9 | 36,8 | 45,7 | 52,3 | 61,9 | 52,7 | 62,9 | 56,7 | 62,6 | 55,1 | 64,1 | 53,3 | 62,0 | 48,7 | 56,9 |
| Fumar cannabis habitualmente | 89,8 | 93,9 | 84,9 | 90,2 | 82,4 | 88,8 | 79,4 | 86,1 | 77,5 | 85,4 | 81,1 | 86,2 | 85,7 | 91,7 | 84,5 | 91,8 | 85,5 | 91,6 | 84,3 | 91,7 | 85,4 | 91,9 | 88,0 | 93,2 |
| Tomar hipnosedantes habitualmente | 89,9 | 91,3 | 87,8 | 89,4 | 87,5 | 89,2 | 86,9 | 87,9 | 88,3 | 89,1 | 89,8 | 89,6 | 86,1 | 88,6 | 84,6 | 88,4 | 83,8 | 87,0 | 88,7 | 90,3 | 88,3 | 89,0 | 87,2 | 88,1 |
| Consumir éxtasis habitualmente | 96,6 | 97,9 | 96,2 | 97,9 | 96,3 | 97,5 | 95,0 | 95,9 | 96,4 | 97,1 | 97,1 | 97,3 | 95,8 | 98,0 | 94,1 | 97,8 | 94,6 | 97,1 | 95,2 | 97,8 | 95,9 | 97,8 | 95,5 | 97,0 |
| Consumir cocaína en polvo habitualmente | 98,1 | 99,0 | 96,9 | 98,3 | 96,7 | 98,0 | 96,3 | 97,5 | 96,9 | 97,8 | 97,5 | 98,1 | 95,6 | 97,9 | 94,0 | 97,8 | 95,0 | 97,3 | 95,4 | 97,9 | 96,0 | 97,7 | 95,7 | 97,1 |
| Consumir heroína habitualmente | 98,4 | 99,3 | 97,4 | 98,8 | 97,5 | 98,7 | 97,6 | 98,8 | 98,4 | 98,8 | 98,5 | 99,1 | 95,8 | 98,1 | 94,3 | 98,0 | 95,0 | 97,5 | 95,7 | 98,0 | 96,4 | 98,4 | 95,6 | 97,1 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.282.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según sexo y edad (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Fumar cannabis alguna vez | 54,1 | 53,0 | 55,2 | 64,9 | 57,0 | 50,6 | 45,9 | 54,5 | 49,3 |
| Consumir cocaína en polvo alguna vez | 78,1 | 79,5 | 76,7 | 75,8 | 77,6 | 78,0 | 79,8 | 77,8 | 82,5 |
| Consumir cocaína base alguna vez | 82,8 | 83,9 | 81,8 | 79,9 | 81,5 | 82,7 | 85,6 | 82,4 | 88,0 |
| Consumir éxtasis alguna vez | 80,3 | 81,5 | 79,1 | 78,7 | 79,3 | 79,8 | 82,0 | 79,9 | 85,1 |
| Consumir anfetaminas o speed alguna vez | 80,4 | 81,5 | 79,2 | 77,5 | 80,0 | 80,3 | 82,2 | 80,0 | 85,0 |
| Consumir alucinógenos alguna vez | 80,3 | 80,7 | 79,9 | 79,1 | 79,8 | 79,4 | 81,8 | 80,0 | 84,4 |
| Consumir heroína alguna vez | 82,3 | 83,6 | 81,1 | 79,2 | 81,4 | 82,0 | 85,2 | 81,9 | 87,5 |
| Inyectarse drogas alguna vez | 88,7 | 89,3 | 88,1 | 86,9 | 87,3 | 89,1 | 90,8 | 88,5 | 90,6 |
| Consumir GHB alguna vez | 88,1 | 88,7 | 87,6 | 85,8 | 86,8 | 88,8 | 90,3 | 88,0 | 90,3 |
| Consumir metanfetamina alguna vez | 85,9 | 86,4 | 85,3 | 83,8 | 84,9 | 86,1 | 88,0 | 85,7 | 88,3 |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 83,0 | 82,7 | 83,2 | 83,9 | 82,8 | 83,2 | 82,2 | 83,0 | 81,9 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | 84,7 | 84,9 | 84,5 | 83,2 | 84,0 | 84,6 | 86,3 | 84,6 | 86,4 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.283.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Fumar un paquete de tabaco diario | 91,8 | 91,0 | 92,7 | 91,2 | 90,9 | 92,3 | 93,0 | 91,9 | 91,4 |
| Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios | 68,2 | 67,1 | 69,3 | 71,7 | 67,3 | 68,7 | 67,0 | 68,8 | 61,0 |
| Fumar cigarrillos electrónicos | 34,2 | 32,8 | 35,6 | 36,1 | 32,4 | 33,3 | 34,2 | 34,0 | 37,3 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana | 56,1 | 55,7 | 56,5 | 65,4 | 58,5 | 53,5 | 49,1 | 56,6 | 49,7 |
| Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 52,9 | 48,7 | 56,9 | 55,5 | 51,9 | 52,5 | 52,0 | 53,0 | 51,8 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 90,5 | 89,0 | 91,9 | 91,5 | 89,6 | 90,4 | 91,1 | 90,7 | 88,2 |
| Tomar hipnosedantes habitualmente | 87,7 | 87,2 | 88,1 | 86,3 | 86,7 | 89,0 | 88,1 | 87,6 | 88,6 |
| Fumar cannabis habitualmente | 90,7 | 88,0 | 93,2 | 93,2 | 91,3 | 90,0 | 89,4 | 90,9 | 86,9 |
| Consumir cocaína polvo habitualmente | 96,4 | 95,7 | 97,1 | 95,8 | 95,9 | 96,6 | 97,3 | 96,4 | 96,0 |
| Consumir éxtasis habitualmente | 96,2 | 95,5 | 97,0 | 95,4 | 95,3 | 96,7 | 97,4 | 96,2 | 96,1 |
| Consumir anfetaminas o speed habitualmente | 96,0 | 95,2 | 96,9 | 95,0 | 95,4 | 96,4 | 97,3 | 96,1 | 96,0 |
| Consumir alucinógenos habitualmente | 95,8 | 94,8 | 96,8 | 95,0 | 94,9 | 96,3 | 96,9 | 95,8 | 95,9 |
| Consumir heroína habitualmente | 96,4 | 95,6 | 97,1 | 95,7 | 95,7 | 96,8 | 97,3 | 96,4 | 96,2 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.284.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2016.

| | Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses | |
|---|--|------|
| | Sí | No |
| Fumar un paquete de tabaco diario | 88,9 | 93,1 |
| Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios | 56,0 | 72,8 |
| Fumar cigarrillos electrónicos | 30,4 | 35,6 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana | 46,1 | 59,9 |
| Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 48,5 | 54,5 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 87,4 | 91,8 |
| Tomar hipnosedantes habitualmente | 86,8 | 88,0 |
| Fumar cannabis habitualmente | 80,3 | 94,7 |
| Consumir cocaína en polvo habitualmente | 95,8 | 96,7 |
| Consumir éxtasis habitualmente | 95,8 | 96,5 |
| Consumir anfetaminas o speed habitualmente | 95,7 | 96,3 |
| Consumir alucinógenos habitualmente | 95,0 | 96,2 |
| Consumir heroína habitualmente | 96,1 | 96,6 |

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.285.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman o no alguna droga ilegal* (%). España, 2016.

| | Ha consumido alguna droga ilegal en los últimos 12 meses | |
|--|--|------|
| | Sí | No |
| Fumar cannabis alguna vez | 31,3 | 62,9 |
| Consumir cocaína en polvo alguna vez | 79,1 | 77,6 |
| Consumir cocaína base alguna vez | 85,3 | 81,8 |
| Consumir éxtasis alguna vez | 80,1 | 80,3 |
| Consumir anfetaminas o speed alguna vez | 80,6 | 80,2 |
| Consumir alucinógenos alguna vez | 78,3 | 81,1 |
| Consumir heroína alguna vez | 84,7 | 81,3 |
| Inyectarse drogas alguna vez | 90,1 | 88,2 |
| Consumir GHB alguna vez | 89,4 | 87,7 |
| Consumir metanfetamina alguna vez | 86,4 | 85,7 |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 78,4 | 84,7 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | 85,3 | 84,5 |

Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con receta, ni inhalables volátiles. Incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.286.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo habitual de hipnosedantes (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas), según hayan consumido hipnosedantes en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

| | Consumo de hipnosedantes en los últimos 12 meses | |
|-----------------------------------|--|------|
| | Sí | No |
| Tomar hipnosedantes habitualmente | 77,4 | 89,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.287.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo habitual, una vez por semana o más frecuentemente, o el consumo esporádico, una vez por al mes o menos frecuentemente puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan hecho binge drinking o se hayan emborrachado en los últimos 30 días y según su puntuación en la escala CAST (%). España, 2016.

| | Total estudiantes E. Secundarias de 14-18 años | Ha hecho binge drinking en los últimos 30 días | Se ha emborrachado en los últimos 30 días | CAST ≥4 (consumo problemático de cannabis) |
|--|--|--|---|--|
| Fumar un paquete de tabaco diario | 91,8 | 89,4 | 89,8 | 79,6 |
| Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios | 68,2 | 58,2 | 58,0 | 40,0 |
| Fumar cigarrillos electrónicos | 34,2 | 30,4 | 29,2 | 31,4 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana | 56,1 | 41,9 | 41,4 | 40,3 |
| Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 52,9 | 46,6 | 47,7 | 45,8 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 90,5 | 86,3 | 87,1 | 82,6 |
| Tomar hipnosedantes habitualmente | 87,7 | 87,9 | 87,8 | 83,1 |
| Fumar cannabis habitualmente | 90,7 | 85,9 | 84,6 | 61,3 |
| Consumir cocaína en polvo habitualmente | 96,4 | 96,0 | 96,5 | 93,6 |
| Consumir éxtasis habitualmente | 96,2 | 96,0 | 96,4 | 93,5 |
| Consumir anfetaminas o speed habitualmente | 96,0 | 95,9 | 96,3 | 92,9 |
| Consumir alucinógenos habitualmente | 95,8 | 95,6 | 95,9 | 91,2 |
| Consumir heroína habitualmente | 96,4 | 96,3 | 96,6 | 93,5 |
| Fumar cannabis alguna vez | 54,1 | 45,1 | 40,9 | 24,1 |
| Consumir cocaína en polvo alguna vez | 78,1 | 79,6 | 79,6 | 73,4 |
| Consumir cocaína base alguna vez | 82,8 | 85,0 | 85,5 | 85,1 |
| Consumir éxtasis alguna vez | 80,3 | 81,1 | 80,9 | 75,4 |
| Consumir anfetaminas o speed alguna vez | 80,4 | 81,5 | 81,6 | 75,2 |
| Consumir alucinógenos alguna vez | 80,3 | 80,6 | 80,3 | 72,8 |
| Consumir heroína alguna vez | 82,3 | 84,3 | 84,9 | 83,9 |
| Injectarse drogas alguna vez | 88,7 | 89,3 | 90,2 | 88,5 |
| Consumir GHB alguna vez | 88,1 | 89,6 | 90,0 | 87,6 |
| Consumir metanfetamina alguna vez | 85,9 | 86,6 | 87,1 | 83,6 |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 83,0 | 81,7 | 80,8 | 69,9 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | 84,7 | 85,7 | 85,8 | 83,2 |

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)

1.2.288.

Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo de tabaco, de bebidas alcohólicas y de cigarrillos electrónicos (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas), según consuman diariamente tabaco o según hayan tomado alcohol en los últimos 30 días (%). España, 2016.

| | Consumo diario de tabaco en los últimos 30 días | | Consumo de alcohol en los últimos 30 días | |
|---|--|------|--|------|
| | Sí | No | Sí | No |
| Fumar un paquete de tabaco diario | 83,7 | 89,8 | 91,1 | 93,4 |
| Fumar de 1 a 5 cigarrillos diarios | 34,7 | 57,9 | 64,3 | 76,3 |
| Fumar cigarrillos electrónicos | 30,2 | 29,9 | 32,4 | 38,3 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas en fin de semana | 41,9 | 47,0 | 49,9 | 69,3 |
| Tomarse 1 o 2 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 46,8 | 49,4 | 50,3 | 58,5 |
| Tomarse 5 o 6 cañas/copas de bebidas alcohólicas cada día | 85,3 | 87,9 | 89,0 | 93,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

1.2.289.


Riesgo percibido por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años ante el consumo esporádico de sustancias psicoactivas (porcentaje de estudiantes que piensa que el consumo esporádico, una vez al mes o menos frecuentemente, puede causar bastantes o muchos problemas) según hayan consumido alguna vez cada sustancia o no (%). España, 2016.

| | Ha consumido la sustancia alguna vez en la vida | |
|--|---|------|
| | Sí | No |
| Fumar cannabis alguna vez | 34,4 | 63,5 |
| Consumir cocaína en polvo alguna vez | 59,6 | 78,5 |
| Consumir cocaína base alguna vez | 70,9 | 83,0 |
| Consumir éxtasis alguna vez | 57,7 | 80,8 |
| Consumir anfetaminas o speed alguna vez | 57,4 | 80,7 |
| Consumir alucinógenos alguna vez | 58,6 | 80,7 |
| Consumir heroína alguna vez | 59,3 | 82,4 |
| Consumir GHB alguna vez | 67,5 | 88,2 |
| Consumir metanfetaminas alguna vez | 66,5 | 86,2 |
| Consumir setas mágicas alguna vez | 51,4 | 83,4 |
| Consumir esteroides anabolizantes alguna vez | 50,8 | 84,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES)..

1.2.290.

Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (porcentaje de estudiantes que piensa que les sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera) (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tabaco | - | - | - | - | - | - | 91,7 | 90,9 | 93,6 | 92,8 | 90,8 | 91,4 |
| Alcohol | 93,8 | 89,0 | 90,5 | 91,2 | 92,0 | 93,8 | 91,2 | 90,8 | 93,3 | 92,9 | 91,4 | 93,0 |
| Hipnosedantes | 55,9 | 65,9 | 65,9 | 67,2 | 67,6 | 67,3 | 58,9 | 55,6 | 64,0 | 53,3 | 49,1 | 47,5 |
| Cannabis | 30,8 | 53,9 | 60,4 | 59,7 | 67,9 | 71,8 | 66,8 | 63,6 | 71,1 | 69,4 | 66,3 | 65,9 |
| Cocaína polvo | 26,7 | 30,4 | 37,9 | 38,0 | 43,5 | 46,7 | 37,4 | 32,7 | 37,2 | 33,8 | 28,9 | 32,3 |
| Heroína | 48,0 | 25,6 | 29,1 | 28,1 | 32,0 | 30,7 | 26,1 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 21,4 | 21,2 |
| Anfetaminas | 43,9 | 40,1 | 39,7 | 40,2 | 45,4 | 41,7 | 32,1 | 28,1 | 32,5 | 28,7 | 24,2 | 23,4 |
| Éxtasis | 46,3 | 42,6 | 39,8 | 43,8 | 50,0 | 45,1 | 31,2 | 26,6 | 29,9 | 26,2 | 21,8 | 21,8 |
| Alucinógenos | 26,2 | 40,1 | 39,2 | 41,4 | 45,3 | 41,9 | 33,7 | 28,6 | 35,8 | 30,9 | 26,2 | 22,8 |
| GHB | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 22,4 | 25,8 | 22,3 | 18,7 | 14,2 |
| Inhalables volátiles | 61,4 | 54,8 | 54,2 | 51,6 | 54,1 | 51,1 | - | - | - | - | - | - |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.291.

Evolución de la disponibilidad de cocaína polvo y/o base percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Disponibilidad percibida | 26,70 | 30,40 | 37,90 | 38,00 | 43,50 | 46,70 | 37,40 | 32,70 | 37,20 | 37,66 | 32,69 | 32,78 |
| Precio (euros/gramo) | - | - | - | 57,16 | 58,30 | 61,85 | 60,28 | 60,03 | 59,98 | 58,95 | 57,57 | 58,15 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.292.

Evolución de la disponibilidad de cannabis percibida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y el precio medio por gramo (%). España, 1994-2016.




| | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Disponibilidad percibida de cannabis | 30,8 | 53,9 | 60,4 | 59,7 | 67,9 | 71,8 | 66,8 | 63,6 | 71,1 | 69,4 | 66,3 | 65,9 |
| Resina de hachís (euros/gramo) | - | - | - | 3,87 | 4,08 | 4,39 | 4,63 | 4,78 | 5,2 | 5,85 | 5,54 | 6,19 |
| Grifa/marihuana (euros/gramo) | - | - | - | 2,49 | 2,86 | 2,86 | 2,99 | 3,09 | 4,1 | 5,02 | 4,68 | 4,96 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.293.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que piensa que les sería fácil o muy fácil conseguir cada droga si quisiera (%). España, 2008-2016.




| | Heroína | Anfetaminas | Alucinógenos | Éxtasis | Cocaína | Hipnosedantes | Cannabis | Alcohol |
|------|---------|-------------|--------------|---------|---------|---------------|----------|---------|
| 2008 | 23,2 | 28,1 | 28,6 | 26,6 | 32,7 | 55,6 | 63,6 | 90,8 |
| 2012 | 24,8 | 28,7 | 30,9 | 26,2 | 37,7 | 53,3 | 69,4 | 92,9 |
| 2016 | 21,2 | 23,4 | 22,8 | 21,8 | 32,8 | 47,5 | 65,9 | 93,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.294.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas (%). España, 2016.




| | Cannabis | Cocaína | Anfetaminas | Éxtasis | Setas mágicas |
|--|----------|---------|-------------|---------|---------------|
| A través de un familiar/amigo/conocido | 13,8 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| A través de un vendedor (camello) | 10,8 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
| En una zona de ocio (festival, concierto...) | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...) | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| A través de internet | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.295.

Distintos modos en los que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años han conseguido alguna de las siguientes drogas entre los estudiantes que han consumido estas drogas alguna vez (%). España, 2016.



| | Cannabis | Cocaína | Anfetaminas | Éxtasis | Setas mágicas |
|--|----------|---------|-------------|---------|---------------|
| A través de un familiar/amigo/conocido | 74,4 | 54,8 | 41,1 | 41,5 | 51,6 |
| A través de un vendedor (camello) | 58,2 | 59,1 | 59,1 | 61,6 | 56,1 |
| En una zona de ocio (festival, concierto...) | 16,6 | 22,8 | 24,3 | 25,5 | 19,6 |
| A través de una tienda especializada (smart shop, herbolario...) | 6,7 | 7,6 | 15,8 | 6,2 | 10,7 |
| A través de internet | 2,6 | 7,9 | 14,1 | 10,7 | 10,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.296.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|--------------------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Tabaco | 91,4 | 91,2 | 91,6 | 83,7 | 89,7 | 93,6 | 96,2 | 91,0 | 96,1 |
| Bebidas alcohólicas | 93,0 | 92,7 | 93,2 | 85,5 | 91,6 | 95,3 | 97,2 | 92,6 | 97,2 |
| Hipnosedantes | 47,5 | 46,0 | 48,9 | 33,8 | 40,2 | 52,0 | 58,7 | 46,1 | 64,3 |
| Cannabis | 65,9 | 68,3 | 63,4 | 42,5 | 60,1 | 71,9 | 79,7 | 64,4 | 83,4 |
| Cocaína en polvo | 32,3 | 35,1 | 29,3 | 19,2 | 26,9 | 35,6 | 42,0 | 30,7 | 51,3 |
| Cocaína base | 22,9 | 26,1 | 19,6 | 13,7 | 19,1 | 25,2 | 29,9 | 21,7 | 38,5 |
| Éxtasis | 21,8 | 25,2 | 18,1 | 12,5 | 18,1 | 23,2 | 28,9 | 20,4 | 38,9 |
| Anfetaminas o speed | 23,4 | 27,5 | 19,0 | 12,4 | 18,7 | 25,1 | 31,6 | 21,7 | 44,2 |
| Alucinógenos | 22,8 | 27,0 | 18,4 | 13,3 | 18,8 | 24,2 | 30,4 | 21,4 | 39,9 |
| Heroína | 21,2 | 23,5 | 18,8 | 14,6 | 19,4 | 22,2 | 25,1 | 20,1 | 35,4 |
| GHB | 14,2 | 17,0 | 11,2 | 9,8 | 12,3 | 14,9 | 17,4 | 13,4 | 23,8 |
| Metanfetamina | 18,4 | 22,1 | 14,5 | 11,7 | 16,0 | 19,5 | 23,3 | 17,4 | 31,4 |
| Setas mágicas | 23,3 | 27,8 | 18,4 | 13,7 | 19,3 | 24,4 | 31,4 | 21,9 | 40,1 |
| Esteroides anabolizantes | 22,3 | 27,8 | 16,4 | 13,46 | 18,2 | 24,4 | 30,0 | 21,3 | 35,5 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.297.

Percepción de disponibilidad de drogas psicoactivas ilegales (conseguirlas en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil) y % de respuesta Ns/Nc entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años por sexo y edad (%). España, 2016.

| | TOTAL* | TOTAL | SEXO | | EDAD (% fácil/muy fácil) | | | | | |
|--------------------------|---------------------|-----------|------|------|--------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | (% fácil/muy fácil) | (% NS/NC) | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Bebidas alcohólicas | 74,6 | 19,8 | 71,7 | 77,5 | 60,4 | 70,5 | 80,1 | 85,4 | 73,8 | 85,0 |
| Tabaco | 72,0 | 21,3 | 69,2 | 74,8 | 57,6 | 67,5 | 77,1 | 83,4 | 71,0 | 84,4 |
| Cannabis | 40,6 | 38,3 | 41,7 | 39,5 | 22,7 | 35,2 | 46,1 | 55,0 | 39,3 | 58,9 |
| Hipnosedantes | 21,2 | 55,3 | 20,2 | 22,2 | 14,8 | 17,5 | 22,9 | 27,4 | 20,5 | 30,8 |
| Cocaína en polvo | 15,5 | 52,0 | 16,9 | 14,0 | 9,0 | 12,8 | 16,9 | 20,6 | 14,7 | 26,6 |
| Cocaína base | 10,2 | 55,7 | 11,7 | 8,6 | 6,1 | 8,5 | 10,9 | 13,2 | 9,6 | 17,9 |
| Anfetaminas o speed | 10,0 | 57,1 | 12,1 | 8,0 | 5,3 | 8,0 | 10,6 | 13,7 | 9,3 | 20,7 |
| Setas mágicas | 9,8 | 57,9 | 12,0 | 7,6 | 5,7 | 8,1 | 10,1 | 13,4 | 9,2 | 18,7 |
| Alucinógenos | 9,8 | 57,3 | 11,8 | 7,6 | 5,6 | 8,0 | 10,1 | 13,1 | 9,1 | 18,8 |
| Éxtasis | 9,4 | 56,7 | 11,0 | 7,8 | 5,4 | 7,8 | 9,8 | 12,6 | 8,8 | 17,9 |
| Heroína | 9,2 | 56,7 | 10,3 | 8,0 | 6,4 | 8,5 | 9,3 | 10,7 | 8,7 | 16,2 |
| Esteroides anabolizantes | 9,1 | 59,3 | 11,6 | 6,5 | 5,5 | 7,4 | 9,8 | 12,2 | 8,6 | 15,5 |
| Metanfetamina | 7,6 | 58,8 | 9,3 | 5,8 | 4,9 | 6,6 | 7,9 | 9,6 | 7,2 | 13,5 |
| GHB | 5,7 | 60,0 | 6,9 | 4,4 | 4,0 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 5,4 | 9,9 |

H = Hombres; M = Mujeres.

* Datos de percepción de disponibilidad teniendo en cuenta todas las respuestas, incluidos Ns/Nc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.298.


Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | ¿Te sientes suficientemente informado con respecto al tema de las drogas? | | | |
|---------|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| | Sí, perfectamente | No, estoy mal informado | Sí, lo suficiente | Sólo a medias |
| Total | 31,3 | 7,5 | 39,9 | 21,3 |
| Hombre | 37,1 | 7,3 | 39,1 | 16,6 |
| Mujer | 25,5 | 7,6 | 40,7 | 26,1 |
| 14 años | 30,2 | 9,5 | 38,2 | 22,0 |
| 15 años | 33,3 | 7,9 | 39,6 | 19,2 |
| 16 años | 30,6 | 6,9 | 40,3 | 22,2 |
| 17 años | 31,0 | 5,5 | 41,0 | 22,4 |
| 18 años | 33,2 | 6,4 | 41,9 | 18,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.299.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | Perfectamente informado | | Mal informado | |
|------------|-------------------------|---------|---------------|---------|
| | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| 14 años | 30,2 | 36,1 | 9,5 | 9,8 |
| 15 años | 33,3 | 37,7 | 7,9 | 7,8 |
| 16 años | 30,6 | 35,6 | 6,9 | 6,9 |
| 17 años | 31,0 | 38,1 | 5,5 | 4,6 |
| 14-17 años | 31,2 | 36,8 | 7,5 | 7,4 |
| 18 años | 33,2 | 41,5 | 6,4 | 5,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.300.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* y según edad (%). España, 2016.

| | Han consumido alguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses | | No han consumido ninguna sustancia ilegal en los últimos 12 meses | |
|------------|---|---------------|---|---------------|
| | Perfectamente informado | Mal informado | Perfectamente informado | Mal informado |
| Total | 38,5 | 28,6 | 4,1 | 8,5 |
| Hombre | 44,8 | 34,0 | 3,8 | 8,4 |
| Mujer | 31,3 | 23,5 | 4,4 | 8,7 |
| 14 años | 37,9 | 29,2 | 5,7 | 9,8 |
| 15 años | 42,4 | 30,4 | 4,8 | 8,8 |
| 16 años | 39,2 | 26,9 | 3,7 | 8,0 |
| 17 años | 36,0 | 27,8 | 3,0 | 7,0 |
| 14-17 años | 38,6 | 28,6 | 3,9 | 8,6 |
| 18 años | 37,8 | 28,5 | 5,1 | 7,8 |

* Alguna droga ilegal: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes, ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Si incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.301.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que se sienten perfectamente informados o mal informados en tema de drogas, según hayan consumido o no cannabis y según edad (%). España, 2016.

| | | No han consumido cannabis en el último año | Han consumido cannabis en el último año (CAST <4) | Han consumido cannabis en el último año (Consumo problemático CAST ≥4) |
|-------------------------|---------------|--|---|--|
| Perfectamente informado | Total | 28,7 | 37,7 | 48,9 |
| | Hombre | 34,2 | 44,9 | 50,6 |
| | Mujer | 23,5 | 30,1 | 45,7 |
| | 14 años | 29,2 | 38,3 | 47,6 |
| | 15 años | 30,6 | 42,2 | 51,6 |
| | 16 años | 27,0 | 38,3 | 53,4 |
| | 17 años | 27,9 | 35,5 | 43,7 |
| | 14-17 años | 28,7 | 38,1 | 48,8 |
| | 18 años | 29,4 | 34,4 | 49,5 |
| | Mal informado | Total | 8,6 | 4,0 |
| Hombre | | 8,4 | 3,7 | 2,5 |
| Mujer | | 8,7 | 4,2 | 0,8 |
| 14 años | | 9,9 | 5,2 | 4,9 |
| 15 años | | 8,7 | 4,2 | 1,8 |
| 16 años | | 8,0 | 3,4 | 2,1 |
| 17 años | | 7,1 | 3,1 | 1,6 |
| 14-17 años | | 8,6 | 3,6 | 2,2 |
| 18 años | | 7,7 | 6,4 | 0,4 |

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.302.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo o en su familia sobre el consumo de drogas y los problemas asociados, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|---|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| He recibido información en centro educativo | 84,9 | 83,7 | 86,0 | 86,9 | 88,8 | 84,5 | 82,9 | 85,8 | 72,5 |
| He recibido información en mi familia | 68,4 | 67,1 | 69,6 | 65,2 | 67,0 | 69,5 | 71,3 | 68,2 | 70,9 |

H = Hombres; M = Mujeres .

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.303.

Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que han recibido formación en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones, según el tipo de información recibida y según edad y sexo. (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) | 71,1 | 69,8 | 72,4 | 69,0 | 75,2 | 72,8 | 70,8 | 71,9 | 60,2 |
| Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, cyberbullying...) | 68,9 | 66,5 | 71,4 | 73,1 | 71,7 | 68,9 | 66,0 | 70,0 | 54,8 |
| Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...) | 65,7 | 65,8 | 65,6 | 61,2 | 70,0 | 68,3 | 66,3 | 66,3 | 56,4 |
| Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas | 26,9 | 29,4 | 24,4 | 32,2 | 29,2 | 24,9 | 22,8 | 27,3 | 21,4 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.304.

Prevalencia de consumo de sustancias legales e ilegales alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la formación que han recibido en su centro educativo sobre el consumo de drogas y otras adicciones (%). España, 2016.

| | Legales* | Ilegales** |
|--|----------|------------|
| Efectos y problemas asociados a drogas legales (tabaco, alcohol, hipnosedantes) | 80,2 | 30,9 |
| Efectos y problemas asociados a drogas ilegales (hachis/marihuana, cocaína, drogas de síntesis...) | 80,7 | 31,2 |
| Efectos y problemas asociados al mal uso de las nuevas tecnologías (móviles, internet, redes sociales, cyberbullying...) | 79,0 | 28,7 |
| Efectos y problemas asociados al juego online, apuestas | 79,3 | 29,8 |

* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes.

** Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.305.


Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “muy importante” la legalización del cannabis y la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según edad y sexo (%). España, 2012-2016.

| | | 2012 | 2014 | 2016 | |
|----------------------------------|-------|------------|------|------|------|
| Legalización del cannabis | Total | 37,7 | 40,3 | 36,4 | |
| | Sexo | Hombre | 39,3 | 40,9 | 36,7 |
| | | Mujer | 35,9 | 39,8 | 36,1 |
| | Edad | 14 años | 35,8 | 40,2 | 35,7 |
| | | 15 años | 36,3 | 39,2 | 35,5 |
| | | 16 años | 36,9 | 41,4 | 35,5 |
| | | 17 años | 38,4 | 39,7 | 36,8 |
| | | 14-17 años | 37,0 | 40,1 | 35,9 |
| | | 18 años | 41,1 | 42,7 | 43,1 |
| Legalización de todas las drogas | Total | 27,0 | 29,6 | 26,8 | |
| | Sexo | Hombre | 25,7 | 27,5 | 25,3 |
| | | Mujer | 28,4 | 31,8 | 28,4 |
| | Edad | 14 años | 32,7 | 36,8 | 32,7 |
| | | 15 años | 28,9 | 31,5 | 28,7 |
| | | 16 años | 26,0 | 28,8 | 24,3 |
| | | 17 años | 24,4 | 24,1 | 22,1 |
| | | 14-17 años | 27,2 | 29,8 | 26,9 |
| | | 18 años | 25,7 | 27,0 | 26,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.306.

Evolución de la valoración* de diversas acciones para resolver el problema de las drogas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2012-2016.




* Algo importante o muy importante.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.307.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización del cannabis para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no cannabis en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




| | Nada importante | Algo importante | Muy importante | NS/NC |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| No han consumido cannabis en el último año | 33,6 | 9,9 | 19,5 | 37,0 |
| Han consumido cannabis en el último año (CAST<4) | 17,1 | 19,6 | 34,9 | 28,5 |
| Han consumido cannabis en el último año (CAST ≥4)* | 10,0 | 16,2 | 48,2 | 25,6 |

* CAST= Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.308.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que valoran como “nada, algo o muy importante” la legalización de todas las drogas para resolver el problema de las drogas, según hayan consumido o no alguna droga ilegal* en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




| | Nada importante | Algo importante | Muy importante | NS/NC |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| No han consumido alguna droga ilegal en el último año | 41,5 | 5,7 | 17,4 | 35,4 |
| Han consumido alguna droga ilegal en el último año | 37,7 | 11,2 | 17,4 | 33,7 |

* Algunas drogas ilegales: no incluye ni tabaco, ni alcohol, ni hipnosedantes ya sean sin receta o con y sin receta, ni inhalables volátiles. Sí incluye: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.309.

Evolución del porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que opina que todos o la mayoría de sus amigos han consumido las siguientes drogas en los últimos 30 días (%). España, 2006-2016.




| | Alcohol | Tabaco | Cannabis | Cocaína en polvo | Hipnosedantes |
|------|---------|--------|----------|------------------|---------------|
| 2006 | 54,9 | 33,2 | 14,7 | 1,6 | 0,7 |
| 2008 | 58,8 | 35,5 | 14,4 | 1,6 | 1,0 |
| 2010 | 58,5 | 34,6 | 12,2 | 1,6 | 1,5 |
| 2012 | 58,0 | 30,6 | 11,9 | 1,8 | 1,7 |
| 2014 | 48,8 | 24,8 | 9,4 | 0,9 | 1,0 |
| 2016 | 43,6 | 20,4 | 7,3 | 1,0 | 1,0 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.310.

Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos consumen cannabis | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cannabis |
|----------------------|--|---|
| No consumen cannabis | 31,5 | 85,7 |
| Sí consumen cannabis | 68,5 | 14,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.311.

Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos consumen alcohol | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen alcohol |
|---------------------|---|--|
| No consumen alcohol | 12,7 | 48,9 |
| Sí consumen alcohol | 87,3 | 51,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.312.

Prevalencia de consumo de cocaína entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos consumen cocaína | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen cocaína |
|---------------------|---|--|
| No consumen cocaína | 74,6 | 99,3 |
| Sí consumen cocaína | 25,4 | 0,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.313.

Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen esa misma sustancia (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos consumen tabaco | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen tabaco |
|--------------------|--|---|
| No consumen tabaco | 35,1 | 82,5 |
| Sí consumen tabaco | 64,9 | 17,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.314.

Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales se emborrachan (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos se emborrachan | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos se emborrachan |
|-------------------|---|--|
| No se emborrachan | 43,7 | 87,1 |
| Sí se emborrachan | 56,3 | 12,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.315.

Prevalencia de botellón entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales hacen botellón (últimos 30 días) (%). España, 2016.




| | Todos/la mayoría de mis amigos hacen botellón | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos hacen botellón |
|-------------------|---|--|
| No hacen botellón | 46,6 | 88,3 |
| Sí hacen botellón | 53,4 | 11,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.316.

Prevalencia de sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de la percepción de que todos o sólo unos pocos de sus iguales consumen este tipo de sustancias (alguna vez en la vida) (%). España, 2016.



| | Todos/la mayoría de mis amigos consumen sustancias estimulantes* | Algunos/pocos/ninguno de mis amigos consumen sustancias estimulantes* |
|--------------------------------------|--|---|
| No consumen sustancias estimulantes* | 45,2 | 73,1 |
| Sí consumen sustancias estimulantes* | 54,8 | 26,9 |

* Sustancias estimulantes para mejorar el rendimiento en el estudio.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.317.

Permisividad de los padres frente al consumo de distintas sustancias psicoactivas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y según edad (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|--|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| MADRE | | | | | | | | | |
| Permisiva frente al consumo de tabaco | 10,8 | 10,7 | 10,9 | 2,5 | 7,0 | 10,6 | 18,7 | 9,2 | 34,3 |
| Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas | 37,3 | 36,3 | 38,2 | 13,2 | 24,9 | 42,6 | 59,9 | 34,9 | 69,6 |
| Permisiva frente al consumo de cannabis | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 4,8 |
| PADRE | | | | | | | | | |
| Permisivo frente al consumo de tabaco | 10,1 | 10,6 | 9,5 | 2,7 | 6,7 | 9,7 | 17,4 | 8,7 | 31,7 |
| Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas | 36,5 | 37,7 | 35,3 | 13,7 | 25,3 | 41,2 | 58,8 | 34,2 | 68,2 |
| Permisivo frente al consumo de cannabis | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 4,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.318.

Permisividad de los padres frente al consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de tabaco que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Tabaco últimos 12 meses | | Tabaco diariamente últimos 30 días | | Cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-----|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| MADRE | | | | | | | |
| Permisiva frente al consumo de tabaco | 10,8 | 24,8 | 3,9 | 60,2 | 6,3 | 24,3 | 7,6 |
| PADRE | | | | | | | |
| Permisivo frente al consumo de tabaco | 10,1 | 22,2 | 4,1 | 53,1 | 6,1 | 21,1 | 7,5 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.319.

Permisividad de los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de bebidas alcohólicas que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Alcohol últimos 30 d | | Borracheras últimos 30 d | | Borracheras últimos 12 m | | Botellón últimos 12 m | | Binge drinking de cannabis* | | Bebidas energéticas + alcohol últimos 30 d | |
|--|---------------|----------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------------|------|--|------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| MADRE | | | | | | | | | | | | | |
| Permisiva frente al consumo de bebidas alcohólicas | | | | | | | | | | | | | |
| | 37,3 | 49,7 | 12,9 | 63,8 | 29,4 | 57,8 | 21,6 | 53,4 | 19,5 | 60,7 | 26,2 | 58,2 | 33,7 |
| PADRE | | | | | | | | | | | | | |
| Permisivo frente al consumo de bebidas alcohólicas | | | | | | | | | | | | | |
| | 36,5 | 48,4 | 13,3 | 60,7 | 29,4 | 55,5 | 22,1 | 51,6 | 19,8 | 58,6 | 26,2 | 56,6 | 33,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.320.

Permisividad de los padres frente al consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Cannabis últimos 12 meses | | Cannabis últimos 30 días | | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) | |
|---|---------------|---------------------------|-----|--------------------------|-----|--|-----|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| MADRE | | | | | | | |
| Permisiva frente al consumo de cannabis | | | | | | | |
| | 1,6 | 4,8 | 0,5 | 6,6 | 0,6 | 17,1 | 3,4 |
| PADRE | | | | | | | |
| Permisivo frente al consumo de cannabis | | | | | | | |
| | 1,8 | 5,1 | 0,7 | 6,7 | 0,8 | 17,1 | 3,7 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.321.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

| | Total estudiantes 14-18 años | Consumidores tabaco últimos 30 días | Consumidores diarios de tabaco últimos 30 días | Consumidores de cigarrillos electrónicos | Consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días | Hombres consumidores bebidas alcohólicas últimos 30 días | Mujeres consumidoras bebidas alcohólicas últimos 30 días | Estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días | Estudiantes que han hecho binge drinking en los últimos 30 días | Estudiantes que han hecho botellón en los últimos 12 meses | Consumidores de bebidas energéticas en los últimos 30 días | Consumidores de bebidas energéticas con alcohol en los últimos 30 días |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Permisividad padres | | | | | | | | | | | | |
| Padres permiten fumar | 12,3 | 30,4 | 60,4 | 26,0 | 16,2 | 16,4 | 15,9 | 26,0 | 22,8 | 17,6 | 17,5 | 27,4 |
| Padres permiten beber | 36,8 | 56,3 | 69,9 | 50,8 | 48,3 | 48,1 | 48,4 | 62,7 | 59,0 | 51,8 | 42,2 | 56,7 |
| Padre permiten consumir cannabis | 2,4 | 5,6 | 10,4 | 5,1 | 3,1 | 3,8 | 2,5 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 3,8 | 6,1 |
| Relaciones padres | | | | | | | | | | | | |
| Bastante malas o muy malas | 5,4 | 8,9 | 10,6 | 8,3 | 6,1 | 5,1 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 8,7 |
| Regulares | 21,6 | 29,6 | 31,1 | 27,4 | 23,8 | 20,2 | 27,3 | 26,1 | 25,4 | 23,4 | 24,3 | 26,7 |
| Bastante buenas o muy buenas | 72,7 | 61,1 | 57,6 | 63,9 | 69,8 | 74,3 | 65,3 | 66,0 | 67,4 | 70,2 | 68,5 | 64,1 |
| Normas en casa y/o fuera de casa | | | | | | | | | | | | |
| Siempre o casi siempre | 75,5 | 73,4 | 71,4 | 74,2 | 74,9 | 74,7 | 75,1 | 72,9 | 73,5 | 74,3 | 74,5 | 72,2 |
| Algunas veces, raramente o nunca | 24,5 | 26,6 | 28,6 | 25,8 | 25,1 | 25,3 | 24,9 | 27,1 | 26,5 | 25,7 | 25,5 | 27,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.322.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

| | Total estudiantes 14-18 años | Consumidores hipnosedantes con o sin receta alguna vez en la vida | Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 12 meses | Consumidores hipnosedantes con o sin receta últimos 30 días | Consumidores hipnosedantes sin receta alguna vez en la vida | Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 12 meses | Consumidores hipnosedantes sin receta últimos 30 días | Consumidores cannabis últimos 12 meses | Consumidores cannabis últimos 30 días | Consumidores problemáticos cannabis (CAST ≥ 4) últimos 12 meses | Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 12 meses | Consumidores cocaína polvo y/o base últimos 30 días |
|----------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Permisividad padres | | | | | | | | | | | | |
| Padres permiten fumar | 12,3 | 20,7 | 21,6 | 22,2 | 23,8 | 24,4 | 22,9 | 29,3 | 33,0 | 53,9 | 45,6 | 42,7 |
| Padres permiten beber | 36,8 | 46,8 | 48,7 | 48,0 | 51,1 | 53,8 | 52,0 | 59,0 | 60,0 | 68,2 | 64,2 | 62,5 |
| Padre permiten consumir cannabis | 2,4 | 4,9 | 5,2 | 6,8 | 6,2 | 6,8 | 9,1 | 6,7 | 8,8 | 20,0 | 23,0 | 25,7 |
| Relaciones padres | | | | | | | | | | | | |
| Bastante malas o muy malas | 5,4 | 9,3 | 10,4 | 12,1 | 10,2 | 11,2 | 14,5 | 8,5 | 9,3 | 13,4 | 15,0 | 17,5 |
| Regulares | 21,6 | 28,3 | 29,9 | 32,3 | 29,5 | 31,8 | 30,6 | 28,5 | 29,4 | 36,1 | 26,7 | 23,3 |
| Bastante buenas o muy buenas | 72,7 | 62,0 | 59,3 | 54,9 | 59,6 | 56,3 | 53,6 | 62,5 | 60,8 | 48,8 | 55,6 | 54,5 |
| Normas en casa y/o fuera de casa | | | | | | | | | | | | |
| Siempre o casi siempre | 75,5 | 74,4 | 74,9 | 74,9 | 73,2 | 74,2 | 74,0 | 72,1 | 72,0 | 67,5 | 69,1 | 67,1 |
| Algunas veces, raramente o nunca | 24,5 | 25,6 | 25,1 | 25,1 | 26,8 | 25,8 | 26,0 | 27,9 | 28,0 | 32,5 | 30,9 | 32,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.323.

Perfil general de la población de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años y de consumidores específicos, según relaciones y normas familiares (%). España, 2016.

| | Total estudiantes 4-18 años | Consumidores drogas legales alguna vez en la vida | Consumidores drogas legales últimos 12 meses | Consumidores drogas legales últimos 30 días | Consumidores drogas ilegales alguna vez en la vida | Consumidores drogas ilegales últimos 12 meses | Consumidores drogas ilegales últimos 30 días | Consumidores nuevas sustancias alguna vez en la vida | Consumidores nuevas sustancias últimos 12 meses | Consumidores nuevas sustancias últimos 30 días | Consumidores sust. estimulantes para mejorar estudio alguna vez en la vida |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|
| Permisividad padres | | | | | | | | | | | |
| Padres permiten fumar | 12,3 | 14,7 | 15,0 | 16,2 | 27,1 | 29,0 | 32,9 | 34,8 | 38,8 | 41,3 | 19,7 |
| Padres permiten beber | 36,8 | 43,8 | 44,7 | 47,2 | 56,0 | 58,7 | 60,0 | 57,0 | 60,8 | 60,7 | 46,9 |
| Padre permiten consumir cannabis | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 6,2 | 6,8 | 8,8 | 12,0 | 14,5 | 17,2 | 4,3 |
| Relaciones padres | | | | | | | | | | | |
| Bastante malas o muy malas | 5,4 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 13,2 | 14,7 | 15,2 | 7,9 |
| Regulares | 21,6 | 23,3 | 23,5 | 23,9 | 27,5 | 28,5 | 29,2 | 28,2 | 29,1 | 28,8 | 26,7 |
| Bastante buenas o muy buenas | 72,7 | 70,4 | 70,2 | 69,5 | 63,4 | 62,6 | 60,8 | 57,1 | 54,3 | 52,8 | 65,0 |
| Normas en casa y/o fuera de casa | | | | | | | | | | | |
| Siempre o casi siempre | 75,5 | 75,0 | 75,1 | 74,9 | 72,3 | 72,2 | 72,0 | 72,5 | 72,7 | 69,4 | 75,2 |
| Algunas veces, raramente o nunca | 24,5 | 25,0 | 24,9 | 25,1 | 27,7 | 27,8 | 28,0 | 27,5 | 27,3 | 30,6 | 24,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.324.


Percepción de tolerancia parental para consumir alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido alcohol, se hayan emborrachado, hayan hecho binge drinking en los últimos 30 días o botellón en los últimos 12 meses (%). España, 2016.

| | Consumo de alcohol últimos 30 días | | Borracheras últimos 30 días | | Binge drinking últimos 30 días | | Botellón últimos 12 meses | |
|--|---------------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------|------------------------------|------|
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| MADRE | | | | | | | | |
| Sí me lo permitiría (o me lo permite) | 49,7 | 12,9 | 63,8 | 29,4 | 60,7 | 26,2 | 53,4 | 19,5 |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 50,3 | 87,1 | 36,2 | 70,6 | 39,3 | 73,8 | 46,6 | 80,5 |
| PADRE | | | | | | | | |
| Sí me lo permitiría (o me lo permite) | 48,4 | 13,3 | 60,7 | 29,4 | 58,6 | 26,2 | 51,6 | 19,8 |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 51,6 | 86,7 | 39,3 | 70,6 | 41,4 | 73,8 | 48,4 | 80,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.325.

Prevalencia de las intoxicaciones étlicas agudas en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




| | MADRE | | PADRE | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría |
| Se ha emborrachado en los últimos 30 días | 63,8 | 36,2 | 60,7 | 39,3 |
| No se ha emborrachado en los últimos 30 días | 29,4 | 70,6 | 29,4 | 70,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.326.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.




| | MADRE | | PADRE | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría |
| Ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días | 60,2 | 39,8 | 53,1 | 46,9 |
| No ha consumido tabaco diariamente en los últimos 30 días | 6,3 | 93,7 | 6,1 | 93,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.327.

Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según la permisividad de los padres ante el consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2016.



| | MADRE | | PADRE | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría | Sí me lo permitiría | No me lo permitiría |
| Ha consumido cannabis en los últimos 30 días | 6,6 | 93,4 | 6,7 | 93,3 |
| No ha consumido cannabis en los últimos 30 días | 0,6 | 99,4 | 0,8 | 99,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.328.

Percepción de tolerancia parental para cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de cannabis que los estudiantes tengan (%). España, 2016.

| | Consumo cannabis últimos 12 meses | | Consumo cannabis últimos 30 días | | Clasificación CAST consumidores cannabis últimos 12 meses | | |
|--|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|---|----------|---------|
| | Sí | No | Sí | No | CAST 0-1 | CAST 2-3 | CAST ≥4 |
| MADRE | | | | | | | |
| Sí me lo permitiría (o me lo permite) | 1,6 | 4,8 | 0,5 | 6,6 | 0,6 | 17,1 | 3,4 |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 98,4 | 95,2 | 99,5 | 93,4 | 99,4 | 82,9 | 96,6 |
| PADRE | | | | | | | |
| Sí me lo permitiría (o me lo permite) | 1,8 | 5,1 | 0,7 | 6,7 | 0,8 | 17,1 | 3,7 |
| No me lo permitiría (o no me lo permite) | 98,2 | 94,9 | 99,3 | 93,3 | 99,2 | 82,9 | 96,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.329.


Frecuencia de uso de tablet como herramienta de trabajo entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Nº casos | 5.014 | 2.508 | 2.507 | 1.396 | 1.272 | 1.128 | 863 | 4.659 | 355 |
| Usan tablet como herramienta de trabajo | 14,3 | 14,2 | 14,4 | 15,8 | 17,5 | 12,1 | 11,9 | 14,3 | 14,9 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.330.

Frecuencia de uso de internet* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.



| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Nº casos | 35.369 | 17.880 | 17.489 | 8.946 | 7.338 | 9.373 | 7.300 | 32.957 | 2.412 |
| Juego dinero en internet | 6,4 | 10,2 | 2,5 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 6,2 | 8,6 |
| Juego dinero fuera de internet | 13,6 | 21,6 | 5,4 | 8,6 | 11,6 | 13,5 | 17,4 | 12,6 | 26,8 |
| Visito páginas sólo para adultos | 39,7 | 65,5 | 13,8 | 30,2 | 38,0 | 42,9 | 46,6 | 39,2 | 46,8 |
| Participo en juegos de realidad virtual | 58,3 | 82,9 | 33,4 | 61,7 | 59,6 | 57,8 | 54,6 | 58,5 | 55,3 |
| Juego a juegos de habilidad | 66,9 | 72,7 | 61,1 | 70,7 | 67,4 | 66,1 | 64,4 | 67,3 | 61,9 |
| Compro ropa, juegos, libros, etc. | 69,4 | 67,6 | 71,3 | 65,5 | 67,3 | 71,0 | 73,6 | 69,3 | 71,2 |
| Uso las redes sociales | 97,9 | 97,4 | 98,4 | 96,9 | 98,0 | 98,1 | 98,6 | 97,9 | 98,1 |
| Veo o me descargo música, películas, series, etc. | 98,5 | 97,8 | 99,1 | 97,8 | 98,0 | 98,9 | 99,1 | 98,4 | 98,8 |
| Uso WhatsApp, email, MSN | 99,6 | 99,4 | 99,7 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 99,7 |

* Aquellos que indiquen cualquier tiempo frente a los que marcan nunca.

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.331.

Frecuencia (días) de actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | POR SEXO Y EDAD | | | | | |
|---|-------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia practicas algún deporte, haces ejercicio? | | | | | | | | |
| Nunca | 10,2 | 6,0 | 14,5 | 7,1 | 9,7 | 10,1 | 12,2 | 17,5 |
| De 1 a 3 días al año | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 3,3 | 4,2 | 4,3 | 7,4 | 8,4 |
| De 1 a 3 días al mes | 14,1 | 10,4 | 17,8 | 11,0 | 13,2 | 14,1 | 17,2 | 18,3 |
| De 1 a 4 días por semana | 54,5 | 56,8 | 52,1 | 60,9 | 54,9 | 55,5 | 48,8 | 42,9 |
| De 5 a 7 días por semana | 16,3 | 23,7 | 8,6 | 17,7 | 17,9 | 16,0 | 14,4 | 12,9 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia lees libros como diversión? | | | | | | | | |
| Nunca | 35,5 | 45,5 | 25,3 | 31,0 | 36,7 | 36,9 | 35,9 | 41,6 |
| De 1 a 3 días al año | 21,1 | 22,1 | 20,2 | 20,9 | 20,1 | 20,7 | 22,5 | 23,1 |
| De 1 a 3 días al mes | 21,0 | 18,7 | 23,5 | 23,0 | 20,6 | 20,2 | 21,3 | 17,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 13,2 | 9,3 | 17,2 | 13,7 | 13,1 | 13,5 | 12,7 | 12,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 9,1 | 4,5 | 13,8 | 11,4 | 9,6 | 8,7 | 7,5 | 5,4 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las noches a una discoteca, bar, fiesta, café...? | | | | | | | | |
| Nunca | 19,6 | 20,2 | 19,0 | 35,3 | 21,9 | 13,8 | 9,3 | 8,6 |
| De 1 a 3 días al año | 16,2 | 15,9 | 16,6 | 19,7 | 19,0 | 15,3 | 12,2 | 10,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 38,6 | 36,8 | 40,3 | 27,9 | 34,5 | 44,1 | 47,0 | 43,3 |
| De 1 a 4 días por semana | 23,6 | 24,7 | 22,5 | 16,0 | 22,4 | 24,7 | 29,5 | 33,7 |
| De 5 a 7 días por semana | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 3,7 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sales con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, vas a un parque para pasar el rato? | | | | | | | | |
| Nunca | 3,3 | 4,4 | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 3,0 | 2,3 |
| De 1 a 3 días al año | 6,0 | 6,7 | 5,2 | 6,6 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| De 1 a 3 días al mes | 29,0 | 28,7 | 29,4 | 30,6 | 27,4 | 27,8 | 30,3 | 29,3 |
| De 1 a 4 días por semana | 49,9 | 47,7 | 52,1 | 48,7 | 49,1 | 51,8 | 49,8 | 49,7 |
| De 5 a 7 días por semana | 11,8 | 12,5 | 11,1 | 10,2 | 13,9 | 12,0 | 11,1 | 12,6 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia realizas otros hobbies? | | | | | | | | |
| Nunca | 41,4 | 44,8 | 37,9 | 39,4 | 42,5 | 40,9 | 42,0 | 45,3 |
| De 1 a 3 días al año | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 9,4 |
| De 1 a 3 días al mes | 14,4 | 13,0 | 15,9 | 14,2 | 14,0 | 14,8 | 14,5 | 14,9 |
| De 1 a 4 días por semana | 20,7 | 19,9 | 21,6 | 22,5 | 20,2 | 20,9 | 19,8 | 17,8 |
| De 5 a 7 días por semana | 14,7 | 13,7 | 15,7 | 15,8 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 12,6 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...? | | | | | | | | |
| Nunca | 86,4 | 78,4 | 94,6 | 91,4 | 88,4 | 86,5 | 82,6 | 73,2 |
| De 1 a 3 días al año | 6,5 | 9,4 | 3,6 | 4,9 | 6,1 | 6,1 | 7,6 | 11,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 4,6 | 7,9 | 1,3 | 2,2 | 3,5 | 4,9 | 6,5 | 9,6 |
| De 1 a 4 días por semana | 2,0 | 3,5 | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 4,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia juegas dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, bingos, apuestas...? | | | | | | | | |
| Nunca | 93,6 | 89,8 | 97,5 | 94,7 | 93,3 | 93,9 | 93,2 | 91,4 |
| De 1 a 3 días al año | 2,7 | 4,4 | 0,9 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 3,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,7 | 3,1 | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 2,3 | 2,2 |
| De 1 a 4 días por semana | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| De 5 a 7 días por semana | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |

1.2.331. (continuación)

| | TOTAL | | POR SEXO Y EDAD | | | | | |
|---|-------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas WhatsApp, e-mail, MSN? | | | | | | | | |
| Nunca | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| De 1 a 3 días al año | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,7 | 6,9 | 4,4 | 8,8 | 6,2 | 4,3 | 3,8 | 3,1 |
| De 5 a 7 días por semana | 92,0 | 90,3 | 93,7 | 87,8 | 91,2 | 93,9 | 94,4 | 95,2 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usas las redes sociales? | | | | | | | | |
| Nunca | 2,1 | 2,6 | 1,6 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,9 |
| De 1 a 3 días al año | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 1,8 |
| De 1 a 4 días por semana | 10,6 | 12,8 | 8,3 | 13,9 | 10,8 | 9,2 | 8,9 | 8,3 |
| De 5 a 7 días por semana | 83,8 | 80,0 | 87,7 | 78,6 | 83,4 | 85,8 | 86,9 | 87,3 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, escuchas o descargas música, ves o descargas vídeos musicales, películas, series, etc.? | | | | | | | | |
| Nunca | 1,5 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| De 1 a 3 días al año | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,4 |
| De 1 a 3 días al mes | 10,6 | 11,5 | 9,6 | 13,8 | 11,2 | 8,8 | 9,0 | 8,8 |
| De 1 a 4 días por semana | 25,8 | 26,2 | 25,3 | 28,7 | 26,4 | 24,4 | 24,4 | 22,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 59,6 | 57,1 | 62,1 | 51,2 | 57,9 | 64,1 | 63,9 | 65,3 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, participas en juegos de realidad virtual? | | | | | | | | |
| Nunca | 41,7 | 17,1 | 66,6 | 38,3 | 40,4 | 42,2 | 45,4 | 44,7 |
| De 1 a 3 días al año | 10,0 | 7,3 | 12,7 | 9,5 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 9,4 |
| De 1 a 3 días al mes | 13,8 | 17,3 | 10,2 | 13,6 | 13,3 | 14,1 | 14,4 | 12,6 |
| De 1 a 4 días por semana | 18,0 | 29,8 | 6,0 | 20,7 | 18,3 | 17,4 | 15,7 | 16,7 |
| De 5 a 7 días por semana | 16,5 | 28,4 | 4,4 | 17,9 | 18,0 | 16,0 | 14,1 | 16,7 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, juegas a juegos de habilidad? | | | | | | | | |
| Nunca | 33,1 | 27,3 | 38,9 | 29,3 | 32,6 | 33,9 | 35,6 | 38,1 |
| De 1 a 3 días al año | 16,3 | 14,7 | 18,0 | 16,6 | 17,1 | 15,9 | 16,9 | 12,8 |
| De 1 a 3 días al mes | 22,2 | 21,7 | 22,7 | 22,7 | 22,2 | 22,0 | 21,7 | 22,2 |
| De 1 a 4 días por semana | 17,5 | 21,0 | 14,0 | 19,6 | 17,3 | 17,6 | 15,4 | 16,6 |
| De 5 a 7 días por semana | 10,9 | 15,3 | 6,4 | 11,8 | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 10,2 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, visitas páginas sólo para adultos? | | | | | | | | |
| Nunca | 60,3 | 34,5 | 86,2 | 69,8 | 62,0 | 57,1 | 53,4 | 53,2 |
| De 1 a 3 días al año | 8,7 | 10,7 | 6,6 | 7,8 | 7,9 | 9,0 | 9,4 | 10,8 |
| De 1 a 3 días al mes | 11,5 | 18,9 | 4,0 | 8,0 | 11,0 | 12,4 | 14,6 | 13,1 |
| De 1 a 4 días por semana | 12,4 | 22,5 | 2,3 | 8,9 | 11,8 | 14,0 | 14,7 | 14,6 |
| De 5 a 7 días por semana | 7,1 | 13,3 | 0,9 | 5,5 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
| En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, a través de internet, compras ropa, juegos, libros, etc.? | | | | | | | | |
| Nunca | 30,6 | 32,4 | 28,7 | 34,5 | 32,7 | 29,0 | 26,4 | 28,8 |
| De 1 a 3 días al año | 34,1 | 32,4 | 35,7 | 32,3 | 32,6 | 34,8 | 36,8 | 33,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 28,1 | 27,6 | 28,6 | 26,8 | 26,9 | 28,9 | 29,6 | 29,6 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,0 | 5,2 | 4,9 | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,7 |
| De 5 a 7 días por semana | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.332.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Alcohol últimos 30 días | | Borracheras últimos 12 meses | | Binge drinking últimos 30 días | | Tabaco últimos 12 meses | | Cannabis últimos 12 meses | | Consumo problemático cannabis* | |
|--|---------------|-------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Nº casos | 35.369 | 23.581 | 11.622 | 14.473 | 19.645 | 11.107 | 23.980 | 12.269 | 23.066 | 9.144 | 25.676 | 1.006 | 6.562 |
| Juego dinero fuera de internet | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 86,4 | 83,1 | 93,2 | 80,6 | 91,0 | 78,0 | 90,6 | 80,3 | 89,7 | 76,4 | 90,2 | 63,7 | 77,8 |
| De 1 a 3 días al año | 6,5 | 7,9 | 3,7 | 8,8 | 4,7 | 9,6 | 5,0 | 9,1 | 5,1 | 10,2 | 5,1 | 12,9 | 10,0 |
| De 1 a 3 días al mes | 4,6 | 5,9 | 2,0 | 7,0 | 2,7 | 8,1 | 2,9 | 6,7 | 3,5 | 8,6 | 3,0 | 14,2 | 8,0 |
| De 1 a 4 días por semana | 2,0 | 2,5 | 0,9 | 2,9 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 3,1 | 1,3 | 3,7 | 1,3 | 6,2 | 3,5 |
| De 5 a 7 días por semana | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 3,0 | 0,8 |
| Juego dinero en internet | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 93,6 | 92,6 | 95,9 | 92,5 | 94,7 | 90,8 | 95,1 | 91,8 | 94,6 | 90,5 | 94,9 | 86,6 | 91,5 |
| De 1 a 3 días al año | 2,7 | 3,1 | 1,7 | 3,0 | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 4,0 | 2,2 | 5,8 | 3,5 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,7 | 2,1 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 2,7 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 2,7 | 1,3 | 4,0 | 2,4 |
| De 1 a 4 días por semana | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,1 |
| De 5 a 7 días por semana | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 1,4 |
| Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| De 1 a 3 días al año | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,5 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,7 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,7 | 3,3 | 10,3 | 2,2 | 8,3 | 2,4 | 7,2 | 2,6 | 7,3 | 2,6 | 6,7 | 2,8 | 2,1 |
| De 5 a 7 días por semana | 92,0 | 95,1 | 85,8 | 96,7 | 88,5 | 96,1 | 90,1 | 95,5 | 90,1 | 95,5 | 90,8 | 94,0 | 96,5 |
| Uso las redes sociales | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 2,1 | 0,9 | 4,4 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,9 | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | 0,5 |
| De 1 a 3 días al año | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,8 |
| De 1 a 3 días al mes | 2,4 | 1,7 | 3,8 | 1,3 | 3,2 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 3,5 | 1,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 10,6 | 7,8 | 16,3 | 6,1 | 14,1 | 5,9 | 12,8 | 6,4 | 12,8 | 6,6 | 12,0 | 7,4 | 6,2 |
| De 5 a 7 días por semana | 83,8 | 88,8 | 73,7 | 91,6 | 77,9 | 91,4 | 80,3 | 90,4 | 80,3 | 89,9 | 81,7 | 87,5 | 91,0 |

1.2.332. (continuación)

| | Total alumnos | Alcohol últimos 30 días | | Borracheras últimos 12 meses | | Binge drinking últimos 30 días | | Tabaco últimos 12 meses | | Cannabis últimos 12 meses | | Consumo problemático cannabis* | |
|---|---------------|-------------------------|------|------------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Veo o me descargo música, películas, series, etc. | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 1,5 | 0,9 | 2,7 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 0,8 |
| De 1 a 3 días al año | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 1,5 | 3,3 | 1,6 | 2,9 | 1,7 | 3,0 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 1,2 |
| De 1 a 3 días al mes | 10,6 | 8,9 | 13,9 | 7,7 | 12,8 | 7,7 | 11,9 | 7,6 | 12,2 | 7,1 | 11,8 | 7,3 | 6,8 |
| De 1 a 4 días por semana | 25,8 | 24,5 | 28,5 | 23,2 | 27,7 | 22,6 | 27,2 | 22,4 | 27,6 | 21,7 | 27,1 | 18,7 | 21,9 |
| De 5 a 7 días por semana | 59,6 | 63,9 | 50,9 | 66,9 | 54,1 | 67,2 | 56,0 | 67,4 | 55,5 | 68,6 | 56,5 | 70,9 | 69,4 |
| Participo en juegos de realidad virtual | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 41,7 | 42,4 | 40,2 | 44,0 | 40,0 | 42,5 | 41,3 | 44,2 | 40,3 | 39,6 | 42,4 | 35,3 | 40,4 |
| De 1 a 3 días al año | 10,0 | 10,5 | 9,0 | 11,0 | 9,2 | 10,9 | 9,6 | 10,8 | 9,6 | 10,8 | 9,7 | 9,8 | 10,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 13,8 | 14,1 | 13,0 | 14,5 | 13,2 | 14,6 | 13,4 | 14,4 | 13,4 | 15,9 | 13,0 | 17,3 | 15,7 |
| De 1 a 4 días por semana | 18,0 | 17,1 | 19,9 | 15,9 | 19,7 | 16,2 | 18,9 | 15,4 | 19,4 | 16,8 | 18,5 | 18,6 | 16,6 |
| De 5 a 7 días por semana | 16,5 | 15,9 | 17,9 | 14,6 | 17,9 | 15,8 | 16,9 | 15,2 | 17,3 | 17,0 | 16,4 | 19,0 | 16,7 |
| Juego a juegos de habilidad | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 33,1 | 34,0 | 31,1 | 34,6 | 31,6 | 35,4 | 31,9 | 36,4 | 31,3 | 35,3 | 32,1 | 39,4 | 34,8 |
| De 1 a 3 días al año | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 16,2 | 15,7 | 16,6 | 16,0 | 16,5 | 15,6 | 16,7 | 15,4 | 15,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 22,2 | 21,8 | 23,0 | 21,8 | 22,7 | 20,8 | 22,9 | 21,0 | 22,8 | 21,1 | 22,7 | 18,4 | 21,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 17,5 | 17,1 | 18,5 | 16,8 | 18,2 | 17,1 | 17,7 | 15,8 | 18,4 | 16,5 | 17,9 | 14,7 | 16,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 10,9 | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,6 | 10,6 | 12,1 | 11,6 |
| Visito páginas sólo para adultos | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 60,3 | 55,3 | 70,3 | 52,3 | 66,5 | 50,1 | 65,1 | 53,1 | 64,1 | 45,6 | 65,7 | 33,2 | 46,4 |
| De 1 a 3 días al año | 8,7 | 9,6 | 6,8 | 9,4 | 8,0 | 9,9 | 8,1 | 9,9 | 8,0 | 10,0 | 8,1 | 9,3 | 10,0 |
| De 1 a 3 días al mes | 11,5 | 12,7 | 9,1 | 13,4 | 10,1 | 13,7 | 10,5 | 12,7 | 10,8 | 14,7 | 10,3 | 19,2 | 14,4 |
| De 1 a 4 días por semana | 12,4 | 14,0 | 9,3 | 15,6 | 10,2 | 15,7 | 10,9 | 14,6 | 11,3 | 18,0 | 10,5 | 21,7 | 17,8 |
| De 5 a 7 días por semana | 7,1 | 8,4 | 4,4 | 9,4 | 5,2 | 10,6 | 5,4 | 9,7 | 5,7 | 11,7 | 5,4 | 16,7 | 11,4 |
| Compro ropa, juegos, libros, etc. | | | | | | | | | | | | | |
| Nunca | 30,6 | 26,0 | 39,8 | 22,6 | 36,4 | 22,5 | 34,3 | 25,4 | 33,3 | 23,3 | 32,9 | 27,5 | 22,5 |
| De 1 a 3 días al año | 34,1 | 34,5 | 33,3 | 35,9 | 33,0 | 33,0 | 34,6 | 33,9 | 34,2 | 35,2 | 33,7 | 34,4 | 35,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 28,1 | 31,3 | 21,7 | 32,8 | 24,6 | 33,7 | 25,6 | 31,1 | 26,5 | 32,3 | 26,8 | 27,2 | 32,9 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,0 | 5,8 | 3,6 | 6,1 | 4,2 | 7,6 | 3,9 | 6,5 | 4,3 | 6,4 | 4,6 | 6,1 | 6,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 3,2 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 4,8 | 2,5 |

* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.333.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Relaciones con tus padres | | Normas en casa | | Normas fuera de casa | | Recibir cariño padres | |
|--|---------------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|-------|
| | | M | B | M | B | M | B | M | B |
| Nº casos | 35.369 | 1.821 | 24.424 | 22.825 | 10.881 | 16.652 | 16.957 | 30.129 | 3.480 |
| Juego dinero fuera de internet | | | | | | | | | |
| Nunca | 86,4 | 88,1 | 86,4 | 86,5 | 87,1 | 88,3 | 85,1 | 86,8 | 85,5 |
| De 1 a 3 días al año | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 7,0 | 6,4 | 7,0 |
| De 1 a 3 días al mes | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 3,8 | 5,2 | 4,5 | 4,8 |
| De 1 a 4 días por semana | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| De 5 a 7 días por semana | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Juego dinero en internet | | | | | | | | | |
| Nunca | 93,6 | 92,5 | 93,9 | 94,0 | 93,4 | 94,4 | 93,3 | 94,1 | 91,3 |
| De 1 a 3 días al año | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 3,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
| De 5 a 7 días por semana | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,8 |
| Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN | | | | | | | | | |
| Nunca | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
| De 1 a 3 días al año | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,7 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 6,0 |
| De 5 a 7 días por semana | 92,0 | 91,2 | 92,2 | 92,4 | 91,9 | 91,2 | 93,2 | 92,5 | 89,7 |
| Uso las redes sociales | | | | | | | | | |
| Nunca | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| De 1 a 3 días al año | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 2,0 |
| De 1 a 3 días al mes | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 3,0 |
| De 1 a 4 días por semana | 10,6 | 10,3 | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 11,7 | 9,5 | 10,5 | 11,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 83,8 | 83,6 | 83,5 | 84,2 | 84,0 | 82,5 | 85,7 | 84,4 | 81,2 |

1.2.333. (continuación)

| | Total alumnos | Relaciones con tus padres | | Normas en casa | | Normas fuera de casa | | Recibir cariño padres | |
|---|------------------|------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|
| | | M | B | M | B | M | B | M | B |
| Veo o me descargo música, películas, series, etc. | | | | | | | | | |
| Nunca | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| De 1 a 3 días al año | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 3,6 |
| De 1 a 3 días al mes | 10,6 | 8,6 | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 11,4 | 9,7 | 10,5 | 10,7 |
| De 1 a 4 días por semana | 25,8 | 20,5 | 27,2 | 26,1 | 24,9 | 26,7 | 24,9 | 26,1 | 22,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 59,6 | 67,8 | 57,6 | 59,8 | 60,1 | 57,7 | 62,0 | 59,7 | 61,5 |
| Participo en juegos de realidad virtual | | | | | | | | | |
| Nunca | 41,7 | 43,0 | 41,5 | 41,9 | 41,3 | 43,2 | 40,3 | 42,1 | 37,9 |
| De 1 a 3 días al año | 10,0 | 10,1 | 9,5 | 9,4 | 10,9 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 11,1 |
| De 1 a 3 días al mes | 13,8 | 13,4 | 13,9 | 13,7 | 13,8 | 13,5 | 13,9 | 13,7 | 13,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 18,0 | 14,5 | 18,8 | 18,7 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 18,1 | 17,4 |
| De 5 a 7 días por semana | 16,5 | 19,0 | 16,3 | 16,3 | 17,3 | 15,9 | 17,4 | 16,2 | 20,1 |
| Juego a juegos de habilidad | | | | | | | | | |
| Nunca | 33,1 | 38,5 | 31,8 | 32,7 | 33,6 | 33,0 | 32,9 | 32,5 | 36,5 |
| De 1 a 3 días al año | 16,3 | 16,7 | 16,4 | 16,0 | 16,7 | 16,5 | 16,0 | 16,4 | 15,7 |
| De 1 a 3 días al mes | 22,2 | 17,4 | 22,5 | 22,1 | 22,8 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 21,2 |
| De 1 a 4 días por semana | 17,5 | 15,4 | 18,3 | 18,3 | 16,0 | 17,8 | 17,3 | 17,9 | 14,3 |
| De 5 a 7 días por semana | 10,9 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 10,4 | 11,3 | 10,7 | 12,3 |
| Visito páginas sólo para adultos | | | | | | | | | |
| Nunca | 60,3 | 57,9 | 61,4 | 61,2 | 59,3 | 64,4 | 56,9 | 61,2 | 55,2 |
| De 1 a 3 días al año | 8,7 | 7,0 | 8,3 | 8,2 | 9,2 | 8,1 | 9,0 | 8,4 | 10,1 |
| De 1 a 3 días al mes | 11,5 | 10,7 | 11,4 | 11,3 | 11,6 | 10,2 | 12,5 | 11,5 | 11,0 |
| De 1 a 4 días por semana | 12,4 | 14,3 | 12,4 | 12,3 | 12,7 | 10,8 | 14,1 | 12,4 | 13,2 |
| De 5 a 7 días por semana | 7,1 | 10,0 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 6,4 | 7,6 | 6,6 | 10,4 |
| Compro ropa, juegos, libros, etc. | | | | | | | | | |
| Nunca | 30,6 | 31,7 | 29,9 | 30,2 | 30,2 | 31,7 | 28,7 | 29,4 | 36,9 |
| De 1 a 3 días al año | 34,1 | 32,8 | 34,3 | 33,9 | 35,2 | 33,7 | 34,8 | 34,6 | 31,0 |
| De 1 a 3 días al mes | 28,1 | 26,5 | 28,9 | 28,6 | 27,6 | 27,6 | 29,1 | 28,9 | 23,5 |
| De 1 a 4 días por semana | 5,0 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,0 |
| De 5 a 7 días por semana | 2,2 | 3,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 3,6 |

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.334.

Tiempo dedicado, de media al día, en actividades de ocio entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.

| | TOTAL | | POR SEXO Y EDAD | | | | | |
|--|-------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a practicar algún deporte, hacer ejercicio? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 10,3 | 6,1 | 14,6 | 7,1 | 9,8 | 10,2 | 12,3 | 17,9 |
| Media hora o menos al día | 13,5 | 9,1 | 18,0 | 12,6 | 13,4 | 13,5 | 14,1 | 15,2 |
| Alrededor de 1 hora al día | 41,3 | 38,2 | 44,6 | 43,1 | 41,4 | 41,3 | 41,0 | 35,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 31,1 | 41,2 | 20,6 | 32,8 | 31,0 | 31,7 | 29,4 | 27,3 |
| 4 horas al día o más | 3,9 | 5,4 | 2,2 | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 3,9 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a salir con amigos por las tardes de compras, a dar un paseo, ir a un parque para pasar el rato? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 3,3 | 4,5 | 2,2 | 4,0 | 3,9 | 2,8 | 3,1 | 2,3 |
| Media hora o menos al día | 7,6 | 8,8 | 6,5 | 8,6 | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| Alrededor de 1 hora al día | 14,4 | 16,2 | 12,5 | 14,6 | 13,1 | 13,9 | 14,9 | 17,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 41,8 | 40,9 | 42,8 | 42,0 | 40,9 | 41,9 | 42,8 | 41,0 |
| 4 horas al día o más | 32,8 | 29,6 | 36,0 | 30,8 | 34,4 | 34,3 | 32,1 | 31,7 |
| En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero fuera de internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 88,1 | 80,8 | 95,3 | 92,7 | 89,8 | 88,2 | 84,4 | 75,7 |
| Media hora o menos al día | 8,6 | 13,9 | 3,3 | 5,3 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 15,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 2,1 | 3,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 5,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,8 |
| 4 horas al día o más | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 |
| En últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a jugar dinero en internet en máquinas tragaperras, loterías, quinielas, juegos de casino, apuestas...? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 93,3 | 89,5 | 97,1 | 94,6 | 92,9 | 93,3 | 92,7 | 91,4 |
| Media hora o menos al día | 3,6 | 6,2 | 0,9 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,2 | 4,7 |
| Alrededor de 1 hora al día | 1,1 | 1,9 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| 4 horas al día o más | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar WhatsApp, e-mail, MSN? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Media hora o menos al día | 8,0 | 10,6 | 5,4 | 11,8 | 9,2 | 6,1 | 5,5 | 4,8 |
| Alrededor de 1 hora al día | 15,7 | 20,1 | 11,2 | 20,6 | 16,8 | 14,3 | 12,4 | 9,8 |
| De 2 a 3 horas al día | 27,3 | 27,5 | 27,0 | 28,8 | 26,3 | 28,0 | 27,4 | 21,2 |
| 4 horas al día o más | 48,6 | 41,2 | 56,1 | 38,2 | 47,1 | 51,2 | 54,4 | 63,9 |

1.2.334. (continuación)

| | TOTAL | | POR SEXO Y EDAD | | | | | |
|---|-------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|------|
| | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 18 años | |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado a usar las redes sociales? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 2,1 | 2,6 | 1,6 | 3,1 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,9 |
| Media hora o menos al día | 8,5 | 10,5 | 6,4 | 10,6 | 9,3 | 7,4 | 7,0 | 6,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 19,5 | 23,1 | 15,9 | 22,8 | 19,0 | 19,2 | 17,6 | 16,4 |
| De 2 a 3 horas al día | 30,3 | 30,0 | 30,6 | 30,8 | 30,1 | 29,8 | 32,0 | 25,9 |
| 4 horas al día o más | 39,6 | 33,7 | 45,5 | 32,7 | 39,7 | 41,6 | 42,1 | 48,9 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a escuchar o descargar música, ver o descargar vídeos musicales, películas, series, etc.? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| Media hora o menos al día | 22,4 | 24,9 | 19,9 | 29,0 | 22,9 | 20,3 | 18,4 | 17,7 |
| Alrededor de 1 hora al día | 30,3 | 30,9 | 29,8 | 30,8 | 29,6 | 30,4 | 31,0 | 29,1 |
| De 2 a 3 horas al día | 25,4 | 23,5 | 27,4 | 21,4 | 24,4 | 26,5 | 28,8 | 28,7 |
| 4 horas al día o más | 20,2 | 18,5 | 22,0 | 16,6 | 21,1 | 21,6 | 20,9 | 23,4 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a participar en juegos de realidad virtual? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 43,9 | 17,9 | 70,8 | 40,5 | 42,7 | 44,6 | 47,5 | 46,7 |
| Media hora o menos al día | 18,0 | 19,6 | 16,4 | 19,4 | 17,7 | 18,0 | 18,0 | 13,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,8 | 25,6 | 7,7 | 17,7 | 16,8 | 16,4 | 16,2 | 16,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 12,9 | 22,1 | 3,3 | 13,2 | 13,6 | 12,5 | 11,8 | 13,7 |
| 4 horas al día o más | 8,4 | 14,9 | 1,8 | 9,1 | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 9,1 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a jugar a juegos de habilidad? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 35,5 | 29,2 | 41,8 | 31,7 | 35,0 | 36,1 | 38,0 | 40,2 |
| Media hora o menos al día | 40,7 | 39,0 | 42,3 | 43,6 | 40,9 | 40,3 | 38,8 | 36,0 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,0 | 19,9 | 12,0 | 16,7 | 15,7 | 15,3 | 16,2 | 15,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 5,1 | 7,5 | 2,7 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,4 |
| 4 horas al día o más | 2,8 | 4,4 | 1,2 | 2,3 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 3,8 |
| En los últimos 12 meses, ¿cuánto tiempo has dedicado, a través de internet, a visitar páginas sólo para adultos? | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 62,2 | 36,0 | 88,1 | 72,2 | 63,9 | 58,9 | 55,1 | 55,1 |
| Media hora o menos al día | 29,2 | 49,4 | 9,4 | 21,3 | 27,4 | 32,3 | 35,6 | 33,1 |
| Alrededor de 1 hora al día | 5,9 | 10,2 | 1,6 | 4,0 | 5,5 | 6,4 | 7,1 | 8,3 |
| De 2 a 3 horas al día | 1,2 | 1,9 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 2,3 |
| 4 horas al día o más | 1,4 | 2,5 | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.335.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas en últimos 12 meses (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Borracheras últimos 12 m | | Binge drinking últimos 30 d | | Tabaco últimos 12 m | | Cannabis últimos 12 m | | Consumo problemático de cannabis* | |
|--|------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Nº casos | 35.369 | 14.473 | 19.645 | 11.107 | 23.980 | 12.269 | 23.066 | 9.144 | 25.676 | 1.006 | 6.562 |
| Juego dinero fuera de internet | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 88,1 | 82,7 | 92,2 | 80,3 | 91,8 | 82,3 | 91,1 | 78,8 | 91,4 | 67,7 | 79,8 |
| Media hora o menos al día | 8,6 | 12,6 | 5,6 | 13,8 | 6,2 | 12,3 | 6,6 | 14,8 | 6,4 | 19,2 | 14,8 |
| Alrededor de 1 hora al día | 2,1 | 3,0 | 1,3 | 3,8 | 1,2 | 3,4 | 1,3 | 4,0 | 1,4 | 7,3 | 3,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 3,9 | 1,1 |
| 4 horas al día o más | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 0,7 |
| Juego dinero en internet | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 93,3 | 92,2 | 94,3 | 90,5 | 94,7 | 91,3 | 94,3 | 90,1 | 94,5 | 85,1 | 91,2 |
| Media hora o menos al día | 3,6 | 4,3 | 2,9 | 5,4 | 2,7 | 4,5 | 3,1 | 5,3 | 2,9 | 7,6 | 4,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 2,8 | 1,5 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 1,0 |
| 4 horas al día o más | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 2,7 | 1,4 |
| Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 |
| Media hora o menos al día | 8,0 | 2,8 | 12,0 | 2,7 | 10,5 | 3,3 | 10,5 | 3,6 | 9,5 | 3,0 | 3,3 |
| Alrededor de 1 hora al día | 15,7 | 10,3 | 19,9 | 8,6 | 19,0 | 9,3 | 19,1 | 10,0 | 17,8 | 12,4 | 9,3 |
| De 2 a 3 horas al día | 27,3 | 26,1 | 28,4 | 24,2 | 28,7 | 23,1 | 29,5 | 23,9 | 28,6 | 18,8 | 24,7 |
| 4 horas al día o más | 48,6 | 60,6 | 39,1 | 64,2 | 41,2 | 64,0 | 40,4 | 62,1 | 43,7 | 65,3 | 62,3 |
| Uso las redes sociales | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 2,1 | 0,5 | 3,3 | 0,5 | 2,9 | 0,7 | 2,9 | 0,7 | 2,6 | 0,1 | 0,5 |
| Media hora o menos al día | 8,5 | 4,8 | 11,3 | 4,5 | 10,3 | 5,0 | 10,3 | 5,5 | 9,5 | 6,0 | 5,2 |
| Alrededor de 1 hora al día | 19,5 | 15,8 | 22,4 | 14,4 | 21,9 | 14,4 | 22,3 | 15,2 | 21,1 | 17,9 | 14,4 |
| De 2 a 3 horas al día | 30,3 | 30,0 | 30,9 | 28,0 | 31,5 | 27,5 | 31,8 | 28,2 | 31,1 | 25,1 | 29,2 |
| 4 horas al día o más | 39,6 | 48,8 | 32,1 | 52,6 | 33,5 | 52,3 | 32,8 | 50,4 | 35,6 | 50,8 | 50,7 |

1.2.335. (continuación)

| | Total alumnos | Borracheras últimos 12 m | | Binge drinking últimos 30 d | | Tabaco últimos 12 m | | Cannabis últimos 12 m | | Consumo problemático de cannabis* | |
|---|------------------|-----------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------------------|------|
| | | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Veo o me descargo música, películas, series, etc. | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 1,6 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 1,9 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
| Media hora o menos al día | 22,4 | 18,1 | 25,7 | 16,9 | 25,0 | 17,2 | 25,3 | 16,7 | 24,5 | 16,5 | 16,1 |
| Alrededor de 1 hora al día | 30,3 | 31,1 | 30,0 | 29,7 | 30,7 | 28,8 | 31,1 | 29,4 | 30,7 | 28,5 | 30,0 |
| De 2 a 3 horas al día | 25,4 | 27,3 | 24,1 | 27,3 | 24,5 | 27,6 | 24,3 | 27,1 | 24,9 | 26,2 | 27,6 |
| 4 horas al día o más | 20,2 | 22,8 | 18,0 | 25,2 | 17,9 | 25,3 | 17,5 | 25,8 | 18,1 | 27,6 | 25,5 |
| Participo en juegos de realidad virtual | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 43,9 | 46,5 | 42,0 | 45,0 | 43,4 | 46,7 | 42,4 | 41,9 | 44,6 | 37,0 | 42,6 |
| Media hora o menos al día | 18,0 | 19,0 | 17,3 | 18,7 | 17,7 | 18,7 | 17,6 | 19,6 | 17,4 | 18,7 | 19,7 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,3 | 16,5 | 16,4 | 17,0 | 18,3 | 16,2 | 24,1 | 17,9 |
| De 2 a 3 horas al día | 12,9 | 11,0 | 14,3 | 11,3 | 13,6 | 10,6 | 14,1 | 11,6 | 13,3 | 12,4 | 11,5 |
| 4 horas al día o más | 8,4 | 6,6 | 9,7 | 7,8 | 8,7 | 7,6 | 8,9 | 8,5 | 8,4 | 7,8 | 8,3 |
| Juego a juegos de habilidad | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 35,5 | 36,9 | 34,0 | 37,7 | 34,3 | 38,8 | 33,7 | 37,8 | 34,5 | 41,8 | 37,3 |
| Media hora o menos al día | 40,7 | 41,0 | 41,0 | 38,2 | 41,9 | 38,3 | 41,9 | 38,1 | 41,8 | 33,3 | 39,0 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,0 | 15,4 | 16,4 | 15,9 | 16,0 | 15,0 | 16,5 | 15,7 | 16,1 | 15,1 | 15,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 5,1 | 4,3 | 5,7 | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,8 |
| 4 horas al día o más | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 2,6 | 4,8 | 3,1 |
| Visito páginas sólo para adultos | | | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 62,2 | 54,3 | 68,4 | 52,0 | 67,0 | 55,3 | 65,9 | 47,4 | 67,6 | 34,3 | 48,3 |
| Media hora o menos al día | 29,2 | 35,2 | 25,0 | 35,2 | 26,6 | 33,3 | 27,1 | 39,1 | 25,7 | 43,9 | 39,3 |
| Alrededor de 1 hora al día | 5,9 | 7,5 | 4,5 | 8,9 | 4,5 | 7,7 | 4,9 | 9,2 | 4,6 | 13,3 | 8,9 |
| De 2 a 3 horas al día | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,1 | 1,5 |
| 4 horas al día o más | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 5,5 | 2,1 |

* Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4).

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.336.

Frecuencia de uso de internet entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según las relaciones que mantienen los estudiantes con sus padres y las normas que ellos fijan (%). España, 2016.

| | Total alumnos | Relaciones con tus padres | | Normas en casa | | Normas fuera de casa | | Recibir cariño padres | |
|--|---------------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|-------|
| | | M | B | M | B | M | B | M | B |
| Nº casos | 35.369 | 1.821 | 24.424 | 22.825 | 10.881 | 16.652 | 16.957 | 30.129 | 3.480 |
| Juego dinero fuera de internet | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 88,1 | 89,7 | 87,9 | 88,4 | 88,2 | 89,9 | 86,8 | 88,5 | 86,6 |
| Media hora o menos al día | 8,6 | 6,8 | 8,9 | 8,5 | 8,3 | 7,3 | 9,6 | 8,4 | 8,5 |
| Alrededor de 1 hora al día | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| 4 horas al día o más | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,2 |
| Juego dinero en internet | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 93,3 | 91,9 | 93,5 | 93,7 | 93,0 | 94,0 | 92,9 | 93,7 | 91,0 |
| Media hora o menos al día | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 2,9 | 4,0 | 3,4 | 4,2 |
| Alrededor de 1 hora al día | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,4 |
| 4 horas al día o más | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,7 |
| Uso WhatsApp, Email (Gmail, etc.), MSN | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
| Media hora o menos al día | 8,0 | 6,9 | 8,3 | 7,5 | 9,0 | 8,6 | 7,3 | 7,8 | 8,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 15,7 | 12,9 | 16,8 | 15,7 | 15,8 | 16,8 | 14,7 | 15,9 | 13,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 27,3 | 23,3 | 28,4 | 28,0 | 26,1 | 28,7 | 26,1 | 27,9 | 23,5 |
| 4 horas al día o más | 48,6 | 56,0 | 46,2 | 48,4 | 48,9 | 45,5 | 51,5 | 48,1 | 52,9 |
| Uso las redes sociales | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 |
| Media hora o menos al día | 8,5 | 9,5 | 8,7 | 8,2 | 8,8 | 9,2 | 7,6 | 8,2 | 10,0 |
| Alrededor de 1 hora al día | 19,5 | 14,5 | 20,8 | 20,0 | 18,6 | 20,7 | 18,5 | 19,9 | 16,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 30,3 | 25,5 | 31,2 | 30,7 | 30,1 | 30,6 | 30,4 | 31,0 | 26,0 |
| 4 horas al día o más | 39,6 | 48,7 | 37,0 | 39,1 | 40,5 | 37,2 | 41,8 | 38,9 | 45,0 |

1.2.336. (continuación)

| | Total alumnos | Relaciones con tus padres | | Normas en casa | | Normas fuera de casa | | Recibir cariño padres | |
|---|------------------|------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|
| | | M | B | M | B | M | B | M | B |
| Veo o me descargo música, películas, series, etc. | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,8 |
| Media hora o menos al día | 22,4 | 18,2 | 23,7 | 22,3 | 22,5 | 23,7 | 21,0 | 22,5 | 21,2 |
| Alrededor de 1 hora al día | 30,3 | 26,6 | 31,6 | 30,8 | 29,4 | 30,6 | 30,1 | 30,8 | 26,7 |
| De 2 a 3 horas al día | 25,4 | 25,5 | 25,2 | 25,6 | 25,7 | 24,9 | 26,4 | 25,9 | 23,6 |
| 4 horas al día o más | 20,2 | 29,0 | 17,9 | 19,8 | 20,9 | 19,0 | 21,3 | 19,4 | 26,7 |
| Participo en juegos de realidad virtual | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 43,9 | 45,1 | 43,6 | 44,1 | 43,4 | 45,5 | 42,3 | 44,4 | 39,6 |
| Media hora o menos al día | 18,0 | 17,1 | 18,0 | 17,9 | 18,2 | 18,1 | 17,9 | 18,0 | 18,1 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,8 | 16,2 | 17,2 | 17,2 | 15,9 | 16,5 | 17,1 | 16,7 | 17,5 |
| De 2 a 3 horas al día | 12,9 | 10,9 | 13,3 | 12,7 | 13,4 | 12,2 | 13,6 | 12,8 | 13,7 |
| 4 horas al día o más | 8,4 | 10,8 | 7,9 | 8,1 | 9,1 | 7,7 | 9,1 | 8,1 | 11,1 |
| Juego a juegos de habilidad | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 35,5 | 41,6 | 34,2 | 35,1 | 36,0 | 35,5 | 35,1 | 34,8 | 39,1 |
| Media hora o menos al día | 40,7 | 33,2 | 41,9 | 41,0 | 40,4 | 41,1 | 40,5 | 41,4 | 35,9 |
| Alrededor de 1 hora al día | 16,0 | 15,6 | 16,2 | 16,1 | 15,7 | 15,7 | 16,3 | 16,0 | 15,6 |
| De 2 a 3 horas al día | 5,1 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| 4 horas al día o más | 2,8 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 4,2 |
| Visito páginas sólo para adultos | | | | | | | | | |
| No lo he hecho | 62,2 | 59,8 | 63,3 | 63,1 | 61,2 | 66,3 | 58,8 | 63,1 | 57,0 |
| Media hora o menos al día | 29,2 | 26,4 | 29,3 | 29,0 | 29,7 | 26,6 | 31,9 | 29,2 | 30,1 |
| Alrededor de 1 hora al día | 5,9 | 8,1 | 5,4 | 5,6 | 6,3 | 4,8 | 6,7 | 5,5 | 8,3 |
| De 2 a 3 horas al día | 1,2 | 2,4 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,8 |
| 4 horas al día o más | 1,4 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,8 |

M = Malas/muy malas; B = Buenas/muy buenas.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.337.

Frecuencia de salidas nocturnas (en los últimos 12 meses) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según edad y sexo (%). España, 2016.


| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Nunca | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 15,9 | 9,5 | 6,4 | 4,2 | 9,1 | 4,3 |
| Menos de una noche al mes | 17,6 | 16,7 | 18,6 | 21,2 | 18,9 | 16,4 | 15,0 | 17,9 | 14,1 |
| De 1 a 3 noches al mes | 28,7 | 27,0 | 30,4 | 23,2 | 27,2 | 31,3 | 32,9 | 28,7 | 28,7 |
| Una noche a la semana | 17,2 | 17,9 | 16,5 | 15,6 | 16,3 | 17,8 | 18,9 | 17,1 | 17,7 |
| Dos noches a la semana | 19,3 | 20,4 | 18,2 | 15,9 | 18,6 | 19,9 | 21,2 | 18,9 | 25,2 |
| 3-4 noches a la semana | 5,2 | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,7 |
| Más de 4 noches a la semana | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 4,3 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.338.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




| | Alcohol | Tabaco | Cannabis | Cocaína (polvo y/o base) |
|-------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------------|
| Nunca | 26,7 | 9,0 | 4,6 | 0,3 |
| Menos de una noche al mes | 65,9 | 21,2 | 15,3 | 1,0 |
| De una a tres noches al mes | 83,0 | 35,6 | 26,5 | 1,8 |
| Una noche a la semana | 84,7 | 39,6 | 30,5 | 2,9 |
| Dos noches a la semana | 90,2 | 50,2 | 38,7 | 4,0 |
| De tres a cuatro noches a la semana | 89,8 | 53,7 | 44,7 | 6,0 |
| Más de cuatro noches a la semana | 89,8 | 56,8 | 46,6 | 8,1 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.339.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST ≥4), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




| | Binge drinking | Borracheras últimos 30 días | Botellón últimos 12 meses | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| Nunca | 3,4 | 1,3 | 3,5 | 3,9 |
| Menos de una noche al mes | 13,8 | 7,4 | 32,8 | 8,7 |
| De una a tres noches al mes | 32,7 | 23,1 | 59,4 | 10,6 |
| Una noche a la semana | 39,0 | 28,1 | 63,3 | 11,7 |
| Dos noches a la semana | 51,1 | 36,1 | 73,4 | 15,0 |
| De tres a cuatro noches a la semana | 53,6 | 39,9 | 74,1 | 21,2 |
| Más de cuatro noches a la semana | 51,9 | 34,8 | 71,9 | 22,1 |

CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.340.

Evolución de la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.




| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Nunca | 11,8 | 10,7 | 11,8 | 7,2 | 8,7 | 8,7 |
| Menos de una noche al mes | 11,7 | 11,0 | 12,7 | 15,1 | 17,7 | 17,6 |
| De una a tres noches al mes | 23,6 | 22,1 | 26,2 | 28,8 | 30,1 | 28,7 |
| Una noche a la semana | 18,5 | 17,3 | 18,4 | 17,9 | 17,0 | 17,2 |
| Dos noches a la semana | 24,5 | 26,7 | 22,1 | 19,9 | 18,6 | 19,3 |
| De tres a cuatro noches a la semana | 5,9 | 6,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 5,2 |
| Más de cuatro noches a la semana | 3,9 | 5,3 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.341.

Prevalencia de consumo de nuevas sustancias* alguna vez en la vida entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




* Nuevas sustancias: son aquellas que imitan el efecto de drogas ilegales como cannabis, cocaína, éxtasis... estas nuevas sustancias (keta, spice, marihuana sintética, miau miau, flakka, superman...) se pueden presentar en forma de hierbas, pastillas, polvos, líquidos, inciensos, etc.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.342.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas ilegales* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.




* Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.343.


Prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.344.


Prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.345.


Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.346.


Prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.347.


Prevalencia de intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.348.

Prevalencia de consumo de cocaína en polvo y/o base en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.349.

Prevalencia de consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según la frecuencia de salidas nocturnas en los últimos 12 meses (%). España, 2016.



CAST= Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.350.

Proporción de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años que regresan a casa (última salida en fin de semana), en cada una de las franjas horarias señaladas, según edad y sexo. (%). España, 2016.


| | TOTAL | SEXO | | EDAD | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|
| | | H | M | 14 años | 15 años | 16 años | 17 años | 14-17 años | 18 años |
| Antes de las 12 de la noche | 20,2 | 19,8 | 20,6 | 38,5 | 25,1 | 13,8 | 8,6 | 21,3 | 5,4 |
| Entre las 12 y la 1 de la madrugada | 18,0 | 19,0 | 17,1 | 26,5 | 23,0 | 17,0 | 9,3 | 18,9 | 6,5 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 12,5 | 12,9 | 12,1 | 11,7 | 14,0 | 14,3 | 11,3 | 12,9 | 7,5 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 12,0 | 12,3 | 11,6 | 9,0 | 12,2 | 13,5 | 13,4 | 12,1 | 10,6 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 12,7 | 11,8 | 13,6 | 6,7 | 10,8 | 15,4 | 16,7 | 12,5 | 15,7 |
| Entre las 4 de la madrugada y las 8 | 19,0 | 17,9 | 20,1 | 5,8 | 10,9 | 19,9 | 32,3 | 17,3 | 42,1 |
| Después de las 8 de la mañana | 5,6 | 6,4 | 4,9 | 1,9 | 4,0 | 6,1 | 8,5 | 5,1 | 12,2 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.351.

Evolución de la hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) en los últimos 12 meses, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 2006-2016.



| | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Antes de las 12 de la noche | 16,1 | 14,5 | 16,5 | 14,6 | 17,1 | 20,2 |
| Entre las 12 y la 1 de la madrugada | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 14,0 | 17,1 | 18,0 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 11,3 | 12,7 | 12,5 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 13,8 | 14,6 | 13,0 | 11,4 | 12,3 | 12,0 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 15,3 | 15,3 | 15,6 | 14,9 | 14,0 | 12,7 |
| Entre las 4 y las 8 de la mañana | 20,6 | 20,3 | 19,6 | 25,2 | 21,0 | 19,0 |
| Después de las 8 de la mañana | 5,2 | 5,9 | 5,1 | 8,6 | 5,8 | 5,6 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.352.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

| | Alcohol | Tabaco | Cannabis | Cocaína polvo y/o base |
|-------------------------------------|---------|--------|----------|------------------------|
| No ha salido | 29,0 | 9,7 | 4,9 | 0,4 |
| Antes de las 12 de la noche | 54,8 | 16,8 | 9,8 | 0,7 |
| Entre las 12 y la 1 de la madrugada | 73,1 | 26,1 | 17,1 | 1,5 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 83,0 | 33,5 | 24,0 | 1,3 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 88,8 | 40,1 | 30,3 | 2,3 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 92,7 | 45,0 | 34,2 | 2,7 |
| Entre las 4 y las 8 de la mañana | 96,0 | 58,0 | 49,0 | 4,2 |
| Después de las 8 de la mañana | 95,7 | 64,4 | 58,1 | 12,2 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.353.

Prevalencia de binge drinking, intoxicaciones étlicas agudas (borracheras) en los últimos 30 días, hacer botellón en los últimos 12 meses y consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.


| | Total estudiantes 14-18 años | Binge drinking últimos 30 días | Borracheras últimos 30 días | Botellón últimos 12 meses | Consumo problemático de cannabis (CAST ≥ 4) |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Antes de las 12 | 20,2 | 10,9 | 5,4 | 23,0 | 7,2 |
| Entre las 12 y la 1 | 18,0 | 20,6 | 11,6 | 43,8 | 11,0 |
| Entre la 1 y las 2 | 12,5 | 30,6 | 19,3 | 59,2 | 10,5 |
| Entre las 2 y las 3 | 12,0 | 36,2 | 25,4 | 66,7 | 12,4 |
| Entre las 3 y las 4 | 12,7 | 45,0 | 31,5 | 72,6 | 11,6 |
| Entre las 4 y las 8 | 19,0 | 60,0 | 46,3 | 82,5 | 14,0 |
| Después de las 8 | 5,6 | 62,6 | 48,6 | 79,4 | 22,6 |

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.354.

Número de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* consumidas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.




| | Una sustancia | Dos sustancias | Tres sustancias | Cuatro o más sustancias |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Antes de las 12 de la noche | 40,5 | 38,5 | 13,7 | 1,7 |
| Entre las 12 y la 1 de la madrugada | 24,5 | 43,1 | 16,9 | 3,2 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 14,9 | 43,2 | 20,9 | 3,9 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 9,7 | 40,9 | 22,8 | 5,4 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 6,6 | 39,7 | 22,2 | 6,6 |
| Entre las 4 y las 8 de la mañana | 3,4 | 28,7 | 22,9 | 13,0 |
| Después de las 8 de la mañana | 2,7 | 25,3 | 18,4 | 21,9 |

* Sustancias psicoactivas legales e ilegales: alcohol, tabaco, hipnosedantes, cannabis, cocaína polvo, cocaína base, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos, heroína, inhalables, GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.355.

Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas (legales e ilegales)* en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.



| | Legales | Ilegales |
|--|---------|----------|
| Antes de las 12 de la noche | 59,7 | 10,3 |
| Entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada | 75,9 | 17,7 |
| Entre la 1 y las 2 de la madrugada | 85,0 | 24,9 |
| Entre las 2 y las 3 de la madrugada | 90,5 | 31,6 |
| Entre las 3 y las 4 de la madrugada | 93,5 | 34,9 |
| Entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana | 96,7 | 49,9 |
| Después de las 8 de la mañana | 96,9 | 59,5 |

* Sustancias psicoactivas legales: alcohol, tabaco e hipnosedantes. Sustancias psicoactivas ilegales: cannabis, cocaína polvo, cocaína base, heroína, anfetaminas, éxtasis, alucinógenos y GHB.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.356.

Situaciones conflictivas experimentadas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hora de regreso a casa (última salida en fin de semana) (%). España, 2016.

| | No ha salido últimos 12 meses | Antes de las 12 | Entre las 12 y la 1 | Entre la 1 y las 2 | Entre las 2 y las 3 | Entre las 3 y las 4 | Entre las 4 y las 8 | Después de las 8 |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Conducción bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 3,0 | 5,2 | 10,0 |
| Conducción bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 4,1 | 8,7 |
| Conducción bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 2,2 |
| Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses | 4,5 | 7,0 | 11,1 | 14,5 | 17,6 | 21,8 | 33,1 | 38,9 |
| Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos del cannabis en los últimos 12 meses | 1,3 | 2,1 | 4,1 | 7,1 | 8,5 | 11,0 | 20,2 | 29,1 |
| Viajar como pasajero de conductor bajo los efectos de la cocaína en los últimos 12 meses | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 3,7 | 8,2 |
| Sufrir un accidente en los últimos 12 meses siendo conductor | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 5,6 |
| Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,2 |
| Sufrir un accidente en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,8 |
| Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses | 7,1 | 9,2 | 11,5 | 12,9 | 14,5 | 15,2 | 20,7 | 30,9 |
| Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes alcohol | 0,4 | 1,3 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 6,4 | 11,3 | 20,5 |
| Sufrir una pelea en los últimos 12 meses habiendo consumido antes cannabis | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 4,9 | 12,2 |
| Tener un conflicto o discusión importante con padres o hermanos en los últimos 12 meses | 24,7 | 30,5 | 33,1 | 35,9 | 37,5 | 39,7 | 42,7 | 46,8 |
| No recordar lo sucedido la noche anterior después de haber salido en los últimos 12 meses | 2,6 | 6,4 | 11,9 | 17,2 | 22,6 | 26,3 | 37,2 | 36,8 |
| Tener dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses | 3,2 | 7,7 | 11,7 | 14,7 | 17,0 | 20,1 | 24,1 | 30,5 |
| Haber sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más en los últimos 12 meses | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 7,2 | 12,9 |
| Tener resaca al día siguiente después de salir en los últimos 12 meses | 1,7 | 8,2 | 18,4 | 29,2 | 35,6 | 44,3 | 59,9 | 55,0 |
| Tener relaciones sexuales de las que se arrepiente al día siguiente en los últimos 12 meses | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 5,3 | 6,6 | 7,1 | 10,2 | 16,7 |
| Tener relaciones sexuales sin preservativo en los últimos 12 meses | 3,5 | 4,4 | 7,5 | 10,9 | 14,3 | 17,7 | 26,7 | 34,1 |
| Sufrir bullying a través de internet o por otros medios en los últimos 12 meses | 10,8 | 8,5 | 6,3 | 6,0 | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 7,8 |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.357.


Dinero disponible (euros) por término medio a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según sexo y edad. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.358.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función del consumo de sustancias psicoactivas. España, 2016.



FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.359.

Dinero disponible (euros) a la semana para gastos personales entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años en función de si han faltado a clase y si han repetido curso. España, 2016.

| | Total alumnos | | Faltar a clase (hacer pellas) | | Reptir curso | |
|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|-------|--------------|----|
| | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| Dinero disponible (euros) | 18,03 | 21,58 | 17,03 | 21,37 | 16,76 | |

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.360.

Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según el consumo de sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

| | Notas saca habitualmente | | | Repetido curso alguna vez | | Expulsión del centro* | | Dificultad de concentración** | |
|--|--------------------------|---------------|----------|---------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------------|------|
| | Sobresaliente/notable | Aprobado/bien | Suspense | Sí | No | Sí | No | Sí | No |
| TOTAL ALUMNOS | 42,7 | 50,5 | 6,8 | 27,8 | 72,2 | 4,9 | 95,1 | 15,1 | 84,9 |
| Ha consumido alcohol últimos 30 días | 38,3 | 53,9 | 7,8 | 32,4 | 67,6 | 6,1 | 93,9 | 20,5 | 79,5 |
| No ha consumido alcohol últimos 30 días | 51,5 | 43,6 | 4,9 | 18,3 | 81,7 | 2,5 | 97,5 | 4,4 | 95,6 |
| Se ha emborrachado últimos 30 días | 35,0 | 55,6 | 9,4 | 37,6 | 62,4 | 8,6 | 91,4 | 32,6 | 67,4 |
| No se ha emborrachado últimos 30 días | 45,8 | 48,3 | 5,8 | 23,9 | 76,1 | 3,6 | 96,4 | 10,0 | 90,0 |
| Ha hecho binge drinking últimos 30 días | 32,9 | 58,1 | 9,0 | 39,3 | 60,7 | 8,3 | 91,7 | 28,5 | 71,5 |
| No ha hecho binge drinking últimos 30 días | 47,4 | 46,8 | 5,7 | 22,2 | 77,8 | 3,3 | 96,7 | 8,9 | 91,1 |
| Ha hecho botellón último año | 39,5 | 52,8 | 7,7 | 31,8 | 68,2 | 6,7 | 93,3 | 23,0 | 77,0 |
| No ha hecho botellón último año | 46,5 | 47,7 | 5,8 | 23,0 | 77,0 | 2,9 | 97,1 | 6,4 | 93,6 |
| Ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días | 22,8 | 62,1 | 15,1 | 57,0 | 43,0 | 16,4 | 83,6 | 35,0 | 65,0 |
| No ha consumido tabaco diariamente últimos 30 días | 45,2 | 48,9 | 5,9 | 24,5 | 75,5 | 3,8 | 96,2 | 12,8 | 87,2 |
| Ha consumido cannabis últimos 30 días | 27,9 | 59,7 | 12,4 | 44,2 | 55,8 | 12,1 | 87,9 | 30,8 | 69,2 |
| No ha consumido cannabis últimos 30 días | 46,2 | 48,2 | 5,6 | 23,8 | 76,2 | 3,3 | 96,7 | 11,7 | 88,3 |
| Consumo problemático de cannabis (CAST ≥4) | 16,6 | 63,7 | 19,7 | 58,6 | 41,4 | 24,3 | 75,7 | 49,0 | 51,0 |
| Consumo de cannabis (CAST <4) | 31,9 | 58,8 | 9,3 | 38,9 | 61,1 | 8,6 | 91,4 | 26,0 | 74,0 |
| Ha consumido cocaína últimos 30 días | 27,2 | 55,7 | 17,2 | 53,8 | 46,2 | 31,0 | 69,0 | 48,5 | 51,5 |
| No ha consumido cocaína últimos 30 días | 43,2 | 50,2 | 6,6 | 27,1 | 72,9 | 4,6 | 95,4 | 14,6 | 85,4 |

* En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.

** En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarse en el colegio al día siguiente después de salir.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.361.

Conducción de un vehículo de motor bajo los efectos de sustancias psicoactivas y viajar como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según edad y sexo (%). España, 2016.

| | Total | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14-17 |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | H | M | años | años | años | años | años | años |
| He conducido un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol | 2,5 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 2,3 |
| He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de hachís o marihuana | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | 3,9 | 1,7 |
| He conducido un vehículo de motor bajo los efectos de cocaína | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,3 |
| He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol | 17,2 | 16,4 | 17,9 | 8,6 | 13,4 | 19,0 | 24,5 | 30,8 | 16,2 |
| He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de hachís o marihuana | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | 6,4 | 9,2 | 14,7 | 22,1 | 8,1 |
| He viajado como pasajero de un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos de cocaína | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 4,4 | 1,6 |

H = Hombres; M = Mujeres.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).

1.2.362.

Situaciones que en los últimos 12 meses han experimentado los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años según hayan consumido o no diferentes sustancias psicoactivas (% de fila). España, 2016.

| | Pelea o agresión* | Rel. sexuales y arrepentido* | Rel. sexuales sin preservativo* | No recordar* | Tener resaca* | Discusión familiar* | Sufrir bullying* |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| TOTAL ALUMNOS | 14,1 | 5,9 | 13,4 | 19,0 | 29,7 | 35,7 | 7,2 |
| En los últimos 12 meses | | | | | | | |
| Ha consumido alcohol | 16,7 | 7,4 | 17,0 | 24,8 | 39,7 | 40,3 | 7,1 |
| No ha consumido alcohol | 6,3 | 1,1 | 2,6 | 1,6 | 0,0 | 21,8 | 7,3 |
| En los últimos 30 días | | | | | | | |
| Ha consumido alcohol | 17,6 | 8,1 | 18,2 | 26,7 | 42,9 | 40,8 | 7,1 |
| No ha consumido alcohol | 7,2 | 1,5 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 25,5 | 7,3 |
| Se ha emborrachado | 26,1 | 13,3 | 28,7 | 47,7 | 77,5 | 49,3 | 6,9 |
| No se ha emborrachado | 10,5 | 3,6 | 8,8 | 10,7 | 15,6 | 31,8 | 7,2 |
| Ha hecho binge drinking | 24,3 | 12,1 | 25,9 | 39,7 | 62,8 | 45,3 | 7,1 |
| No ha hecho binge drinking | 9,4 | 3,0 | 7,6 | 9,4 | 14,8 | 31,2 | 7,2 |
| Ha hecho botellón | 25,3 | 12,8 | 26,2 | 41,2 | 64,3 | 46,0 | 6,7 |
| No ha hecho botellón | 10,5 | 3,6 | 9,3 | 11,9 | 19,0 | 32,4 | 7,3 |

1.2.362. (continuación)

| | Pelea o agresión* | Rel. sexuales y arrepentido* | Rel. sexuales sin preservativo* | No recordar* | Tener resaca* | Discusión familiar* | Sufrir bullying* |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------|
| En los últimos 30 días | | | | | | | |
| Ha consumido tabaco diariamente | 36,5 | 18,7 | 42,2 | 41,4 | 68,0 | 55,4 | 9,5 |
| No ha consumido tabaco diariamente | 11,8 | 4,5 | 10,5 | 16,4 | 25,5 | 33,4 | 6,8 |
| En los últimos 12 meses | | | | | | | |
| Ha consumido hipnosedantes | 24,6 | 11,3 | 23,1 | 28,5 | 40,4 | 55,1 | 15,9 |
| No han consumido hipnosedantes | 12,6 | 5,1 | 12,1 | 17,8 | 28,5 | 33,2 | 6,0 |
| En los últimos 30 días | | | | | | | |
| Ha consumido hipnosedantes | 25,8 | 14,0 | 24,3 | 28,0 | 39,3 | 56,5 | 19,3 |
| No han consumido hipnosedantes | 13,3 | 5,3 | 12,7 | 18,5 | 29,3 | 34,4 | 6,4 |
| En los últimos 12 meses | | | | | | | |
| Ha consumido cannabis | 27,7 | 13,7 | 31,1 | 39,1 | 60,8 | 49,1 | 7,8 |
| No ha consumido cannabis | 9,2 | 3,1 | 7,2 | 11,9 | 19,1 | 30,9 | 6,9 |
| En los últimos 30 días | | | | | | | |
| Ha consumido cannabis | 31,3 | 16,0 | 34,4 | 39,8 | 61,0 | 50,1 | 8,4 |
| No ha consumido cannabis | 10,3 | 3,6 | 8,8 | 14,4 | 23,1 | 32,6 | 6,9 |
| Consumo de cannabis | | | | | | | |
| CAST ≥4 | 54,5 | 26,0 | 51,1 | 49,4 | 68,9 | 63,1 | 10,5 |
| CAST <4 | 24,6 | 12,8 | 29,8 | 38,9 | 62,0 | 48,1 | 7,5 |
| En los últimos 12 meses | | | | | | | |
| Ha consumido cocaína** | 52,2 | 30,0 | 51,9 | 45,5 | 59,5 | 52,8 | 14,0 |
| No ha consumido cocaína** | 13,1 | 5,3 | 12,5 | 18,3 | 29,1 | 35,2 | 7,0 |
| En los últimos 30 días | | | | | | | |
| Ha consumido cocaína** | 57,6 | 31,9 | 49,3 | 47,0 | 54,8 | 55,2 | 15,7 |
| No ha consumido cocaína** | 13,5 | 5,5 | 12,9 | 18,6 | 29,4 | 35,4 | 7,0 |

* Las definiciones completas son las siguientes: Sufrir una pelea o agresión física en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales de las que me he arrepentido al día siguiente. En los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales sin preservativo. En los últimos 12 meses no has podido recordar lo que sucedió la noche anterior después de haber salido. En los últimos 12 meses has tenido resaca al día siguiente después de salir. En los últimos 12 meses has tenido un conflicto o discusión importante con padres o hermanos. En los últimos 12 meses has sufrido bullying (acoso) a través de internet o por otros medios.

** Cocaína polvo y/o base.

CAST = Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático = puntuación CAST ≥4.

FUENTE: OEDA. Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES).




Problemas
relacionados con
las drogas

2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2016

2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2016.




| | Nº de admisiones |
|------|------------------|
| 1998 | 54.338 |
| 2002 | 46.744 |
| 2004 | 52.128 |
| 2005 | 50.630 |
| 2006 | 49.283 |
| 2007 | 50.555 |
| 2008 | 53.155 |
| 2009 | 52.549 |
| 2010 | 53.434 |
| 2011 | 50.281 |
| 2012 | 49.678 |
| 2013 | 51.946 |
| 2014 | 48.926 |
| 2015 | 47.308 |
| 2016 | 45.637 |

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2016.



| | Primeros tratamientos | Con tratamiento previo | Total | | Primeros tratamientos | Con tratamiento previo | Total |
|------|--------------------------|---------------------------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 1991 | 15.277 | 13.296 | – | 2004 | 3.836 | 15.617 | 20.532 |
| 1992 | 20.017 | 15.956 | – | 2005 | 3.604 | 14.005 | 18.653 |
| 1993 | 18.977 | 16.703 | – | 2006 | 3.318 | 14.502 | 18.803 |
| 1994 | 18.770 | 17.526 | – | 2007 | 3.672 | 14.331 | 18.904 |
| 1995 | 17.878 | 20.369 | – | 2008 | 3.840 | 13.616 | 17.456 |
| 1996 | 16.647 | 28.382 | – | 2009 | 3.412 | 12.750 | 16.989 |
| 1997 | 12.993 | 30.173 | – | 2010 | 4.526 | 12.166 | 17.325 |
| 1998 | 11.867 | 30.756 | – | 2011 | 2.951 | 10.391 | 13.898 |
| 1999 | 10.473 | 26.031 | – | 2012 | 2.555 | 9.302 | 12.238 |
| 2000 | 8.151 | 26.412 | – | 2013 | 2.572 | 8.940 | 11.756 |
| 2001 | 7.461 | 24.844 | – | 2014* | 2.356 | 8.555 | 10.911 |
| 2002 | 5.051 | 21.162 | – | 2015 | 2.202 | 7.713 | 10.978 |
| 2003 | 4.337 | 17.867 | 23.225 | 2016 | 2.353 | 7.907 | 10.807 |


* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2016.



| | Primeros | Con tratamiento | Total | | Primeros | Con tratamiento | Total |
|------|--------------|-----------------|--------|-------|--------------|-----------------|--------|
| | tratamientos | previo | | | tratamientos | previo | |
| 1991 | 681 | 262 | — | 2004 | 14.126 | 6.747 | 21.646 |
| 1992 | 932 | 367 | — | 2005 | 15.258 | 7.562 | 23.746 |
| 1993 | 1.146 | 431 | — | 2006 | 13.463 | 8.036 | 22.242 |
| 1994 | 1.265 | 491 | — | 2007 | 13.429 | 8.753 | 23.037 |
| 1995 | 1.415 | 516 | — | 2008 | 12.847 | 10.786 | 24.680 |
| 1996 | 1.892 | 932 | — | 2009 | 12.142 | 9.107 | 23.132 |
| 1997 | 3.129 | 1.402 | — | 2010 | 12.130 | 9.095 | 22.087 |
| 1998 | 4.174 | 1.838 | — | 2011 | 10.637 | 8.889 | 20.335 |
| 1999 | 6.126 | 2.576 | — | 2012 | 10.142 | 8.855 | 19.497 |
| 2000 | 5.499 | 2.773 | — | 2013 | 10.734 | 8.726 | 19.848 |
| 2001 | 5.977 | 3.046 | — | 2014* | 9.683 | 8.182 | 17.864 |
| 2002 | 7.125 | 3.893 | 11.904 | 2015 | 8.445 | 7.248 | 17.327 |
| 2003 | 11.851 | 5.893 | 18.359 | 2016 | 9.052 | 7.678 | 17.889 |


* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2016.



| | Primeros | Con tratamiento | Total | | Primeros | Con tratamiento | Total |
|------|--------------|-----------------|-------|-------|--------------|-----------------|--------|
| | tratamientos | previo | | | tratamientos | previo | |
| 1996 | 1.300 | 230 | - | 2007 | 4.619 | 1.114 | 5.936 |
| 1997 | 1.768 | 387 | - | 2008 | 5.058 | 2.055 | 7.419 |
| 1998 | 2.412 | 407 | - | 2009 | 7.273 | 1.705 | 9.503 |
| 1999 | 2.335 | 418 | - | 2010 | 8.639 | 2.101 | 11.192 |
| 2000 | 2.487 | 408 | - | 2011 | 9.736 | 2.603 | 12.873 |
| 2001 | 2.966 | 540 | - | 2012 | 10.982 | 3.402 | 14.869 |
| 2002 | 3.972 | 665 | 4.772 | 2013 | 12.912 | 3.585 | 16.914 |
| 2003 | 4.613 | 871 | 5.711 | 2014* | 12.968 | 3.510 | 16.478 |
| 2004 | 5.319 | 928 | 6.500 | 2015 | 11.185 | 3.448 | 15.676 |
| 2005 | 4.426 | 844 | 5.524 | 2016 | 9.278 | 3.208 | 13.304 |
| 2006 | 4.125 | 941 | 5.304 | | | | |


* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2016.



| | Primeros tratamientos | Con tratamiento previo | Total | | Primeros tratamientos | Con tratamiento previo | Total |
|------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1996 | 109 | 77 | – | 2007 | 503 | 261 | 795 |
| 1997 | 144 | 111 | – | 2008 | 463 | 352 | 845 |
| 1998 | 197 | 143 | – | 2009 | 598 | 312 | 963 |
| 1999 | 165 | 147 | – | 2010 | 580 | 323 | 944 |
| 2000 | 214 | 154 | – | 2011 | 709 | 386 | 1.143 |
| 2001 | 299 | 170 | – | 2012 | 648 | 421 | 1.083 |
| 2002 | 350 | 242 | – | 2013 | 787 | 374 | 1.175 |
| 2003 | 382 | 225 | – | 2014* | 871 | 321 | 1.192 |
| 2004 | 441 | 224 | 693 | 2015 | 742 | 256 | 1.068 |
| 2005 | 383 | 209 | 618 | 2016 | 772 | 282 | 1.105 |
| 2006 | 466 | 223 | 717 | | | | |


* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2016.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.


Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2016.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2016.



| | Primeros tratamientos | Con tratamiento previo | Total |
|-------|-----------------------|------------------------|--------|
| 2005 | 10.096 | 8.133 | 18.950 |
| 2006 | 10.172 | 8.611 | 19.454 |
| 2007 | 9.898 | 8.587 | 19.224 |
| 2008 | 9.395 | 9.753 | 26.318 |
| 2009 | 10.924 | 11.288 | 27.958 |
| 2010 | 15.126 | 11.764 | 28.111 |
| 2011 | 11.612 | 10.350 | 29.014 |
| 2012 | 14.816 | 12.714 | 28.234 |
| 2013 | 15.121 | 12.978 | 28.652 |
| 2014* | 15.240 | 12.418 | 27.658 |
| 2015 | 13.457 | 11.254 | 27.469 |
| 2016 | 13.319 | 11.323 | 26.655 |


* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2016.



| | Inyección alguna vez en la vida | Inyección en 12 meses previos a la admisión |
|--------|---------------------------------|---|
| 1996 | 31.046 | 24.224 |
| 1997 | 29.419 | 21.605 |
| 1998 | 28.527 | 18.910 |
| 1999 | 24.520 | 15.562 |
| 2000 | 24.941 | 13.955 |
| 2001 | 19.988 | 10.898 |
| 2002 | 17.950 | 9.583 |
| 2003 | 15.806 | 7.966 |
| 2004 | 13.605 | 6.516 |
| 2005 | 12.252 | 5.620 |
| 2006 | 11.601 | 4.892 |
| 2007 | 12.487 | 5.055 |
| 2008 | 12.066 | 5.050 |
| 2009 | 9.637 | 3.763 |
| 2010 | 9.697 | 3.549 |
| 2011 | 8.195 | 3.010 |
| 2012 | 7.580 | 2.562 |
| 2013 | 7.026 | 2.237 |
| 2014** | 6.360 | 1.664 |
| 2015 | 5.904 | 2.413 |
| 2016 | 6.117 | 2.621 |


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.10.

Número* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2016.



| | Inyección alguna vez en la vida | Inyección en 12 meses previos a la admisión |
|--------|---------------------------------|---|
| 1996 | 8.801 | 7.132 |
| 1997 | 7.154 | 5.488 |
| 1998 | 6.247 | 4.526 |
| 1999 | 5.315 | 3.655 |
| 2000 | 5.055 | 2.793 |
| 2001 | 3.483 | 2.181 |
| 2002 | 2.765 | 1.801 |
| 2003 | 2.722 | 1.583 |
| 2004 | 2.356 | 1.303 |
| 2005 | 2.283 | 1.228 |
| 2006 | 1.879 | 928 |
| 2007 | 2.073 | 1.060 |
| 2008 | 2.271 | 1.124 |
| 2009 | 1.687 | 866 |
| 2010 | 2.196 | 979 |
| 2011 | 1.635 | 702 |
| 2012 | 1.393 | 523 |
| 2013 | 1.457 | 530 |
| 2014** | 1.065 | 261 |
| 2015 | 1.038 | 367 |
| 2016 | 1.141 | 416 |


* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

** En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2016.




| | Edad media de admisión a tratamiento | Edad media primer consumo |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1987 | 24,8 | 19,7 |
| 1988 | 25,4 | 19,8 |
| 1989 | 25,7 | 19,8 |
| 1990 | 26,2 | 20,0 |
| 1991 | 26,4 | 20,3 |
| 1992 | 26,6 | 20,3 |
| 1993 | 27,2 | 20,3 |
| 1994 | 27,8 | 20,6 |
| 1995 | 28,5 | 20,6 |
| 1996 | 29,3 | 20,6 |
| 1997 | 30,0 | 20,7 |
| 1998 | 30,7 | 20,6 |
| 1999 | 31,3 | 20,8 |
| 2000 | 32,0 | 20,6 |
| 2001 | 32,0 | 20,8 |
| 2002 | 33,6 | 20,9 |
| 2003 | 33,9 | 20,7 |
| 2004 | 35,4 | 20,8 |
| 2005 | 35,6 | 20,6 |
| 2006 | 36,4 | 20,3 |
| 2007 | 36,8 | 21,0 |
| 2008 | 37,5 | 21,1 |
| 2009 | 37,9 | 20,9 |
| 2010 | 38,4 | 21,4 |
| 2011 | 39,3 | 20,8 |
| 2012 | 40,4 | 20,7 |
| 2013 | 40,8 | 20,9 |
| 2014 | 40,9 | 21,1 |
| 2015 | 41,3 | 21,5 |
| 2016 | 41,6 | 21,1 |

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2016.




| | Edad media de admisión a tratamiento | Edad media primer consumo |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1991 | 25,7 | 20,6 |
| 1992 | 26,0 | 20,6 |
| 1993 | 26,4 | 20,7 |
| 1994 | 27,3 | 21,0 |
| 1995 | 27,9 | 21,2 |
| 1996 | 28,6 | 21,3 |
| 1997 | 29,2 | 21,4 |
| 1998 | 29,9 | 21,2 |
| 1999 | 30,3 | 21,8 |
| 2000 | 30,9 | 22,1 |
| 2001 | 31,4 | 22,3 |
| 2002 | 31,8 | 22,6 |
| 2003 | 31,9 | 22,3 |
| 2004 | 33,0 | 22,8 |
| 2005 | 33,0 | 22,0 |
| 2006 | 33,0 | 21,5 |
| 2007 | 34,1 | 23,3 |
| 2008 | 35,0 | 22,9 |
| 2009 | 34,5 | 22,8 |
| 2010 | 35,0 | 23,5 |
| 2011 | 36,7 | 22,6 |
| 2012 | 38,1 | 22,4 |
| 2013 | 38,2 | 22,3 |
| 2014 | 37,9 | 23,5 |
| 2015 | 38,0 | 23,8 |
| 2016 | 38,2 | 23,5 |

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2016.




| | Edad media de admisión a tratamiento | Edad media primer consumo |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1987 | 25,4 | 20,9 |
| 1988 | 26,1 | 21,3 |
| 1989 | 26,2 | 21,2 |
| 1990 | 26,5 | 21,4 |
| 1991 | 27,0 | 21,9 |
| 1992 | 27,6 | 22,1 |
| 1993 | 27,9 | 22,0 |
| 1994 | 28,5 | 22,0 |
| 1995 | 29,1 | 22,5 |
| 1996 | 29,3 | 22,3 |
| 1997 | 29,1 | 22,2 |
| 1998 | 29,1 | 22,1 |
| 1999 | 28,6 | 21,7 |
| 2000 | 29,1 | 21,5 |
| 2001 | 29,8 | 21,6 |
| 2002 | 29,8 | 21,9 |
| 2003 | 29,8 | 21,3 |
| 2004 | 30,0 | 21,3 |
| 2005 | 30,4 | 20,9 |
| 2006 | 31,2 | 20,7 |
| 2007 | 31,6 | 21,2 |
| 2008 | 32,1 | 21,0 |
| 2009 | 32,5 | 20,7 |
| 2010 | 33,3 | 20,8 |
| 2011 | 33,8 | 20,6 |
| 2012 | 34,4 | 20,7 |
| 2013 | 35,0 | 20,6 |
| 2014 | 35,3 | 20,6 |
| 2015 | 35,9 | 20,7 |
| 2016 | 35,9 | 20,4 |

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2016.




| | Edad media de admisión a tratamiento | Edad media primer consumo |
|------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1991 | 26,6 | 21,9 |
| 1992 | 27,2 | 22,3 |
| 1993 | 27,6 | 22,3 |
| 1994 | 28,2 | 22,2 |
| 1995 | 28,6 | 22,6 |
| 1996 | 28,8 | 22,4 |
| 1997 | 28,6 | 22,4 |
| 1998 | 28,4 | 22,2 |
| 1999 | 27,8 | 21,9 |
| 2000 | 28,2 | 21,6 |
| 2001 | 29,0 | 21,8 |
| 2002 | 28,8 | 21,7 |
| 2003 | 28,8 | 21,5 |
| 2004 | 29,1 | 21,4 |
| 2005 | 30,0 | 21,1 |
| 2006 | 30,4 | 20,9 |
| 2007 | 30,8 | 21,5 |
| 2008 | 31,2 | 21,1 |
| 2009 | 31,6 | 20,9 |
| 2010 | 32,4 | 21,2 |
| 2011 | 33,0 | 21,1 |
| 2012 | 33,4 | 21,1 |
| 2013 | 33,9 | 21,0 |
| 2014 | 34,1 | 20,8 |
| 2015 | 34,8 | 21,1 |
| 2016 | 34,8 | 21,1 |

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




| | Pulmonar | Inyectada | Esnifada |
|------|----------|-----------|----------|
| 1991 | 6.188 | 7.164 | 822 |
| 1992 | 9.585 | 8.232 | 1.219 |
| 1993 | 10.493 | 7.129 | 995 |
| 1994 | 10.873 | 6.435 | 978 |
| 1995 | 11.161 | 5.033 | 1.028 |
| 1996 | 10.934 | 4.488 | 696 |
| 1997 | 8.487 | 3.011 | 887 |
| 1998 | 7.884 | 2.518 | 910 |
| 1999 | 7.033 | 1.969 | 968 |
| 2000 | 5.917 | 1.414 | 532 |
| 2001 | 5.461 | 1.276 | 471 |
| 2002 | 3.540 | 894 | 399 |
| 2003 | 2.805 | 748 | 386 |
| 2004 | 2.690 | 648 | 358 |
| 2005 | 2.487 | 544 | 350 |
| 2006 | 2.320 | 486 | 303 |
| 2007 | 2.842 | 470 | 327 |
| 2008 | 2.891 | 455 | 285 |
| 2009 | 2.719 | 386 | 256 |
| 2010 | 3.589 | 465 | 258 |
| 2011 | 2.211 | 365 | 201 |
| 2012 | 1.870 | 276 | 159 |
| 2013 | 2.047 | 283 | 175 |
| 2014 | 1.670 | 154 | 125 |
| 2015 | 1.831 | 167 | 145 |
| 2016 | 1.982 | 186 | 146 |

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




| | Pulmonar | Inyectada | Esnifada |
|------|----------|-----------|----------|
| 1991 | 43,4 | 50,3 | 5,8 |
| 1992 | 50,0 | 42,9 | 6,4 |
| 1993 | 56,1 | 38,1 | 5,3 |
| 1994 | 59,2 | 35,0 | 5,3 |
| 1995 | 64,5 | 29,1 | 5,9 |
| 1996 | 67,0 | 27,5 | 4,3 |
| 1997 | 67,2 | 23,8 | 7,0 |
| 1998 | 68,3 | 21,8 | 7,9 |
| 1999 | 69,3 | 19,4 | 9,5 |
| 2000 | 74,1 | 17,7 | 6,7 |
| 2001 | 74,9 | 17,5 | 6,5 |
| 2002 | 71,8 | 18,1 | 8,1 |
| 2003 | 69,3 | 18,5 | 9,5 |
| 2004 | 68,0 | 16,4 | 9,0 |
| 2005 | 69,0 | 15,1 | 9,7 |
| 2006 | 73,8 | 15,5 | 9,6 |
| 2007 | 77,4 | 12,8 | 8,9 |
| 2008 | 78,5 | 12,4 | 7,7 |
| 2009 | 79,7 | 11,3 | 7,5 |
| 2010 | 82,0 | 10,6 | 5,9 |
| 2011 | 77,7 | 12,8 | 7,1 |
| 2012 | 78,3 | 11,6 | 6,7 |
| 2013 | 79,6 | 11,0 | 6,8 |
| 2014 | 80,6 | 7,4 | 6,0 |
| 2015 | 83,7 | 7,6 | 6,6 |
| 2016 | 84,7 | 7,9 | 6,2 |

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




| | Pulmonar | Inyectada | Esnifada |
|------|----------|-----------|----------|
| 1991 | 315 | 139 | 109 |
| 1992 | 547 | 196 | 121 |
| 1993 | 611 | 278 | 108 |
| 1994 | 714 | 238 | 97 |
| 1995 | 739 | 287 | 74 |
| 1996 | 1.307 | 413 | 82 |
| 1997 | 2.172 | 741 | 100 |
| 1998 | 3.073 | 856 | 128 |
| 1999 | 4.777 | 1.048 | 128 |
| 2000 | 4.067 | 1.172 | 105 |
| 2001 | 4.413 | 1.284 | 91 |
| 2002 | 5.613 | 1.403 | 156 |
| 2003 | 9.228 | 1.242 | 485 |
| 2004 | 11.140 | 1.837 | 693 |
| 2005 | 12.298 | 1.755 | 793 |
| 2006 | 11.155 | 1.617 | 103 |
| 2007 | 11.393 | 1.295 | 130 |
| 2008 | 10.391 | 1.276 | 117 |
| 2009 | 10.272 | 1.139 | 136 |
| 2010 | 9.952 | 1.203 | 166 |
| 2011 | 8.787 | 1.205 | 97 |
| 2012 | 8.346 | 781 | 95 |
| 2013 | 8.995 | 1.320 | 129 |
| 2014 | 6.798 | 986 | 56 |
| 2015 | 7.005 | 1.078 | 30 |
| 2016 | 7.564 | 1.107 | 33 |

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2016.




| | Esnifada | Pulmonar | Inyectada |
|------|----------|----------|-----------|
| 1991 | 55,4 | 24,4 | 19,2 |
| 1992 | 62,7 | 22,5 | 13,9 |
| 1993 | 60,8 | 27,7 | 10,7 |
| 1994 | 67,4 | 22,5 | 9,2 |
| 1995 | 66,5 | 25,8 | 6,7 |
| 1996 | 71,7 | 22,6 | 4,5 |
| 1997 | 71,0 | 24,2 | 3,3 |
| 1998 | 74,8 | 20,8 | 3,3 |
| 1999 | 79,5 | 17,4 | 2,1 |
| 2000 | 75,2 | 21,7 | 1,9 |
| 2001 | 75,2 | 21,9 | 1,6 |
| 2002 | 77,0 | 19,2 | 2,1 |
| 2003 | 83,0 | 11,2 | 4,4 |
| 2004 | 80,9 | 13,3 | 4,8 |
| 2005 | 80,6 | 11,5 | 5,2 |
| 2006 | 86,0 | 12,5 | 0,8 |
| 2007 | 88,0 | 10,0 | 1,0 |
| 2008 | 86,9 | 10,7 | 1,0 |
| 2009 | 87,7 | 9,7 | 1,2 |
| 2010 | 86,8 | 10,5 | 1,4 |
| 2011 | 85,5 | 11,7 | 0,9 |
| 2012 | 88,3 | 8,3 | 1,0 |
| 2013 | 83,8 | 12,3 | 1,2 |
| 2014 | 82,6 | 12,0 | 0,7 |
| 2015 | 83,5 | 12,9 | 0,4 |
| 2016 | 83,9 | 12,3 | 0,4 |

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2016.



2.1.20.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2016.




| | Cocaína | Cannabis | Hipnosedantes | Opiáceos | Estimulantes | Alucinógenos |
|-------|---------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 2005 | 57,4 | 42,7 | 8,9 | 10,9 | 5,9 | 0,6 |
| 2006 | 58,7 | 44,1 | 9,0 | 11,8 | 5,2 | 0,9 |
| 2007 | 58,0 | 43,3 | 8,5 | 12,3 | 4,6 | 0,8 |
| 2008 | 66,1 | 49,1 | 10,6 | 11,8 | 4,3 | 1,2 |
| 2009 | 61,5 | 50,9 | 9,8 | 5,9 | 3,9 | 0,9 |
| 2010 | 63,4 | 52,0 | 9,9 | 6,6 | 4,3 | 1,3 |
| 2011 | 63,7 | 51,6 | 9,3 | 6,5 | 4,9 | 1,5 |
| 2012 | 62,1 | 52,9 | 10,1 | 7,1 | 4,6 | 1,2 |
| 2013 | 60,8 | 53,5 | 9,1 | 6,7 | 4,8 | 1,2 |
| 2014* | 56,7 | 48,3 | 8,1 | 4,5 | 2,8 | 0,4 |
| 2015 | 60,3 | 51,4 | 8,2 | 5,3 | 4,4 | 0,5 |
| 2016 | 62,3 | 51,1 | 7,3 | 4,4 | 4,1 | 0,3 |

* El 76,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 23,4% restante (n= 6.428) que ha consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2016.




| | Hombre | Mujer | Total |
|------|--------|-------|-------|
| 1996 | 35,9 | 43,4 | 37,1 |
| 1997 | 32,4 | 41,0 | 33,7 |
| 1998 | 32,4 | 39,7 | 33,6 |
| 1999 | 31,9 | 40,2 | 33,0 |
| 2000 | 32,7 | 37,9 | 33,5 |
| 2001 | 32,7 | 40,2 | 33,7 |
| 2002 | 30,9 | 38,9 | 32,0 |
| 2003 | 31,5 | 39,3 | 32,6 |
| 2004 | 27,7 | 38,3 | 29,3 |
| 2005 | 31,5 | 39,5 | 32,7 |
| 2006 | 32,7 | 37,4 | 33,4 |
| 2007 | 30,0 | 36,2 | 30,9 |
| 2008 | 26,7 | 33,3 | 27,6 |
| 2009 | 26,0 | 32,2 | 26,9 |
| 2010 | 29,8 | 31,7 | 30,2 |
| 2011 | 28,5 | 30,0 | 28,7 |
| 2012 | 28,2 | 30,0 | 28,4 |
| 2013 | 24,2 | 26,1 | 24,4 |
| 2014 | 26,3 | 24,4 | 26,0 |
| 2015 | 33,4 | 35,4 | 33,7 |
| 2016 | 33,9 | 39,0 | 34,6 |

Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.22.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2016.



| | <25 años | 25-34 años | >34 años |
|------|----------|------------|----------|
| 1996 | 20,3 | 39,3 | 48,9 |
| 1997 | 17,5 | 34,0 | 46,4 |
| 1998 | 15,1 | 33,4 | 45,8 |
| 1999 | 15,2 | 32,0 | 44,0 |
| 2000 | 13,1 | 30,5 | 45,5 |
| 2001 | 14,0 | 29,1 | 44,4 |
| 2002 | 12,1 | 26,7 | 42,8 |
| 2003 | 9,2 | 25,5 | 43,8 |
| 2004 | 7,1 | 20,9 | 39,4 |
| 2005 | 9,7 | 23,1 | 41,9 |
| 2006 | 7,2 | 21,4 | 42,2 |
| 2007 | 3,2 | 18,7 | 40,3 |
| 2008 | 3,2 | 16,9 | 35,6 |
| 2009 | 2,2 | 15,2 | 34,7 |
| 2010 | 8,1 | 14,8 | 38,0 |
| 2011 | 9,9 | 14,5 | 35,6 |
| 2012 | 8,6 | 11,7 | 35,4 |
| 2013 | 4,7 | 8,9 | 30,4 |
| 2014 | 5,9 | 12,0 | 31,2 |
| 2015 | 11,5 | 12,1 | 38,4 |
| 2016 | 3,1 | 16,0 | 39,3 |

Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.23.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2016.

| Droga principal por la que es admitido a tratamiento | Número de admisiones a tratamiento | % respecto al total de admisiones |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Cocaína | 17.889 | 24,7 |
| Cocaína polvo | 17.098 | 23,7 |
| Cocaína base | 785 | 1,1 |
| Opioides | 12.235 | 16,9 |
| Heroína | 10.807 | 14,9 |
| Metadona (mal uso) | 509 | 0,7 |
| Otros opioides | 919 | 1,3 |
| Cannabis | 13.304 | 18,4 |
| Hipnosedantes | 1.105 | 1,5 |
| Estimulantes | 931 | 1,3 |
| Anfetaminas | 699 | 1,0 |
| Éxtasis y derivados | 89 | 0,1 |
| Otros estimulantes | 143 | 0,2 |
| Alucinógenos | 82 | 0,1 |
| Inhalantes volátiles | 28 | 0,0 |
| Otras drogas ilegales | 63 | 0,1 |
| Alcohol | 26.655 | 36,9 |
| Total drogas ilegales | 45.637 | 63,1 |
| Total drogas ilegales y alcohol | 72.292 | - |

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2016.



| | Todas las admisiones | Admitidos primera vez en la vida | Admitidos menores 18 años* | Nacidos fuera de España |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Opioides | 16,9 | 8,4 | 0,4 | 17,8 |
| Cocaína | 24,7 | 25,1 | 1,7 | 19,1 |
| Cannabis | 18,4 | 25,7 | 94,3 | 19,9 |
| Otros estimulantes | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 1,1 |
| Alcohol | 36,9 | 36,9 | 2,4 | 41,0 |
| Número de admisiones | 72.292 | 36.135 | 2.702 | 7.122 |


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años* y nacidos fuera de España) (%). España, 2016.



| | Todas las admisiones | Admitidos primera vez en la vida | Admitidos menores 18 años* | Nacidos fuera de España |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Opioides | 26,8 | 13,3 | 0,5 | 30,1 |
| Cocaína | 39,2 | 39,7 | 1,7 | 32,4 |
| Cannabis | 29,2 | 40,7 | 96,6 | 33,7 |
| Otros estimulantes | 2,0 | 2,4 | 0,3 | 1,8 |
| Otras sustancias | 2,8 | 3,9 | 0,9 | 2,0 |
| Número de admisiones | 45.637 | 22.816 | 2.637 | 4.201 |


* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2016.



| | TASAS | NÚMERO DE CASOS |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | (España 98,02/100.000 habitantes) | (Total 45.637) |
| Canarias | 3.011 | 143,25 |
| Andalucía | 11.437 | 136,35 |
| Extremadura | 1.438 | 132,20 |
| Comunidad Valenciana | 6.179 | 124,58 |
| Baleares | 1.268 | 114,52 |
| Melilla | 93 | 108,11 |
| Galicia | 2.753 | 101,27 |
| Ceuta | 82 | 97,02 |
| Cataluña | 7.109 | 94,50 |
| Madrid | 5.183 | 80,15 |
| Murcia | 1.147 | 78,30 |
| La Rioja | 241 | 76,32 |
| Castilla - La Mancha | 1.486 | 72,78 |
| Cantabria | 417 | 71,62 |
| País Vasco | 1.391 | 63,53 |
| Aragón | 738 | 56,40 |
| Castilla y León | 1.303 | 53,24 |
| Navarra | 145 | 22,63 |
| Asturias | 216 | 20,72 |

Tasas brutas. Población de cada CCAA a 1 de enero de 2015 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.27.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2016.

| | Total | Tratamiento previo* | | Sexo* | |
|---|--------|---------------------|--------|---------|---------|
| | | Sí | No | Hombres | Mujeres |
| Total | 45.637 | 20.124 | 22.816 | 38.127 | 7.454 |
| Tratamiento previo (%) | | | | | |
| Sí | 46,9 | 100 | 0,0 | 48,0 | 41,1 |
| No | 53,1 | 0,0 | 100 | 52,0 | 58,9 |
| Edad media (años) | 35,0 | 38,2 | 32,0 | 35,0 | 35,2 |
| Sexo (%) | | | | | |
| Hombre | 83,6 | 85,8 | 82,0 | 100 | 0,0 |
| Mujer | 16,4 | 14,2 | 18,0 | 0,0 | 100 |
| Máximo nivel de estudios (%) | | | | | |
| Sin estudios | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Primaria | 55,6 | 57,6 | 54,6 | 56,8 | 49,5 |
| Secundaria | 38,8 | 37,4 | 39,5 | 38,2 | 42,1 |
| Ha finalizado estudios superiores | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 4,1 | 7,5 |
| Situación laboral (%) | | | | | |
| Trabajo | 31,3 | 28,6 | 33,4 | 32,3 | 26,4 |
| Parado no habiendo trabajado antes | 7,3 | 6,8 | 7,7 | 7,0 | 8,4 |
| Parado habiendo trabajado antes | 41,3 | 46,8 | 36,4 | 41,2 | 41,5 |
| Otras | 20,2 | 17,8 | 22,4 | 19,5 | 23,7 |
| Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%) | | | | | |
| Otros servicios de tratamiento de drogodependencias | 6,9 | 11,9 | 2,5 | 6,7 | 8,3 |
| Médico general, Atención Primaria de Salud | 10,4 | 7,0 | 13,5 | 10,1 | 11,8 |
| Hospitales u otros servicios de salud | 9,8 | 9,0 | 10,5 | 9,0 | 13,9 |
| Servicios Sociales | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 2,4 | 6,3 |
| Prisión, centro de reforma o internamiento para menores | 5,7 | 7,8 | 4,2 | 6,2 | 3,2 |
| Servicios legales o policiales | 8,1 | 6,5 | 9,7 | 8,5 | 5,8 |
| Empresas o empleador | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Familiares y amigos | 11,9 | 7,4 | 16,1 | 12,1 | 10,6 |
| Iniciativa propia | 41,0 | 45,5 | 36,4 | 41,9 | 36,4 |
| Servicios de educación | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| Otra | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,0 |
| Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Solo/a | 13,7 | 16,3 | 11,4 | 14,0 | 12,3 |
| Únicamente con pareja | 10,8 | 11,2 | 10,3 | 10,0 | 15,0 |
| Únicamente con hijos/as | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 7,3 |
| Con la pareja e hijos/as | 16,3 | 15,3 | 17,1 | 16,3 | 16,1 |
| Con padres o familia de origen | 43,4 | 38,2 | 48,0 | 44,3 | 38,6 |
| Con amigos/as | 3,2 | 3,6 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
| Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social) | 5,5 | 6,5 | 4,8 | 6,1 | 2,4 |
| En instituciones no detenido (ej. albergue) | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
| Otros | 2,0 | 3,1 | 1,0 | 2,1 | 1,8 |

2.1.27. (continuación)

| | Total | Tratamiento previo* | | Sexo* | |
|--|-------|---------------------|------|---------|---------|
| | | Sí | No | Hombres | Mujeres |
| Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Casas, pisos, apartamentos | 80,9 | 76,2 | 84,8 | 80,6 | 82,2 |
| Prisión, centro de reforma o internamiento para menores | 6,6 | 8,2 | 5,4 | 7,3 | 2,9 |
| Otras instituciones | 6,7 | 7,0 | 6,6 | 6,4 | 8,2 |
| Pensiones, hoteles, hostales | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| Alojamiento inestable/precario | 5,1 | 7,6 | 3,0 | 5,0 | 6,0 |
| Otros lugares | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Español o extranjero (%) | | | | | |
| Español | 90,4 | 91,6 | 89,1 | 90,4 | 90,0 |
| Extranjero | 9,6 | 8,4 | 10,9 | 9,6 | 10,0 |
| Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%) | | | | | |
| Opioides | 26,8 | 42,6 | 13,3 | 27,1 | 25,5 |
| Heroína | 23,7 | 39,3 | 10,3 | 24,2 | 20,8 |
| Metadona | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| Otros opioides | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 3,2 |
| Cocaína | 39,2 | 38,2 | 39,7 | 40,0 | 32,9 |
| CLH Cocaína | 37,5 | 36,6 | 37,7 | 38,7 | 31,1 |
| Cocaína otras | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
| Estimulantes sin cocaína | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 2,5 |
| Anfetaminas | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,9 |
| MDMA y derivados | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Otros estimulantes | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Hipnosedantes | 2,4 | 1,4 | 3,4 | 1,6 | 6,5 |
| Alucinógenos | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Inhalables volátiles | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Cannabis | 29,2 | 15,9 | 40,7 | 28,6 | 32,1 |
| Otras sustancias | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Edad al inicio del consumo de la droga principal (años) | 19,6 | 19,4 | 19,8 | 19,2 | 21,6 |
| Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Todos los días | 47,4 | 43,4 | 51,1 | 46,6 | 51,5 |
| 4-6 días/semana | 7,8 | 6,8 | 8,8 | 8,1 | 6,4 |
| 2-3 días/semana | 13,8 | 11,8 | 15,5 | 14,0 | 12,5 |
| 1 día/semana | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 5,2 | 4,7 |
| Menos de 1 día/semana | 6,9 | 7,3 | 6,5 | 7,1 | 6,2 |
| No consumió | 18,9 | 26,1 | 12,8 | 19 | 18,7 |

2.1.27. (continuación)

| | Total | Tratamiento previo* | | Sexo* | |
|---|-------|---------------------|------|---------|---------|
| | | Sí | No | Hombres | Mujeres |
| Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%) | | | | | |
| Oral | 6,3 | 4,6 | 7,8 | 5,2 | 11,8 |
| Pulmonar o fumada | 52,9 | 51,9 | 54,3 | 52,8 | 53,0 |
| Intranasal o esnifada | 35,7 | 34,9 | 35,9 | 36,8 | 30,2 |
| Inyectada o parenteral | 4,3 | 7,8 | 1,2 | 4,4 | 4,0 |
| Otras | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Se inyectó drogas alguna vez en la vida | 15,6 | 26,7 | 5,5 | 16,0 | 13,9 |
| Se inyectó drogas en los últimos 12 meses | 6,7 | 11,6 | 2,0 | 6,8 | 6,2 |
| Prevalencia mínima VIH** | 4,1 | 6,9 | 1,7 | 4,0 | 4,7 |
| Prevalencia mínima Hepatitis C** | 8,2 | 14,8 | 2,4 | 8,3 | 7,5 |
| Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)** | 3,2 | 4,0 | 2,0 | 3,3 | 2,8 |
| Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)*** | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

*** Dejando desconocidos.

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación*

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España 2013-2016.

| | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | N absoluto | % | N absoluto | % | N absoluto | % | N absoluto | % |
| Han consumido sólo alcohol | 21.264 | 74,2 | 21.264 | 76,9 | 21.041 | 76,6 | 20.251 | 76,0 |
| Han consumido alcohol y otras drogas | 7.388 | 25,8 | 6.394 | 23,1 | 6.428 | 23,4 | 6.404 | 24,0 |
| Una droga más | 5.134 | 17,9 | 4.725 | 17,1 | 4.729 | 17,2 | 4.733 | 17,8 |
| Dos drogas más | 1.781 | 6,2 | 1.379 | 5,0 | 1.424 | 5,2 | 1.411 | 5,3 |
| Tres o más drogas | 473 | 1,7 | 290 | 1,0 | 275 | 1,0 | 260 | 0,9 |

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2016.

| | Total | Tratamiento previo* | | Sexo* | |
|---|--------|---------------------|--------|--------|-------|
| | | Sí | No | Hombre | Mujer |
| Nº de casos | 26.655 | 11.323 | 13.319 | 20.490 | 6.137 |
| Tratados por primera vez por la droga principal (%) | 46,0 | 0,0 | 100 | 46,3 | 44,9 |
| Edad media (años) | 46,1 | 47,0 | 45,5 | 45,9 | 46,8 |
| Mujeres (%) | 23,0 | 22,4 | 23,4 | 0,0 | 100 |
| Máximo nivel de estudios completado (%)* | | | | | |
| Sin estudios | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Enseñanza primaria | 49,6 | 50,5 | 49,4 | 52,2 | 41,2 |
| Enseñanzas secundarias | 40,7 | 40,4 | 40,5 | 39,6 | 44,3 |
| Estudios universitarios | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 7,3 | 13,7 |
| Situación laboral principal (%) | | | | | |
| Trabajando | 39,8 | 35,6 | 42,8 | 40,7 | 36,8 |
| Parado no habiendo trabajado | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,8 |
| Parado habiendo trabajado | 37,1 | 39,7 | 34,7 | 36,9 | 37,9 |
| Otras | 20,1 | 21,6 | 19,7 | 19,7 | 21,5 |
| Nacidos fuera de España (%) | 11,5 | 9,6 | 13,5 | 10,6 | 14,5 |
| Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%) | | | | | |
| Otros servicios de tratamiento de drogodependencias | 4,2 | 6,5 | 2,3 | 4,1 | 4,7 |
| Médicos generales, atención primaria de salud | 23,0 | 17,4 | 28,2 | 23,0 | 22,6 |
| Hospitales u otros servicios de salud | 17,4 | 17,1 | 17,7 | 16,5 | 20,4 |
| Servicios sociales | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,2 | 6,8 |
| Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 0,4 |
| Servicios legales o policiales | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Empresas o empleadores | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Familiares o amigos/as | 11,4 | 9,5 | 13,3 | 11,9 | 9,8 |
| Iniciativa propia | 31,5 | 37,8 | 25,0 | 32,0 | 30,1 |
| Otras | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,0 |
| Servicios de educación | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Solo/a | 20,6 | 22,9 | 18,8 | 21,0 | 19,1 |
| Únicamente con pareja | 15,4 | 14,2 | 16,2 | 14,8 | 17,4 |
| Únicamente con hijos | 4,3 | 4,0 | 4,7 | 1,9 | 13,4 |
| Con pareja e hijos/as | 26,6 | 23,8 | 29,0 | 27,0 | 25,1 |
| Con padres o familia de origen | 24,4 | 24,5 | 24,1 | 26,2 | 18,0 |
| Con amigos | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 3,3 |
| Otros | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
| Detenido (centro penitenciario, centro inserción social) | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 0,8 |
| En instituciones no detenido (albergue) | 3,5 | 4,7 | 2,5 | 3,7 | 2,7 |

2.1.29. (continuación)

| | Total | Tratamiento previo* | | Sexo* | |
|--|-------|---------------------|------|--------|-------|
| | | Sí | No | Hombre | Mujer |
| Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Casas, pisos, apartamentos | 82,1 | 79,1 | 84,0 | 81,7 | 83,5 |
| Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,0 |
| Otras instituciones | 9,5 | 10,2 | 9,6 | 9,3 | 10,1 |
| Pensiones, hoteles, hostales | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Alojamientos inestables/precarios | 5,5 | 7,5 | 3,8 | 5,7 | 5,0 |
| Otros lugares | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Otras sustancias consumidas en los últimos 30 días (%) | | | | | |
| Opioides | 4,4 | 5,5 | 2,8 | 4,4 | 4,0 |
| Cocaína | 62,3 | 62,1 | 61,6 | 64,2 | 52,7 |
| Estimulantes sin cocaína | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
| Hipnosedantes | 7,3 | 7,9 | 6,3 | 5,7 | 15,5 |
| Alucinógenos | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Inhalables volátiles | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Cannabis | 51,1 | 49,9 | 52,7 | 51,9 | 47,2 |
| Otras sustancias | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Edad al inicio del consumo de la droga principal (años) | 24,6 | 24,6 | 23,9 | 23,6 | 28,0 |
| Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | |
| Todos los días | 58,5 | 55,4 | 61,2 | 59,5 | 55,5 |
| 4-6 días/semana | 6,9 | 6,5 | 7,2 | 6,6 | 7,8 |
| 2-3 días/semana | 11,2 | 10,0 | 12,4 | 11,0 | 12,0 |
| 1 día/semana | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 4,8 |
| Menos de 1 día/semana | 5,0 | 5,7 | 4,5 | 4,8 | 5,8 |
| No consumió | 14,1 | 18,5 | 10,4 | 14,1 | 14,2 |
| Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%) | 4,1 | 5,3 | 3,0 | 4,5 | 2,8 |
| Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%) | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
| Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%) | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Prevalencia mínima VIH** (positivo) | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 2,4 |
| Prevalencia de mínima Hepatitis C** (positivo) | 2,9 | 3,8 | 2,0 | 3,0 | 2,3 |
| Prevalencia mínima Hepatitis B (portador crónico)** | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Prevalencia de VIH entre casos con información (positivo)*** | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 2,4 |
| Prevalencia de Hepatitis C entre casos con información (positivo)*** | 8,5 | 9,4 | 7,0 | 9,0 | 6,8 |
| Situación Hepatitis B (portador crónico) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |

* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

*** Eliminando los casos desconocidos.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2016.

| | Alcohol | Cocaína | Cannabis | Opioides | Hipnosedantes | Estimulantes | Alucinógenos | Otras sustancias psicoactivas | Sustancias volátiles |
|---|---------|---------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Nº de casos | 26.655 | 17.889 | 13.304 | 12.235 | 1.105 | 931 | 82 | 63 | 28 |
| Tratamiento previo (%) | | | | | | | | | |
| Sí | 54,0 | 45,9 | 25,7 | 73,8 | 26,8 | 38,1 | 34,6 | 23,3 | 11,1 |
| No | 46,0 | 54,1 | 74,3 | 26,2 | 73,2 | 61,9 | 65,4 | 76,7 | 88,9 |
| Sexo (%) | | | | | | | | | |
| Hombre | 67,0 | 86,3 | 82,0 | 84,4 | 56,1 | 80,1 | 86,3 | 58,7 | 85,7 |
| Mujer | 23,0 | 13,7 | 18,0 | 15,6 | 43,9 | 19,9 | 13,8 | 41,3 | 14,3 |
| Edad media (años) | 46,1 | 36,0 | 26,9 | 41,9 | 43,5 | 33,9 | 29,3 | 40,6 | 26,9 |
| Máximo nivel de estudios (%) | | | | | | | | | |
| Sin estudios | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Primaria | 49,6 | 51,8 | 56,0 | 62,6 | 49,0 | 43,5 | 42,3 | 41,7 | 69,2 |
| Secundaria | 40,7 | 42,0 | 39,6 | 32,7 | 37,4 | 45,8 | 47,4 | 41,7 | 23,1 |
| Ha finalizado estudios superiores | 8,7 | 5,5 | 3,9 | 3,1 | 11,8 | 10,5 | 10,3 | 16,7 | 3,8 |
| Situación laboral (%) | | | | | | | | | |
| Trabajo | 39,8 | 43,3 | 24,8 | 20,6 | 26,3 | 39,6 | 32,9 | 33,9 | 23,1 |
| Parado no habiendo trabajado antes | 2,9 | 4,6 | 10,9 | 7,3 | 6,8 | 5,6 | 15,2 | 6,8 | 19,2 |
| Parado habiendo trabajado antes | 37,1 | 40,9 | 31,1 | 53,1 | 41,2 | 42,4 | 40,5 | 28,8 | 26,9 |
| Otras | 20,1 | 11,2 | 33,3 | 19,1 | 25,7 | 12,4 | 11,4 | 30,5 | 30,8 |
| Español o extranjero (%) | | | | | | | | | |
| Español | 88,5 | 92,1 | 88,9 | 89,0 | 94,6 | 91,3 | 92,5 | 93,1 | 37,0 |
| Extranjero | 11,5 | 7,9 | 11,1 | 11,0 | 5,4 | 8,7 | 7,5 | 6,9 | 63,0 |
| Fuente de referencia principal que lo ha referido a tratamiento (%) | | | | | | | | | |
| Otros servicios de tto. drogodependencias | 4,2 | 4,9 | 2,6 | 14,7 | 4,4 | 6,9 | 11,3 | 1,7 | 4,0 |
| Médico general, Atención Primaria de Salud | 23,0 | 11,2 | 11,7 | 6,3 | 23,7 | 12,7 | 7,5 | 23,3 | 20,0 |
| Hospitales u otros servicios de salud | 17,4 | 9,1 | 12,3 | 7,0 | 20,4 | 13,7 | 7,5 | 13,3 | 32,0 |
| Servicios Sociales | 4,8 | 2,0 | 6,0 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 1,7 | 16,0 |
| Prisión, centro reforma o intern. menores | 1,4 | 4,7 | 5,3 | 8,2 | 3,0 | 3,5 | 1,3 | 5,0 | 8,0 |
| Servicios legales o policiales | 3,7 | 6,9 | 14,1 | 3,3 | 4,5 | 11,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| Empresas o empleador | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Familiares y amigos | 11,4 | 13,2 | 15,7 | 5,8 | 8,6 | 14,8 | 18,8 | 16,7 | 4,0 |
| Iniciativa propia | 31,5 | 46,0 | 27,8 | 49,8 | 30,5 | 31,4 | 41,3 | 33,3 | 16,0 |
| Servicios de educación | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Otra | 2,3 | 1,7 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 5,0 | 0,0 |
| Número de hijos | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,4 |

2.1.30. (continuación)

| | Alcohol | Cocaína | Cannabis | Opioides | Hipnosedantes | Estimulantes | Alucinógenos | Otras sustancias psicoactivas | Sustancias volátiles |
|---|---------|---------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Nº de casos | 26.655 | 17.889 | 13.304 | 12.235 | 1.105 | 931 | 82 | 63 | 28 |
| Convivencia más prolongada en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | | | | | |
| Solo/a | 20,6 | 12,9 | 9,4 | 18,9 | 17,6 | 18,4 | 11,7 | 21,7 | 15,4 |
| Únicamente con pareja | 15,4 | 12,4 | 7,0 | 12,5 | 12,4 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 11,5 |
| Únicamente con hijos/as | 4,3 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 6,3 | 1,9 | 3,9 | 1,7 | 0,0 |
| Con la pareja e hijos/as | 26,3 | 22,7 | 10,0 | 13,9 | 20,5 | 9,6 | 7,8 | 20,0 | 3,8 |
| Con padres o familia de origen | 24,4 | 38,2 | 60,0 | 33,1 | 32,1 | 47,0 | 58,4 | 35,0 | 34,6 |
| Con amigos/as | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 4,5 | 2,7 | 6,5 | 3,9 | 1,7 | 7,7 |
| Detenido (ej. centro penitenciario o inser. social) | 2,0 | 5,6 | 4,1 | 7,1 | 4,9 | 3,7 | 1,3 | 5,0 | 7,7 |
| En instituciones no detenido (ej. albergue) | 3,5 | 1,5 | 3,4 | 3,3 | 2,0 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 7,7 |
| Otros | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 3,9 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 3,3 | 11,5 |
| Con pareja y/o hijos y otros familiares | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%) | | | | | | | | | |
| Casas, pisos, apartamentos | 82,1 | 82,9 | 84,6 | 73,3 | 82,0 | 84,8 | 86,3 | 90,2 | 46,4 |
| Prisiones, centros de internamiento menores | 2,2 | 6,5 | 4,9 | 9,0 | 5,5 | 3,6 | 1,3 | 3,3 | 10,7 |
| Otras instituciones | 9,5 | 6,2 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,6 | 5,0 | 3,3 | 28,6 |
| Pensiones, hoteles, hostales | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alojamientos inestables/precarios | 5,5 | 3,8 | 2,7 | 9,8 | 4,9 | 4,4 | 6,3 | 3,3 | 10,7 |
| Otros lugares | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 3,6 |
| Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%) | | | | | | | | | |
| Opioides | 4,4 | 6,2 | 2,2 | 10,9 | 9,6 | 1,8 | 2,2 | 14,3 | 0,0 |
| Cocaína | 62,3 | 0,6 | 36,9 | 44,9 | 34,1 | 29,9 | 53,3 | 35,7 | 16,7 |
| Estimulantes | 4,1 | 5,7 | 10,6 | 2,1 | 6,0 | 7,3 | 15,6 | 14,3 | 8,3 |
| Hipnosedantes | 7,3 | 6,6 | 5,4 | 15,1 | 0,0 | 5,1 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Alucinógenos | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 14,3 | 0,0 |
| Sustancias volátiles | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cannabis | 51,1 | 49,9 | 0,0 | 50,8 | 50,5 | 54,2 | 64,4 | 42,9 | 58,3 |
| Alcohol | 0,0 | 69,8 | 74,8 | 34,0 | 51,8 | 53,3 | 33,3 | 42,9 | 50,0 |
| Otras sustancias psicoactivas | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Edad inicio del consumo droga principal (años) | 17,8 | 20,4 | 15,5 | 21,9 | 29,9 | 20,8 | 19,2 | 27,7 | 24,8 |

2.1.30. (continuación)

| | Alcohol | Cocaína | Cannabis | Opioides | Hipnosedantes | Estimulantes | Alucinógenos | Otras sustancias psicoactivas | Sustancias volátiles |
|--|---------|---------|----------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| Frecuencia de consumo de la droga principal (%) | | | | | | | | | |
| Todos los días | 58,5 | 24,4 | 68,1 | 57,1 | 84,2 | 26,3 | 27,6 | 57,9 | 40,0 |
| 4-6 días a la semana | 6,9 | 12,1 | 5,3 | 4,5 | 2,3 | 12,8 | 14,5 | 5,3 | 12,0 |
| 2-3 días a la semana | 11,2 | 23,8 | 7,9 | 5,8 | 3,2 | 21,1 | 19,7 | 12,3 | 24,0 |
| 1 día a la semana | 4,2 | 9,2 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 8,6 | 5,3 | 3,5 | 0,0 |
| Menos de 1 día a la semana | 5,0 | 11,8 | 3,7 | 3,6 | 1,3 | 10,0 | 14,5 | 5,3 | 12,0 |
| No consumió | 14,1 | 18,7 | 12,7 | 27,1 | 7,6 | 21,2 | 18,4 | 15,8 | 12,0 |
| Vía de administración droga principal (%) | | | | | | | | | |
| Oral | 99,6 | 2,6 | 1,4 | 7,0 | 97,1 | 24,7 | 36,3 | 56,7 | 3,6 |
| Pulmonar o fumada | 0,2 | 13,4 | 97,9 | 70,4 | 1,2 | 6,3 | 6,3 | 11,7 | 39,3 |
| Intranasal o esnifada | 0,1 | 82,5 | 0,4 | 6,3 | 1,3 | 66,7 | 56,3 | 5,0 | 42,9 |
| Inyectada o parenteral | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 14,9 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Otras | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 1,3 | 23,3 | 14,3 |
| Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%) | 4,1 | 5,4 | 2,8 | 45,1 | 8,5 | 8,7 | 8,5 | 11,5 | 4,8 |
| Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%) | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 20,8 | 1,8 | 4,4 | 1,7 | 7,7 | 4,8 |
| Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%) | 0,4 | 1,3 | 0,3 | 11,6 | 0,9 | 2,9 | 1,7 | 3,8 | 0,0 |
| Prevalencia de VIH entre los casos con información | | | | | | | | | |
| Positivo | 3,3 | 4,6 | 3,4 | 18,7 | 6,9 | 11,5 | 5,3 | 15,0 | 12,5 |
| Prevalencia de Hepatitis C entre los casos con información | | | | | | | | | |
| Positivo | 8,5 | 6,9 | 6,1 | 41,4 | 14,5 | 12,0 | 6,1 | 13,6 | 0,0 |
| Prevalencia de Hepatitis B entre los casos con información | | | | | | | | | |
| Portador crónico | 3,0 | 1,5 | 1,8 | 5,9 | 4,1 | 0,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Inmune o no inmune | 97,0 | 98,5 | 98,2 | 94,1 | 95,9 | 99,5 | 95,7 | 100,0 | 100,0 |
| Prevalencia mínima de VIH** (positivo) | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 11,0 | 2,5 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 3,6 |
| Prevalencia mínima Hepatitis C** (positivo) | 2,9 | 2,8 | 1,6 | 23,8 | 5,2 | 4,6 | 2,4 | 4,8 | 0,0 |
| Prevalencia mínima Hepatitis B** (portador crónico) | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |

* En 2014, se aplicó el cambio de protocolo para adaptarse a los cambios en el sistema educativo nacional. Los estudios de 3º y 4º de la ESO del sistema educativo actual, en el sistema educativo anterior se correspondían con 2 cursos de BUP, eso hace que, lo que antes se clasificaba como estudios secundarios a partir del 2014 se clasifica como estudios primarios, se debe tener este dato en cuenta a la hora de interpretar la serie histórica.

** Positivos entre el total (prevalencia mínima).

Notas:


- En alcohol, los porcentajes de la variable "Convivencia en los últimos 30 días" se calculan eliminando los casos de Cataluña que, en 2016, mostraron un error de codificación.
- El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables
- Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2016

2.2.1.

Evolución de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según el tipo de droga. España*, 1996-2016.



| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cocaína | 19,9 | 25,0 | 31,6 | 39,4 | 40,9 | 40,5 | 44,7 | 50,0 | 55,5 | 51,1 | 53,8 | 55,1 | 51,1 | 49,5 | 45,2 | 46,0 | 44,9 | 43,7 | 43,4 | 42,5 |
| Alcohol** | 12,4 | 15,2 | 22,2 | 20,0 | 26,8 | 29,0 | 35,4 | 30,7 | 32,3 | 36,0 | 35,7 | 37,3 | 40,2 | 36,3 | 40,4 | 39,0 | 38,7 | 38,7 | 39,7 | 43,9 |
| Cannabis | 6,2 | 6,6 | 8,9 | 9,3 | 12,8 | 16,9 | 19,9 | 19,3 | 21,7 | 23,9 | 22,9 | 24,7 | 29,5 | 30,5 | 33,3 | 33,0 | 34,6 | 35,5 | 42,1 | 40,1 |
| Hipnosed. | 23,6 | 18,9 | 24,3 | 23,8 | 28,9 | 29,2 | 30,1 | 22,3 | 17,0 | 21,0 | 15,8 | 15,6 | 16,5 | 16,7 | 18,9 | 18,3 | 17,8 | 18,5 | 18,0 | 20,5 |
| Heroína | 56,1 | 50,9 | 38,7 | 33,0 | 35,3 | 29,2 | 21,4 | 17,5 | 19,0 | 16,9 | 16,9 | 17,2 | 17,1 | 17,8 | 14,2 | 13,0 | 11,9 | 10,3 | 11,2 | 8,6 |
| Anfetaminas | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 9,8 | 2,2 | 4,2 | 3,4 | 2,3 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 9,2 | 8,9 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | 7,5 |
| Otros opioid. | 13,5 | 17,4 | 16,8 | 18,9 | 18,0 | 17,4 | 13,1 | 9,1 | 8,3 | 8,5 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 6,7 | 6,2 | 6,1 | 5,7 | 7,6 | 7,4 | 7,7 |
| MDMA y der. | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | 4,4 | 5,3 | 3,2 | 4,7 | 6,4 | 5,0 | 4,2 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 3,7 | 3,2 |
| Alucinógenos | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,50 | 1,60 | 1,50 |
| I. volátiles | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.2.

Número total de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas y porcentaje de urgencias en el que aparece cada sustancia. España*, 1996-2016.

| | Nº de episodios | Cocaína | Alcohol** | Cannabis | Hipnóticos y sedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opiáceos | MDMA y derivados | Alucinógenos | Sustancias volátiles |
|------|-----------------|---------|-----------|----------|-----------------------|---------|-------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|
| 1996 | 2.585 | 19,9 | 12,4 | 6,2 | 23,6 | 56,1 | 2,2 | 13,5 | 1,3 | 2,1 | 0,2 |
| 1997 | 1.932 | 25,0 | 15,2 | 6,6 | 18,9 | 50,9 | 2,9 | 17,4 | 2,2 | 1,8 | 0,1 |
| 1998 | 2.099 | 31,6 | 22,2 | 8,9 | 24,3 | 38,7 | 3,0 | 16,8 | 2,2 | 2,4 | 0,3 |
| 1999 | 2.141 | 39,4 | 20,0 | 9,3 | 23,8 | 33,0 | 9,8 | 18,9 | 2,4 | 1,7 | 0,1 |
| 2000 | 2.328 | 40,9 | 26,8 | 12,8 | 28,9 | 35,3 | 2,2 | 18,0 | 4,5 | 2,7 | 0,3 |
| 2001 | 2.145 | 40,5 | 29,0 | 16,9 | 29,2 | 29,2 | 4,2 | 17,4 | 4,4 | 1,9 | 0,9 |
| 2002 | 2.673 | 44,7 | 35,4 | 19,9 | 30,1 | 21,4 | 3,4 | 13,1 | 5,3 | 1,3 | 0,2 |
| 2004 | 5.828 | 50,0 | 30,7 | 19,3 | 22,3 | 17,5 | 2,3 | 9,1 | 3,2 | 0,8 | 0,6 |
| 2005 | 7.089 | 55,5 | 32,3 | 21,7 | 17,0 | 19,0 | 4,2 | 8,3 | 4,7 | 1,7 | 0,5 |
| 2006 | 7.042 | 51,1 | 36,0 | 23,9 | 21,0 | 16,9 | 4,7 | 8,5 | 6,4 | 1,7 | 0,4 |
| 2007 | 7.822 | 53,8 | 35,7 | 22,9 | 15,8 | 16,9 | 4,2 | 8,1 | 5,0 | 2,0 | 0,5 |
| 2008 | 6.431 | 55,1 | 37,3 | 24,7 | 15,6 | 17,2 | 4,4 | 7,5 | 4,2 | 1,6 | 0,5 |
| 2009 | 5.567 | 51,1 | 40,2 | 29,5 | 16,5 | 17,1 | 4,6 | 7,6 | 2,4 | 2,6 | 0,5 |
| 2010 | 5.626 | 49,5 | 36,3 | 30,5 | 16,7 | 17,8 | 5,5 | 6,7 | 2,9 | 1,7 | 0,4 |
| 2011 | 5.279 | 45,2 | 40,4 | 33,3 | 18,9 | 14,2 | 9,2 | 6,2 | 3,9 | 2,1 | 0,3 |
| 2012 | 5.999 | 46,0 | 39,0 | 33,0 | 18,3 | 13,0 | 8,9 | 6,1 | 4,6 | 2,5 | 0,5 |
| 2013 | 5.715 | 44,9 | 38,7 | 34,6 | 17,8 | 11,9 | 9,0 | 5,7 | 4,8 | 2,5 | 0,4 |
| 2014 | 6.441 | 43,7 | 38,7 | 35,5 | 18,5 | 10,3 | 8,6 | 7,6 | 4,5 | 2,5 | 0,3 |
| 2015 | 5.238 | 43,5 | 39,8 | 42,2 | 18,2 | 11,2 | 8,0 | 7,4 | 3,7 | 1,6 | 0,3 |
| 2016 | 4.565 | 42,5 | 43,9 | 40,1 | 20,5 | 8,6 | 7,5 | 7,7 | 3,2 | 1,5 | 0,3 |

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.3.

Evolución de las características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España*, 1996-2016.

| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Número de episodios | 2.585 | 1.932 | 2.099 | 2.141 | 2.328 | 2.145 | 2.673 | 5.828 | 7.089 | 7.042 | 7.822 | 6.431 | 5.567 | 5.626 | 5.279 | 5.999 | 5.715 | 6.441 | 5.238 | 4.565 | |
| Edad media (años) | 27,8 | 28,1 | 29,1 | 29,4 | 30,3 | 29,8 | 29,8 | 31,0 | 30,7 | 31,6 | 32,0 | 32,4 | 33 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 33,0 | 33,2 | 34,1 | 34,5 | |
| Sexo (%) mujeres | 21,4 | 20,8 | 23,1 | 23,5 | 27,4 | 27,1 | 27,4 | 28,0 | 25,0 | 26,1 | 23,4 | 22,7 | 21,6 | 26,3 | 24,7 | 26,1 | 26,1 | 24,5 | 22,6 | 22,6 | |
| Detenidos (%) | 14,4 | 22,4 | 11,7 | 9,4 | 6,4 | 5,7 | 5,2 | 4,1 | 4,9 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | |
| Resolución de la urgencia (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alta médica | 80,5 | 82,0 | 81,2 | 80,9 | 78,7 | 79,1 | 82,1 | 81,4 | 79,1 | 76,2 | 79,1 | 80,0 | 80,9 | 79,6 | 75,4 | 75,9 | 72,8 | 69,8 | 72,2 | 71,6 | |
| Alta voluntaria | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 7,5 | 7,4 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 7,0 | 8,5 | 8,2 | 9,4 | 9,9 | 8,2 | 8,2 | |
| Ingreso hospitalario | 7,6 | 7,2 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 7,8 | 6,3 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | 7,8 | 8,1 | 10,2 | 12,5 | 12,5 | 14,8 | 15,9 | 16,0 | 17,0 | |
| Muerte en urgencias | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Traslado a otro centro | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 5,4 | 4,0 | 5,3 | 5,7 | 6,3 | 4,1 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | |

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. Total, según sexo y según droga. España*, 2016.


| | Total | Según sexo | | Según droga | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|----------|---------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | Hombres | Mujeres | Cocaína | Alcohol | Cannabis | Hipnosedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opioides | MDMA y der. | Alucinogenos | I. volátiles |
| Número de episodios | 4.565 | 3.460 | 1.098 | 1.874 | 1.934 | 1.769 | 902 | 378 | 330 | 338 | 140 | 64 | 12 |
| Edad media (años) | 34,3 | 34,7 | 32,8 | 35,5 | 35 | 31,4 | 36,7 | 38,4 | 31,7 | 40,7 | 28,5 | 28,9 | 33,1 |
| Sexo (%) mujeres | 24,1 | 100,0 | 0,0 | 22,3 | 22,5 | 22,2 | 28,6 | 21,2 | 26,4 | 26,6 | 30,0 | 20,3 | 8,3 |
| Detenidos (%) | 3,7 | 4,3 | 1,7 | 7,1 | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 6,7 | 2,4 | 7,1 | 2,2 | 6,3 | 8,3 |
| Resolución de la urgencia (%) | | | | | | | | | | | | | |
| Alta médica | 71,6 | 71,3 | 72,8 | 72,0 | 73,6 | 70,1 | 65,3 | 65,6 | 67,4 | 67,4 | 75,6 | 80,7 | 71,4 |
| Alta voluntaria | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 9,2 | 9,2 | 5,7 | 8,5 | 8,6 | 10,6 | 9,6 | 15,4 | 7,0 | 28,6 |
| Ingreso hospitalario | 17,0 | 17,5 | 15,6 | 15,5 | 14,6 | 20,9 | 21,3 | 23,9 | 18,1 | 19,3 | 7,3 | 12,3 | 0,0 |
| Muerte en urgencias | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Traslado a otro centro | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,6 | 3,4 | 4,9 | 1,6 | 3,9 | 3,7 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.5.

Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias. España*, 2016.



| | Cocaína | Cannabis | Hipnosedantes | Heroína | Anfetaminas | Otros opiáceos | MDMA y der. | Alucinógenos |
|------------------------|---------|----------|---------------|---------|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Oral | 3,3 | 5,1 | 99,5 | 2,2 | 65,9 | 91,3 | 98,1 | 82,8 |
| Pulmonar o fumada | 17,9 | 94,8 | 0,3 | 50,0 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 3,4 |
| Intranasal o esnifada | 73,5 | 0,1 | 0,0 | 6,7 | 27,8 | 0,4 | 1,9 | 13,8 |
| Inyectada o parenteral | 8,6 | 0,0 | 0,1 | 41,1 | 1,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| Otra vía | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |

** Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.2.6.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de algunas drogas ilegales, según sexo. España, 2016.

| | Total | Hombres | Mujeres |
|------------------|-------|---------|---------|
| Cocaína | 42,7 | 43,6 | 39,7 |
| Alcohol | 44,0 | 44,9 | 41,2 |
| Cannabis | 40,2 | 41,1 | 37,2 |
| Hipnosedantes | 20,5 | 19,3 | 24,5 |
| Heroína | 8,6 | 9,0 | 7,6 |
| Anfetaminas | 7,5 | 7,3 | 8,3 |
| Otros opiáceos | 7,7 | 7,5 | 8,6 |
| MDMA y derivados | 3,2 | 2,9 | 4,0 |
| Otras sustancias | 2,7 | 1,9 | 5,3 |
| Alucinógenos | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| I. volátiles | 0,3 | 0,3 | 0,1 |

* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.


** El alcohol sólo se registra cuando aparece acompañado de otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1983-2016. Mortalidad relacionada con drogas

2.3.1.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016.



Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.2.

Número de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España, 1983-2016.

| | Estimación nacional | Reg. Específico Mortalidad (CCAA) | Reg. Específico Mortalidad (6 ciudades) |
|------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1983 | 266 | - | 82 |
| 1984 | 440 | - | 139 |
| 1985 | 453 | - | 143 |
| 1986 | 516 | - | 163 |
| 1987 | 741 | - | 234 |
| 1988 | 1.067 | - | 337 |
| 1989 | 1.440 | - | 455 |
| 1990 | 1.440 | - | 455 |
| 1991 | 1.833 | - | 579 |
| 1992 | 1.760 | - | 558 |
| 1993 | 1.399 | - | 444 |
| 1994 | 1.067 | - | 388 |
| 1995 | 1.051 | - | 395 |
| 1996 | 1.310 | - | 421 |
| 1997 | 1.127 | - | 339 |
| 1998 | 1.049 | - | 306 |
| 1999 | 972 | - | 291 |
| 2000 | 1.012 | 444 | 284 |
| 2001 | 923 | 496 | 268 |
| 2002 | 1.079 | 496 | 229 |
| 2003 | 900 | 493 | 270 |
| 2004 | 796 | 468 | 212 |
| 2005 | 1.004 | 455 | 242 |
| 2006 | 820 | 428 | 218 |
| 2007 | 703 | 475 | 188 |
| 2008 | 773 | 424 | 139 |
| 2009 | 739 | 438 | 181 |
| 2010 | 706 | 517 | 182 |
| 2011 | 736 | 408 | 181 |
| 2012 | 707 | 519 | 195 |
| 2013 | 727 | 489 | 196 |
| 2014 | 767 | 556 | 172 |
| 2015 | 936 | 600 | 171 |
| 2016 | 866 | 613 | 194 |

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad, CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad, 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España*, 2003-2016.

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Número de fallecidos | 493 | 468 | 455 | 428 | 475 | 424 | 438 | 517 | 453 | 519 | 489 | 556 | 600 | 613 |
| Casos analizados | 490 | 466 | 455 | 428 | 475 | 424 | 427 | 517 | 408 | 478 | 437 | 520 | 518 | 501 |
| Sexo (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Varones | 85,3 | 83,9 | 86,3 | 84,3 | 87,4 | 85,6 | 84,5 | 83,9 | 82,1 | 85,7 | 80,7 | 80,9 | 80,6 | 83,4 |
| Mujeres | 14,7 | 16,1 | 13,7 | 15,7 | 12,6 | 14,4 | 15,5 | 16,1 | 17,9 | 14,3 | 19,3 | 19,1 | 19,4 | 16,6 |
| Edad media (años) | 35,3 | 37,0 | 36,1 | 37,2 | 38,2 | 38,1 | 38,3 | 39,8 | 40,2 | 42,0 | 42,7 | 44,3 | 43,6 | 44,1 |
| Grupo de edad (años) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-19 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| 20-24 | 6,7 | 4,1 | 6,2 | 4,2 | 4,3 | 6,1 | 6,4 | 2,5 | 5,0 | 2,9 | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 1,8 |
| 25-29 | 14,6 | 11,9 | 11,2 | 12,9 | 9,7 | 10,6 | 8,0 | 7,9 | 6,0 | 6,7 | 7,6 | 4,7 | 4,7 | 5,4 |
| 30-34 | 22,6 | 20,5 | 20,0 | 18,0 | 17,6 | 16,3 | 17,4 | 12,4 | 12,2 | 11,6 | 13,1 | 10,4 | 9,3 | 8,3 |
| 35-39 | 28,2 | 27,9 | 28,9 | 23,8 | 24,1 | 22,2 | 18,9 | 25,5 | 19,9 | 15,8 | 15,7 | 13,8 | 18,3 | 14,0 |
| 40-44 | 16,9 | 19,2 | 20,7 | 21,3 | 22,2 | 19,8 | 24,9 | 24,8 | 21,4 | 22,4 | 19,6 | 17,7 | 16,5 | 19,4 |
| ≥45 | 10,2 | 15,1 | 11,6 | 18,9 | 21,5 | 23,1 | 23,7 | 26,5 | 34,0 | 40,3 | 42,3 | 51,2 | 47,7 | 50,6 |
| Estado civil (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Soltero | 69,4 | 68,9 | 68,7 | 72,0 | 62,8 | 61,4 | 67,3 | 61,0 | 63,6 | 65,4 | 61,3 | 59,3 | 64,8 | 64,2 |
| Casado | 19,0 | 15,6 | 16,4 | 12,2 | 19,1 | 16,8 | 15,4 | 21,6 | 18,2 | 20,7 | 18,9 | 14,5 | 17,8 | 17,8 |
| Separado/Divorciado | 10,5 | 14,4 | 13,7 | 13,6 | 17,4 | 18,9 | 15,0 | 15,9 | 16,2 | 12,8 | 18,9 | 23,1 | 16,5 | 15,6 |
| Viudo | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 2,3 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 3,1 | 0,9 | 2,5 |
| Procedencia del cadáver (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicilio | 54,5 | 55,2 | 58,1 | 52,3 | 60,6 | 60,0 | 61,9 | 64,3 | 68,6 | 69,6 | 71,7 | 74,4 | 72,6 | 68,5 |
| Hotel-Pensión | 5,3 | 5,1 | 6,2 | 5,8 | 4,6 | 3,9 | 5,9 | 4,3 | 2,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,3 | 3,8 |
| Calle | 18,5 | 17,4 | 13,5 | 20,1 | 13,1 | 15,8 | 11,8 | 14,0 | 11,1 | 12,3 | 9,1 | 10,1 | 8,2 | 8,2 |
| Local público | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 4,8 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | 2,1 |
| Hospital | 10,6 | 9,5 | 6,4 | 7,7 | 5,7 | 6,8 | 6,1 | 3,9 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 8,4 |
| Cárcel | 1,1 | 3,5 | 4,8 | 3,9 | 3,7 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 4,9 | 4,0 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 3,3 |
| Otra | 8,2 | 8,1 | 8,5 | 5,3 | 9,8 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 4,9 | 5,4 | 6,0 | 5,1 | 4,7 | 5,6 |
| Evidencias de consumo reciente (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 85,6 | 92,6 | 94,4 | 92,4 | 85,3 | 89,0 | 90,4 | 77,4 | 89,9 | 76,6 | 85,8 | 81,8 | 84,9 | 82,0 |
| No | 14,4 | 7,4 | 5,6 | 7,6 | 14,7 | 11,0 | 9,6 | 22,6 | 10,1 | 23,4 | 14,2 | 18,2 | 15,1 | 18,0 |
| Evidencia de suicidio (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 12,1 | 8,8 | 5,7 | 10,8 | 8,8 | 9,0 | 8,5 | 9,7 | 12,4 | 8,1 | 11,1 | 20,3 | 26,4 | 20,6 |
| No | 87,9 | 91,2 | 94,3 | 89,2 | 91,2 | 91,0 | 91,5 | 90,3 | 87,6 | 91,9 | 88,9 | 79,7 | 73,6 | 79,4 |
| Signos recientes venopunción (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 53,3 | 43,0 | 51,7 | 40,6 | 35,2 | 35,4 | 39,2 | 29,6 | 16,3 | 14,9 | 16,2 | 12,5 | 13,5 | 13,0 |
| No | 46,7 | 57,0 | 48,3 | 59,4 | 64,8 | 64,6 | 60,8 | 70,4 | 83,7 | 85,1 | 83,8 | 87,5 | 86,5 | 87,0 |
| Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Sí | 35,4 | 32,6 | 35,5 | 28,6 | 20,4 | 26,6 | 30,9 | 31,4 | 37,2 | 37,4 | 36,0 | 35,4 | 27,0 | 31,5 |
| No | 64,6 | 67,4 | 64,5 | 71,4 | 79,6 | 73,4 | 69,1 | 68,6 | 62,8 | 62,6 | 64,0 | 64,6 | 73,0 | 68,5 |
| Anticuerpos anti-VIH (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| Positivo | 42,7 | 40,6 | 42,8 | 36,9 | 37,4 | 40,7 | 41,1 | 34,4 | 39,2 | 37,8 | 31,5 | 27,2 | 26,2 | 21,4 |
| Negativo | 57,3 | 59,4 | 57,2 | 63,1 | 62,6 | 59,3 | 58,9 | 65,6 | 60,8 | 62,2 | 68,5 | 72,8 | 73,8 | 78,6 |


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.Registro Específico de Mortalidad.

2.3.4.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España*, 1983-2016.



| | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opioides | 98,0 | 98,8 | 93,9 | 100,0 | 92,4 | 96,6 | 94,8 | 96,0 | 93,1 | 94,9 | 92,8 | 92,9 | 93,4 | 90,4 | 89,8 | 90,1 | 88,0 |
| Cocaína | 2,0 | 12,5 | 11,0 | 11,5 | 19,3 | 18,4 | 29,6 | 24,8 | 21,6 | 26,0 | 30,9 | 28,8 | 24,7 | 32,7 | 41,4 | 51,2 | 63,3 |
| Hipnosedantes | 13,7 | 22,5 | 41,5 | 46,0 | 33,8 | 40,2 | 43,8 | 47,4 | 37,2 | 37,9 | 37,4 | 48,4 | 54,8 | 47,7 | 58,6 | 47,4 | 48,8 |
| Anfetaminas | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 4,0 | 8,6 | 2,8 | 4,5 |
| Cannabis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 12,2 | 11,3 | 14,3 |
| MDMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,8 |
| Alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 | 28,6 | 26,2 | 30,5 |
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Opioides | 89,4 | 86,8 | 83,8 | 76,7 | 74,9 | 78,2 | 78,7 | 72,8 | 77,7 | 79,8 | 79,1 | 77,9 | 76,6 | 77,3 | 64,0 | 64,7 | 63,9 |
| Cocaína | 54,4 | 51,7 | 54,2 | 62,2 | 60,1 | 69,2 | 60,0 | 67,0 | 60,2 | 59,1 | 57,3 | 52,2 | 58,6 | 54,1 | 51,7 | 48,8 | 53,7 |
| Hipnosedantes | 58,5 | 55,2 | 54,0 | 48,0 | 48,7 | 54,1 | 50,7 | 46,9 | 45,1 | 42,2 | 58,4 | 65,0 | 63,2 | 62,8 | 65,8 | 68,0 | 67,3 |
| Anfetaminas | 6,9 | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 2,2 | 3,5 | 1,5 | 4,7 | 3,8 | 6,2 | 7,9 | 4,4 | 6,2 |
| Cannabis | 15,2 | 18,7 | 20,0 | 16,7 | 16,7 | 20,9 | 16,8 | 14,6 | 15,6 | 22,8 | 23,8 | 24,5 | 22,4 | 21,6 | 16,5 | 23,4 | 23,4 |
| MDMA | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 3,5 | 2,3 | 2,8 |
| Alcohol | 35,5 | 35,3 | 42,5 | 39 | 35,8 | 33,0 | 34,3 | 27,8 | 25,9 | 28,8 | 28,8 | 33,3 | 28,9 | 31,2 | 40,8 | 39,8 | 42,9 |

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador y los casos en los que se ha detectado alguna sustancia.

** El alcohol sólo se registra cuando aparece junto a otra sustancia.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.5.

Número de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancias/metabolitos detectados en el análisis toxicológico. España*, 2004-2016.

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opioides | 349 | 356 | 338 | 340 | 324 | 346 | 409 | 318 | 366 | 337 | 333 | 335 | 320 |
| Cocaína | 280 | 315 | 250 | 313 | 251 | 247 | 297 | 213 | 280 | 236 | 269 | 253 | 269 |
| Hipnosedantes | 227 | 246 | 217 | 223 | 191 | 180 | 302 | 265 | 302 | 273 | 342 | 352 | 337 |
| Anfetaminas | 12 | 12 | 15 | 17 | 9 | 13 | 8 | 19 | 18 | 27 | 41 | 23 | 31 |
| Cannabis | 78 | 95 | 70 | 68 | 65 | 88 | 123 | 100 | 107 | 94 | 86 | 121 | 117 |
| MDMA | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 18 | 9 | 12 | 14 |
| Alcohol | 167 | 150 | 143 | 130 | 108 | 120 | 149 | 136 | 138 | 136 | 212 | 206 | 215 |
| Nº de defunciones con información toxicológica | 466 | 455 | 428 | 475 | 424 | 427 | 517 | 408 | 478 | 437 | 520 | 518 | 501 |
| Número total de fallecidos | 468 | 455 | 428 | 475 | 424 | 438 | 517 | 453 | 519 | 489 | 556 | 600 | 613 |


* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador.

En 2011, 45 casos de Galicia sin información.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.6.

Número de fallecidos en los que se detecta la metadona (independientemente de otras sustancias), metadona y no otro opioide y no otro opioide y metadona sola. España*, 2005-2016.




| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Metadona | 162 | 167 | 177 | 146 | 161 | 243 | 203 | 250 | 209 | 192 | 168 | 182 |
| Metadona y no otro opioide | 69 | 91 | 108 | 105 | 90 | 141 | 145 | 175 | 131 | 118 | 85 | 96 |
| Sólo metadona | 3 | 8 | 18 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.7.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detecta cocaína (cocaína y no opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España*, 1985-2016.



| | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2002 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cocaína y no opioides** | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1 | 0,6 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | 5,5 | 8,8 | 6,1 | 11,3 |
| Sólo cocaína*** | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 2,3 | 2,4 | 4,1 | 2,9 | 2,6 |
| Cocaína y alcohol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cocaína y no opioides** | 16,4 | 20,4 | 18,5 | 25,1 | 18,9 | 16,4 | 18,0 | 17,2 | 19,0 | 19,7 | 17,7 | 18,0 | 20,0 |
| Sólo cocaína*** | 7,5 | 5,9 | 4,7 | 7,8 | 6,4 | 5,4 | 5,8 | 3,4 | 6,7 | 7,6 | 4,6 | 4,4 | 3,2 |
| Cocaína y alcohol | - | 4,1 | 3,5 | 2,9 | 4 | 4,7 | 2,1 | 4,6 | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 5,4 | 3,3 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.


** Cocaína y no opioides (independientemente de otras sustancias, incluye sólo cocaína).

*** Sólo cocaína (sin ninguna otra sustancia).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.8.

Distribución de los fallecidos en los que se detecta cocaína en función de otras sustancias detectadas. España, 2016.




* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.9.

Evolución del porcentaje de fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas en los que se detectan opioides (opioides y no cocaína, sólo opioides, opioides y cocaína). España*, 1984-2016.




| | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Opioides y no cocaína** | 49,6 | 49,7 | 49,2 | 47,0 | 42,4 | 35,2 | 46,6 | 31,3 | 35,4 | 44,0 | 55,8 | 59,8 | 55,1 | 45,4 | 41,7 | 31,5 | 40,3 |
| Sólo opioides*** | 28,1 | 25,2 | 20,2 | 23,9 | 20,8 | 14,1 | 20,6 | 11,5 | 14,2 | 18,1 | 13,1 | 9,0 | 17,7 | 12,6 | 10,8 | 7,6 | 9,2 |
| Opioides y cocaína*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Opioides y no cocaína** | 41,7 | 40,5 | 30,8 | 29,7 | 29,7 | 36,8 | 30,7 | 34,3 | 37,8 | 39,8 | 42,9 | 37,9 | 42,8 | 30,0 | 33,8 | 32,1 | |
| Sólo opioides*** | 8,7 | 7,1 | 5,9 | 6,4 | 4,0 | 4,7 | 7,8 | 7,3 | 8,2 | 6,4 | 4,2 | 2,7 | 4,6 | 3,1 | 1,7 | 2,0 | |
| Opioides y cocaína*** | - | - | - | - | 48,8 | 40,0 | 40,8 | 40,3 | 41,5 | 39,5 | 35,0 | 39,5 | 34,3 | 34,0 | 30,9 | 32,3 | |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.
 ** Opioides y no cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides).
 *** Sólo opioides (ninguna otra sustancia).
 **** Opioides y cocaína (independientemente de otras sustancias, incluye sólo opioides y cocaína).

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.10.

Distribución de los fallecidos en los que se detectan opioides en función de otras sustancias detectadas. España*, 2016.



* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.
 FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.11.

Evolución del porcentaje de fallecidos en los que se detecta metadona (sólo metadona, y metadona y no otro opioide —aunque haya otras sustancias—). España*, 1996-2016.


| | Sólo metadona | Metadona | Metadona y no otro opioide | Sólo metadona y benzodiazepinas |
|------|---------------|----------|----------------------------|---------------------------------|
| 1996 | 1,5 | - | - | - |
| 1997 | 0,9 | - | - | - |
| 1998 | 0,9 | - | - | - |
| 1999 | 0,4 | - | - | - |
| 2000 | 1,2 | - | - | - |
| 2001 | 2,7 | - | - | - |
| 2002 | 1,8 | - | - | - |
| 2003 | 0,6 | - | - | - |
| 2004 | 0,4 | - | - | - |
| 2005 | 0,6 | 36,5 | 15,1 | 3,0 |
| 2006 | 2,8 | 39,8 | 27,4 | 3,3 |
| 2007 | 4,2 | 37,5 | 24,4 | 4,8 |
| 2008 | 2,4 | 30,0 | 20,6 | 4,2 |
| 2009 | 2,6 | 32,4 | 21,9 | 3,2 |
| 2010 | 2,7 | 47,4 | 30,7 | 4,6 |
| 2011 | 2,2 | 49,7 | 34,6 | 5,9 |
| 2012 | 1,1 | 52,2 | 40,2 | 5,9 |
| 2013 | 2,1 | 47,8 | 34,8 | 4,6 |
| 2014 | 1,5 | 36,9 | 20,0 | 2,1 |
| 2015 | 0,6 | 32,4 | 16,4 | 1,9 |
| 2016 | 1,0 | 36,3 | 19,2 | 3,4 |

* Se incluyen datos de todas las áreas geográficas monitorizadas por el indicador. Casos con información en sustancias detectadas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.12.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo. España, 1999-2016.




| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hombres | 657 | 610 | 558 | 564 | 552 | 568 | 539 | 417 | 462 | 470 | 366 | 330 | 291 | 324 | 333 | 376 | 321 | 403 |
| Mujeres | 95 | 81 | 92 | 88 | 81 | 91 | 97 | 72 | 57 | 70 | 76 | 63 | 70 | 59 | 70 | 79 | 69 | 80 |
| Total | 752 | 691 | 650 | 652 | 633 | 659 | 636 | 489 | 519 | 540 | 442 | 393 | 361 | 383 | 403 | 455 | 390 | 483 |

Datos del Registro General de Mortalidad. Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) a partir de datos del Registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.13.

Evolución del número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según edad. España, 1999-2016.



| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <35 años | 505 | 429 | 391 | 349 | 310 | 285 | 262 | 200 | 192 | 193 | 141 | 108 | 101 | 104 | 93 | 76 | 80 | 99 |
| ≥35 años | 247 | 262 | 259 | 303 | 323 | 374 | 374 | 289 | 327 | 347 | 301 | 285 | 260 | 279 | 310 | 379 | 310 | 384 |
| Total | 752 | 691 | 650 | 652 | 633 | 659 | 636 | 489 | 519 | 540 | 442 | 393 | 361 | 383 | 403 | 455 | 390 | 483 |

* Códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto de Estadística.

2.3.14.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de hipnosedantes. España*, 2015-2016.

| Sustancia detectada | Nº de casos** 2015 | Nº de casos** 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| Sólo hipnosedantes | 11 | 3 |
| Hipnosedantes y cocaína (independientemente de otras sustancias) | 133 | 152 |
| Hipnosedantes y opioides (independientemente de otras sustancias) | 249 | 230 |
| Hipnosedantes y alcohol (independiente de otras sustancias) | 120 | 137 |
| Sólo hipnosedantes y alcohol | 17 | 9 |
| Sólo hipnosedantes y opioides | 37 | 30 |
| Sólo hipnosedantes y cocaína | 7 | 11 |

* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

** La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por hipnosedantes, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.15.

Distribución de combinaciones de sustancias entre los fallecidos en los que se detecta la presencia de cannabis. España* 2015-2016.

| Sustancia detectada | 2015** | 2016** |
|--|--------|--------|
| Sólo cannabis y opioides | 5 | 5 |
| Sólo cannabis y cocaína | 2 | 4 |
| Sólo cannabis | 2 | 1 |
| Cannabis y opioides (independiente de otras sustancias) | 88 | 87 |
| Cannabis y cocaína (independiente de otras sustancias) | 55 | 68 |
| Cannabis y alcohol (independiente de otras sustancias) | 50 | 42 |
| Cannabis e hipnosedantes (independiente de otras sustancias) | 86 | 82 |


* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

** La suma de casos puede ser superior al número total de fallecidos por cannabis, porque algunas de las opciones no son excluyentes.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.16.

Número de fallecidos en las 6 ciudades españolas (casos con información toxicológica, fallecidos con y sin presencia de opioides). 2005-2016.



| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Con opioides* | 182 | 170 | 136 | 104 | 140 | 143 | 148 | 152 | 141 | 105 | 94 | 105 |
| Sin opioides* | 55 | 48 | 52 | 35 | 41 | 39 | 33 | 43 | 51 | 60 | 65 | 53 |
| Casos con información | 237 | 218 | 188 | 139 | 181 | 182 | 181 | 195 | 192 | 165 | 159 | 158 |
| Total | 237 | 218 | 188 | 139 | 181 | 182 | 181 | 195 | 196 | 172 | 171 | 194 |

* Independientemente de la aparición o no de otras sustancias.

Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.17.

Evolución de las edades de los fallecidos en 6 ciudades españolas*. España, 2005-2016.


| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <15 años | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-19 años | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20-24 años | 17 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 25-29 años | 31 | 25 | 24 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 17 | 9 | 6 | 12 |
| 30-34 años | 40 | 42 | 30 | 22 | 35 | 21 | 14 | 21 | 24 | 23 | 10 | 14 |
| 35-39 años | 66 | 43 | 32 | 23 | 26 | 48 | 40 | 29 | 32 | 20 | 35 | 29 |
| 40-44 años | 52 | 44 | 39 | 23 | 49 | 39 | 41 | 45 | 31 | 28 | 27 | 40 |
| 45-49 años | 19 | 27 | 23 | 26 | 35 | 39 | 34 | 37 | 42 | 38 | 24 | 29 |
| 50-54 años | 5 | 13 | 6 | 15 | 12 | 13 | 18 | 30 | 30 | 32 | 39 | 29 |
| 55-59 años | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 13 | 17 | 20 |
| 60-64 años | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| ≥65 años | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desconocida | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total fallecidos | 237 | 218 | 188 | 139 | 181 | 182 | 181 | 195 | 196 | 172 | 171 | 194 |

* Registro Específico de Mortalidad: 6 ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

FUENTE: OEDA. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas. Registro Específico de Mortalidad.

2.3.18.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales (estimación nacional). España, 1983-2016.



| Número de defunciones | | Número de defunciones | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 1983 | 266 | 2000 | 1.012 |
| 1984 | 440 | 2001 | 923 |
| 1985 | 453 | 2002 | 1.079 |
| 1986 | 516 | 2003 | 900 |
| 1987 | 741 | 2004 | 796 |
| 1988 | 1.067 | 2005 | 1.004 |
| 1989 | 1.440 | 2006 | 820 |
| 1990 | 1.440 | 2007 | 703 |
| 1991 | 1.833 | 2008 | 773 |
| 1992 | 1.760 | 2009 | 739 |
| 1993 | 1.399 | 2010 | 706 |
| 1994 | 1.067 | 2011 | 736 |
| 1995 | 1.051 | 2012 | 707 |
| 1996 | 1.310 | 2013 | 727 |
| 1997 | 1.127 | 2014 | 767 |
| 1998 | 1.049 | 2015 | 936 |
| 1999 | 972 | 2016 | 866 |

FUENTE: Estimación del Observatorio Español de la Droga y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

2.3.19.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, en base a diferentes fuentes de información. España, 2000-2016.

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Estimación nacional | 1.012 | 923 | 1.079 | 900 | 796 | 1.004 | 820 | 703 | 773 | 739 | 706 | 736 | 707 | 727 | 767 | 936 | 866 |
| Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican) | 444 | 496 | 496 | 493 | 468 | 455 | 428 | 475 | 424 | 438 | 517 | 408 | 519 | 489 | 556 | 600 | 613 |
| Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas) | 284 | 268 | 229 | 270 | 212 | 242 | 218 | 188 | 139 | 181 | 182 | 181 | 195 | 196 | 172 | 171 | 194 |
| Registro General de Mortalidad (INE) | 691 | 650 | 652 | 633 | 659 | 636 | 489 | 519 | 540 | 442 | 393 | 361 | 383 | 403 | 455 | 390 | 483 |

Estimación nacional: Estimación del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDA y del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Registro Específico de Mortalidad (CCAA que notifican): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro Específico de Mortalidad (6 ciudades españolas): Incluye las defunciones notificadas al Registro Específico de Mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de 6 ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro General de Mortalidad (INE - Instituto Nacional de Estadística): Se incluyen los códigos CIE-10: F11, F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

Información complementaria

Páginas web de interés

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

<http://www.mscbs.gob.es/>

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

<http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

Encuesta Nacional de Salud

<https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/home.htm>

MINISTERIO DEL INTERIOR

<http://www.interior.gob.es/>

Dirección General de Tráfico

<http://www.dgt.es/es/>

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx>

Comisionado para el Mercado de Tabacos

<http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/paginas/Default.aspx>

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

<http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/>

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

<http://www.isciii.es/>

OFICINAS DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD)

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC)

<https://www.unodc.org/>

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

<http://www.who.int/es/>

Abuso de sustancias psicoactivas. Management of Substance Abuse

http://www.who.int/substance_abuse/en/

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES (JIFE)
INTERNATIONAL NARCOTICS CONTROL BOARD (INCB)

<https://www.incb.org/incb/en/about.html>

OBSERVATORIO EUROPEO DE LAS DROGAS Y LAS TOXICOMANÍAS
EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUGS ADDICTION (EMCDDA)

<http://www.emcdda.europa.eu/>

ENCUESTA ESCOLAR EUROPEA SOBRE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (ESPAD)
THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (ESPAD)

<http://www.espad.org/>

REDUCING ALCOHOL RELATED HARMS (RARHA)

<http://www.rarha.eu/>

CONDUCTAS DE SALUD EN NIÑOS (HBSC)
HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC)

<http://www.hbsc.org/>

COMISIÓN EUROPEA. EUROBARÓMETRO EUROPEAN COMMISSION. EUROBAROMETER

<http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm>