



Problemas  
relacionados con  
las drogas

# ÍNDICE

## 2. Problemas relacionados con las drogas 118

### 2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2013 . . . . 119

#### Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2013

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2013 . . . . .	119
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2013 .	120
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2013 .	121
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2013	122
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2013 . . . . .	123
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2013 . . . . .	124
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2013	125
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2013 .	126
2.1.9.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoacti- vas (total tratados). España, 1996-2013 . . . . .	127
2.1.10.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoacti- vas (tratados por primera vez). España, 1996-2013 . . . . .	128
2.1.11.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2013 . . . . .	129
2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2013 . . . . .	130
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2013 . . . . .	131
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2013 . . . . .	132
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013 . . . . .	133
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013 . . . . .	134
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013 . . . . .	135

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013	136
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2013	137
2.1.20.	Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión a tratamiento). España, 2005-2013	138
2.1.21.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2013	139
2.1.22.	Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2013	140

#### **Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2012-2013**

---


2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2012	141
2.1.24.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2013	141
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2012	142
2.1.26.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2012	143
2.1.27.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2013	144
2.1.28.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2013	145
2.1.29.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012	146
2.1.30.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013	146
2.1.31.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012	147
2.1.32.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013	149
2.1.33.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2012	151
2.1.34.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2013	151
2.1.35.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012	152
2.1.36.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013	154
2.1.37.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2012	156

2.1.38.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2013 . . . . .	158
2.1.39.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2012 . . .	161
2.1.40.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2013 .	162
2.1.41.	Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: estado serológico y vía de consumo según droga principal. España, 2013 . . . . .	163
2.1.42.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2013 . . . . .	164
2.1.43.	Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (número y %). España, 2005-2013 . . . . .	164
2.1.44.	Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, total y según sexo. 1996-2013 . . . . .	165
2.1.45.	Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, según edad. 1996-2013 . . . . .	165

## 2.1. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2013

### 2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2013.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.2.

### Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	-
1992	20.017	15.956	-
1993	18.977	16.703	-
1994	18.770	17.526	-
1995	17.878	20.369	-
1996	16.647	28.382	-
1997	12.993	30.173	-
1998	11.867	30.756	-
1999	10.473	26.031	-
2000	8.151	26.412	-
2001	7.461	24.844	-
2002	5.051	21.162	-
2003	4.337	17.867	23.225
2004	3.836	15.617	20.532
2005	3.604	14.005	18.653
2006	3.318	14.502	18.803
2007	3.672	14.331	18.904
2008	3.840	13.616	17.456
2009	3.412	12.750	16.989
2010	4.526	12.166	17.325
2011	2.951	10.391	13.898
2012	2.555	9.302	12.238
2013	2.572	8.940	11.756

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.3.

#### Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. España, 1991-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-
1992	932	367	-
1993	1.146	431	-
1994	1.265	491	-
1995	1.415	516	-
1996	1.892	932	-
1997	3.129	1.402	-
1998	4.174	1.838	-
1999	6.126	2.576	-
2000	5.499	2.773	-
2001	5.977	3.046	-
2002	7.125	3.893	11.904
2003	11.851	5.893	18.359
2004	14.126	6.747	21.646
2005	15.258	7.562	23.746
2006	13.463	8.036	22.242
2007	13.429	8.753	23.037
2008	12.847	10.786	24.680
2009	12.142	9.107	23.132
2010	12.130	9.095	22.087
2011	10.637	8.889	20.335
2012	10.142	8.855	19.497
2013	10.734	8.726	19.848

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2013.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	-
1997	1.768	387	-
1998	2.412	407	-
1999	2.335	418	-
2000	2.487	408	-
2001	2.966	540	-
2002	3.972	665	4.772
2003	4.613	871	5.711
2004	5.319	928	6.500
2005	4.426	844	5.524
2006	4.125	941	5.304
2007	4.619	1.114	5.936
2008	5.058	2.055	7.419
2009	7.273	1.705	9.503
2010	8.639	2.101	11.192
2011	9.736	2.603	12.873
2012	10.982	3.402	14.869
2013	12.912	3.585	16.914


Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



### 2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	-
1997	144	111	-
1998	197	143	-
1999	165	147	-
2000	214	154	-
2001	299	170	-
2002	350	242	-
2003	382	225	-
2004	441	224	693
2005	383	209	618
2006	466	223	717
2007	503	261	795
2008	463	352	845
2009	598	312	963
2010	580	323	944
2011	709	386	1.143
2012	648	421	1.083
2013	787	374	1.175

Nota: El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2013.




	Anfetaminas	Éxtasis	Alucinógenos
1996	319	226	74
1997	323	237	85
1998	347	154	62
1999	339	135	50
2000	288	240	64
2001	255	335	83
2002	342	452	68
2003	266	254	63
2004	330	236	44
2005	386	229	39
2006	426	165	37
2007	415	172	43
2008	400	155	43
2009	461	127	69
2010	501	93	66
2011	595	102	83
2012	512	134	107
2013	671	201	120

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2013.




	Admisión a tratamiento (droga principal)	Admisión a tratamiento (droga secundaria)
2005	8	50
2006	10	59
2007	22	107
2008	20	112
2009	43	130
2010	46	132
2011	54	157
2012	66	164
2013	70	141

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.8.

#### Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2013.




	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652

Notas: En 2008 se inició el registro de las admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol en todas las CCAA (hasta el 2007 eran datos parciales de algunas CCAA). El sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de desconocidos. En 2008 y 2009 algunas CCAA no recogían información desagregada por primer tratamiento/tratamiento previo en las admisiones por abuso o dependencia de alcohol.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total tratados). España, 1996-2013.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237

Notas: Las estimaciones del número de inyectores admitidos a tratamiento para el conjunto de España se han obtenido multiplicando el número de admitidos a tratamiento en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses previos a la admisión (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.10.

Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (tratados por primera vez). España, 1996-2013.




	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530

Notas: Las estimaciones del número de inyectores admitidos a tratamiento para el conjunto de España se han obtenido multiplicando el número de admitidos a tratamiento en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas alguna vez en la vida o en los últimos 12 meses previos a la admisión (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,0	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



### 2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,6	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,8
2011	33,9	20,7
2012	34,4	20,7
2013	35,0	20,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2013.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	34,0	21,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por heroína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del período considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por heroína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por cocaína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2013.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2

Notas: El sumatorio puede no coincidir debido a la existencia de otras vías de administración no mostradas en el gráfico. Las estimaciones del número de tratados por heroína para el conjunto de España, según vía principal de administración, se han obtenido multiplicando el número de tratados por cocaína en el conjunto de España por la proporción de admitidos a tratamiento de cada vía de administración (proporción que no estaba disponible para todas las comunidades en algunos años del periodo considerado).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.19.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2013.



2.1.20.

Porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión a tratamiento). España, 2005-2013.



	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Opiáceos	Estimulantes	Alucinógenos
2005	57,4	42,7	8,9	10,9	5,9	0,6
2006	58,7	44,1	9	11,8	5,2	0,9
2007	58	43,3	8,5	12,3	4,6	0,8
2008	66,1	49,1	10,6	11,8	4,3	1,2
2009	61,5	50,9	9,8	5,9	3,9	0,9
2010	63,4	52	9,9	6,6	4,3	1,3
2011	63,7	51,6	9,3	6,5	4,9	1,5
2012	62,1	52,9	10,1	7,1	4,6	1,2
2013	60,8	53,5	9,1	6,7	4,8	1,2


El 74,2% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo ha consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 25,8% restante (n = 7.388) que ha consumido alcohol y otras drogas (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



### 2.1.21.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según sexo. España, 1996-2013.




	Hombre	Mujer	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2002	30,9	38,9	32,0
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores (últimos 12 meses) admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012 y 26,4% en 2013.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.22.

Prevalencia (%) de VIH entre los admitidos a tratamiento que se habían inyectado drogas en los últimos 12 meses y conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2013.



	< 25 años	25-34 años	> 34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34,0	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32,0	44,0
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14,0	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38,0
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores (últimos 12 meses) admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012 y 26,4% en 2013.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.23.

Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2012.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	19.497	25,0
Cocaína polvo	18.746	24,1
Cocaína base	744	1,0
Opioides	13.333	17,1
Heroína	12.238	15,7
Metadona (mal uso)	563	0,7
Otros opioides	532	0,7
Cannabis	14.869	19,1
Hipnosedantes	1.083	1,4
Estimulantes	678	0,9
Anfetaminas	512	0,7
Éxtasis y derivados	134	0,2
Otros estimulantes	32	0,0
Alucinógenos	107	0,1
Inhalantes volátiles	38	0,0
Otras drogas ilegales	73	0,1
Alcohol	28.234	36,2
Total drogas ilegales	49.678	63,8
Total drogas ilegales y alcohol	77.912	100,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.24.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2013.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	19.848	24,6
Cocaína polvo	19.046	23,6
Cocaína base	794	1,0
Opioides	12.863	16,0
Heroína	11.756	14,6
Metadona (mal uso)	492	0,6
Otros opioides	615	0,8
Cannabis	16.914	21,0
Hipnosedantes	1.175	1,5
Estimulantes	923	1,1
Anfetaminas	671	0,8
Éxtasis y derivados	201	0,2
Otros estimulantes	51	0,1
Alucinógenos	120	0,1
Inhalantes volátiles	26	0,0
Otras drogas ilegales	77	0,1
Alcohol	28.652	35,5
Total drogas ilegales	51.946	64,5
Total drogas ilegales y alcohol	80.598	100,0

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2012.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	17,2	7,2	0,6	18,2
Cocaína	25,0	25,3	2,3	21,9
Cannabis	19,1	27,4	91,2	18,2
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	0,9	1,1	0,3	0,8
Alcohol	36,2	37,0	3,8	39,6
Número de admisiones	77.912	40.025	2.345	7.096

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2012.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	26,8	11,4	0,6	26,4
Cocaína	39,2	40,2	2,4	37,0
Cannabis	29,9	43,6	94,9	33,1
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,4	1,7	0,4	0,8
Número de admisiones	49.678	25.209	2.255	4.489

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.27.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). Incluye alcohol. España, 2013.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	16,0	7,1	0,5	14,6
Cocaína	24,6	24,8	2,7	20,9
Cannabis	21,0	29,8	92,8	21,3
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,1	1,4	0,4	0,5
Alcohol	35,5	34,9	2,3	41,2
Número de admisiones	80.598	43.360	2.389	7.215

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.28.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). No incluye alcohol. España, 2013.




	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores de 18 años	Nacidos fuera de España
Opioides	24,8	10,9	0,5	24,8
Cocaína	38,2	38,0	2,8	35,5
Cannabis	32,6	45,7	95,0	36,2
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,8	2,1	0,4	0,9
Número de admisiones	51.946	28.239	2.334	4.239

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en este gráfico sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.


2.1.29.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2012.



2.1.30.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2013.





## 2.1.31.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	49.678	23.024	25.209	41.697	7.750
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	52,3	-	-	52,0	54,1
Edad media (años)	33,4	36,9	30,2	33,3	34,0
Mujeres (%)	15,7	15,1	16,2	-	-
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	1,1	0,9	1,1	1,0
Enseñanza primaria	46,7	47,7	45,8	47,5	41,7
Enseñanzas secundarias	47,3	46,6	47,8	46,9	49,6
Estudios universitarios	4,5	4,0	4,9	4,0	7,2
Otros	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	26,3	24,4	27,9	27,1	22,5
Parado no habiendo trabajado	7,2	6,7	7,7	6,9	8,6
Parado habiendo trabajado	46,1	50,6	42,3	46,4	44,2
Otras	20,4	18,3	22,1	19,6	24,6
Nacidos fuera de España (%)	9,3	7,6	10,7	9,2	9,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	7,1	12,7	2,4	6,6	10,0
Médicos generales, atención primaria de salud	10,7	7,3	13,5	10,5	12,3
Hospitales u otros servicios de salud	5,6	4,6	6,5	5,1	8,4
Servicios sociales	3,4	2,7	3,9	2,7	6,9
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	7,1	9,1	5,6	7,6	4,4
Servicios legales o policiales	12,0	7,9	14,8	12,9	7,2
Empresas o empleadores	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiares o amigos/as	13,5	8,7	17,8	13,8	12,4
Iniciativa propia	37,7	44,5	32,5	38,1	35,6
Otras	2,7	2,4	2,8	2,6	2,8
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	11,9	14,1	9,8	12,1	10,8
Únicamente con pareja	9,9	10,5	9,5	9,2	14,0
Únicamente con hijos	6,4	5,9	6,4	5,4	12,1
Con pareja e hijos/as	15,2	15,0	15,5	15,2	15,0
Con padres o familia de origen	42,1	36,8	47,3	43,7	33,6
Con amigos	2,7	2,9	2,6	2,5	4,0
Otros	11,8	14,8	9,0	12,1	10,6
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	86,6	82,5	90,8	86,2	89,2
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	6,8	8,3	5,3	7,4	3,2
Otras instituciones	1,9	2,7	1,2	1,8	2,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,4	0,5	0,6
Alojamientos inestables/precarios	2,2	3,2	1,2	2,1	2,5
Otros lugares	1,9	2,5	1,2	1,9	2,0

## 2.1.31. (continuación)

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	26,8	43,7	11,4	26,5	28,6
Heroína	24,6	40,4	10,1	24,5	25,4
Metadona	1,1	1,8	0,6	1,0	1,7
Otros Opioides	1,1	1,5	0,6	1,0	1,5
Cocaína	39,2	38,5	40,2	40,0	35,5
Cocaína CLH	37,8	36,7	38,9	38,5	33,9
Cocaína base	1,5	1,8	1,3	1,5	1,6
Otros estimulantes	1,4	1,0	1,7	1,3	1,7
Anfetaminas	1,0	0,8	1,2	1,0	1,4
Éxtasis y derivados	0,3	0,1	0,4	0,3	0,2
Otros estimulantes	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Hipnosedantes	2,2	1,8	2,6	1,6	5,5
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepinas	1,9	1,6	2,3	1,4	4,8
Otros hipnosedantes	0,2	0,2	0,2	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros alucinógenos	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Cannabis	29,9	14,8	43,6	30,3	28,0
Otras sustancias	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,4	19,7	19,1	19,1	21,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	44,2	40,1	47,5	43,6	47,8
4-6 días/semana	6,6	5,8	7,3	6,7	5,9
2-3 días/semana	13,1	11,0	14,8	13,4	11,3
1 día/semana	5,4	5,1	5,7	5,5	4,9
Menos de 1 día/semana	7,4	8,1	6,9	7,5	6,6
No consumió	23,2	30,0	17,8	23,2	23,5
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	5,8	5,7	6,0	5,0	10,5
Pulmonar	53,1	50,5	55,2	53,3	51,6
Intranasal	34,8	33,0	36,5	35,4	31,6
Parenteral	5,4	9,7	1,6	5,5	5,4
Otras	0,9	1,1	0,7	0,9	1,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	15,3	26,4	5,5	15,2	15,7
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	5,2	8,7	2,1	5,1	5,4
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	5,3	9,3	1,6	4,9	7,3
Negativo (análisis últimos 6 meses)	20,6	24,7	17,1	20,5	21,5
Negativo (sin fecha de análisis)	20,5	26,6	15,6	20,5	20,6
Sin análisis o resultado desconocido	53,6	39,3	65,8	54,1	50,6

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.32.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013.

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Nº de casos	51.946	22.577	28.239	43.487	8.159
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,6	-	-	44,9	41,7
Edad media (años)	33,6	37,3	30,7	33,5	34,1
Mujeres (%)	15,8	14,8	16,5	-	-
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
Enseñanza primaria	46,0	47,2	45,2	46,8	41,5
Enseñanzas secundarias	48,0	47,2	48,5	47,7	49,8
Estudios universitarios	4,5	4,0	4,8	4,0	7,1
Otros	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	25,7	24,0	27,1	26,5	22,0
Parado no habiendo trabajado	7,3	6,6	7,8	7,1	8,1
Parado habiendo trabajado	41,4	45,2	38,7	41,9	38,5
Otras	25,6	24,2	26,4	24,5	31,3
Nacidos fuera de España (%)	8,3	7,1	9,2	8,3	8,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	11,2	17,5	6,4	10,8	13,7
Médicos generales, atención primaria de salud	9,4	6,2	11,8	9,1	10,9
Hospitales u otros servicios de salud	5,7	6,3	5,3	5,2	8,8
Servicios sociales	4,4	3,2	5,3	3,9	7,6
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	9,1	11,1	7,6	9,5	7,2
Servicios legales o policiales	11,6	6,9	15,0	12,4	7,6
Empresas o empleadores	1,5	1,7	1,3	1,6	1,0
Familiares o amigos/as	12,1	7,3	15,8	12,3	11,1
Iniciativa propia	32,9	38,2	29,2	33,4	30,1
Otras	1,9	1,6	2,2	1,9	1,9
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	11,7	14,1	9,9	12,0	10,7
Únicamente con pareja	9,6	10,4	9,0	8,8	14,3
Únicamente con hijos	5,4	5,3	5,4	4,4	10,7
Con pareja e hijos/as	15,8	15,3	16,4	15,8	16,3
Con padres o familia de origen	43,7	37,6	48,7	45,5	34,0
Con amigos	2,6	2,8	2,4	2,5	3,3
Otros	11,0	14,5	8,2	11,1	10,7
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	88,7	84,1	92,7	88,5	90,3
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	4,9	6,8	3,3	5,3	2,4
Otras instituciones	1,8	2,7	1,1	1,8	2,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,2	3,2	1,4	2,2	2,6
Otros lugares	1,8	2,5	1,2	1,8	2,0

## 2.1.32. (continuación)

	Total	Tratamiento previo		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	24,8	42,1	10,9	24,7	24,9
Heroína	22,6	39,6	9,1	22,8	21,5
Metadona	0,9	1,1	0,8	0,9	1,3
Otros Opioides	1,2	1,4	1,0	1,0	2,1
Cocaína	38,2	38,6	38,0	39,0	34,1
Cocaína CLH	36,7	37,3	36,3	37,4	32,8
Cocaína base	1,5	1,4	1,7	1,6	1,3
Otros estimulantes	1,8	1,3	2,1	1,7	2,1
Anfetaminas	1,3	1,2	1,4	1,3	1,5
Éxtasis y derivados	0,4	0,1	0,6	0,4	0,5
Otros estimulantes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Hipnosedantes	2,3	1,7	2,8	1,5	6,1
Barbitúricos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benzodiazepinas	2,0	1,5	2,5	1,4	5,3
Otros hipnosedantes	0,2	0,1	0,3	0,1	0,7
Alucinógenos	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
LSD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros alucinógenos	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Inhalables volátiles	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Cannabis	32,6	15,9	45,7	32,6	32,1
Otras sustancias	0,1	0,1	0,2	0,1	0,4
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,4	19,7	19,0	19,0	21,1
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,7	42,9	49,3	46,0	50,0
4-6 días/semana	7,1	6,2	7,7	7,4	5,6
2-3 días/semana	13,1	11,0	14,7	13,3	11,9
1 día/semana	5,5	4,9	5,9	5,5	5,2
Menos de 1 día/semana	6,9	7,3	6,7	7,0	6,2
No consumió	20,8	27,6	15,8	20,8	21,1
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	6,1	5,1	6,9	5,1	11,3
Pulmonar	54,7	51,5	57,1	55,0	53,0
Intranasal	33,4	33,2	33,8	34,1	30,1
Parenteral	4,8	8,8	1,5	4,8	4,5
Otras	1,0	1,4	0,7	1,0	1,2
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	13,5	24,3	5,2	13,8	12,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	4,3	7,4	1,9	4,4	3,9
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	4,4	8,1	1,4	4,3	5,2
Negativo (análisis últimos 6 meses)	19,0	23,6	15,4	18,9	20,1
Negativo (sin fecha de análisis)	20,4	27,5	15,2	20,6	19,3
Sin análisis o resultado desconocido	56,1	40,7	68,0	56,2	55,3

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.33.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2012.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	20.546	72,8
Han consumido alcohol y otras drogas	7.688	27,2
Alcohol y 1 droga	5.254	18,6
Alcohol y 2 drogas	1.897	6,7
Alcohol y 3 o más drogas	537	1,9

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.34.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido (30 días previos a la admisión a tratamiento) sólo alcohol o alcohol más otras drogas. España, 2013.

Admitidos a tratamiento por alcohol	Número absoluto	Porcentaje
Han consumido sólo alcohol	21.264	74,2
Han consumido alcohol y otras drogas	7.388	25,8
Alcohol y 1 droga	5.134	17,9
Alcohol y 2 drogas	1.781	6,2
Alcohol y 3 o más drogas	473	1,7

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.35.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2012.

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	28.234	12.714	14.816	22.257	5.815
Tratados por primera vez por alcohol (%)	53,8	–	–	53,7	54,2
Edad media (años)	44,3	45,0	43,7	44,2	44,7
Mujeres (%)	20,7	20,5	20,9	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	0,8	1,1	1,0	0,8
Enseñanza primaria	44,8	45,0	44,6	46,8	36,6
Enseñanzas secundarias	45,3	45,7	44,8	44,6	48,1
Estudios universitarios	7,9	7,4	8,4	6,7	12,7
Otros	1,0	1,1	1,0	0,9	1,8
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	33,9	30,9	36,5	35,0	30,2
Parado no habiendo trabajado	2,9	2,8	3,0	2,6	4,0
Parado habiendo trabajado	43,5	45,4	41,9	43,7	42,5
Otras	19,7	21,0	18,6	18,7	23,4
Nacidos fuera de España (%)	11,5	10,3	12,4	10,9	14,1
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	4,2	6,5	2,3	4,0	5,2
Médicos generales, atención primaria de salud	25,5	18,7	31,1	25,5	25,2
Hospitales u otros servicios de salud	11,4	10,1	12,4	10,7	13,7
Servicios sociales	5,5	5,3	5,8	5,1	7,4
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	1,6	1,5	1,7	1,9	0,5
Servicios legales o policiales	2,2	1,9	2,2	2,5	0,9
Empresas o empleadores	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Familiares o amigos/as	14,2	12,5	15,9	14,5	13,5
Iniciativa propia	32,5	40,9	25,6	32,9	31,2
Otras	2,6	2,3	2,7	2,6	2,3

## 2.1.35. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,3	20,4	16,7	18,9	16,2
Únicamente con pareja	11,7	11,3	12,1	11,0	14,5
Únicamente con hijos	8,0	8,2	7,7	6,0	16,0
Con pareja e hijos/as	26,7	23,5	29,6	27,0	25,1
Con padres o familia de origen	24,7	24,7	24,8	26,3	18,5
Con amigos	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7
Otros	8,2	9,4	6,8	8,6	7,0
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,5	90,0	93,3	90,7	94,5
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,7	1,5	1,6	1,9	0,5
Otras instituciones	1,8	2,6	1,1	1,9	1,4
Pensiones, hoteles, hostales	0,7	0,9	0,5	0,7	0,5
Alojamientos inestables/precarios	2,1	2,5	1,7	2,2	1,5
Otros lugares	2,3	2,4	1,7	2,5	1,6
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,4	18,2	18,5	17,6	21,2
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	59,0	57,3	60,4	59,9	55,9
4-6 días/semana	5,9	5,6	6,1	5,7	6,7
2-3 días/semana	11,6	9,9	13,1	11,4	12,5
1 día/semana	4,5	3,9	4,9	4,4	5,0
Menos de 1 día/semana	5,3	5,9	4,7	5,2	5,7
No consumió	13,7	17,3	10,7	13,5	14,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,6	5,3	2,1	3,8	2,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	1,0	1,2	0,7	1,0	0,7
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	1,1	1,6	0,7	1,1	1,2
Negativo (análisis últimos 6 meses)	17,2	18,6	15,9	17,0	17,9
Negativo (sin fecha de análisis)	18,8	23,6	15,0	18,6	19,3
Sin análisis o resultado desconocido	63,0	56,2	68,4	63,2	61,7

Nota: El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.36.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según tratamiento previo o no, y según sexo. España, 2013.

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Número de casos	28.652	12.978	15.121	22.198	6.292
Tratados por primera vez por alcohol (%)	53,8	–	–	53,8	53,8
Edad media (años)	44,9	45,8	44,1	44,8	45,4
Mujeres (%)	22,1	22,1	22,1	–	–
Máximo nivel de estudios completado (%)					
Sin estudios	1,0	0,8	1,2	1,1	0,7
Enseñanza primaria	43,8	43,9	43,8	45,8	36,7
Enseñanzas secundarias	45,6	46,6	44,8	45,0	48,0
Estudios universitarios	8,5	7,8	9,0	7,1	13,2
Otros	1,1	0,9	1,3	1,0	1,4
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	33,2	29,7	36,1	34,4	29,2
Parado no habiendo trabajado	2,7	2,6	2,7	2,4	3,5
Parado habiendo trabajado	36,1	37,0	35,4	36,4	34,8
Otras	28,1	30,7	25,7	26,8	32,6
Nacidos fuera de España (%)	10,7	8,3	12,5	10,1	12,6
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	10,6	14,0	7,6	10,2	12,5
Médicos generales, atención primaria de salud	19,9	14,0	24,5	20,3	18,0
Hospitales u otros servicios de salud	9,8	10,0	9,7	9,1	12,3
Servicios sociales	10,1	8,5	11,4	9,5	12,6
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	5,9	5,6	6,1	6,0	5,8
Servicios legales o policiales	3,4	3,1	3,6	3,5	2,8
Empresas o empleadores	1,2	1,2	1,2	1,4	0,8
Familiares o amigos/as	11,9	10,3	13,4	12,2	10,6
Iniciativa propia	25,3	31,4	20,4	25,9	22,9
Otras	1,9	1,7	2,0	1,9	1,7



## 2.1.36. (continuación)

	Total	Tratamiento previo por alcohol		Sexo	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	18,4	20,0	17,0	19,0	16,3
Únicamente con pareja	11,7	11,2	12,3	10,7	15,3
Únicamente con hijos	7,2	7,2	7,1	5,1	14,6
Con pareja e hijos/as	26,4	24,0	28,4	26,9	24,2
Con padres o familia de origen	25,6	25,5	25,7	27,2	19,6
Con amigos	2,2	2,1	2,3	2,2	2,3
Otros	8,6	10,0	7,1	8,8	7,8
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,8	90,2	93,4	91,0	94,8
Prisiones, centros de internamiento cerrado para menores	1,4	1,4	1,3	1,6	0,5
Otras instituciones	1,8	2,4	1,3	1,9	1,5
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,8	0,5	0,7	0,4
Alojamientos inestables/precarios	2,3	2,6	2,0	2,5	1,4
Otros lugares	2,1	2,6	1,6	2,3	1,5
Edad al inicio del consumo de alcohol (años)	18,8	18,5	19,0	17,9	21,8
Frecuencia de consumo de alcohol en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,9	56,1	61,1	59,8	55,4
4-6 días/semana	6,2	6,2	6,2	5,9	7,2
2-3 días/semana	11,1	9,6	12,4	10,7	12,5
1 día/semana	4,6	4,2	4,9	4,4	5,2
Menos de 1 día/semana	5,2	5,5	4,9	5,0	5,7
No consumió	14,1	18,4	10,5	14,1	14,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,3	4,8	2,0	3,5	2,9
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,8	1,0	0,6	0,8	0,7
Estado serológico frente al VIH (%)					
Positivo	2,9	3,2	2,6	3,0	2,6
Negativo (análisis últimos 6 meses)	46,6	43,1	50,5	46,9	45,8
Negativo (sin fecha de análisis)	31,4	33,1	29,5	31,0	32,7
Sin análisis o resultado desconocido	19,0	20,6	17,5	19,1	18,9

Nota: El número de casos con o sin tratamiento previo o el número de hombres más el número de mujeres pueden no sumar el total, debido a la existencia de casos con valores desconocidos en estas variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.37.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2012.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	19.497	14.869	13.333	12.238	1.083	965	563	512	134	107	38
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	53,4	76,3	22,2	21,5	60,6	61,8	26,8	62,3	78,0	78,6	66,7
Edad media (años)	34,5	25,5	40,5	40,4	38,5	38,2	41,1	32,4	27,0	28,9	23,2
Mujeres (%)	14,2	14,6	16,7	16,2	39,6	38,5	22,8	20,7	14,2	13,3	5,3
Máximo nivel de estudios completado (%)											
Sin estudios	0,8	0,5	1,9	2,0	2,4	2,5	2,1	0,4	0,0	0,0	5,9
Enseñanza primaria	42,1	47,3	53,3	53,3	48,2	49,1	58,7	34,5	39,7	25,7	64,7
Enseñanzas secundarias	51,0	47,8	41,0	41,3	39,2	38,6	35,0	59,4	50,4	67,6	23,5
Estudios universitarios	5,5	3,9	3,3	3,1	8,8	8,4	3,8	5,3	8,4	6,7	5,9
Otros	0,6	0,5	0,4	0,4	1,4	1,4	0,4	0,4	1,5	0,0	0,0
Situación laboral principal (%)											
Trabajando	37,3	19,1	18,3	18,2	17,8	16,4	19,8	35,4	27,5	34,6	5,6
Parado no habiendo trabajado	4,1	10,8	7,7	7,8	8,3	8,5	6,2	6,7	3,8	11,5	19,4
Parado habiendo trabajado	47,1	37,6	54,2	54,6	47,8	49,1	50,6	46,6	41,2	38,5	25,0
Otras	11,5	32,4	19,9	19,4	26,1	26,0	23,3	11,3	27,5	15,4	50,0
Nacidos fuera de España (%)	8,7	10,3	9,1	9,1	7,9	7,5	6,1	5,1	6,1	5,3	73,5
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	5,4	2,5	16,1	15,2	4,3	4,3	28,5	6,2	2,7	3,0	0,0
Médicos generales, atención primaria salud	12,5	11,6	5,6	5,3	21,4	20,1	4,0	15,1	9,7	13,1	8,7
Hospitales u otros servicios de salud	5,3	6,6	3,5	3,0	15,6	15,7	6,0	11,1	3,5	7,1	8,7
Servicios sociales	2,7	5,2	2,2	2,3	3,5	3,7	1,8	1,5	1,8	3,0	17,4
Prisiones, centros de menores	6,1	4,6	12,0	12,7	5,4	5,9	6,9	4,7	2,7	5,1	39,1
Servicios legales o policiales	8,1	22,8	5,1	5,3	4,1	4,6	3,1	10,6	34,5	10,1	8,7
Empresas o empleadores	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,6	0,9	0,0	0,0
Familiares o amigos/as	15,3	17,5	5,9	6,1	10,8	10,8	3,1	15,7	18,6	14,1	0,0
Iniciativa propia	42,6	25,6	46,6	46,9	31,9	31,7	45,2	31,7	24,8	40,4	17,4
Otras	1,9	3,4	3,0	3,1	2,8	3,0	1,3	2,8	0,9	4,0	0,0
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	12,0	7,4	16,4	16,4	15,6	15,3	15,6	14,5	10,5	13,6	8,6
Únicamente con pareja	11,7	6,1	11,5	11,2	11,2	11,4	15,0	9,6	8,1	8,7	2,9
Únicamente con hijos	6,7	7,1	5,0	5,0	6,6	6,2	4,0	5,5	3,2	13,6	5,7
Con pareja e hijos/as	20,8	9,3	13,5	13,1	19,6	18,8	19,0	7,9	8,9	9,7	5,7
Con padres o familia de origen	36,7	59,1	31,2	31,4	33,1	33,2	29,8	46,6	58,1	41,7	22,9
Con amigos	2,4	2,3	3,6	3,6	1,7	1,8	4,5	4,9	3,2	6,8	2,9
Otros	9,8	8,7	18,7	19,2	12,3	13,3	12,1	11,0	8,1	5,8	51,4

## 2.1.37. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	89,6	92,9	74,9	74,1	86,8	85,6	84,9	88,9	92,9	94,2	38,9
Prisiones, centros de menores	6,1	3,3	11,9	12,3	6,7	7,5	7,0	5,2	5,6	2,9	19,4
Otras instituciones	1,4	1,6	3,0	3,0	2,3	2,4	1,8	1,8	0,0	1,0	25,0
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,3	1,0	1,1	0,7	0,8	0,6	0,8	0,0	1,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	1,2	0,7	5,4	5,7	1,9	1,9	2,9	1,6	1,6	1,0	8,3
Otros lugares	1,3	1,3	3,8	3,8	1,7	1,8	2,7	1,6	0,0	0,0	8,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)											
	20,7	15,5	21,2	20,7	27,1	27,1	28,5	20,0	19,7	20,7	15,3
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	1,7	2,3	6,2	1,0	97,9	97,8	92,1	20,0	89,7	43,7	0,0
Pulmonar	14,5	96,8	67,8	72,0	1,2	1,3	4,7	2,4	2,4	10,7	62,9
Intranasal	81,1	0,6	6,4	6,5	0,1	0,1	1,3	76,7	7,9	44,7	28,6
Parenteral	2,0	0,0	17,8	18,6	0,6	0,6	1,7	0,6	0,0	1,0	0,0
Otras	0,7	0,3	1,8	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	8,6
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	20,4	67,7	49,1	46,7	78,3	79,9	87,6	29,5	7,1	29,1	25,0
4-6 días/semana	9,8	5,1	3,9	4,1	3,1	2,9	2,2	8,9	3,6	9,3	8,3
2-3 días/semana	22,7	8,0	4,9	5,2	2,9	2,9	1,4	27,3	22,3	11,6	8,3
1 día/semana	9,6	3,0	2,4	2,4	1,5	1,2	1,0	7,2	10,7	14,0	0,0
Menos de 1 día/semana	12,5	3,8	4,4	4,6	2,3	2,1	1,4	8,5	19,6	12,8	25,0
No consumió	25,0	12,5	35,3	36,9	11,8	11,1	6,4	18,6	36,6	23,3	33,3
Otras drogas consumidas en los 30 días previos a la admisión de tratamiento (%)											
1. Opiáceos	8,3	3,6	11,7	11,4	14,3	14,3	18,6	4,3	5,4	4,0	5,0
11. Heroína	7,4	2,9	0,8	-	8,8	9,1	17,6	3,1	4,3	1,3	5,0
12. Metadona	0,7	0,1	7,3	7,7	2,4	2,4	-	0,3	0,0	0,0	0,0
13. Otros opiáceos	0,5	0,6	3,6	3,8	3,2	2,8	1,0	0,9	1,1	2,7	0,0
2. Cocaína	0,4	34,6	56,1	57,8	32,7	32,2	24,7	30,5	37,0	37,3	35,0
21. Cocaína CIH	0,2	34,3	51,8	53,4	31,1	30,6	21,7	30,5	37,0	37,3	35,0
22. Base cocaína	0,2	0,4	4,5	4,6	1,8	1,8	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Estimulantes	9,7	10,0	3,2	3,3	4,6	4,4	0,7	6,6	8,7	25,3	10,0
31. Anfetaminas	4,5	5,1	2,1	2,1	2,7	2,8	0,3	-	6,4	36,2	5,7
32. Éxtasis y derivados	5,4	4,6	1,0	1,1	1,3	1,2	0,3	7,1	-	8,6	2,9
33. Otros estimulantes	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,4	0,0
4. Hipnóticos y sedantes	6,8	5,0	19,9	19,8	0,6	0,4	24,1	5,1	7,6	6,7	10,0
41. Barbitúricos	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42. Benzodiazepinas	6,3	5,5	19,1	19,0	1,1	-	22,4	1,2	3,8	1,7	8,6
43. Otros hipnosedantes	0,4	0,5	0,7	0,6	0,4	0,4	1,7	0,5	1,3	1,7	0,0

### 2.1.37. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
5. Alucinógenos	2,1	2,9	1,1	1,1	0,4	0,0	0,0	7,4	5,4	0,0	0,0
51. LSD	0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	6,9	0,0
52. Otros alucinógenos	1,9	2,3	0,9	0,9	0,9	0,8	0,0	5,4	2,6	0,0	2,9
6. Inhalables volátiles	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
7. Cannabis	50,1	-	45,9	45,6	58,8	61,3	52,2	62,4	57,6	61,3	65,0
8. Alcohol	73,6	80,6	37,6	37,5	54,2	54,0	40,3	56,7	63,0	60,0	60,0
9. Otras sustancias	1,0	1,1	1,4	1,5	0,8	0,7	0,0	0,9	0,0	2,7	5,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	6,1	2,7	43,7	44,0	10,3	10,9	43,3	7,4	3,7	5,6	5,3
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	2,5	0,7	14,5	15,1	4,3	4,5	6,2	1,4	0,7	2,8	0,0
Estado serológico frente al VIH (%)											
Positivo	2,0	0,7	15,6	15,7	4,3	4,5	15,6	1,4	0,7	2,8	0,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	24,2	13,3	24,2	24,8	15,1	15,1	16,3	19,9	16,4	23,4	28,9
Negativo (sin fecha de análisis)	22,2	13,2	26,4	26,5	19,2	19,9	25,8	18,4	15,7	12,1	18,4
Sin análisis o resultado desconocido	51,7	72,8	33,7	33,0	61,4	60,5	42,3	60,4	67,2	61,7	52,6

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.38.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2013.

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Nº de casos	19.848	16.914	12.863	11.756	1.175	1.062	492	671	201	120	26
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	55,2	78,3	24,4	22,3	67,8	67,0	45,6	60,0	86,1	63,2	69,2
Edad media (años)	35,0	26,0	40,8	40,8	40,8	40,5	42,0	32,3	28,7	31,1	24,5
Mujeres (%)	14,1	15,6	15,9	15,0	42,4	41,1	22,1	18,5	19,1	15,8	3,8
Máximo nivel de estudios completado (%)											
Sin estudios	0,8	0,5	1,9	1,9	1,6	1,5	3,4	0,3	0,0	0,8	8,0
Enseñanza primaria	41,9	46,0	53,2	53,4	49,0	48,3	57,2	32,6	38,0	36,1	56,0
Enseñanzas secundarias	51,5	48,8	41,3	41,5	40,3	41,8	36,9	61,1	56,8	54,6	36,0
Estudios universitarios	5,3	4,2	3,1	2,8	8,6	8,1	2,3	5,4	5,2	8,4	0,0
Otros	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0

## 2.1.38. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Situación laboral principal (%)											
Trabajando	37,3	18,8	16,9	16,9	19,3	19,2	15,0	36,1	24,7	26,1	7,7
Parado no habiendo trabajado	4,4	10,4	7,6	7,7	8,4	8,1	6,5	5,7	9,3	5,9	30,8
Parado habiendo trabajado	41,5	34,3	50,7	51,2	41,6	42,8	50,9	44,2	42,8	37,8	23,1
Otras	16,8	36,6	24,7	24,2	30,7	30,0	27,6	14,1	23,2	30,3	38,5
Nacidos fuera de España (%)											
	7,8	9,3	8,3	8,4	6,5	6,5	4,6	4,2	3,1	11,7	47,8
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)											
Otros servicios tto. drogodependencias	11,4	5,7	19,5	19,7	6,3	5,7	20,5	9,8	8,3	10,8	0,0
Médicos generales, atención primaria salud	10,0	11,0	5,2	4,7	19,0	18,3	3,6	12,2	7,1	9,0	5,3
Hospitales u otros servicios de salud	5,3	5,7	5,5	5,0	10,6	11,0	7,7	11,4	1,8	9,9	10,5
Servicios sociales	4,5	5,7	2,6	2,4	5,7	5,4	1,7	3,3	5,3	6,3	5,3
Prisiones, centros de menores	8,1	7,2	13,2	13,5	11,5	11,9	14,3	5,5	10,1	5,4	26,3
Servicios legales o policiales	8,1	21,5	3,6	3,7	3,9	4,1	3,2	14,3	29,6	16,2	15,8
Empresas o empleadores	1,4	1,6	1,9	2,0	0,1	0,1	0,9	0,7	0,6	0,0	0,0
Familiares o amigos/as	13,5	15,3	5,2	5,3	11,7	11,8	3,4	14,6	12,4	13,5	5,3
Iniciativa propia	36,7	23,1	41,9	42,1	30,1	30,4	43,9	26,0	24,9	27,0	5,3
Otras	1,1	3,3	1,5	1,4	1,1	1,2	0,9	2,3	0,0	1,8	26,3
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Solo/a	12,3	7,4	16,4	16,6	14,2	13,9	13,9	15,8	9,3	11,9	3,8
Unicamente con pareja	11,4	6,2	11,5	11,2	11,0	11,4	14,6	7,6	8,2	7,6	3,8
Unicamente con hijos	5,7	5,4	4,7	4,7	7,5	6,9	4,8	4,1	4,1	6,8	0,0
Con pareja e hijos/as	22,0	9,8	14,1	13,5	23,2	22,7	18,2	10,9	7,7	7,6	7,7
Con padres o familia de origen	37,4	59,9	32,6	32,8	31,5	32,1	30,8	47,9	61,3	47,5	34,6
Con amigos	2,3	2,3	3,7	3,8	1,7	1,6	3,9	3,6	2,6	6,8	3,8
Otros	8,9	9,1	17,0	17,3	11,0	11,5	13,9	10,2	6,7	11,9	46,2
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	91,7	93,0	78,2	77,6	89,1	88,6	82,0	90,3	96,4	93,2	53,8
Prisiones, centros de menores	3,9	3,1	9,0	9,3	4,4	4,5	7,0	3,2	1,5	4,2	19,2
Otras instituciones	1,4	1,4	3,1	3,2	1,4	1,5	1,6	1,1	1,0	0,8	19,2
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,2	0,9	0,9	0,7	0,8	1,3	0,3	0,5	0,0	0,0
Alojamientos inestables/precarios	1,5	0,9	5,3	5,5	1,8	2,0	3,6	2,6	0,0	0,8	3,8
Otros lugares	1,1	1,4	3,4	3,5	2,6	2,6	4,5	2,6	0,5	0,8	3,8
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)											
	20,6	15,6	21,4	20,9	28,1	27,8	28,6	20,3	20,1	21,9	15,2
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)											
Oral	2,0	2,3	5,7	0,8	97,9	97,9	89,3	23,1	86,3	39,3	4,2
Pulmonar	14,5	96,9	69,9	74,0	1,0	1,1	6,7	4,5	3,3	10,3	54,2
Intranasal	80,3	0,5	6,3	6,5	0,6	0,6	1,1	71,1	9,8	45,3	33,3
Parenteral	2,3	0,0	15,8	16,6	0,2	0,2	2,4	1,2	0,0	4,3	0,0
Otras	0,9	0,3	2,2	2,1	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,9	8,3

## 2.1.38. (continuación)

	Cocaína	Cannabis	Opioides	Heroína	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Metadona	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Frecuencia de consumo de la droga principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Todos los días	22,3	67,3	53,4	51,3	83,3	83,5	88,6	25,6	13,8	33,0	44,4
4-6 días/semana	10,4	5,5	4,5	4,8	2,0	2,0	1,7	11,0	2,4	11,3	0,0
2-3 días/semana	22,6	8,1	5,6	5,8	3,2	3,1	1,2	25,4	18,6	21,7	22,2
1 día/semana	10,4	2,7	2,0	2,0	0,6	0,5	1,2	9,0	7,2	2,8	5,6
Menos de 1 día/semana	12,2	3,5	3,7	3,8	1,3	1,2	1,2	9,4	18,6	8,5	5,6
No consumió	22,1	12,9	30,8	32,2	9,6	9,7	6,2	19,6	39,5	22,6	22,2
Otras drogas consumidas en los 30 días previos a la admisión de tratamiento (%)											
1. Opiáceos	8,0	3,3	10,9	10,5	14,0	14,6	24,4	4,2	2,3	3,8	0,0
11. Heroína	7,1	2,7	1,0	0,0	9,1	9,3	23,2	3,5	1,5	3,8	0,0
12. Metadona	0,5	0,2	7,3	7,7	3,0	3,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
13. Otros opiáceos	0,4	0,5	2,6	2,8	1,9	2,0	1,2	0,4	0,8	0,0	0,0
2. Cocaína	0,5	33,2	53,6	54,7	35,1	36,4	26,8	31,8	44,6	50,6	30,8
21. Cocaína CIH	0,3	32,7	48,9	50,0	32,3	33,4	21,3	31,8	43,1	49,4	30,8
22. Base cocaína	0,2	0,5	4,7	4,7	2,8	3,0	5,5	0,0	1,5	1,3	0,0
3. Estimulantes	10,0	10,7	3,4	3,4	4,7	4,9	0,8	7,5	10,0	29,1	23,1
31. Anfetaminas	4,6	5,4	2,2	2,2	3,0	3,2	0,8	–	7,7	15,2	15,4
32. MDMA y derivados	5,0	5,0	1,1	1,1	1,5	1,4	0,0	6,1	–	12,7	0,0
33. Otros estimulantes	0,4	0,4	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	1,3	2,3	1,3	7,7
4. Hipnóticos y sedantes	7,0	4,7	18,6	18,5	0,8	0,4	20,5	4,2	3,1	1,3	7,7
41. Barbitúricos	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42. Benzodiazepinas	6,5	4,5	17,9	17,8	0,4	–	20,5	3,7	3,1	1,3	7,7
43. Otros hipnosedantes	0,4	0,1	0,5	0,6	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
5. Alucinógenos	2,0	2,0	1,0	1,1	0,4	0,4	0,0	6,6	10,8	1,3	0,0
51. LSD	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	1,5	1,3	0,0
52. Otros alucinógenos	1,8	1,8	0,7	0,7	0,4	0,4	0,0	5,9	9,2	0,0	0,0
6. Inhalables volátiles	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	–
7. Cannabis	49,9	–	46,9	46,8	54,2	55,1	50,8	62,3	60,8	49,4	69,2
8. Alcohol	73,6	80,2	38,1	38,1	57,0	55,9	37,4	62,5	53,1	59,5	46,2
9. Otras sustancias	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	5,7	2,6	41,1	41,7	8,2	8,8	40,0	6,3	6,5	3,3	3,8
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	2,2	0,8	12,7	13,2	1,2	1,3	4,7	2,8	1,5	2,5	0,0
Estado serológico frente al VIH (%)											
Positivo	1,9	0,7	13,6	13,7	2,8	2,9	15,2	0,7	2,5	3,3	0,0
Negativo (análisis últimos 6 meses)	22,7	12,5	22,6	23,0	14,2	14,0	16,9	18,8	12,4	15,8	23,1
Negativo (sin fecha de análisis)	21,3	13,4	28,7	29,2	18,8	19,4	24,8	21,3	12,4	22,5	19,2
Sin análisis o resultado desconocido	54,1	73,4	35,1	34,1	64,2	63,7	43,1	59,2	72,6	58,3	57,7

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.39.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2012.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo		Total	Tratamiento previo	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	2.562	2.001	523	7.580	6.073	1.393
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.910	1.583	309	5.957	5.011	862
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,4	30,3	19,1	33,1	34,4	25,2
Hombres inyectores (nº)	2.130	1.681	419	6.326	5.057	1.180
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.594	1.328	251	4.953	4.153	734
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,2	29,7	19,5	32,0	33,2	24,7
Mujeres inyectoras (nº)	420	313	99	1218	989	206
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	313	252	58	981	837	127
Prevalencia de infección por VIH (%)	30	33,3	17,2	39,1	40,9	28,3
Inyectores < 25 años (nº)	165	80	82	216	106	107
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	93	54	37	116	68	46
Prevalencia de infección por VIH (%)	8,6	13,0	2,7	8,6	13,2	2,2
Inyectores 25-34 años (nº)	667	482	170	1250	926	304
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	452	357	89	889	717	161
Prevalencia de infección por VIH (%)	11,7	13,2	4,5	13,6	15,2	5,6
Inyectores > 34 años (nº)	1.728	1.438	270	6.107	5.037	980
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.363	1.171	182	4.945	4.222	653
Prevalencia de infección por VIH (%)	35,4	36,3	29,7	37,2	38,0	31,7
Inyectores < 2 años de uso de la droga principal	39	13	25	68	31	36
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	18	9	8	37	24	12
Prevalencia de infección por VIH (%)	22,2	11,1	25,0	27,0	25,0	25,0
Inyectores ≥ 2 años de uso de la droga principal	2.029	1.670	328	5.375	4.609	679
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.572	1.346	211	4.426	3.891	472
Prevalencia de infección por VIH (%)	28,8	30,0	21,3	32,1	33,2	23,1
Inyectores consumidores de opiáceos	2.121	1.752	342	6.325	5.307	930
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.635	1.408	216	5.103	4.435	602
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,9	31,7	25,5	35,0	35,6	28,9
Inyectores no consumidores de opiáceos	441	249	181	1.255	766	463
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	275	175	93	854	576	260
Prevalencia de infección por VIH (%)	13,5	18,9	4,3	21,9	24,7	16,5

## Notas:

- El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.
- Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.
- No se incluyen datos de algunas Comunidades/Ciudades Autónomas, debido a problemas de calidad de la variable "tiempo desde la última inyección de cualquier sustancia psicoactiva".
- Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.40.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH. España, 2013.

	Inyección en 12 meses previos a la admisión			Inyección alguna vez en la vida		
	Total	Tratamiento previo		Total	Tratamiento previo	
		Sí	No		Sí	No
Total inyectores (nº)	2.237	1.663	530	7.026	5.484	1.457
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.646	1.317	302	5.439	4.488	892
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,4	26,2	16,6	30,6	31,9	23,7
Hombres inyectores (nº)	1.896	1.431	432	5.982	4.678	1.239
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.404	1.131	253	4.633	3.818	771
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,2	25,8	17,8	29,7	30,9	24,4
Mujeres inyectoras (nº)	322	216	97	1.005	772	217
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	230	176	48	782	649	120
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,1	29,5	10,4	35,5	38,2	19,2
Inyectores < 25 años (nº)	152	53	92	209	80	119
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	64	30	31	93	51	37
Prevalencia de infección por VIH (%)	4,7	6,7	0,0	5,4	5,9	2,7
Inyectores 25-34 años (nº)	583	374	197	1095	756	324
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	383	275	103	762	581	173
Prevalencia de infección por VIH (%)	8,9	10,5	4,9	11,8	13,1	6,9
Inyectores > 34 años (nº)	1.502	1.236	241	5.722	4.648	1.014
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.199	1.012	168	4.584	3.856	682
Prevalencia de infección por VIH (%)	30,4	31,0	26,8	34,2	35,1	29,0
Inyectores < 2 años de uso de la droga principal	45	14	30	74	30	43
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	21	9	12	36	18	18
Prevalencia de infección por VIH (%)	9,5	22,2	0,0	13,9	27,8	0,0
Inyectores 2 o más años de uso de la droga principal	1.784	1.422	325	4.971	4.249	653
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.372	1.143	204	4.041	3.550	442
Prevalencia de infección por VIH (%)	24,8	26,1	17,2	29,8	31,2	18,1
Inyectores consumidores de opiáceos	1.767	1.416	325	5.723	4.756	912
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	1.381	1.158	203	4.587	3.950	595
Prevalencia de infección por VIH (%)	26,3	27,2	20,2	32,0	32,8	26,4
Inyectores no consumidores de opiáceos	470	247	205	1.303	728	545
Conocen estado serológico frente a VIH (nº)	265	159	99	852	538	297
Prevalencia de infección por VIH (%)	14,7	18,9	9,1	22,8	25,5	18,2

## Notas:

- El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.
- Las prevalencias están calculadas sobre el nº de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las otras variables que se cruzan.
- No se incluyen datos de algunas Comunidades/Ciudades Autónomas, debido a problemas de calidad de la variable "tiempo desde la última inyección de cualquier sustancia psicoactiva".
- Se incluyen tanto los admitidos a tratamiento por dependencia de opiáceos como los admitidos por otras drogas psicoactivas que han consumido opiáceos en los 30 días previos a la admisión.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



## 2.1.41.


Admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: estado serológico y vía de consumo según droga principal. España, 2013.

	Opioides	Heroína	Metadona	Otros opioides	Cocaína	Cocaína CLH	Cocaína base	Otros estimulantes	Anfetaminas	Éxtasis y derivados	Hipnosedantes	Benzodiazepinas	Alucinógenos	In. volátiles	Cannabis
Nº de casos	12.863	11.756	492	615	19.848	19.046	794	923	671	201	1.175	1.062	120	26	16.914
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	21,4	20,9	28,6	26,6	20,6	20,6	21,9	20,5	20,3	20,1	28,1	27,8	21,9	15,2	15,6
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)															
Oral	5,7	0,8	89,3	37,7	2,0	2,1	0,4	38,4	23,1	86,3	97,9	97,9	39,3	4,2	2,3
Pulmonar	69,9	74,0	6,7	38,1	14,5	11,3	89,7	4,2	4,5	3,3	1,0	1,1	10,3	54,2	96,9
Intranasal	6,3	6,5	1,1	7,3	80,3	83,3	8,4	56,3	71,1	9,8	0,6	0,6	45,3	33,3	0,5
Parenteral	15,8	16,6	2,4	10,9	2,3	2,3	0,4	0,9	1,2	0,0	0,2	0,2	4,3	0,0	0,0
Otras	2,2	2,1	0,4	6,0	0,9	0,9	1,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	0,9	8,3	0,3
Se inyectó drogas alguna vez en la vida	41,1	41,7	40,0	30,6	5,7	5,4	12,8	6,3	6,3	6,5	8,2	8,8	3,3	3,8	2,6
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses	12,7	13,2	4,7	9,4	2,2	2,2	2,6	2,4	2,8	1,5	1,2	1,3	2,5	0,0	0,8
Estado serológico frente al VIH (%)															
Positivo	13,6	13,7	15,2	10,1	1,9	1,8	3,5	1,3	0,7	2,5	2,8	2,9	3,3	0,0	0,7
Negativo (análisis últimos 6 meses)	22,6	23,0	16,9	19,5	22,7	23,1	14,4	17,2	18,8	12,4	14,2	14,0	15,8	23,1	12,5
Negativo (sin fecha de análisis)	28,7	29,2	24,8	22,4	21,3	21,0	27,0	19,1	21,3	12,4	18,8	19,4	22,5	19,2	13,4
Sin análisis o resultado desconocido	35,1	34,1	43,1	48,0	54,1	54,1	55,2	62,4	59,2	72,6	64,2	63,7	58,3	57,7	73,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.42.

Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (%). España, 2005-2013.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Porcentaje inyectores (alguna vez en la vida) que conocen estado serológico (VIH)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4
Porcentaje inyectores (último año previo a admisión) que conocen estado serológico (VIH)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6
Prevalencia (%) de VIH en inyectores alguna vez en la vida	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6
Prevalencia (%) de VIH en inyectores último año previo a admisión	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.43.


Inyectores (alguna vez en la vida y último año) admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas: prevalencia y conocimiento de estado serológico por VIH (número y %). España, 2005-2013.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total inyectores último año previo a admisión (nº)	4.358	4.892	4.575	4.546	3.763	3.549	3.094	2.562	2.237
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	2.996	3.665	3.319	3.203	2.585	2.487	2.259	1.910	1.646
Conocen su estado serológico frente a VIH (%)	68,7	74,9	72,5	70,5	68,7	70,1	73,0	74,6	73,6
Prevalencia de infección por VIH (%)	32,7	33,4	30,8	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4
Total inyectores alguna vez en la vida (nº)	9.533	11.601	11.249	10.895	9.637	9.697	8.385	7.580	7.026
Conocen su estado serológico frente a VIH (nº)	6.991	9.068	8.643	8.126	7.143	7.243	6.546	5.957	5.439
Conocen su estado serológico frente a VIH (%)	73,3	78,2	76,8	74,6	74,1	74,7	78,0	78,6	77,4
Prevalencia de infección por VIH (%)	36,1	36,4	34,5	32,5	32,3	33,6	33,0	33,1	30,6

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.44.

Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, total y según sexo. 1996-2013.




	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Hombre	35,9	32,4	32,4	31,9	32,7	32,7	30,9	31,5	27,7	31,5	32,7	30,0	26,7	26,0	29,8	28,5	28,2	24,2
Mujer	43,4	41,0	39,7	40,2	37,9	40,2	38,9	39,3	38,3	39,5	37,4	36,2	33,3	32,2	31,7	30,0	30,0	26,1
Total	37,1	33,7	33,6	33,0	33,5	33,7	32,0	32,6	29,3	32,7	33,4	30,9	27,6	26,9	30,2	28,7	28,4	24,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.45.

Prevalencia (%) de VIH, entre los inyectores, en el último año, admitidos a tratamiento que conocían su estado serológico, según edad. 1996-2013.




	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
< 25	20,3	17,5	15,1	15,2	13,1	14,0	12,1	9,2	7,1	9,7	7,2	3,2	3,2	2,2	8,1	9,9	8,6	4,7
25-34	39,3	34,0	33,4	32,0	30,5	29,1	26,7	25,5	20,9	23,1	21,4	18,7	16,9	15,2	14,8	14,5	11,7	8,9
> 34	48,9	46,4	45,8	44,0	45,5	44,4	42,8	43,8	39,4	41,9	42,2	40,3	35,6	34,7	38	35,6	35,4	30,4

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.2. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas, 1996-2013

### 2.2.1.

Porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España\*, 1996-2013.



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cocaína	19,9	25,0	31,6	39,4	40,9	40,5	44,7	50,0	55,5	51,1	53,8	55,1	51,1	49,5	45,2	46,0	44,9
Alcohol	12,4	15,2	22,2	20,0	26,8	29,0	35,4	30,7	32,3	36,0	35,7	37,3	40,2	36,3	40,4	39,0	38,7
Cannabis	6,2	6,6	8,9	9,3	12,8	16,9	19,9	19,3	21,7	23,9	22,9	24,7	29,5	30,5	33,3	33,0	34,6
Hipnosedantes	23,6	18,9	24,3	23,8	28,9	29,2	30,1	22,3	17,0	21,0	15,8	15,6	16,5	16,7	18,9	18,3	17,8
Heroína	56,1	50,9	38,7	33,0	35,3	29,2	21,4	17,5	19,0	16,9	16,9	17,2	17,1	17,8	14,2	13,0	11,9
Anfetaminas	2,2	2,9	3,0	9,8	2,2	4,2	3,4	2,3	4,2	4,7	4,2	4,4	4,6	5,5	9,2	8,9	9,0
Éxtasis y der.	1,3	2,2	2,2	2,4	4,5	4,4	5,3	3,2	4,7	6,4	5,0	4,2	2,4	2,9	3,9	4,6	4,8
Alucinógenos	2,1	1,8	2,4	1,7	2,7	1,9	1,3	0,8	1,7	1,7	2,0	1,6	2,6	1,7	2,1	2,5	2,6
I. volátiles	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas.

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.2

Número total y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas, según tipo de droga. España\*, 1996-2013.

	Nº de episodios	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y derivados	Alucinógenos	Inhalables volátiles	Otras sustancias
1996	2.585	19,9	12,4	6,2	23,6	56,1	2,2	13,5	1,3	2,1	0,2	4,1
1997	1.932	25,0	15,2	6,6	18,9	50,9	2,9	17,4	2,2	1,8	0,1	3,2
1998	2.099	31,6	22,2	8,9	24,3	38,7	3,0	16,8	2,2	2,4	0,3	4,9
1999	2.141	39,4	20,0	9,3	23,8	33,0	9,8	18,9	2,4	1,7	0,1	1,3
2000	2.328	40,9	26,8	12,8	28,9	35,3	2,2	18,0	4,5	2,7	0,3	0,8
2001	2.145	40,5	29,0	16,9	29,2	29,2	4,2	17,4	4,4	1,9	0,9	1,6
2002	2.673	44,7	35,4	19,9	30,1	21,4	3,4	13,1	5,3	1,3	0,2	1,8
2004	5.828	50,0	30,7	19,3	22,3	17,5	2,3	9,1	3,2	0,8	0,6	8,7
2005	7.089	55,5	32,3	21,7	17,0	19,0	4,2	8,3	4,7	1,7	0,5	3,3
2006	7.042	51,1	36,0	23,9	21,0	16,9	4,7	8,5	6,4	1,7	0,4	4,9
2007	7.822	53,8	35,7	22,9	15,8	16,9	4,2	8,1	5,0	2,0	0,5	6,0
2008	6.431	55,1	37,3	24,7	15,6	17,2	4,4	7,5	4,2	1,6	0,5	1,8
2009	5.567	51,1	40,2	29,5	16,5	17,1	4,6	7,6	2,4	2,6	0,5	1,2
2010	5.626	49,5	36,3	30,5	16,7	17,8	5,5	6,7	2,9	1,7	0,4	1,8
2011	5.279	45,2	40,4	33,3	18,9	14,2	9,2	6,2	3,9	2,1	0,3	2,2
2012	5.999	46,0	39,0	33,0	18,3	13,0	8,9	6,1	4,6	2,5	0,5	3,3
2013	5.715	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	5,7	4,8	2,5	0,4	2,5

Nota: El porcentaje se calcula dividiendo el número de episodios en los que se relaciona cada sustancia con la urgencia entre el total de episodios de urgencias relacionadas con drogas. El sumatorio puede no ser del 100% debido a que no se presentan todas las drogas y algunas drogas pueden aparecer en más de un episodio.

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.2.3.

#### Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas. España\*, 1996-2013.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nº episodios	2.585	1.932	2.099	2.141	2.328	2.145	2.673	5.828	7.089	7.042	7.822	6.431	5.567	5.626	5.279	5.999	5.715
Edad media (años)	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0	31,6	32,4	33,0	32,6	32,7	32,8	33,0	27,8	29,1	30,3	29,8	31,0
Sexo (%)																	
Mujeres	21,4	20,8	23,1	23,5	27,4	27,1	27,4	28,0	25,0	26,1	23,4	22,7	21,6	26,3	24,7	26,1	26,1
Condición legal (%)																	
Detenido	14,4	22,4	11,7	9,4	6,4	5,7	5,2	4,1	4,9	3,7	3,8	4,4	4,9	4,2	3,7	4,1	3,8
Resolución urgencia (%)																	
Alta médica	80,5	82,0	81,2	80,9	78,7	79,1	82,1	81,4	79,1	76,2	79,1	80,0	80,9	79,6	75,4	75,9	72,8
Alta voluntaria	7,0	6,7	8,8	8,6	8,5	7,5	7,4	5,3	6,7	8,6	7,8	8,5	8,2	7,0	8,5	8,2	9,4
Ingreso hospitalario	7,6	7,2	6,0	6,5	8,3	7,8	6,3	8,0	8,4	8,8	9,0	7,8	8,1	10,2	12,5	12,5	14,8
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Traslado a otro centro	4,8	4,1	3,9	3,9	3,7	5,4	4,0	5,3	5,7	6,3	4,1	3,7	2,8	3,2	3,6	3,3	2,9

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.4.

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España\*, 2012.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.999	4.419	1.557	2.452	2.082	1.760	976	695	476	327	245	136	29
Edad media (años)	32,8	33,2	31,7	34,0	34,2	30,1	36,0	37,3	29,2	38,2	27,0	28,0	28,7
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	22,7	22,3	20,2	28,9	23,6	26,5	27,0	23,3	25,0	37,9
Detenidos (%)	4,1	5,0	1,6	3,5	2,4	4,6	5,3	5,5	1,7	6,2	1,2	2,2	10,3
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	75,9	74,8	78,9	75,1	75,2	74,8	68,4	69,8	77,3	71,7	74,0	76,2	75,0
Alta voluntaria	8,2	8,7	7,0	8,1	8,8	6,0	9,4	9,3	6,9	7,9	17,2	11,9	8,3
Ingreso hospitalario	12,5	13,0	11,3	12,8	12,5	15,3	16,5	18,2	12,9	15,0	7,7	8,9	16,7
Muerte en urgencias	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	1,0	0,0
Traslado a otro centro	3,2	3,4	2,8	4,0	3,3	3,9	5,7	2,5	2,6	5,0	1,2	2,0	0,0

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.5

Características de los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas (total, según sexo y según droga). España\*, 2013.

	Total	Según sexo		Según droga									
		Hombres	Mujeres	Cocaína	Alcohol	Cánnabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opioides	Éxtasis y der.	Alucinogenos	I. volátiles
Número de episodios	5.715	4.219	1.490	2.490	2.143	1.919	985	659	500	316	265	145	21
Edad media (años)	33,0	33,4	31,9	33,9	34,2	29,5	35,6	37,4	29,3	39,2	27,3	27,8	30,4
Sexo (% mujeres)	26,1	-	-	24,6	24,6	24,6	29,5	21,9	26,2	28,5	28,0	22,9	33,3
Detenidos (%)	3,8	4,4	2,0	4,2	3,4	4,5	4,6	3,8	2,6	6,7	3,4	3,4	0,0
Resolución de la urgencia (%)													
Alta médica	72,8	72,6	73,3	71,4	74,2	74,5	65,6	62,4	77,5	65,7	78,4	63,1	63,2
Alta voluntaria	9,4	9,6	8,8	9,8	10,3	6,7	10,6	8,8	8,1	11,2	11,6	16,5	5,3
Ingreso hospitalario	14,8	14,9	14,4	15,4	12,8	15,4	20,3	24,2	11,3	19,8	8,0	17,5	15,8
Muerte en urgencias	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Traslado a otro centro	2,9	2,8	3,3	3,4	2,6	3,4	3,4	4,0	2,8	3,3	2,0	2,9	15,8

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.6.

#### Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España\* 2012.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	2,1	6,4	99,1	1,5	79,1	93,8	96,1	67,3
Pulmonar o fumada	12,0	93,1	0,4	19,4	5,5	1,2	1,6	4,1
Intranasal o esnifada	66,3	0,5	0,1	8,0	14,1	0,3	2,4	18,4
Parenteral o inyectada	19,4	0,0	0,4	70,9	1,2	3,0	0,0	8,2
Otra vía	0,3	0,0	0,0	0,2	0,0	1,8	0,0	2,0

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.7.

#### Vía de administración de las drogas relacionadas con urgencias hospitalarias (%). España\* 2013.

Vía de administración	Cocaína	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Otros opiáceos	Éxtasis y der.	Alucinógenos
Oral	0,5	2,2	99,5	0,2	69,9	98,7	98,6	54,8
Pulmonar o fumada	18,5	97,3	0,2	30,6	10,6	0,4	0,0	11,3
Intranasal o esnifada	61,2	0,4	0,0	9,5	18,7	0,1	0,0	17,7
Parenteral o inyectada	19,6	0,1	0,3	59,6	0,4	0,5	0,7	16,1
Otra vía	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4	0,2	0,7	0,0

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

### 2.2.8.

#### Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España\* 2012.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	46,0	47,0	42,5
Alcohol	39,0	40,1	35,5
Cannabis	33,3	34,9	27,2
Hipnosedantes	18,3	17,2	21,6
Heroína	13,0	13,2	12,5
Anfetaminas	8,9	8,7	9,7
Otros opioides	6,1	5,9	6,8
Éxtasis y derivados	4,6	4,7	4,4
Otras sustancias	3,3	2,6	5,4
Alucinógenos	2,5	2,5	2,6
Inhalables volátiles	0,5	0,4	0,8

Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.



## 2.2.9.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según sexo. España\*, 2013.

	Total	Hombres	Mujeres
Cocaína	44,9	45,9	42,3
Alcohol	38,7	39,4	36,3
Cannabis	34,6	35,3	32,6
Hipnosedantes	17,8	17,0	20,1
Heroína	11,9	12,6	10,0
Anfetaminas	9,0	9,0	9,1
Otros opioides	5,7	5,5	6,2
Éxtasis y derivados	4,8	4,6	5,1
Otras sustancias	2,5	2,1	3,7
Alucinógenos	2,6	2,7	2,3
Inhalables volátiles	0,4	0,3	0,5


Nota: La suma puede superar el 100% porque existen episodios en los que se relaciona más de una sustancia.

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.2.10.

Porcentaje de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de drogas ilegales, según tipo de sustancia psicoactiva (total, hombres y mujeres). España\*, 2013.



	Cocaína	Alcohol	Cannabis	Hipnosedantes	Heroína	Anfetaminas	Éxtasis y der.	Alucinógenos	I. volátiles
Total	44,9	38,7	34,6	17,8	11,9	9,0	4,8	2,6	0,4
Hombres	45,9	39,4	35,3	17,0	12,6	9,0	4,6	2,7	0,3
Mujeres	42,3	36,3	32,6	20,1	10,0	9,1	5,1	2,3	0,5

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias.

FUENTE: OEDT. Indicador Urgencias hospitalarias en consumidores de sustancias psicoactivas.

## 2.3. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, 1999- 2013

### 2.3.1.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas, según diferentes fuentes de información. España, 1983-2013.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Estimación nacional	266	440	453	516	741	1.067	1.440	1.440	1.833	1.760	1.399	1.067	1.051	1.310	1.127	1.049
Seis ciudades españolas	82	139	143	163	234	337	455	455	579	558	444	388	395	421	339	306
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Estimación nacional	972	1.012	923	1.079	900	796	1.004	820	703	773	739	706	736	707	727	
Seis ciudades españolas	291	284	268	229	270	212	242	218	188	139	181	182	181	195	196	
Indicador mortalidad	-	444	496	496	493	468	455	428	475	424	438	517	453	519	489	
INE	752	691	650	652	633	659	636	489	519	540	442	393	361	383	403	

Estimación Nacional: Estimación del Observatorio Español de la droga y las toxicomanías (OEDT) para el total de España a partir de datos del Registro Específico de Mortalidad del OEDT y datos del Registro General de Mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística)

Registro específico de mortalidad: seis ciudades españolas. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de seis ciudades españolas correspondientes con los partidos judiciales de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro específico de mortalidad: CCAA que notifican. Incluye las defunciones notificadas al registro específico de mortalidad por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas de todas las comunidades/ciudades autónomas que declaran al Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

Registro general de mortalidad del INE (Instituto Nacional de Estadística). Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías (OEDT).

### 2.3.2.

#### Características de los fallecidos por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas. España\*, 2003-2013.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Número de fallecidos	493	468	455	428	475	424	438	517	453**	519	489
Sexo (%)											
Varones	85,3	83,9	86,3	84,3	87,4	85,6	84,5	83,9	82,1	85,7	80,7
Mujeres	14,7	16,1	13,7	15,7	12,6	14,4	15,5	16,1	17,9	14,3	19,3
Edad media (años)	35,3	37,0	36,1	37,2	38,2	38,1	38,3	39,8	40,2	42,0	42,7
Grupo de edad (años)											
15-19	0,8	1,3	1,4	0,9	0,6	1,9	0,7	0,4	1,2	0,4	0,2
20-24	6,7	4,1	6,2	4,2	4,3	6,1	6,4	2,5	5,0	2,9	1,4
25-29	14,6	11,9	11,2	12,9	9,7	10,6	8,0	7,9	6,0	6,7	7,6
30-34	22,6	20,5	20,0	18,0	17,6	16,3	17,4	12,4	12,2	11,6	13,1
35-39	28,2	27,9	28,9	23,8	24,1	22,2	18,9	25,5	19,9	15,8	15,7
40-44	16,9	19,2	20,7	21,3	22,2	19,8	24,9	24,8	21,4	22,4	19,6
>= 45	10,2	15,1	11,6	18,9	21,5	23,1	23,7	26,5	34,0	40,3	42,3
Estado civil (%)											
Soltero	69,4	68,9	68,7	72,0	62,8	61,4	67,3	61,0	63,6	65,4	61,3
Casado	19,0	15,6	16,4	12,2	19,1	16,8	15,4	21,6	18,2	20,7	18,9
Separado/Divorciado	10,5	14,4	13,7	13,6	17,4	18,9	15,0	15,9	16,2	12,8	18,9
Viudo	1,0	1,1	1,1	2,2	0,7	2,9	2,3	1,5	2,0	1,1	1,1
Procedencia del cadáver (%)											
Domicilio	54,5	55,2	58,1	52,3	60,6	60,0	61,9	64,3	68,6	69,6	71,7
Hotel-Pensión	5,3	5,1	6,2	5,8	4,6	3,9	5,9	4,3	2,8	2,0	2,1
Calle	18,5	17,4	13,5	20,1	13,1	15,8	11,8	14,0	11,1	12,3	9,1
Local público	1,8	1,3	2,5	4,8	2,4	1,7	2,8	2,6	2,6	1,2	2,5
Hospital	10,6	9,5	6,4	7,7	5,7	6,8	6,1	3,9	5,1	5,6	5,6
Cárcel	1,1	3,5	4,8	3,9	3,7	4,9	4,0	3,7	4,9	4,0	3,1
Otra	8,2	8,1	8,5	5,3	9,8	7,0	7,3	7,1	4,9	5,4	6,0
Evidencias de consumo reciente (%)											
Sí	85,6	92,6	94,4	92,4	85,3	89,0	90,4	77,4	89,9	76,6	85,8
No	14,4	7,4	5,6	7,6	14,7	11,0	9,6	22,6	10,1	23,4	14,2
Evidencia de suicidio (%)											
Sí	12,1	8,8	5,7	10,8	8,8	9,0	8,5	9,7	12,4	8,1	11,1
No	87,9	91,2	94,3	89,2	91,2	91,0	91,5	90,3	87,6	91,9	88,9
Signos recientes venopunción (%)											
Sí	53,3	43,0	51,7	40,6	35,2	35,4	39,2	29,6	16,3	14,9	16,2
No	46,7	57,0	48,3	59,4	64,8	64,6	60,8	70,4	83,7	85,1	83,8
Muerte causada por patología previa agravada por el consumo de sustancias psicoactivas (%)											
Sí	35,4	32,6	35,5	28,6	20,4	26,6	30,9	31,4	37,2	37,4	36,0
No	64,6	67,4	64,5	71,4	79,6	73,4	69,1	68,6	62,8	62,6	64,0
Anticuerpos anti-VIH (%)											
Positivo	42,7	40,6	42,8	36,9	37,4	40,7	41,1	34,4	39,2	37,8	31,5
Negativo	57,3	59,4	57,2	63,1	62,6	59,3	58,9	65,6	60,8	62,2	68,5


\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

\*\* El número de fallecidos incluye 45 casos de Galicia de los que no se dispone de información desagregada para el resto de las variables.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

2.3.3.

Porcentaje de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España\*, 1983-2013.



	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Opioides	98,0	98,8	93,9	100,0	92,4	96,6	94,8	96,0	93,1	94,9	92,8	92,9	93,4	90,4	89,8	90,1
Cocaína	2,0	12,5	11,0	11,5	19,3	18,4	29,6	24,8	21,6	26,0	30,9	28,8	24,7	32,7	41,4	51,2
Hipnosedantes	13,7	22,5	41,5	46,0	33,8	40,2	43,8	47,4	37,2	37,9	37,4	48,4	54,8	47,7	58,6	47,4
Anfetaminas	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,9	3,8	3,2	4,3	4,9	4,0	8,6	2,8
Cannabis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	12,2	11,3
Éxtasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,5	0,0
Alcohol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,7	28,6	26,2
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Opioides	88,0	89,4	86,8	83,8	76,7	74,9	78,2	78,7	72,8	77,7	79,8	79,1	77,9	76,6	77,3	
Cocaína	63,3	54,4	51,7	54,2	62,2	60,1	69,2	60,0	67,0	60,2	59,1	57,3	52,2	58,6	54,1	
Hipnosedantes	48,8	58,5	55,2	54,0	48,0	48,7	54,1	50,7	46,9	45,1	42,2	58,4	65,0	63,2	62,8	
Anfetaminas	4,5	6,9	3,4	2,9	3,1	2,6	2,6	3,6	3,6	2,2	3,5	1,5	4,7	3,8	6,2	
Cannabis	14,3	15,2	18,7	20,0	16,7	16,7	20,9	16,8	14,6	15,6	22,8	23,8	24,5	22,4	21,6	
Éxtasis	1,8	1,6	1,5	2,5	1,6	1,9	0,4	1,7	1,1	1,4	1,1	0,8	1,7	1,7	1,1	
Alcohol	30,5	35,5	35,3	42,5	39,0	35,8	33,0	34,3	27,8	25,9	28,8	28,8	33,3	28,9	31,2	

\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.4.

Número y proporción (%) de muertes por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico. España\*, 2003-2013.

	2003		2004		2005		2006		2007		2008	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Opioides	376	76,7	349	74,9	356	78,2	338	78,7	340	72,8	324	77,7
Cocaína	305	62,2	280	60,1	315	69,2	250	60,0	313	67,0	251	60,2
Barbitúricos	1	0,2	2	0,4	5	1,1	4	1,0	0	0,0	0	0,0
Benzodiazepinas	234	47,8	225	48,3	241	53,0	203	48,7	212	45,4	186	44,6
Anfetaminas	15	3,1	12	2,6	12	2,6	15	3,6	17	3,6	9	2,2
Éxtasis y derivados	8	1,6	9	1,9	2	0,4	7	1,7	5	1,1	6	1,4
Cannabis	82	16,7	78	16,7	95	20,9	70	16,8	68	14,6	65	15,6
Alucinógenos	2	0,4	5	1,1	0	0,0	1	0,2	2	0,4	3	0,7
S. volátiles	0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	7	1,5	0	0,0
Alcohol	191	39,0	167	35,8	150	33,0	143	34,3	130	27,8	108	25,9
Casos analizados	490	100,0	466	100,0	455	100,0	428	100	475	100,0	424	100,0
	2009		2010		2011		2012		2013			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
Opioides			346	81,0	409	79,1	318	78,1	366	76,6	337	77,3
Cocaína			247	57,8	297	57,4	213	52,3	280	58,6	236	54,1
Barbitúricos			2	0,5	2	0,4	4	1,0	2	0,4	6	1,4
Benzodiazepinas			180	42,2	292	56,5	258	63,4	291	60,9	265	60,8
Anfetaminas			13	3,0	8	1,5	19	4,7	18	3,8	27	6,2
Éxtasis y derivados			4	0,9	4	0,8	7	1,7	8	1,7	5	1,1
Cannabis			88	20,6	123	23,8	100	24,6	107	22,4	94	21,6
Alucinógenos			0	0,0	2	0,4	2	0,5	3	0,6	1	0,2
S. volátiles			0	0,0	0	0,0	3	0,7	0	0,0	1	20,0
Alcohol			120	28,1	149	28,8	136	33,4	138	28,9	136	31,2
Casos analizados			427	97,5	517	100,0	408**	100,0	478	92,1	437	89,4


\* Comunidades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad

\*\* No se incluyen 45 casos de Galicia, ya que no se dispone de información desagregada por drogas.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.5.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (cocaína y otras sustancias distintas de los opioides, sólo cocaína, cocaína y alcohol). España\*, 1983-2013.




	Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol		Cocaína y no opioides	Sólo cocaína	Cocaína y alcohol
1983	0,0	0,0	-	1999	8,8	4,1	-
1984	0,0	0,0	-	2000	6,1	2,9	-
1985	2,1	0,7	-	2001	7,9	3,2	-
1986	0,0	0,0	-	2002	11,3	2,6	-
1987	1,7	0,9	-	2003	16,4	7,5	-
1988	0,9	0,0	-	2004	15,0	6,8	-
1989	1,8	1,3	-	2005	20,6	6,8	4,1
1990	0,4	0,0	-	2006	18,5	4,7	3,7
1991	1,0	0,0	-	2007	25,1	7,8	2,9
1992	0,6	0,4	-	2008	19,3	6,4	4,0
1993	3,3	1,2	-	2009	16,4	5,4	4,7
1994	2,8	0,6	-	2010	18,2	5,8	2,1
1995	3,5	1,2	-	2011	17,1	3,4	4,6
1996	3,9	2,3	-	2012	19,9	7,1	7,6
1997	5,5	2,4	-	2013	19,7	3,8	3,2
1998	7,3	3,1	-				

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.6.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (opioides y otras sustancias distintas de la cocaína, sólo opioides, opioides con benzodiacepinas (BZD) y/o alcohol)). España\*, 1983-2013.



	Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol		Opioides y no cocaína	Sólo opioides	Opioides, BZD y/o alcohol
1983	59,8	46,3	-	1999	31,5	7,6	-
1984	49,6	28,1	-	2000	40,3	9,2	-
1985	49,7	25,2	-	2001	41,7	8,7	-
1986	49,2	20,2	-	2002	40,5	7,1	-
1987	47,0	23,9	-	2003	30,8	5,9	-
1988	42,4	20,8	-	2004	29,7	6,4	-
1989	35,2	14,1	-	2005	26,6	4,1	16,9
1990	46,6	20,6	-	2006	36,8	4,7	17,6
1991	31,3	11,5	-	2007	30,7	7,8	14,5
1992	35,4	14,2	-	2008	34,3	7,0	15,3
1993	44,0	18,1	-	2009	37,8	7,5	13,9
1994	55,8	13,1	-	2010	39,8	6,3	16,0
1995	59,8	9,0	-	2011	42,9	4,4	16,9
1996	55,1	17,7	-	2012	37,9	2,7	24,3
1997	45,4	12,6	-	2013	42,8	4,6	29,3
1998	41,7	10,8	-				

\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.

### 2.3.7.

Porcentaje de defunciones por reacción aguda tras el consumo de sustancias psicoactivas, según el tipo de sustancia detectado en el análisis toxicológico (metadona, sólo metadona, metadona y no otro opioide, sólo metadona y benzodiazepinas). España\*, 1996-2013.

Año	Sólo metadona	Metadona	Metadona y no otro opioide	Sólo metadona y benzodiazepinas
1996	1,5	–	–	–
1997	0,9	–	–	–
1998	0,9	–	–	–
1999	0,4	–	–	–
2000	1,2	–	–	–
2001	2,7	–	–	–
2002	1,8	–	–	–
2003	0,6	–	–	–
2004	0,4	–	–	–
2005	0,6	36,5	15,1	3,0
2006	2,8	39,8	27,4	3,3
2007	4,2	37,5	24,4	4,8
2008	2,4	30,0	20,6	4,2
2009	2,6	32,4	21,9	3,2
2010	2,7	47,4	30,7	4,6
2011	2,2	49,7	34,6	5,9
2012	1,1	52,2	40,2	5,9
2013	2,1	47,8	34,8	4,6


\* Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al Indicador Mortalidad.

FUENTE: OEDT. Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas.



### 2.3.8.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según sexo (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013.



	Hombres	Mujeres	Total
1999	657	95	752
2000	610	81	691
2001	558	92	650
2002	564	88	652
2003	552	81	633
2004	568	91	659
2005	539	97	636
2006	417	72	489
2007	462	57	519
2008	470	70	540
2009	366	76	442
2010	330	63	393
2011	291	70	361
2012	324	59	383
2013	333	70	403

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).

2.3.9.

Número de defunciones por consumo de sustancias psicoactivas ilegales, según edad (Registro de Mortalidad del INE). España, 1999-2013.



	< 35 años	≥ 35 años	Total
1999	505	247	752
2000	429	262	691
2001	391	259	650
2002	349	303	652
2003	310	323	633
2004	285	374	659
2005	262	374	636
2006	200	289	489
2007	192	327	519
2008	193	347	540
2009	141	301	442
2010	108	285	393
2011	101	260	361
2012	104	279	383
2013	93	310	403

Nota: Se incluyen los códigos CIE-10: F11-F12, F14-F16, F19, X42, X44, X62, Y12.

FUENTE: Gráfico elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) a partir de datos del registro General de Mortalidad. Instituto Nacional de Estadística (INE).