

# ESTADÍSTICAS 2019

Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LAS DROGAS Y LAS ADICCIONES

**INDICADOR ADMISIONES A TRATAMIENTO  
POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,  
1987-2017**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE SERVICIOS SOCIALES

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO  
PARA EL PLAN NACIONAL  
SOBRE DROGAS

## GESTIÓN, ANÁLISIS Y REDACCIÓN

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).  
Begoña BRIME. Noelia LLORENS. Fernando MÉNDEZ. Marta MOLINA. Eva SÁNCHEZ.

## RESPONSABLES EN LAS COMUNIDADES/CIUDADES AUTÓNOMAS

### Andalucía

Fernando ARENAS  
Rosario BALLESTA  
Izaskun BILBAO  
Pedro Manuel SEJO  
Mercedes SUÁREZ

### Aragón

Carmen BARANGUAN  
Francisco Javier FALO  
Laura JOSÉ

### Asturias

Rafael COFIÑO  
José Antonio GONZÁLEZ  
José Ramón HEVIA

### Baleares

Francisca BIBILONI  
Rut SUÁREZ  
Juana María VANRELL

### Canarias

Nicolás AMADOR  
Marcos GASPAS  
Concepción María GIL  
Luz Marina MORENO

### Cantabria

Mª Carmen DIEGO  
Ángela HIGUERA  
Paloma NAVAS  
Antonia RUEDA

### Castilla-La Mancha

Carlos ALONSO  
Juan José CAMACHO  
Carmen DE PEDRO

### Castilla y León

Susana REDONDO  
Ana SÁNCHEZ  
Esperanza VÁZQUEZ

### Cataluña

Mª Teresa BRUGAL  
Joan COLOM  
Xavier MAJO  
Regina MUÑOZ

### Extremadura

Mercedes CORTÉS  
Mª Pilar MORCILLO

### Galicia

Sara CERDEIRA  
Jaime FRAGA  
María TAJES  
Sergio VEIGA  
Raquel ZUBIZARRETA

### Madrid

Carmen Yolanda FUENTES  
Mª Angeles GUTIÉRREZ  
Ana RUIZ

### Murcia

Mónica BALLESTA  
Mª Dolores CHIRLAQUE  
Juan Francisco CORREA  
Purificación ROS  
José Carlos VICENTE

### Navarra

Raquel GONZÁLEZ  
Miguel MARTÍNEZ  
Mª Ángeles NUIÑ

### País Vasco

Elena ALDASORO  
Juan José AURREKOETXEA  
Nieves RODRÍGUEZ-SIERRA

### La Rioja

Cristina NUEZ  
Enrique RAMALLE

### Comunidad Valenciana

Inmaculada CLEMENTE  
Ofelia JIMENO  
Mª Jesús MATEU  
Francisco VERDÚ

### Ceuta

Miguel Ángel MANCILLA  
Cleopatra R'KAINA

### Melilla

Luisa Fernanda HERMOSO

## AGRADECIMIENTOS

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quieren agradecer su contribución a este informe a:

- Coordinadores de los departamentos autonómicos de drogas, los trabajadores de los sistemas de información sobre drogas en las Comunidades Autónomas; así como a todas las instituciones y personas que aportan rutinariamente información al sistema, en particular a los centros de tratamientos de drogas, los servicios de urgencia hospitalarios, los institutos de medicina legal, las unidades de tratamiento de Instituciones Penitenciarias, los laboratorios de toxicología y los centros educativos de enseñanzas secundarias.
- Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Ministerio del Interior.
- Comisionado para el Mercado de Tabacos. Ministerio de Hacienda.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas.
- Integrantes del Sistema Español de Alerta Temprana, entre los que se incluyen el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales, el Instituto de Toxicología del Ministerio de Defensa, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Centro del Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Plan Nacional sobre Sida, el Centro Nacional de Epidemiología, responsables en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas y Organizaciones No Gubernamentales, especialmente Energy Control, Ai Laket y Cruz Roja Española.

## CONTACTO

Dirección: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17 - 28008 Madrid  
Teléfono: 91 822 00 00 - Fax: 91 822 61 08  
Correo electrónico: cendocupnd@mscbs.es  
Internet: <http://www.pnsd.mscbs.gob.es/>

## EDITA Y DISTRIBUYE

© MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL  
Centro de Publicaciones

© SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES  
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

NIPO: 731-19-091-2

# ÍNDICE

## Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2017

5

### Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Evolutivo, hasta 2017

2.1.1.	Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2017 . . . . .	5
2.1.2.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2017 . .	6
2.1.3.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2017 . . . . .	7
2.1.4.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2017 . .	8
2.1.5.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2017 . . . . .	9
2.1.6.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2017 . . . . .	10
2.1.7.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2017 . .	10
2.1.8.	Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2017 . .	11
2.1.9.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2017 . . . . .	12
2.1.10.	Número de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2017 . . . . .	13
2.1.11.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2017 . . . . .	14
2.1.12.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2017 . . . . .	15
2.1.13.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2017 . . . . .	16
2.1.14.	Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2017 . . . . .	17
2.1.15.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017 . . . . .	18
2.1.16.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017 . . . . .	19
2.1.17.	Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017 . . . . .	20

2.1.18.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017 . . . . .	21
2.1.19.	Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2017 . . . . .	22
2.1.20.	Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2017 . .	23
2.1.21.	Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2017 . . . . .	24
2.1.22.	Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2017 . . . . .	25

**Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Datos 2017**


---

2.1.23.	Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2017 . . . . .	26
2.1.24.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2017 . . . . .	27
2.1.25.	Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años y nacidos fuera de España). España, 2017 . . . . .	28
2.1.26.	Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2017 . . . . .	29
2.1.27.	Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2017 . . . . .	30
2.1.28.	Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2013-2017 . . . . .	32
2.1.29.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2017 . . . . .	33
2.1.30.	Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2017 . . . . .	35

# Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1987-2017

## 2.1.1.

Número de admisiones a tratamiento por drogas ilegales. España, 1998-2017.




	Nº de admisiones
1998	54.338
2002	46.744
2004	52.128
2005	50.630
2006	49.283
2007	50.555
2008	53.155
2009	52.549
2010	53.434
2011	50.281
2012	49.678
2013	51.946
2014	48.926
2015	47.308
2016	45.637
2017	46.799

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.2.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. España, 1991-2017.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	15.277	13.296	30.146	2005	3.604	14.005	18.653
1992	20.017	15.956	37.239	2006	3.318	14.502	18.803
1993	18.977	16.703	37.188	2007	3.672	14.331	18.904
1994	18.770	17.526	37.225	2008	3.840	13.616	17.456
1995	17.878	20.369	40.007	2009	3.412	12.750	16.989
1996	16.647	28.382	46.635	2010	4.526	12.166	17.325
1997	12.993	30.173	44.089	2011	2.951	10.391	13.898
1998	11.867	30.756	43.598	2012	2.555	9.302	12.238
1999	10.473	26.031	37.417	2013	2.572	8.940	11.756
2000	8.151	26.412	34.563	2014*	2.356	8.555	10.911
2001	7.461	24.844	32.305	2015	2.202	7.713	10.978
2002	5.051	21.162	26.213	2016	2.353	7.907	10.807
2003	4.337	17.867	23.225	2017	2.259	7.775	10.384
2004	3.836	15.617	20.532				


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.3.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (en general). España, 1991-2017.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1991	681	262	-	2005	15.258	7.562	23.746
1992	932	367	-	2006	13.463	8.036	22.242
1993	1.146	431	-	2007	13.429	8.753	23.037
1994	1.265	491	-	2008	12.847	10.786	24.680
1995	1.415	516	-	2009	12.142	9.107	23.132
1996	1.892	932	-	2010	12.130	9.095	22.087
1997	3.129	1.402	-	2011	10.637	8.889	20.335
1998	4.174	1.838	-	2012	10.142	8.855	19.497
1999	6.126	2.576	-	2013	10.734	8.726	19.848
2000	5.499	2.773	-	2014*	9.683	8.182	17.864
2001	5.977	3.046	-	2015	8.445	7.248	17.327
2002	7.125	3.893	11.904	2016	9.052	7.678	17.889
2003	11.851	5.893	18.359	2017	10.393	9.025	20.168
2004	14.126	6.747	21.646				


\* Datos relacionados con la variable tratamiento previo son estimados para el conjunto nacional, debido a que algunas CCAA han aportado sólo información parcial de esta variable.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.4.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. España, 1996-2017.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	1.300	230	–	2007	4.619	1.114	5.936
1997	1.768	387	–	2008	5.058	2.055	7.419
1998	2.412	407	–	2009	7.273	1.705	9.503
1999	2.335	418	–	2010	8.639	2.101	11.192
2000	2.487	408	–	2011	9.736	2.603	12.873
2001	2.966	540	–	2012	10.982	3.402	14.869
2002	3.972	665	4.772	2013	12.912	3.585	16.914
2003	4.613	871	5.711	2014*	12.968	3.510	16.478
2004	5.319	928	6.500	2015	11.185	3.448	15.676
2005	4.426	844	5.524	2016	9.278	3.208	13.304
2006	4.125	941	5.304	2017	9.122	3.314	12.932

\* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.


Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



## 2.1.5.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de hipnosedantes. España, 1996-2017.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total		Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
1996	109	77	–	2007	503	261	795
1997	144	111	–	2008	463	352	845
1998	197	143	–	2009	598	312	963
1999	165	147	–	2010	580	323	944
2000	214	154	–	2011	709	386	1.143
2001	299	170	–	2012	648	421	1.083
2002	350	242	–	2013	787	374	1.175
2003	382	225	–	2014*	871	321	1.192
2004	441	224	693	2015	742	256	1.068
2005	383	209	618	2016	772	282	1.105
2006	466	223	717	2017	721	269	1.032


\* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.6.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. España, 1996-2017.




	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfetaminas	319	323	347	339	288	255	342	266	330	386	426	415	400	461	501	595	512	671	635	636	699	608
Éxtasis	226	237	154	135	240	335	452	254	236	229	165	172	155	127	93	102	134	201	133	157	89	68
Alucinógenos	74	85	62	50	64	83	68	63	44	39	37	43	43	69	66	83	107	120	82	77	82	73

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.7.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de ketamina. España, 2005-2017.




	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	8	10	22	20	43	46	54	66	70	49	42	54	52

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.8.

Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. España, 2005-2017.



	Primeros tratamientos	Con tratamiento previo	Total
2005	10.096	8.133	18.950
2006	10.172	8.611	19.454
2007	9.898	8.587	19.224
2008	9.395	9.753	26.318
2009	10.924	11.288	27.958
2010	15.126	11.764	28.111
2011	11.612	10.350	29.014
2012	14.816	12.714	28.234
2013	15.121	12.978	28.652
2014*	15.240	12.418	27.658
2015	13.457	11.254	27.469
2016	13.319	11.323	26.655
2017	13.060	11.556	25.753


\* Datos estimados para el conjunto nacional porque algunas CCAA no han recogido la variable tratamiento previo.

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable tratamiento previo

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.9.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (total admitidos a tratamiento). España, 1996-2017.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	31.046	24.224
1997	29.419	21.605
1998	28.527	18.910
1999	24.520	15.562
2000	24.941	13.955
2001	19.988	10.898
2002	17.950	9.583
2003	15.806	7.966
2004	13.605	6.516
2005	12.252	5.620
2006	11.601	4.892
2007	12.487	5.055
2008	12.066	5.050
2009	9.637	3.763
2010	9.697	3.549
2011	8.195	3.010
2012	7.580	2.562
2013	7.026	2.237
2014**	6.360	1.664
2015	5.904	2.413
2016	6.117	2.621
2017	5.946	2.691


\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.10.

Número\* de inyectores admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas (admitidos a tratamiento por primera vez). España, 1996-2017.



	Inyección alguna vez en la vida	Inyección en 12 meses previos a la admisión
1996	8.801	7.132
1997	7.154	5.488
1998	6.247	4.526
1999	5.315	3.655
2000	5.055	2.793
2001	3.483	2.181
2002	2.765	1.801
2003	2.722	1.583
2004	2.356	1.303
2005	2.283	1.228
2006	1.879	928
2007	2.073	1.060
2008	2.271	1.124
2009	1.687	866
2010	2.196	979
2011	1.635	702
2012	1.393	523
2013	1.457	530
2014**	1.065	261
2015	1.038	367
2016	1.141	416
2017	1.150	471


\* Para los datos de este gráfico se utiliza una estimación basada en los porcentajes válidos.

\*\* En 2014 varias CCAA no aportaron datos de inyección debido a la modificación del protocolo del indicador.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.11.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (total tratados). España, 1987-2017.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	24,8	19,7
1988	25,4	19,8
1989	25,7	19,8
1990	26,2	20,0
1991	26,4	20,3
1992	26,6	20,3
1993	27,2	20,3
1994	27,8	20,6
1995	28,5	20,6
1996	29,3	20,6
1997	30,0	20,7
1998	30,7	20,6
1999	31,3	20,8
2000	32,0	20,6
2001	32,0	20,8
2002	33,6	20,9
2003	33,9	20,7
2004	35,4	20,8
2005	35,6	20,6
2006	36,4	20,3
2007	36,8	21,0
2008	37,5	21,1
2009	37,9	20,9
2010	38,4	21,4
2011	39,3	20,8
2012	40,4	20,7
2013	40,8	20,9
2014	40,9	21,1
2015	41,3	21,5
2016	41,6	21,1
2017	42,6	21,5

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.12.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de heroína (tratados por primera vez). España, 1991-2017.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	25,7	20,6
1992	26,0	20,6
1993	26,4	20,7
1994	27,3	21,0
1995	27,9	21,2
1996	28,6	21,3
1997	29,2	21,4
1998	29,9	21,2
1999	30,3	21,8
2000	30,9	22,1
2001	31,4	22,3
2002	31,8	22,6
2003	31,9	22,3
2004	33,0	22,8
2005	33,0	22,0
2006	33,0	21,5
2007	34,1	23,3
2008	35,0	22,9
2009	34,5	22,8
2010	35,0	23,5
2011	36,7	22,6
2012	38,1	22,4
2013	38,2	22,3
2014	37,9	23,5
2015	38,0	23,8
2016	38,2	23,5
2017	39,9	24,1

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.13.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (total tratados). España, 1987-2017.



	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1987	25,4	20,9
1988	26,1	21,3
1989	26,2	21,2
1990	26,5	21,4
1991	27,0	21,9
1992	27,6	22,1
1993	27,9	22,0
1994	28,5	22,0
1995	29,1	22,5
1996	29,3	22,3
1997	29,1	22,2
1998	29,1	22,1
1999	28,6	21,7
2000	29,1	21,5
2001	29,8	21,6
2002	29,8	21,9
2003	29,8	21,3
2004	30,0	21,3
2005	30,5	21,0
2006	31,2	20,8
2007	31,7	21,2
2008	32,1	21,0
2009	32,5	20,7
2010	33,3	20,9
2011	33,9	20,7
2012	34,5	20,7
2013	35,0	20,6
2014	35,3	20,6
2015	35,9	20,7
2016	35,9	20,4
2017	36,6	20,6


Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



## 2.1.14.

Edad media de admisión a tratamiento y edad del primer consumo de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína (tratados por primera vez). España, 1991-2017.




	Edad media de admisión a tratamiento	Edad media primer consumo
1991	26,6	21,9
1992	27,2	22,3
1993	27,6	22,3
1994	28,2	22,2
1995	28,6	22,6
1996	28,8	22,4
1997	28,6	22,4
1998	28,4	22,2
1999	27,8	21,9
2000	28,2	21,6
2001	29,0	21,8
2002	28,8	21,7
2003	28,8	21,5
2004	29,1	21,4
2005	30,0	21,1
2006	30,4	20,9
2007	30,8	21,5
2008	31,2	21,1
2009	31,6	20,9
2010	32,4	21,2
2011	33,0	21,1
2012	33,4	21,1
2013	33,9	21,0
2014	34,1	20,8
2015	34,8	21,1
2016	34,8	21,1
2017	35,4	21,2

Nota: Las edades medias de inicio de consumo correspondientes a 2016 se han calculado excluyendo los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña por problemas de notificación.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.15.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	6.188	7.164	822
1992	9.585	8.232	1.219
1993	10.493	7.129	995
1994	10.873	6.435	978
1995	11.161	5.033	1.028
1996	10.934	4.488	696
1997	8.487	3.011	887
1998	7.884	2.518	910
1999	7.033	1.969	968
2000	5.917	1.414	532
2001	5.461	1.276	471
2002	3.540	894	399
2003	2.805	748	386
2004	2.690	648	358
2005	2.487	544	350
2006	2.320	486	303
2007	2.842	470	327
2008	2.891	455	285
2009	2.719	386	256
2010	3.589	465	258
2011	2.211	365	201
2012	1.870	276	159
2013	2.047	283	175
2014	1.670	154	125
2015	1.831	167	145
2016	1.982	186	146
2017	1.870	209	147

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.16.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017.




	Pulmonar	Inyectada	Esnifada
1991	43,4	50,3	5,8
1992	50,0	42,9	6,4
1993	56,1	38,1	5,3
1994	59,2	35,0	5,3
1995	64,5	29,1	5,9
1996	67,0	27,5	4,3
1997	67,2	23,8	7,0
1998	68,3	21,8	7,9
1999	69,3	19,4	9,5
2000	74,1	17,7	6,7
2001	74,9	17,5	6,5
2002	71,8	18,1	8,1
2003	69,3	18,5	9,5
2004	68,0	16,4	9,0
2005	69,0	15,1	9,7
2006	73,8	15,5	9,6
2007	77,4	12,8	8,9
2008	78,5	12,4	7,7
2009	79,7	11,3	7,5
2010	82,0	10,6	5,9
2011	77,7	12,8	7,1
2012	78,3	11,6	6,7
2013	79,6	11,0	6,8
2014	80,6	7,4	6,0
2015	83,7	7,6	6,6
2016	84,7	7,9	6,2
2016	84,7	7,9	6,2
2017	83,0	9,3	6,5

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.17.

Número de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína, según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	315	139	109
1992	547	196	121
1993	611	278	108
1994	714	238	97
1995	739	287	74
1996	1.307	413	82
1997	2.172	741	100
1998	3.073	856	128
1999	4.777	1.048	128
2000	4.067	1.172	105
2001	4.413	1.284	91
2002	5.613	1.403	156
2003	9.228	1.242	485
2004	11.140	1.837	693
2005	12.298	1.755	793
2006	11.155	1.617	103
2007	11.393	1.295	130
2008	10.391	1.276	117
2009	10.272	1.139	136
2010	9.952	1.203	166
2011	8.787	1.205	97
2012	8.346	781	95
2013	8.995	1.320	129
2014	6.798	986	56
2015	7.005	1.078	30
2016	7.564	1.107	33
2017	8.730	1.304	36

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.18.

Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de cocaína (en general), según la vía principal de administración de esta droga. España, 1991-2017.




	Esnifada	Pulmonar	Inyectada
1991	55,4	24,4	19,2
1992	62,7	22,5	13,9
1993	60,8	27,7	10,7
1994	67,4	22,5	9,2
1995	66,5	25,8	6,7
1996	71,7	22,6	4,5
1997	71,0	24,2	3,3
1998	74,8	20,8	3,3
1999	79,5	17,4	2,1
2000	75,2	21,7	1,9
2001	75,2	21,9	1,6
2002	77,0	19,2	2,1
2003	83,0	11,2	4,4
2004	80,9	13,3	4,8
2005	80,6	11,5	5,2
2006	86,0	12,5	0,8
2007	88,0	10,0	1,0
2008	86,9	10,7	1,0
2009	87,7	9,7	1,2
2010	86,8	10,5	1,4
2011	85,5	11,7	0,9
2012	88,3	8,3	1,0
2013	83,8	12,3	1,2
2014	82,6	12,0	0,7
2015	83,5	12,9	0,4
2016	83,9	12,3	0,4
2017	84,3	12,6	0,3

Nota: El sumatorio puede o no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en la variable vía de administración y la existencia de otras vías de administración.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.19.


Porcentaje de admisiones a tratamiento (primera vez) por abuso o dependencia de heroína, cuya vía principal de administración era la parenteral, según CCAA. España, 1991-2017.



FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.20.

Evolución del porcentaje de personas admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, según la droga ilegal consumida (durante los 30 días previos a la admisión). España, 2005-2017.




	Opioides	Cocaína	Estimulantes	Cannabis	Hipnosedantes
2005	5,7	57,4	5,9	42,7	8,9
2006	6,1	58,7	5,2	44,1	9,0
2007	6,4	58,0	4,6	43,3	8,5
2008	6,1	66,1	4,3	49,1	10,6
2009	5,9	61,5	3,9	50,9	9,8
2010	6,6	63,4	4,3	52,0	9,9
2011	6,5	63,7	4,9	51,6	9,3
2012	7,1	62,1	4,6	52,9	10,1
2013	6,7	60,8	4,8	53,5	9,1
2014*	4,5	56,7	2,8	48,3	8,1
2015	5,3	60,3	4,4	51,4	8,2
2016	4,4	62,3	4,1	51,1	7,3
2017	4,5	64,0	4,0	49,5	8,0

\* El 76,6% de los admitidos a tratamiento por alcohol sólo han consumido alcohol (30 días previos a la admisión a tratamiento). Los porcentajes de esta tabla están calculados sobre el 23,4% restante (n= 6.428) que ha consumido otras sustancias (30 días previos a la admisión a tratamiento).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.21.

Prevalencia de infección por VIH (total y según sexo) entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico (%). España, 1996-2017.



	Hombres	Mujeres	Total
1996	35,9	43,4	37,1
1997	32,4	41,0	33,7
1998	32,4	39,7	33,6
1999	31,9	40,2	33,0
2000	32,7	37,9	33,5
2001	32,7	40,2	33,7
2003	31,5	39,3	32,6
2004	27,7	38,3	29,3
2005	31,5	39,5	32,7
2006	32,7	37,4	33,4
2007	30,0	36,2	30,9
2008	26,7	33,3	27,6
2009	26,0	32,2	26,9
2010	29,8	31,7	30,2
2011	28,5	30,0	28,7
2012	28,2	30,0	28,4
2013	24,2	26,1	24,4
2014	26,3	24,4	26,0
2015	33,4	35,4	33,7
2016	33,9	39,0	34,6
2017	31,3	37,6	32,0

Los porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016 y 2017.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



2.1.22.

Prevalencia (%) de infección por VIH entre los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de drogas psicoactivas que han utilizado la vía inyectada en el último año y que conocían su estado serológico, según edad. España, 1996-2017.



	<25 años	25-34 años	>34 años
1996	20,3	39,3	48,9
1997	17,5	34	46,4
1998	15,1	33,4	45,8
1999	15,2	32	44
2000	13,1	30,5	45,5
2001	14	29,1	44,4
2002	12,1	26,7	42,8
2003	9,2	25,5	43,8
2004	7,1	20,9	39,4
2005	9,7	23,1	41,9
2006	7,2	21,4	42,2
2007	3,2	18,7	40,3
2008	3,2	16,9	35,6
2009	2,2	15,2	34,7
2010	8,1	14,8	38
2011	9,9	14,5	35,6
2012	8,6	11,7	35,4
2013	4,7	8,9	30,4
2014	5,9	12,0	31,2
2015	11,5	12,1	38,4
2016	3,1	16,0	39,3
2017	4,2	19,7	35,1

os porcentajes están calculados sobre el número de casos con información sobre el estado serológico VIH y sobre las variables de cruce. La proporción de inyectores admitidos a tratamiento que desconocía su estado serológico frente al VIH fue de 33,5% en 1997, 29,4% en 1999, 25,5% en 2001, 26,1% en 2003, 27,5% en 2004, 26,7% en 2005, 21,8% en 2006, 23,2% en 2007, 29,5% en 2008, 16,9% en el 2009, 18,1% en 2010, 18,3% en 2011, 18,6% en 2012, 26,4% en 2013, 27,2% en 2014, 29,1% en 2015 y 30% en 2016 y 2017.

FUENTE OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

### 2.1.23.


Número y porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal. España, 2017.

Droga principal por la que es admitido a tratamiento	Número de admisiones a tratamiento	% respecto al total de admisiones
Cocaína	20.168	27,8
Cocaína polvo	17.566	24,2
Cocaína base	2.600	3,6
Opioides	11.632	16,0
Heroína	10.384	14,3
Metadona (mal uso)	441	0,6
Otros opioides	807	1,1
Cannabis	12.932	17,8
Hipnosedantes	1.032	1,4
Estimulantes	867	1,2
Anfetaminas	689	0,9
Éxtasis y derivados	68	0,1
Otros estimulantes	110	0,2
Alucinógenos	73	0,1
Inhalantes volátiles	22	0,0
Otras drogas ilegales	73	0,1
Alcohol	25.753	35,5
<b>Total drogas ilegales</b>	<b>46.799</b>	<b>-</b>
<b>Total drogas ilegales y alcohol</b>	<b>72.552</b>	<b>-</b>

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

2.1.24.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales, según droga principal, incluye alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2017.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	16,0	7,7	0,2	15,7
Cocaína	27,8	28,2	2,4	22,2
Cannabis	17,8	24,8	94,3	19,9
Otros estimulantes (anfetaminas, éxtasis, etc.)	1,2	1,5	0,3	1,5
Alcohol	35,5	35,5	2,2	39,5
Número de admisiones	72.552	36.798	2.458	8.099


\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.25.

Porcentaje de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según droga principal, sin alcohol (total de admitidos, admitidos por primera vez, menores de 18 años\* y nacidos fuera de España) (%). España, 2017.



	Todas las admisiones	Admitidos primera vez en la vida	Admitidos menores 18 años*	Nacidos fuera de España
Opioides	24,9	12,0	0,2	25,9
Cocaína	43,1	43,8	2,5	36,6
Cannabis	27,6	38,4	96,3	32,9
Otros estimulantes	1,9	2,2	0,3	1,8
Otras sustancias	2,5	3,6	0,7	2,8
Número de admisiones	46.799	23.738	2.405	4.900


\* Todos los admitidos a tratamiento menores de 18 años.

Nota: El porcentaje puede no sumar 100% debido a que en esta figura sólo se representan algunas drogas.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

2.1.26.

Número y tasa (por 100.000 habitantes) de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, según Comunidad/Ciudad Autónoma. España, 2017.



	NÚMERO DE CASOS (Total: 45.637)	TASAS (España 98 casos/100.000 habitantes)
Melilla	139	163,64
Andalucía	11.724	139,42
Extremadura	1.453	134,85
Canarias	2.888	134,02
C. Valenciana	6.377	129,22
Baleares	1.266	110,00
Galicia	2.824	104,20
Cataluña	7.231	97,18
Madrid	5.662	87,42
Cantabria	468	80,48
Castilla - La Mancha	1.539	75,41
Murcia	1.100	74,68
La Rioja	232	74,21
País Vasco	1.449	66,86
Ceuta	51	59,98
Aragón	753	57,22
Castilla y León	1.273	52,26
Navarra	166	25,92
Asturias	204	19,72

Tasas brutas. Población de cada CCAA a 1 de enero de 2017 (Datos INE).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.27.

Características sociodemográficas y del consumo del total de admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas ilegales y según hayan tenido tratamiento previo y según sexo (%). España, 2017.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Total	46.799	21.353	23.738	39.065	7.688
Tratamiento previo (%)					
Sí	47,4	100	0,0	48,6	41,2
No	52,6	0,0	100	51,4	58,8
Edad (años)	35,6	38,8	32,7	35,6	35,7
Sexo (%)					
Hombre	83,6	85,8	81,7	100	0,0
Mujer	16,4	14,2	18,3	0,0	100
Máximo nivel de estudios* (%)					
Sin estudios	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0
Primaria	55,5	57,3	54,2	56,6	49,7
Secundaria	38,8	37,5	39,7	38,0	42,7
Ha finalizado estudios superiores	4,8	4,2	5,2	4,4	6,6
Situación laboral (%)					
Trabajo	32,8	30,7	34,3	34,3	25,0
Parado no trabajado antes	6,4	5,9	7,0	6,1	8,0
Parado habiendo trabajado antes	39,5	44,2	35,7	39,1	41,4
Otras	21,3	19,2	23,0	20,5	25,6
Fuente de referencia principal (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	6,3	11,3	1,9	6,1	7,3
Médico general, Atención Primaria de Salud	11,4	7,4	15,2	11,2	12,6
Hospitales u otros servicios de salud	7,7	5,7	9,4	6,8	12,3
Servicios Sociales	3,3	2,2	4,3	2,5	7,5
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	6,4	9,1	4,1	7,1	2,9
Servicios legales o policiales	6,1	5,1	7,2	6,6	3,7
Empresas o empleador	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Familiares y amigos	12,4	7,7	16,9	12,7	10,9
Iniciativa propia	43,4	49,2	37,4	44,2	39,2
Servicios de educación	0,6	0,2	0,8	0,5	0,9
Otra	2,4	2,0	2,7	2,3	2,7
Convivencia (%)					
Solo/a	14,2	16,4	12,2	14,4	13,0
Únicamente con pareja	11,2	11,5	10,7	10,3	16,0
Únicamente con hijos/as	3,3	3,3	3,4	2,3	8,9
Con la pareja e hijos/as	17,1	16,3	18,1	17,4	15,7
Con padres o familia de origen	38,2	33,3	42,7	39,3	32,9
Con amigos/as	3,0	3,4	2,5	2,8	3,8
Detenido (ej. centro penitenciario, centro inserción social)	7,2	9,3	5,6	8,1	3,0
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,1	2,6	1,7	2,0	2,5
Otros	3,5	4,1	3,1	3,4	4,2

## 2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Alojamiento principal en los 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	86,2	81,9	90,0	85,5	89,7
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	6,9	9,1	5,1	7,9	2,3
Otras instituciones	2,5	3,1	2,0	2,4	2,8
Pensiones, hoteles, hostales	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4
Alojamiento inestable/precario	3,3	4,3	2,2	3,1	4,1
Otros lugares	0,7	0,9	0,5	0,7	0,7
Español o extranjero (%)					
Español	89,4	91,0	88,0	89,4	89,2
Extranjero	10,6	9,0	12,0	10,6	10,8
Droga principal por la que es admitido a tratamiento (%)					
Opioides	24,9	39,4	12,0	25,1	23,5
Heroína	22,2	36,4	9,5	22,8	19,1
Metadona	0,9	1,1	0,8	0,9	1,2
Otros opioides	1,7	1,8	1,6	1,4	3,2
Cocaína	43,1	42,3	43,8	44,4	36,3
CLH Cocaína	37,5	36,1	38,9	38,8	31,3
Cocaína base	5,6	6,1	4,8	5,7	5,0
Cocaína Otras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estimulantes sin cocaína	1,9	1,4	2,2	1,8	2,2
Anfetaminas	1,3	1,1	1,5	1,2	1,6
Metanfetaminas	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2
MDMA y derivados	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1
Otros estimulantes	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Hipnosedantes	2,2	1,3	3,0	1,4	6,3
Alucinógenos	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Inhalables volátiles	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Cannabis	27,6	15,5	38,4	26,9	31,1
Alcohol	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras sustancias	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	19,8	19,6	19,9	19,4	21,8
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	46,0	41,8	49,7	45,1	50,4
4-6 días/semana	8,7	7,5	9,7	9,0	7,3
2-3 días/semana	14,1	12,4	15,7	14,6	12,0
1 día/semana	5,5	5,1	6,0	5,6	5,2
Menos de 1 día/semana	6,9	7,4	6,5	7,0	6,6
No consumió	18,7	25,8	12,5	18,8	18,5

## 2.1.27. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombres	Mujeres
Vía más frecuente de consumo de la droga principal en los últimos 30 días (%)					
Oral	5,7	4,5	6,8	4,5	11,4
Pulmonar	51,1	50,4	51,9	50,9	52,4
Intranasal	38,1	36,9	39,2	39,3	32,1
Parenteral	4,4	7,6	1,3	4,6	3,1
Otras	0,7	0,7	0,8	0,7	0,9
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	14,6	24,6	5,4	15,0	12,5
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	6,6	11,1	2,2	6,9	5,1
Prevalencia VIH mínima	4,1	6,5	1,8	3,9	4,6
Prevalencia VIH máxima	9,8	11,9	6,1	9,7	10,5
Prevalencia Hepatitis C mínima	7,5	13,4	2,3	7,5	7,2
Prevalencia Hepatitis C máxima	18,7	25,1	7,8	19,0	17,2
Prevalencia Hepatitis B mínima	0,7	1,0	0,3	0,7	0,5
Prevalencia Hepatitis B máxima	2,8	3,6	1,9	3,0	2,1

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido)

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

Nota: Debido al redondeo algunos totales no suman

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.28.

Número y porcentaje de personas admitidas a tratamiento por alcohol, según hayan consumido, en los 30 días previos a la admisión a tratamiento, sólo alcohol o alcohol y otras drogas. España, 2013-2017.

	2013		2014		2015		2016		2017	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Han consumido sólo alcohol	21.264	74,2	21.264	76,9	21.041	76,6	20.251	76,0	19.361	75,2
Han consumido alcohol y otras drogas	7.388	25,8	6.394	23,1	6.428	23,4	6.404	24,0	6.392	24,8
Una droga más	5.134	17,9	4.725	17,1	4.729	17,2	4.733	17,8	4.695	18,2
Dos drogas más	1.781	6,2	1.379	5,0	1.424	5,2	1.411	5,3	1.403	5,4
Tres o más drogas	473	1,7	290	1,0	275	1,0	260	0,9	294	1,1

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a Tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.



## 2.1.29.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol, siendo el alcohol la droga principal que motiva el tratamiento, según hayan tenido tratamiento previo y según sexo. España, 2017.

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombre	Mujer
Nº de casos	25.753	11.556	13.060	19.866	5.845
Tratados por primera vez por la droga principal (%)	53,1	0,0	100	52,8	53,9
Edad media (años)	46,8	47,8	45,9	46,7	47,2
Mujeres (%)	22,7	22,3	23,1	0,0	100,0
Máximo nivel de estudios completado (%)*					
Sin estudios	1,0	0,8	1,2	1,1	0,8
Enseñanza primaria	48,0	49,9	46,9	50,1	40,5
Enseñanzas secundarias	41,5	40,6	42,0	40,5	45,0
Estudios universitarios	9,5	8,7	9,9	8,3	13,6
Situación laboral principal (%)					
Trabajando	40,0	35,8	43,7	41,5	35,2
Parado no habiendo trabajado	2,7	3,2	2,9	2,5	3,2
Parado habiendo trabajado	35,9	38,2	34,0	35,0	39,0
Otras	21,4	23,5	19,5	21,1	22,6
Nacidos fuera de España (%)	12,7	10,1	14,6	11,7	15,7
Fuente principal que lo ha referido a tratamiento (%)					
Otros servicios de tratamiento de drogodependencias	3,3	5,6	1,4	3,2	3,6
Médicos generales, atención primaria de salud	25,9	20,0	31,9	25,9	25,8
Hospitales u otros servicios de salud	14,3	12,6	16,1	13,6	16,8
Servicios sociales	5,2	4,9	5,6	4,6	7,4
Prisiones, centros internamiento cerrado de menores	1,7	1,8	1,7	2,1	0,4
Servicios legales o policiales	2,1	2,1	2,1	2,4	1,1
Empresas o empleadores	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Familiares o amigos/as	11,4	9,7	13,4	11,8	10,4
Iniciativa propia	33,2	40,7	25,0	33,7	31,6
Otras	2,4	2,2	2,5	2,3	2,6
Servicios de educación	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Convivencia más prolongada en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Solo/a	21,1	23,0	19,6	21,7	19,2
Únicamente con pareja	15,5	15,3	15,4	14,7	18,2
Únicamente con hijos	5,5	5,5	5,5	3,3	13,2
Con pareja e hijos/as	24,1	21,7	26,6	24,4	23,1
Con padres o familia de origen	22,8	22,5	23,0	24,5	16,7
Con amigos	2,7	2,6	2,7	2,7	2,6
Otros	2,8	3,2	2,6	2,8	3,1
Detenido (centro penitenciario, centro inserción social)	2,9	3,0	2,8	3,2	1,8
En instituciones no detenido (albergue)	2,6	3,2	1,9	2,7	2,1

## 2.1.29. (continuación)

	Total	Tratamiento previo*		Sexo*	
		Sí	No	Hombre	Mujer
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Casas, pisos, apartamentos	91,0	89,7	92,3	90,0	94,3
Prisiones, centros de internamiento cerrado de menores	1,9	2,0	1,9	2,3	0,5
Otras instituciones	2,6	3,3	1,9	2,7	2,3
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4
Alojamientos inestables/precarios	2,8	7,5	2,5	3,1	1,7
Otros lugares	1,2	1,5	0,8	1,3	0,7
Otras sustancias consumidas en los últimos 30 días (%)					
Opioides	4,5	5,1	3,0	4,5	4,5
Cocaína	64,0	64,1	62,8	65,3	56,8
Estimulantes sin cocaína	4,0	3,6	4,1	3,7	5,5
Hipnosedantes	8,0	8,2	7,8	6,7	15,2
Alucinógenos	0,5	0,5	0,2	0,5	0,7
Inhalables volátiles	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Cannabis	49,5	47,1	51,3	50,7	43,4
Otras sustancias	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4
Edad al inicio del consumo de la droga principal (años)	–	17,9	18,5	17,4	21,4
Frecuencia de consumo de la droga principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)					
Todos los días	58,9	55,8	61,4	59,9	55,3
4-6 días/semana	6,5	6,1	6,9	6,3	7,2
2-3 días/semana	11,1	10,0	12,1	10,9	11,9
1 día/semana	4,0	3,7	4,4	3,9	4,6
Menos de 1 día/semana	4,8	5,3	4,4	4,5	6,0
No consumió	14,7	19,1	10,8	14,5	15,1
Se inyectó drogas alguna vez en la vida (%)	3,4	4,3	2,6	3,7	2,6
Se inyectó drogas en los últimos 12 meses (%)	0,6	0,8	0,4	0,6	0,6
Se inyectó drogas en los últimos 30 días (%)	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5
Prevalencia VIH mínima	1,1	1,2	1,0	1,1	1,3
Prevalencia Hepatitis C mínima	2,9	3,7	2,1	2,9	2,8
Prevalencia Hepatitis B mínima	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Prevalencia VIH máxima	3,2	2,9	3,6	3,2	3,4
Prevalencia Hepatitis C máxima	8,3	8,8	7,0	8,5	7,7
Prevalencia Hepatitis B máxima	2,6	2,6	2,6	2,6	2,59

\* El porcentaje puede no sumar 100% o el sumatorio puede no coincidir con el total debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

Prevalencia mínima: Positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocido)

Prevalencia máxima: Positivos entre los casos con información (positivos y negativos); en Hepatitis B (portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune).

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.

## 2.1.30.

Características de los admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, según la droga principal que motiva el tratamiento. España, 2017.

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Nº de casos	25.753	17.566	12.932	10.384	2.600	1.032	867	807	441	73	22
Tratamiento previo											
Sí	46,9	45,5	26,6	77,5	53,3	27,2	36,1	50,1	54,2	31,3	20,0
No	53,1	54,5	73,4	22,5	46,7	72,8	63,9	49,9	45,8	68,7	80,0
Sexo											
Hombre	77,3	86,3	81,5	85,8	85,2	52,7	80,7	69,7	79,1	84,7	72,7
Mujer	22,7	13,7	18,5	14,2	14,8	47,3	19,3	30,3	20,9	15,3	27,3
Edad	46,8	36,4	27,0	42,6	38,0	43,5	35,0	45,3	44,4	32,0	30,2
Máximo nivel de estudios											
Sin estudios	1,0	0,7	0,7	1,6	1,2	1,3	0,1	0,5	2,2	0,0	0,0
Primaria	48,0	50,0	55,7	65,1	61,5	51,2	40,4	51,2	64,3	29,6	85,0
Secundaria	41,5	43,5	39,6	30,2	34,1	37,0	48,2	40,5	30,6	62,0	15,0
Finalizado estudios superiores	9,5	5,9	4,0	3,0	3,2	10,5	11,3	7,7	2,9	8,5	0,0
Situación laboral											
Trabajo	40,0	48,3	24,0	19,9	27,9	24,4	39,1	22,3	19,7	47,0	15,0
Parado no trabajado antes	2,7	3,6	9,8	7,2	5,8	6,8	5,2	4,4	9,5	10,6	10,0
Parado habiendo											
trabajado antes	35,9	38,0	30,4	50,5	50,0	40,8	40,3	39,3	50,0	31,8	35,0
Otras	21,4	10,1	35,8	22,4	16,4	28,0	15,4	34,0	20,9	10,6	40,0
Español o extranjero											
Español	87,3	91,2	87,3	88,9	89,7	92,7	85,7	87,4	89,3	90,3	38,1
Extranjero	12,7	8,8	12,7	11,1	10,3	7,3	14,3	12,6	10,7	9,7	61,9
Fuente de referencia principal											
Otros servicios tto. drogodep.	3,3	4,5	2,1	14,2	5,8	3,4	4,3	13,9	22,2	7,0	4,5
Médico general, At. Primaria	25,9	13,3	13,0	4,6	9,5	23,3	15,8	20,3	3,4	15,5	4,5
Hospitales/otros serv. salud	14,3	6,8	10,9	3,0	4,8	22,9	15,0	17,2	6,0	9,9	31,8
Servicios Sociales	5,2	2,4	6,4	1,5	2,5	3,0	3,1	1,4	0,9	1,4	13,6
Prisión, centro de reforma o internamiento para menores	1,7	3,8	5,1	12,2	8,0	5,5	5,3	4,3	11,7	0,0	9,1
Servicios legales o policiales	2,1	4,8	11,2	2,3	7,9	2,3	7,2	2,2	0,7	5,6	9,1
Empresas o empleador	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Familiares y amigos	11,4	14,2	16,3	5,9	11,3	8,4	13,0	3,9	3,2	12,7	0,0
Iniciativa propia	33,2	48,3	29,6	54,2	47,5	28,7	33,7	34,9	49,5	43,7	27,3
Servicios de educación	0,1	0,2	1,6	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0
Otra	2,4	1,7	3,8	1,8	2,6	2,3	2,2	1,6	2,1	4,2	0,0

## 2.1.30. (continuación)

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Número de hijos	1,3	1,0	0,4	1,0	1,1	1,2	0,5	1,2	1,1	0,2	0,7
Convivencia											
Solo/a	21,1	13,4	9,8	19,2	16,2	17,0	19,6	17,9	20,5	19,4	22,7
Únicamente con pareja	15,5	12,9	7,2	12,4	12,0	15,9	11,1	17,2	13,5	13,9	9,1
Únicamente con hijos/as	5,5	3,9	2,9	2,4	2,5	8,7	3,9	5,3	3,3	5,6	0,0
Con la pareja e hijos/as	24,1	24,4	10,5	13,4	15,5	21,5	11,8	22,3	14,0	4,2	4,5
Con padres o familia origen	22,8	34,1	55,7	27,7	33,0	24,9	33,6	22,5	29,8	37,5	27,3
Con amigos/as	2,7	2,0	2,6	4,6	2,8	2,7	6,7	3,7	3,0	12,5	4,5
Detenido (ej. centro penitenciario o inserción social)											
En instituciones no detenido (ej. albergue)	2,9	5,7	4,2	13,0	11,9	5,8	7,1	4,5	8,4	2,8	9,1
En instituciones no detenido (ej. albergue)											
Otros	2,6	1,0	3,1	3,0	1,6	0,6	3,1	3,0	2,6	0,0	18,2
Otros	2,8	2,6	4,0	4,2	4,5	3,0	3,2	3,6	5,1	4,2	4,5
Alojamiento principal en 30 días previos a la admisión a tratamiento (%)											
Casas, pisos, apartamentos	91,0	91,5	89,7	74,3	78,9	89,8	85,5	86,7	80,1	87,5	68,2
Prisiones, centros internamiento											
cerrado de menores	1,9	5,1	4,1	13,0	11,7	4,9	5,4	5,4	8,1	2,8	4,5
Otras instituciones	2,6	1,3	3,5	3,3	2,3	1,5	3,4	3,8	3,2	0,0	9,1
Pensiones, hoteles, hostales	0,6	0,3	0,3	0,7	0,4	0,7	0,5	0,5	1,6	1,4	0,0
Aloj. inestables/precarios	2,8	1,5	1,7	7,5	5,3	2,5	4,9	3,3	5,1	6,9	13,6
Otros lugares	1,2	0,4	0,6	1,2	1,3	0,7	0,3	0,3	1,9	1,4	4,5
Otras sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 30 días (%)											
Opioides	4,5	3,1	2,3	10,0	22,2	8,9	1,7	10,9	17,7	4,2	0,0
Cocaína	64,0	,4	39,7	45,0	3,6	33,1	29,6	41,3	24,8	47,9	50,0
Estimulantes	4,0	5,5	9,7	1,6	3,3	5,8	7,3	2,5	,9	18,8	12,5
Hipnosedantes	8,0	4,9	5,1	15,4	13,5	0,0	7,1	16,9	14,2	6,3	12,5
Alucinógenos	0,5	1,1	1,7	0,5	0,8	0,3	4,4	0,9	0,4	0,0	0,0
Sustancias volátiles	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Cannabis	49,5	49,0	0,0	52,6	60,3	52,5	52,9	43,4	53,1	54,2	75,0
Alcohol	0,0	72,8	72,0	35,6	50,3	57,4	48,3	38,1	44,7	33,3	62,5
Otras sust. psicoactivas	0,5	0,3	0,7	0,4	0,6	1,2	1,3	2,5	0,0	2,1	0,0
Edad de inicio droga principal	18,3	20,6	15,5	21,5	20,9	29,4	22,4	29,9	27,8	20,9	19,7

## 2.1.30. (continuación)

	Alcohol	CLH Cocaína	Cannabis	Heroína	Cocaína base	Hipnosedantes	Estimulantes*	Otros opioides	Metadona	Alucinógenos	Sust. volátiles
Frecuencia de consumo de la droga principal											
Todos los días	58,9	23,3	67,9	53,2	38,9	86,0	27,8	69,1	84,3	30,3	55,0
4-6 días a la semana	6,5	13,1	5,5	5,4	12,3	2,1	11,9	2,4	1,4	10,6	10,0
2-3 días a la semana	11,1	23,9	8,0	5,9	17,7	2,8	21,5	3,7	1,2	19,7	10,0
1 día a la semana	4,0	10,1	2,2	2,3	6,1	0,8	9,0	2,1	0,7	6,1	5,0
Menos de 1 día a la semana	4,8	11,8	3,8	3,6	6,3	1,3	11,0	2,2	0,9	15,2	15,0
No consumió	14,7	17,8	12,6	29,5	18,8	7,1	18,7	20,5	11,5	18,2	5,0
Vía de administración droga principal											
Oral	99,5	2,6	1,3	0,7	0,0	98,6	22,2	39,8	85,8	26,8	4,5
Pulmonar o fumada	0,3	2,6	98,1	75,8	94,7	1,1	10,8	32,9	10,3	9,9	36,4
Intranasal o esnifada	0,2	92,9	0,5	6,3	5,0	0,0	62,8	7,6	0,9	59,2	54,5
Inyectada o parenteral	0,0	1,0	0,0	16,5	0,1	0,2	3,8	13,1	3,0	4,2	0,0
Otras	0,1	0,8	0,2	0,7	0,2	0,1	0,3	6,5	0,0	0,0	4,5
Se inyectó drogas											
Alguna vez en la vida (%)	3,4	3,8	2,3	46,1	12,6	7,4	9,9	35,3	45,5	13,2	0,0
En los últimos 12 meses (%)	0,6	1,9	0,4	22,3	3,4	1,5	6,2	17,1	9,9	7,5	0,0
En los últimos 30 días (%)	0,5	1,7	0,3	20,3	2,1	0,9	5,8	15,7	6,1	7,5	0,0
Prevalencia VIH máxima	3,2	3,8	4,3	19,1	7,4	8,2	15,6	19,2	20,4	16,7	0,0
Prevalencia Hepatitis C máxima	8,3	5,2	6,2	41,6	13,2	13,9	11,6	32,1	37,9	12,5	0,0
Prevalencia Hepatitis B máxima	2,6	1,6	1,7	5,0	2,3	1,1	2,5	9,6	8,3	0,0	0,0
Prevalencia VIH mínima	1,1	1,5	1,2	11,2	3,7	3,4	7,2	9,3	10,4	6,8	0,0
Prevalencia Hepatitis C mínima	2,9	2,0	1,7	23,7	6,3	5,6	4,7	15,6	18,4	4,1	0,0
Prevalencia Hepatitis B mínima	0,5	0,4	0,3	1,4	0,7	0,3	0,7	2,7	2,0	0,0	0,0

\* Estimulantes sin cocaína.

Notas:

- Prevalencia mínima: positivos entre el total (incluye positivos, negativos, pendientes de resultado y desconocidos).
- Prevalencia máxima: positivos entre los casos con información (incluye positivos y negativos); en Hepatitis B, portador crónico entre portador crónico más inmune, más no inmune.
- El porcentaje puede no sumar 100% debido a la existencia de casos con valores desconocidos en algunas variables.

FUENTE: OEDA. Indicador Admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.