

## Instituto Nacional de Toxicología

### Cuadro de dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas objeto de tráfico de drogas, actualmente vigente

Fecha de actualización: martes, 1 de diciembre de 2009 (revisado el 1 de agosto de 2021)

Archivo asociado: [Cuadro de dosis mínimas psicoactivas de las principales sustancias tóxicas objeto de tráfico de drogas](#)

	unidades peso	dosis habitual más baja	dosis habitual más alta	dosis media	Consumo diario estimado máximo	Dosis mínima psicoactiva	Previsión (3 a 5 días de consumo) en gramos
Heroína <sup>1</sup>	mg	50	150	100	600	0,66 mg <sup>6</sup>	3
Morfina	mg	10	80		2000	Intravenosa: 2 mg	
Metadona	mg	40	120		240	5 mg/3-4 horas	
Buprenorfina	mg			0,6	2,4	0,2 a 0,3 mg/8 h	
Dextropropoxifeno	mg			150	600	100 mg/hora	
Pentazocina	mg			60	360	50 mg/4 horas	
Fentanilo	mg			0,025	0,1	25 mg/hora	
Dihidrocodeína	mg			120	360	60	
Levoacetilmetadol	mg			180	180	60 mg/2 días	
Petidina	mg			100	300	50 mg/24 h	
Tramadol	mg			100	400	50 mg/8 h	
Cocaína HCl <sup>2</sup>	mg	100	250		1500	50 mg	7,5
Marihuana	g	1,5	2		15-20	10 mg (vía oral), 5 mg/m <sup>2</sup> de superficie	100
Haschis	g	0,3	0,5		5	10 mg (vía oral), 5 mg/m <sup>2</sup> de superficie	25
Aceite de Haschis	mg	0,03	0,06		600	10 mg (vía oral), 5 mg/m <sup>2</sup> de superficie	
LSD	mg	0,019	0,3	0,132	0,6	0,02-0,025	0,003
Anfetamina Sulfato <sup>3</sup>	mg	30	60		180	10	0,9
Anfepramona	mg			75	150	75	
Clobenzorex	mg			30	90	30	
Fenproporex	mg			10	30	10	
Metanfetamina	mg	2,5	15		60	-	0,3
Alprazolam	mg			1	10	0,25	
Triazolam	mg			1	3	0,125	
Flunitrazepam	mg	1	2		10	0,5	
Lorazepam	mg			5	15	1	
Clorazepato diK	mg			25	150	5	
MDA <sup>4</sup>	mg	20	150	80	480	20	2,4
MDMA <sup>4</sup>	mg	20	150	80	480	20-50	2,4
MDEA <sup>4</sup>	mg	20	150	80	480	20-50	2,4
Ketamina <sup>5</sup>	mg			200		30	

#### Comentarios informe INTCF 12691/03

<sup>1</sup> Dosis= peso total de las papelinillas, con droga y resto sustancias acompañantes en base a una riqueza media del 45-50% de la sustancia psicoactiva hallada en 1997-1999.

<sup>2</sup> Dosis= peso medio de las papelinillas en nuestro país en los años 1997-1999. Se estima que con ese peso se podrían hacer entre 2 y 4 rayas.

<sup>3</sup> Cantidades halladas por comprimidos en el INTCF. Los consumidores podrían llegar a tomarse entre 3 y 6 comprimidos/día.

<sup>4</sup> Dosis media aproximada neta de droga de abuso, según los comprimidos analizados en el INTCF.

#### Otros informes ampliatorios del INTCF

<sup>5</sup> Informe del INTCF de fecha 14/12/2011

<sup>6</sup> Informe del INTCF de fecha 12/01/2004